

Ταχ. lib.

8.1 - . -
77 - 90

[illegible][illegible]

En ofta nämnd litteratur


[illegible]

Seconda difficoltà

[illegible]

**THE INTER-
STATE AND
LOCAL
LAW:**

Supporting
data



PAVLI AEGINE-
TAE TOTIVS REI MEDI-
CAE LIBRI VII. AD PROFECTIONE-
M PARATI, ET BREVI SYMMA OM-
nem artem complectentes. Per ~~seipsum~~
~~autem~~ medicū Phyliscum Latina
lingua cōscripti.

Cum Indice rerum et notis non leuissimis.



Cum Casaree Maiest. Gratia et Privilegio ad decerniūm.

BASILEAE PER IOANNES HER-
VAGIOS ANNO D. M. LVI.

Chaucus



PAVLVS AEGINETA DE SEIP.

SO, AC OPERE SVO.

Pavli laborem me uides, qui plurimam
Eminentis orbis, ortus est ex Aegina.

PRAEFATIO TOTIVS OPERIS.



O n sanè quod à veteribus quid circa artis translationem
prætermisum sit, ad huius operis compositionem perue-
ni, sed compendiarie doctrinae gratia. Vice versa enim
ab illis quidem recte ac citra defectum omnia elaborata
sunt. Recentiores uero supra hoc quod neq; omnino ip-
sos attingere student, etiam garrulitatem ipsorum damnant. Quæ de cau-
sa ad hoc opus adornandum progressus sum, quod his qui ipsam, velut par-
est, habere uolent, commentarij ac monumenti usum exhibebit, mihi uero e-
xercitationis loco fuerit. Absurdum enim est, rhetoras compendiarie in-
dicialibus libellis ad professionem paratis uti, in quibus uniuersarum legu-
summa continentur ad usum expositæ: nos uero tales negligere. Et quidẽ
quam illi non ad modicum solum, sed longum etiam tempus, considerationẽ
deferre possunt, nos autem nunquam, aut ualde raro, eiusmodi facultatem
habeamus. Nam ætates in quibusdam morbis sæpenumero solitudine
requirit neutrquam differendam. Quapropter recte Hippocrati tempo-
ris occasionem præcipuam promouimus. Illos equidem in solis feri urbi-
bus negotiorum usus ardet, in quibus etiam laborum incidentia adeo co-
pia. At Medici non solum in urbibus, aut agris, aut desertis quibusdam
regionibus sed etiam in mari sæpe, in ipsi nauibus, repletis morborum
mensuris inuenerunt, in quibus dilatio moriem, aut omnino periculum extre-
mitatis inducit. Ceterum omnem medici methodum, aut omnem periculosa-
rum matrum, memoria tenere difficilissimum est, aut etiam omnino impos-
sibile: quare hoc compendium ex ueteribus collectum confeci. Neque cum
meis futuris in ipso proposui, paucis quibusdam excerptis, quæ inter artis
opera, et uidi, et experientia cognoui. Verum in pluribus præclaris uer-
satus, et maxime in Orbasio, (qui et ipse totu librari, in quo omne tuen-
da sanitatis rationem tradidit, anstus florum aliunde descripsit. Nam post
Galenum et adhuc uiciorum fuit) optima ex his delegi, nullo quantum ri-
us fieri potuit morbo prætermisso. Etenim Orbasij opus illud in septua-
ginta libros distinctum, omnem artis doctrinam in se continet. At non sa-
cile parabilis est tante molis opus, ad multos adeo uersus excentum. Epu-
tome uero compendio omnia huius tractans, ad filium Eustabium scrip-
ta, multos morbos penitus non habet, et reliquorum translationem imper-
fectam continet, ita ut iam causædam cognationis signa, quandoq; etiam si si-
ficiens curatio desit, itaq; alia quæ mentionem sui fieri possulant. At ue-
ro præsens nostrum scriptum, et signa, et causas, et curationes omnium
morborum, simularum, instrumentalium, et eorum quæ in uicioris solatio-
ne considerantur, compræhendit, nõ modo summam, sed etiam diffusi pro-

Recentiores
damnant ueteres.

172

Dilatatio pre-
sentium

Orbasio

ut res

ut res ipsa exigat. Et ante horum aggregationem, totam curandæ sanitatis ex-
acta rationem exposuimus. Postremam vero librum, de medicamentis, cum
simplicibus, cum compositis conscripsimus.

QUAE IN VII. TOTIVS OPERIS,
libris continentur.

IN primo omnem curandæ sanitatis compertis doctrinam: Et affectio-
num acutibus, remporibus, temperamentis, Et quibusdam alijs peculia-
rium praeservationem ac correctionem: Et alimentorum omnium vires ac
usus per capita expositos.

In Secundo febrium omnium doctrina habetur, præmissis his quæ ad ip-
sam conferunt, nempe ex recrementis, Et duobus indicatorijs, Et alijs si-
gnis, subiectis item symptomatis ad febres consequentibus.

In Tercio de affectionibus in locis constitutibus tractatur, initio à sum-
mo capite facto, itaque ad summos pedes, usque ad ipsos nares descendentes.

In Quarto de affectibus extrinsecus corpus impetantibus, Et velut
in propatulo constitutibus agitur, ab quidem in certis, sed in plurib. par-
tibus. In quo etiam de lumbricis, Et de acutulis dicitur.

In Quinto de venenarum insulantium plagis ac morsibus tractatur. In
quo etiam de morsu à cane rabido, Et aquæ feruientis affectu agitur. Itē
de morsu à cane non rabiente, Et de morsu ab homine. Ibidem quoque, de ve-
nens, Et anxiantibus aduersus ea medicamentis habetur.

In Sexto omnia ad chirurgiam peruenientia recensentur, tum circa cari-
nem, abī Et de ulcorum extractione agitur, tum circa ossa, In quibus etiam
de fracturis, Et luxatis sermo habetur.

In Septimo omnium medicamentorum vires continentur, primum qui-
dem simplicium, deinde vero compositorum, Et præsertim eorum quorum
in aliorum sex librorum decursu mentionem fecimus, maxime maiorum Et
compositionis appellacionem adeptorum. Neque enim placuit nobis in il-
lis sparsim omnes compositiones collocare, quo Et doctrina minus pertur-
bata esset, Et ne quis unam aliquā quatenus, aut etiam plures ex nobilibus
compositionibus, facile reperiat. Ad finem vero quedam ad componenda
medicamenta conducentia, Et succedanea inter se species referuntur. Ita ut
totus liber in doctrinam de ponderibus ac mensuris absolua-
tur. Primum igitur librum ita exor-
diatur.

Libri pri-

*Primus totius operis præfatus liber existit, in quo omnem tractanda san-
tatis rationem percurramus, acut & tam in præfatione dictum est, &
rursus per capita referetur, ubi hoc tantum antea protuleramus, quod in
primo & secundo libro plurima ex Orisasio transscripturus. Non enim
nostram sententiam producere volumus, sed ex omnibus utilitatem colliges
re. At reliquis quinque libris paucissima ex illius scriptis relata sunt.*

CAPITA PRIMI LIBRI.

De his quæ accidunt prægnantibus, & quo usque uti debeant	Cap. I	De repletione	Cap. XXXII
De nutrice	Cap. II	De ebrietate	Cap. XXXIII
De lacte nutricis	Cap. III	De his quæ cibos corrumpunt	Cap. XXXIII
Quomodo utricosum lac corrigatur	Caput III	De uenere	Cap. XXXV
Educatio pueri	Cap. V	Ad impotentes ad coitum	Caput XXXVI
De pustulis puerorum	Cap. VI	De immodico coitu	Cap. XXXVII
De fussi & grauedine pueri	Cap. VII	De feminis redundantia	Caput XXXVIII
De pruritu	Cap. VIII	De perfrigeratis	Cap. XXXIX
De dentitione	Cap. IX	De adustis à sole	Cap. XL
De Aphtha ulcere	Cap. X	De pituita in superiore uentre re- dundante	Cap. XLI
Ad formorum intertrigines	Cap. XI	Quomodoque facile uomat	Cap. XLII
Ad aurium humiditates	Cap. XII	De subducentibus aluum & urinam mouentibus in sanis	Cap. XLIII
De Striali	Cap. XIII	De insulis per clysterem	Cap. XLIII
Vicius infantum, & reliquarum æ- tatum usque ad inclinam	Cap. XIV	De glandibus	Cap. XLV
De frictione præparatoria	Caput XV	Quæ commanfa, aut moribus indi- ta ac illis, pituitam à capite du- cant	Cap. XLVI
De exercitijs	Cap. XVI	Quæ menses ducant	Cap. XLVII
De exercitiorum speciebus	Caput XVI	Sudorifica	Cap. XLVIII
De frictionum speciebus	Caput XVI	De aere	Cap. XLIX
De uocis extractio	Cap. XIX	De aquis	Cap. L
De lassitudinibus ex exercitijs	Cap. XX	De balneis	Cap. LI
De cutis adfrictione	Cap. XXI	De balneis naturalibus	Caput LI
De lassitudinibus spontaneis	Cap. XXII	De uicis temporibus anni singulis conuenienter	Cap. LII
Vicius senum	Cap. XXIII	Vicius negotiosam uitam degentis um	Caput LIII
Ad ragosum corpus	Cap. XXIII	Vicius iter facientium	Caput LV
Vt lucundum odorem spiraret corpus	Caput XXV	Vicius nauigantium	Cap. LVI
Vt recalescat habitus	Cap. XXVI	De carnium imitatione	Caput LVII
Ad colorem uitam	Cap. XXVII	Quomodo attenuatos renutrire o- portet	Cap. LVIII
Ad luores	Cap. XXVIII	Quomodo quis partes corporis at- tenuatas curare possit	Cap. LIX
Dentibus præseruandis	Caput XXX	Dignotio optimi temperamenti	Caput LX
Vt ne grauis sit auditus	Cap. XXX	Dignotio corporum distemperato- rum	
Ad caliginem oculorum	Caput XXXI		

rum	Cap. LXXI	De leguminibus	Cap. LXXXIX
De capitis formatione	Cap. LXXII	De fructibus fugacibus	Caput
Cerebri temperamenti nota	Ca-	LXXX	
put	LXXIII	De fructibus arborum	Caput
Ventriculi temperamenti nota	Ca-	LXXXI	
put	LXXIII	De animalibus, & primum de vola-	
Pulmonis dignosco	Cap. LXXV	tilibus	Cap. LXXXII
Cordis nota	Cap. LXXVI	De ovibus	Cap. LXXXIII
Hepatis temperamenti nota	Ca-	De pedescribus animalibus	Caput
put	LXXVII	LXXXIII	
Testium temperamenti dignosco	Ca-	De partibus animalium	Caput
put	LXXVIII	LXXXV	
De omiffis	Cap. LXXIX	De lacte	Cap. LXXXVI
Calidae corporis intemperiei corre-		De lactis potu	Cap. LXXXVII
ctio	Cap. LXXX	De lacte crasso	Cap. LXXXVIII
Frigidae intemperiei correctio	Ca-	De caseo	Cap. LXXXIX
put	LXXXI	De piscibus	Cap. XC
Saccae intemperiei correctio in ven-		De testaceis	Cap. XCI
ericofo, velut exempli causa. De		De mollibus	Cap. XCII
inde etiam reliquarum intempe-		De cartilagineis	Cap. XCIII
rierum	Cap. LXXXII	De cutaceis	Cap. XCIII
De alimentorum facultatibus	Ca-	De unguiculis	Cap. XCV
put	LXXXIII	De melle & aqua multa	Caput
De oleribus	Cap. LXXXIII	XCVI	
De Asparagis	Cap. LXXXV	De fomno	Cap. XCVII
De radicibus efui aptis	Ca. LXXXVI	De uigilia	Cap. XCVIII
De Tuberculis & fungis	Caput	De fopore graui	Caput
LXXXVII		XCVIX	
De frumentaceis	Cap. LXXXVIII	Dioclis epistola perferuatia	Ca. c

INDEX IN ALPHABETIC ORDER

IN PAVLVVM

APPENDIX

INDEX

[illegible]

INDEX 12

[illegible]

Melancholica	325.b	Morchopopularis	30.a	Nervus castoreus cum clypeo de aceto-	
Melancholica commodissima unde		Morbi acuti et diuturni ratio-		calum	162.b
har ratio	325	nes	33.b.34.a	Nervus castoreus, vel totus dissol-	
Melancholicum	324.a	Morbi principium quid	33.a	ditur	162.b
Melanophylla ciliis	309.a	Morbi singularem partem suspic-		Nervus motus volens	164.a
Melanotum suspensum	304.b	tiorem fibris	32.a	Nervus sensibilis	164.a
Melior quid	302.a	Morbi confecti non transmutantur		Nervus motus	164.a
Mel primum in fatis est	2.b	di	34.b	Nervorum generis candidior	32.a
Mella utra	329.a	Morificatum aut molire	197.b	Nervus densus acurabilis	78.b
Mel	329.b	Mordax	79.a	Nervus duplicatus	325.b.340.b
Mel in herules	323.b	Mordidus	149.a	Mixander poeta	191.b
Melius	377.b	Moribus acutis	196.b	Nigredinis fides	24.a
Mella esse	311.b	Moribus calidioribus et lancinantibus		Nitrum purgati	102.a
Melicoides	170.b	ita	182.a	Nitrum	102.b
et	119.b	Musculus	101.a	Nitri species	170.b
Melitrus Coribis	324.a	Musculus	147.a	Nos purgatorum afflictionem, per-	
Melospiramentum	102.b	Musum insensibile	79.a	grum	102.b
et	324.b	Mutatio promota fluxu et refluxu	112.a	Nodus confectus	106.b
Melospiren	31.a	Mutabiliter motu purgati	112.b	Nomen	142.b
Melospirorum genitalium in potestati-		Mutatio molis	67.b	Nomen aliorum dispariter, po-	
tas	119.b	Mutabiliter locorum afflictus	106.b	gnus	174.b
Membrum	124.a	Muraria	192.b	Nomen in ore	172.a
Memoria confusa	74.b	Murina	149.a	Mutabilis	164.b
Menses in utero	113.b.114.a	Muricatus morbus	192.b	Muric nobile et ponit	120.b
Mesochium purgabile, et eius tempera-		Muric	169.b	Mur phos	164.b
ta	112.b	Muric paranda modus	110.b	Murum et cerebra et cerebra	10.a
Mesochium durescit	112	Muricis	120.b	Muric fides et durescit fides red-	
Muric fides et pulvis sanatus et af-		Mutatio purgati	12.a.101.a	ditur	12.b
que durescit	62.a	Myriobolus	148.b	Mur arbor	161.b
Murica	164	Myriobolus minus	191.b	Muric regis	191.b
Murica	278.b	Myriobolus	181.b	Natru ampliatum	100.b
Muricaria	182.a	Myrica et Myrica	190.a	Natru multum, que citra per-	
Murica	112.b	Myrica	114.b	riculum accipitur	10.b
Muric purgati	112.a.b			Natru optima notione, melle,	
Murica anno castella	101.a			atque	1.b
Muricorum necem	192.b			Natru latus melle et corre-	
Muricium	148.a			ditur	62.a
Murica tris	144.b			Natru affert	74.b
Muricium	169.b.169.a			Nymphocorus	179.b
Muricium quid	169.b			Nymphopropheta	162.b
Murica barba	124.a			Nymphopet	162.a
Murum	144.b.182.a			Nymphodorus pallidus	182.a
Muricatus morbus	191.a				
Muricosis	82.a				
Muricosis in loco	119.a				
Muricosis perungit	119.b				
Muricosis suspensum	174.b				
Muricosis	102.a.101.a				
Muric	192.b				
Muricosis et durescit	112.a				
Muricosis quo citra acurabilis					
esse	197.a				
Muricosis	147.b.148.b				
Muricosis purgati	12.b				
Muric	191.b				
Muricosis diffusa	107.a				
Muric	12.a.190.b				
Muricosis et durescit	142.b				

THE

[illegible]

REFERENCES

[illegible]

[illegible]

INDEX IN ALPHABETIC ORDER

[illegible]

FINDS



De his quae accidunt pregnantibus, et quae ipsis uti debent.

CAPVT PRIMVM



VANDO QV IDEM ex his quae pregnantibus accidunt, haec Maxime ipsis diuocant, humoru crudoru redundancia, assiduum vomitus, spumatio, oris ventriculi morbus, & ciboru fastidium, commodum sane fuerit ipsis consilia praescribere. Conueniant itaq; deambulationes, cibi non valde dulces, & uini sului, odorati, quinquena, & potus moderatus. Haec enim omnia, humoru crudoru redundanciae, & uomitus, remedia sunt. At medicamentu loco, polygonum herbam aqua

*Ida potius
uoluit*

coctam bibant, & Anethum similiter, & pongiam radiem, quae uerna cula lingua Rha uocatur. Haec & post & ante cibum sumant. Fortis autem Oenanthen, & balaustiam, & mali punici florem, & sinymi comam, & corniculifemen, aut omnia haec simul, aut prout miscere uolueris, cum palmulis & uino ueteri, praecordiu campasmatidis uice impones. Ceterum oris uentriculimorbus aliuandi sunt, aquae calidae potu, & placida deambulatione, & praecordiu mollissima intectio. Cibum uero aueriantes, ad uariorum eduliorum & ad uoluptatem paratorum, itemq; amylicicelsum, inhortari oportet. Hoc autem potius his obtuleris quae terram edere cupiunt, uelut in pice appellata affectione contingere solet, quae circa tertium maxime fit impressionis mensure, quod si ferax tam non possit totum id quod pro alimentum ratione ad uterum afferriur consumere, nimirum imbecillior, ita ut ex hoc ipso uariis in stomacho superfluitates redundent. Vnde etiam uaria & absurda appetunt, uelut carbones extinctos, & cimoliam terram, & alia multa. Haec enim de causa, etiam appellatione hanc affectio ipsa adepta est, ob pice animalis uarietatem, aut quod etiam illa sepe haec afflictoe corrumpitur. Commoditatem & labores, & longiores peregrinationes. Verum quae de hac uita degere consuevit, ea ubi praegnans est, repentinis motiones non bene tolerat. Quin & acris aliquando gustare, & maxime sinapi, commodum est cibum aueriant. At uero ad pedum tumores principium est, Anthyllid em aceto maceratas alligare, & brassicae folia in latum superponere, & terram cimoliam cum aceto illinere, & alumen similiter cum aceto. Bonum est etiam molorum Medicorum, quae & citria appellantur, decoctio ex aqua pedes lauare.

Ida affectio

Ida potius

*Ida potius
citria*

De Satrix. CAPVT II

Deligenda est nutritrix nullum morbum habens, neq; ancilla ualde, neque iuuenicula. Sit autem nata minima annorum triginti quinque: nata maxima triginta quinque. Et habeat pectus magnum, & mammas magnas, & papillas neq; conuidentes, neq; auersas. Reliquum autem corpus neq; pingue sit ualde, neq; nimis tenue. Magnum uero commodum fuerit infanti, si nutritrix non ita multo ante pepererit, & praesertim masculum. Vitae porro debet nutritrix ualde siccantia, & salia, & acris, & acerba, & acida, & amara, & uehementer calfacientia, & ualde graecolentia. Itemq; insigniter iucundus odores, & condimenta, & alia acris. Abstineat etiam nutritrix huiusmodi. Et labores per manus & humeros, & molam perferat & texat. Et puerum ubi gestans circumfusa est, qui tamen iam sit trimestris aut quadrimestris.

Lactis huius
modi

I Ac optimum est, quod moderatum est crassitudine, copia, colore, odore, sapore. Quod modicum est, aut quod pollitum ungui infillat, dum ad lucem consideratur, in flectendo unguem, neque cito, neque tarde defluit. Praestat etiam sic lac probare. Infundatur lac in vas vitreum, & coaguli moderata copia immittatur, ac digitis coneratur, atque ita donec coaguletur dimittatur, ac deinde consideretur, an calci minus in ipso sit quàm feri. Tale enim lac inutile est. Contrarium vero cōcoctu difficile. Optimum verò est id quod utraq; habet moderata.

Quomodo vitiosum corrigatur. CAP. IIII.

Lactis generis
matris

I Actis vitia hoc modo corrigere oportet. Si quidem crassius fuerit, nimis cupituis extrahenda est, optimus autem est ab aceto mulso. Sed & laboribus ante cibos attenuare oportet. Commoda sunt hic sunt, & origanum, & hyssopum, & satorela, & leandix, & thymus, & raphani modici, & salsa mentum ictus, cum aceto mulso. Si vero acius fuerit ac tenuius lac, à multis laboribus nutricem levare oportet, & forbitionibus ac carnis porcinæ nutrire. Et sapam bibendam dare, ac vinum dulce. At si lac imminuat, forbitiones exhibenda sunt ac laegior vitius, & vinum dulce dandum, & pectus ac mammae confricanda. His vero etiam cucurbita medicinalis affixa commoda existit. Ceterum quod medicamenta ad lactis generationem efficacia sunt noui, non tamen assiduam ipsorum usum probō. Violentius enim colligunt. Sunt autem fœniculi radix & semen, in priscina cocta: & cythi solta in vino nigro, aut persina: & melanthium in passio, & anethum, & passinae radix ac semē. Oportet autem calida aqua prius rigata, ita exhibere. Omne vero vitiosum lac, siue crassum fuerit, siue acre, & graueolens, ubi nutritrix prius id emulserit, ita puerum admoceat: neque unquam acre ieiunio exhibent. Verum graueolentias & vinum odoratum, & cibis ieiunio das corrigere poterit. De lacte vero in casum coagulato, in tractatione de mammis libro tertio dicitur.

De lactis puri CAP. V.

Ad primum
infantis cibum

Primum alimentum recens natum infanti mel exhibere oportet. Postea vero lac perbere bis in die, aut ad summum ter. Quam autem & ipse promptus fuerit ad accipendum, & ipse exhibuerit concoctionis, tunc iam etiam cibus dandus est, qui non repleat. Si vero nobis non animaduertentibus repleti fuerint, somnolentiores statim & segniores fiunt, & tumor in ventre adeft, & flatus, & urinae sunt aquosiores. Ex quibus signis repletione deprehensa, nutritrix nihil exhibere debet, donec fuerit consumpta. Sufficit autem hactenus lac nutrire. Deinde ad cibos transgredi.

De passio puri transpuribus. CAP. VI.

Ad primum
purificandum

Quia circa cutem puero erumpunt, primum quidem patienter si me oportet. Vbi vero probe omnino eruperint, sic tam curare, ita ut ad sanationem nutritrix immittat myrtum, aut lentilem, aut rosas. Deinde rosas aut lentilem utatur, & ceram cum cerusa. Sed & nitro mollius extergat. Nam fortiora non feret. Optimum est etiam nutritricē dulciore vitius modo uti. Optimum item est & puerum ita nutrire, ut neque ipsum nimis impleat, neque rursus unde sitimem ferat linat. Quod si alius puero supprimatur, mel ad cibum assiduam simul coquito. Si vero neque sic obediat, terebinthinae electris magnitudinis adjecto. Si liquidior fuerit alius, melis maxime offerendus est.

De singulis grandis puri. CAP. VII.

Si quando tussis aut grauedo puerū uerget, mellis illitiones adhibeantur. Oportet itaque ipsam ubi multa calida aqua lauit, caput quoque multo melle illinere. Deinde linguā leniter digito comprimere. Multa enim pituitus uocatur.

De pruritis. CAP. VIII.

(metu)

Si quis pruritus puerum infestant, fomen utendum est, & unctione laeva ex oleo cocto, modica cera in ipso eliquata.

De

ADdentium quidem pueri circa septimum mensem. Contingunt autē tunc inflammationes gingivarum, maxillarum, & tendinum: & aliquando cōuulsiōnes. Tunc igitur nihil puero exhibendum est, quod manda opus habeat. Digno uero gingiuarū assidue in lauacro contrescitur, ac molliatur adipe gallinaceo, aut cerebro leporino. Prominentibus autem sarn dentibus, delicatatem mollium lanarum circumiecta urendum est, ad collum, caput, & maxillas, ita ut eodem ex oleo dulci calido irrigentur, & oleum quoque auditorijs mentibus insillatur. Tunc uero etiam uicinis luteulentiore puero dan dus est, idemq; calida lauandas. Et si quidem alui profusam habuerit, comedum est ut uenter epithematis impositis adstringatur, quo maxime fistula, cumino lanarū insperso, aut aniso, aut aplo. Bonum est & rosarum semem ammiscere: & in summa, calide reficere. Si uero nihil deorsum subeat, melle in glandulam efformato, alius leniter irriteretur: aut calamintha trita cum melle illinatur. At uerb cōuulsiōnibus puerorū maxime auxiliari uideatur helleboropii, si in aqua coquatut, & puer in hac habetut. Prodest etiam irino, aut cyperino, aut scyoni oleo uni, & in summa, calefacere. Quando uero emergentibus dentibus, & digitos mordet, & uulnerat, bonum fuerit iridis radicem rasam, & non ualde siccam, ac continere. Hoc etiam ulceribus auxiliatur. Prodest & butyrum cum melle diluū. Gingiuarum autem prurius salisamenti ueteris caro sedat.

Alui profusio
in pueris con
tusa

Conuulsiō
puerorum

Gingiuarum
pruritus

Aphtharum
puerorum

Per & alius puero, quod aphtha appellatur, modo subalbidum, modo subrubeum, quandoq; nigrum, ueluti crusta, quod pessimum est, & maxime lenale. Auxiliatur autem iris cum melle: & si siccam inflare uelis. Item rosarum folia rasa, & flos rosarum, & crocus, & myrris parū, & galla, & thus, & thuris cortex, & simul singularimq; melle excepta. Post haec, aqua mulsa, & mali punici dulcis succus.

Promerum intertrigines myrto arida, & rosas, & cypero inspergito.

A Vesum humiditate afficit lana alumine imbuta induratur uinum mulsum aut uinum uetus insillarum: aut crocus cum uino tritus.

Sirtaxis est inflammatio partium circa cerebrū & membranas ipsius. Consequitur ad hanc sincipitis exutis, itemq; oculorum, cum pallore ac siccitate corporis. Auxiliatur autem ipsa lateum qui cum rosaceo impositum sincipiti ad modum lanæ conuolutus, ita ut frequenter alteretur. Aliud ad Sirtacem. Folia helleboropii scopiari appellati, sicut puri imposito, laem cucurbitae ramenta, & cucumeris peponis pelliculam, quæ eius carnem amittit. Aut solani hortensis succum cum rosaceo.

Infantēs & à lacte amotos, in remissione ac hilaritate sinere oportet. Exercentia uero & alimenta leniter exhibere. A sexto autem & septimo anno, & pueros, & puellas, litteratoribus lenibus ac humanis tradere oportet. Hi enim cum remissione ac studio docent. At animi remissio ad bonam corporis nutritionem multam confert. Duodecimum annum egressos pueros, ad grammaticos tam ire ac geometras, & corpus exercere necesse est. Verum à decimo quarto usq; ad tres annorum septenarios, consenti exercitiis in discipulis, & in philosophicis doctrinis instruatis. Sed & exercitationes plures assumere conuenit, propter corporis robur quo & anima & corpore laborantes, ab impetu in Venem impediuntur. In his etiam uisū contrahendum est. Ceterum in uigore itacis, uicinus perfectus & anima, & corporis consenti. Quapropter exercitiis omnibus utendum est, maxime his quibus

Animi remissio
fauet utilitas

Animi
uicinus

quibus quilibet adfectus est, & alimentis sufficientibus ac probe alimentibus. A
Ac in declinante aetate, uetus & animae, & corporis remissus congruit. Nam
& exercitiis qualiacumque fuerint, pro hominum ratione subtrahenda sunt, &
alimenta sensim contrahenda, quum habitus ipsorum frigidiutis princí-
pium accipias.

De frictione preparatoria. CAP. XV.

ANte exercitiis corpus moderatè calefacere oportet, frictione perfricta
facta. Deinde per oleum fricandum est nudis manibus, donec probe ca-
luerit, & mollitiam fuerit corpus, & florido rubore rubuerit, & ad tumo-
rem perductum fuerit.

De exercitijs. CAP. XVI.

EXercitium est motus inhemens. Vehementia terminus est, respiratio-
nis mutatio ad densitudinē. Exercitiis uero preparant partes instrumentum
talem, ut ne facile offendi possint, & robustas ad actiones efficiunt. Faciunt
etiam alimentis attractionem fortiores, & alterationem promptiores, & nar-
tritionem meliorem, propter exsistentem caliditatem. Expurgant quoque
meatus, & superfluitates euacuans, propter lentum spiritus motum. Quam-
doquidem igitur distributioni alimentis opitulanteur, non oportet crudesci
ac incoolorum neque ciborum, neque humorum copias, aut in uentre, aut in
uenis contineri. Periculum enim est ne ad omnes corporis partes attraham-
tur, prius quam concocti commodi fiant. Clarum itaque est etiam ante cibos
exercitiis assumi debere. Veritas neque oportuni exercitijs temporis, ex uris-
narum colore colliguntur. Nam quae aquosa est, ante concoctum adhuc signi-
ficat distributum ex uentre humorem. Pulvis uero & biliosus, iam diu conco-
ctum esse. Noderosi autem pallida, recens factae concoctionis signum est.
Tunc igitur ad exercitiis ducere oportet, & uelice & uentris recrementis
potius detrahis.

*Exercitiis etiam
ante cibos*

De exercitijs speciebus. CAP. XVII.

OMnibus exercitijs commune hoc est, quod caliditatis augmentum ex
ipsis animantibus efficiunt. Proprium uero in singulis speciebus ite-
rit. Etenim ualidum exercitium, hoc est uolensum, musculos ac nervos ad
roborem preparat. Talia autem sunt, sedere, & maximo onere sublapo, aut in
eodem loco manere, aut paululum progredi, ac uelut deambulare. Huius
generis sunt, & per funem manibus ac pedibus nitendo ascendere, & pluri-
ma alia huiusmodi. At uero uelocia, sine robore ac uolentia sunt. Talia
sunt cursus, & umbratilis pugna, & flammae manibus decertatio, & per sol-
lem, & per magnam ac paruum pilam exercitium. Compotium autem sit
ex ualido ac ueloci. Nam quae exercitiis ualida sunt, his uelut uehementibus
ut quis poterit, si ueloces motus addat. Praeterea exercitiis alia lumbos ma-
gis quam manus aut crura exercent alia spinam, aut thoracē solum, aut pul-
monem. Exerceri autem oportet quum diu ad tumorem corpus attollitur,
& floridum existit, & quum diu motus prompti, & aequales ac concinui fi-
unt. In hoc autem & sudorem calidum uidebis uapore amixto. Tunc uo-
ro primum desinere oportet, ubi unum ex relatis fuerit alterati, ueluti uer-
bi causa, si corporis tumor contrahi uideatur, statim quiescendum est. Simi-
liter si coloris floriditas marcescat, cessandum est. Quin & si motus omni-
no remittere uideatur, statim cessandum est: & si circa sudorē mutatio ali-
qua fiat, aut in copia, aut in qualitate. Si enim minor, aut frigidior fiat, ces-
sare oportet, oleoq; cum transito de cetero recurrere. deinde reparatoria fric-
tione uti, uelut pectoris, & facere solent.

De frictione speciebus. CAP. XVIII.

Frigida dura densare, mollis solvere potest. Quare corpora ultra modum
exalta, diuiter sicanda sunt a diutius uero, molliter. Si uero moderato
corpore quis praeditus sit, clarum est quod neque molliter, neque durescit frican-
das is sit, sed quantum eius fieri potest, excessibus utrisque utatur. Etenim
multa

*Frictione
utitur*

A multa & dura frictio, corporis tumorem deprimat. Modica autem & mollis, uisit uersa in tumorem eleuat. At uero tres differentie frictionis secundum quantitatem, tribus differentiis secundum qualitatem complicata, coniugationes nouem efficiunt, uelut subiectum est. Nam una secundum quantitatem, multa uidelicet, tribus secundum qualitatem complicata, dura dico, & mollis, & moderata in duricia, tres differentias facit. Et rursus modica, si idem tribus complicata, alias tres. Moderata uero in quantitate, si idem tribus complicata, alias tres, uelut subiecta tabula ostendit.

Quantitas.		Qualitas
Multa	}	Dura
Multa		Mollis
Multa		Moderata
Modica		Dura
Modica		Mollis
Modica		Moderata
Moderata		Dura
Moderata		Mollis
Moderata		Moderata

De uocis exercitiis.

CAP. XIX.

Inter uocis exercitia iucunda ac concinna modulatio nihil ad sanitatem conducit. Verum grauiorum uocis sonus utilis est. Quare in hoc se exerceat oportet. Sic enim plurimus aer in respiratione in corpus tractus, & ibi necem & uentrem diducit, & meatus totius corporis dilatat ac dispersat. Quapropter in ipsis lectionibus redundantium humorum excretionem facit, his quidem qui maiore contentione legunt, magis, & per sudores, his uero qui lenius conuersantur, per occultam de tota corporis mole contingentem transpirationem. Contingit enim ut propter attenuationem, multarum superfluitatum quae creata reijciuntur, & sputorum, & muci, & pituitae excretio ac consumptio fiat. Proinde his qui caliditate opus habent, propter frigiditatem, quodnam aliud commodius auxilium contingere possit, quidem actio illi in transpiratione. Quare saepe legere oportet, toto corpore remisso, & eam diffusam, ita ut de industria arteriam ac reliquos spiritus transmissos, ad raritatem disperemus, & grauiores uoces sonemus. Vitandum est autem tunc exercitiis, & aditionibus, neque temere, neque inconsiderate. Ita neque quum peris ac corruptis plenis sumus humoribus, neque in magnis & manifestis stomachi cruditatibus, ad uocis exercitium deueniendum est, ut ne maior distributio corruptorum humorum ac usperum in corpus fiat.

De lassitudine exercitiis. CAP. XX.

I assiduo ulcerofo excrementorum tenuium simulq; actuum copia fit. Tenuia uero, nullam quidem memorabilem recrementum corporibus incumbere indiciunt. Verum circa musculos & neruos affectio quaedam contingit, in qua tendi sibi uidentur. Inflammatoria uero lassitudo, in qua uelut contusas aut inflammatas sentimus partes, tunc accidere solet, quam ex alio facti musculi aliquid de circumfusus sibi superfluis recrementis attraxerint. Est & alia affectio quarta, cuius generatio ex eo est, quod musculi ultra q; cohaerentificentur, adeo ut denudati corpus, appareat squalidum ac contritum, & ad motus pigrum. Curationem potius ulcerofo lassitudo habet, recrementorum discissionem, per multam ac mollem frictionem cum oleo multo, quod nullam adhesionem habet. Altera lassitudo tensura scorpum curationis habet laxationem. Laxatur autem id quod dissentum est, frictione modica simulq; molli, cum oleo uelut ex sole calente, requie tunc ac omni quiete, & balneis temperatis, & diutius in aqua calida mora. Quare si etiam his aut utriusque laetis, plus profecerit. Tertia lassitudo inflammatoria tres curationis sepos habet, superflui eius curationem, diffenti laxationem, & inflammationis refrigerationem. Oleum itaq; multum repidum,

Vocis exercitia
fracturaLassitudo
fractura
tunc

& molliſſime frictiones, & in temperata aq̃uā longiſſima mora. tales laſſitudines ſanant. Sic autem & quæ multa, & uñctiones afflictor. Quarta aſſectio in prima quidem die niſi diuerſum à prioribus poſtulat, præterquã calidiorẽ aquam, ut leniter eam confringat. In ſecunda uero die exercitio recuſatorio opus habet. Exiliam autem baſim in balneis, in frigida aqua ſolia. Omnes porro laſſi boni ſucci cibo opus habent.

De caſe afflictor. CAP. XXXI

A Diſtictio fit aut ex obſturatione, aut ex denſatione in eorum. Et obſturtio quidem fit ob coctũ aut craſſitudinẽ, craſſorum & inconcoctũ humorum. denſatio uero, aut per frigefaciẽtia, aut diſtinctiũ, aut ſiccantia. Statim autem cognõſcitur ubi ſe exuerint, ex decoloratione alba, ubi cum duricia ac denſitate corporis. In ipſa uero exercitatione, ex eo quòd difficileſcer caleſcunt. Curatio huius affectionis eſt calefactio. Inq̃ affiduis exercitiis utendum eſt, & balneis calidioribus. Mora uero in frigido ſolio non ſit diuturna, neq̃ ipſa aqua ualde frigida ſit. Vbi autem ſe induere uolent, ex aliquo moderatẽ caſſificante unguentum, uelut oleo dulci ac tenuiſſi partium. At uero denſitates cutis ſanis ſanat oleum anethinum, præſertim ſi uiride fuerit anethum, itemq̃ oleum ex populo nigra.

De laſſitudine ſpæmatici. CAP. XXXII

Q Vando quidem ob acutum recrementorum uñctum ulceroſa ſit laſſitudo, ſi quidem omnino modicus fuerit uñctus humor, exercitium ſufficit recuſatorium. Si uero maior & per profundum, talem nõ amplius ad exercitium ducemus, neq̃ omnino ad ullum motum. Verũ quieſcere ac dormire iuſſum, per totam diem in abſtinentia cibi conſeruabimus. Deinde ad uſperam pinguius uñcto, & temperata calida lota, cibum boni ſucci ac ſorbilem modicum dabimus. & neq̃ à uino ipſos prohibebimus. Vñctum enim ſemicrodos humores, ſi quid aliud, coquit. Si igitur ex reſotis ſedatum fuerit ſympagma, ad conſorta munia obeunda pro ratione homo reducatur. Si uero etiam poſtera die adhuc permanſerit, de fortiore auxilio iam conſiderandum eſt. Nam ſi uires fuerint robuſtæ, ex duobus alterum, aut utram ſecare, aut purgare conuenit, diſtinctiũ ſaſco utro magis auxiliũ opus habeat. Si uero uires debiles fuerint, uena quidem nequaquam ſecanda eſt, ſed purgatio moderatẽ faciẽda. Si uero crudi humores multi fuerint, neq̃ uena ſecetur, neq̃ purgetur, neq̃ exerceatur. Imò neq̃ omnino moueatur, neq̃ lauceat. Verũ in omni quiete ſeruetur. Et edulia & potiores ac pharmaca exhibeantur attenuantia, & ſecantia, citra maniſſtam caſſiõnem. Veſtus itaq̃ ſit ex aceto mulſo, ita ut aliquando etiam parti poſſa nã & aquæ mulſæ exhibeamus. Quando uero etiam præcordiũ omnibus talibus deuium eſt, & inſarũ, & ſi ciſe inſtantur, quicquid tandem ingeſſerint, præſtiterit aliquid piperis cum alimento dare. Melius etiam fuerit dios ſpæletico uñ medicamento, & ſimplici illo ex tribus piperis generibus coſpoſito. Sed & acetum mulſum commodiſſimum ipſis eſt. Potũ uero utantur ſimorum cremore cocto, maxime ubi exaceruẽt, & uinis leniter acidis, & euſuſis attenuantibus citra caſſiõnem: qualis eſt & capparĩa, ſi ex aceto mulſo, aut ex aceto & oleo ſumatur. At uero tendus laſſitudo, ubi citra exercitiũ ob horitur, multũ in diem indicat ſolidas animalis partes deſcendentem. Clarum autem eſt ſi ſanguinis fuerit multitudo, optimũ eſſe aut utram ſecare, aut malleolos caſſificare. Cæterũ inſſam maſſa ſpontanea laſſitudo, neq̃e paucarum horarum tarditatem ſuſtinet, nedum duorũ aut trium dierum. Statim enim febrem inducit uehementiſſimam, ſi non quis præoccupat ſanguinem detrahendo. Præſtat autem ſi id fieri poſſit, his detrache; reuẽ die, priore uſq̃ ita euacuando, ut ne animi deliquium incidat homo.

Secunda uero uice neq̃ animi deliquium uereri conuenit. Aſſi uerũ his ſecta non fuerit, bona fortuna ita affectũ opus habent ut ſeruentur.

Videtur

Spæmatici laſſitudines

Vini coſſio
rũab

Exercitiũ cito
morũ potũ

Vithesium. CAP. XXXII.

Senefus sicca est & frigida. Correctio vero eius fit per calefacientia, ac hu-
mectantia una cum calefacientibus. Oportet autem & fescere circa fissi-
tudinem. Cibum autē dare debilibus ter in die, circa horam tertiam pa-
rum panis cum melle Attico. Et postea hora septima, ubi defricti, & exerei
tisi convenientibus senescunt exercitati, & loti fuerint, primi exhibere que
aliis molliora. deinde pisores sataniculas postea in corna ea que optima
fucci sunt, & argre corrumpuntur. Nec vero prohibeo unis ex melle pra-
paratis uti, & maxime in his senibus, in quibus suscipio aliqua est genera-
tionis calculorum in thenis, aut etiam podagra. Tunc vero in ipsum in-
sciendum est petroselinum. Si vero quandoq; pituita in ventre generata,
de necessitate deligamus aliqua istam secantia, istam ad humectantem ul-
tis transire oportet. Dande vero sunt ipsi etiam maturi fici, ante reliqua ci-
bum. In hyeme autem carice, si nullum symptoma circa dextrum præcor-
dium sentiat. Quandoquidem vero serosa ac pituitosa recementa, circa
scium corpus coagulantur, mictionem quotidie petnubere oportet, &
ventrem subducere, maxime per oleum abforptum ante cibos. Clarum autē
est quod omnia oleracea ante cibos edere oportet, ex oleo & garo. Itemq;
olivas ex muria, & damascena. At alio amplius suppressa, etiam meku-
chis suis est efficax, & cicuis. facit & cerebinthina. de his autem ignan-
doq; nucis pontica magnitudinem sumere oportet, quandoq; duarum aut
unum. Est & oleum per clysterem infusum alio suppressa commodissimum.

Ad rugosum corpus. CAP. XXXIII.

Corpus erugat erui farina, uti alba amicta. Aliud smegma, quo se-
quenter corpus confricari debes. Ficus pinguis una cum bryonia tun-
dantur, & farina erui, & sepius teste ulis adijciuntur, atq; hęc modico mel-
le assillato excipiuntur.

Vithesium odorem habet corpus. CAP. XXXIV.

Quo uero facundum odorem spirit corpus, ad idem unguentum cupe-
si comam ammicere oportet siccam tusam, aut pinl coricem. Verum
eius meminisse convenit, ut mane post indutas vestes parum calis aut fa-
line degustent.

Vt modica habitus. CAP. XXXV.

Quandoquidem vero etiam habitui opulari oportet, medicamēto de-
frictorio inspersi sequei eide in balneo dam lausuruiatur. Habeat
autem id calamitum, sampuchum, hyssopum, baccas lauri, rorem mari-
num, lapidem pyritum, salem, secem uini usam, nartum, & pumice insin-
ga. Is pro canone, & parum linapi, & triphidis syluestris, & grani enedj. Ve-
rum in balneo acopo utatur calefaciente, & habet uinum balneum uetus, &
propoma ex uino mulso, pipere, & ruta, ac similibus.

Ad colorem vitiatum. CAP. XXXVII.

Corporis colorem vitiatum minuit uita hilaris, & cibis gratus. cui am-
mificare oportet radicles, & porrum, & uiride cicor. Bonum autem co-
lorem facit mali punici dulcis succus abforptus. Bonum est etiam in oleo co-
dia ductus in ipso bryonia radice. Hoc quoq; corpus erugat. Ceterum in
medicamēto defrictoria ammificare oportet paffillos factos ex farina aliqua
deigente, & ex bulbo narcissi, & bryonia radice. Bonum colorem indu-
cunt, si cui copia derui, amygdali amara & radice, & fructus, si in aqua co-
quantur, atq; hac quis pro balneo utatur.

Ad luorem. CAP. XXXVIII.

Luores oboritur in senibus prohibere oportet, cutem ipsorum crassam fa-
ciendo, ita ut non facit eladi possit, & habitum unde calidum redden-
do. Quo uero citius de cedant, sale utendum est in balneis ad denigratam
partem. Sed & spongijs raphani aut abundij decoctio im-
buta fouere prodest.

Senibus opor-
te cibis dam-Vitis ex melle
preparataTentibus
ut cibos
preparatFicus ut
lunaOleracea ante
cibos comed-
endaPropoma
paucaColorem huius
inducuntLiuorem
eradicat

Dentes con-
firmantur

Dentes non dūc edent si quis hæc faciat. Vitare oportet primum ciborum corruptiones. Vitare etiam assiduam uomitionem. Vitare quoque cibos qui dentibus non sunt commodi, sicut siccas, & mel coctum valde durum, & palmulas quæ agere teruntur, & omnia quæ glutinum habent, & quæ uix franguntur, adeo ut dentes commoueantur; & quæ dentibus sapore in ducunt, & perfrigida ac purida omnia. Oportet etiam post eorundem, dentes purgare.

Vitis grauis sit auditis. CAP. XXX.

Auditus graui-
tati conser-
uanda

Vitis ne grauis sit auditis, primum sordes in meatu expurgare oportet. Per temporis autem intervallum lima metum dropacæ insinuat in ipsum dominicare, & appressum extrahere. Nam simul & meatus expurgatio fit, & simul auditus promouetur. Postea lana ad eui magnitudinē obuoluta, meatum ad diem obturat. Et deinde ea extracta, ad dies aliquot oleo amygdali- no, aut nardino, aut chamæmedino, aut adipe asinino cum modico felle bubulo illinito. Rursus autem tempore interposito, sinapi & ficus teritis, & factum ex his collirium ad horas duas indito. Et posita hoc quidem exini- to, insundito autem oleum in asphodeli radicis cavitatē seruatactum.

Vitis ne caliginem habeant oculi. CAP. XXXI.

Oculi con-
firmantur

Vitis ne caliginem habeant oculi, quum in aquam frigidam te immergis, diutius apertis suspice. hinc enim robur uisui accedit. Nec uero lectio- nibus talem offendere oportet. Cauent autem huiusmodi crasso ac dulci, & ei- bus qui diutius super e manent, & qui agere concoquuntur, & liquidum ma- teriam generant lentam ac crassam, erucas item & porrum, & omnia quo- rum acrimonia sursum attollitur. Vitare etiam oportet decubatum superius diutius, & frigus, & uentos contrarios, & fumum, & puluerem. Ipsi au- tem oculis a quam hoc modo factam quotidie instillare conuenit. Ad men- sis & dies unius spatium, feniculi uiride in uas fictile forissecus pice obli- tum misto, & aquam pluuiatilem affundito, & postea exempto feniculo, a quam repositam seruato ac utitur.

De repletione. CAP. XXXII.

Ventriculi reple-
tio

In eis his maxime delinquitur circa repletionem. Nam etiam si uentriculus probe concoquat, uenæ tamen nimium impletæ assurgunt, distenduntur, rumpuntur, oburantur, & statu plene fiunt, & ualde grauantur. Perissi- mam autem est in morbis uenarum repletionem esse. Ac uentris repleti- o quandoque sursum euacuat id quod redundat, quandoque deorsum per lacer- sum: & in summa, debilis est repletione uenarum. Et tamen neque hæc ad- mittenda est. Verum si quis plura ingesserit, statim uomere oportet. Pericu- lum enim est ne facta concoctione impleat uenas, & hoc magis si quis assiduè circa ciborum ingestionem intemperans, nullam euacuationem exco- gitet. Vomere igitur oportet priusquam cibi corruptantur. Si uero aliqua impedimenta sint ad uomitionem, si quidem fuerit alius, saepe prodest: si ni- hil, diutius dormire, & aquam calidam frequenter bibere. Facta autem sus- ficiens concoctione, & maxime facta etiam alui egestionē, laeuare oportet, & fomenta adhibere, & siliamentum modicum edere, & potionem aquo- sam bibere. Si uero neque egeret quicquam, neque cito coqueret. Insuperque res- liquum corpus graue, & agrum ad motum, & somnolentum fuerit, & pi- grities quedam præter rationem detinuerint quoque mentem. Hæc signa sunt repletionis uenarum. Qui uero ob hæc lassitudine premuntur, his quiescere conducit, donec ea quæ in uentriculo sunt concoxerint, & pos- tea laboribus euacuant.

De detentis. CAP. XXXIII.

Ventriculi reple-
tio

Eritate detentis uomitus conuenit statim abortus. Oportet autem & largam aquam insuper bibere, itemque aquam nullam, & uomere donec quamplurima reiecerint, & morbus obstuderit. Post uomitus autem solio utendum.

utendum est, cum larga unctioue. Reliquo uero tempore quiescendum, ita ut sub tegmine dormiant longissimo tempore, donec remulencia solvatur.

De his qui cibos corrumpunt. CAP. XXXIII.

Corruptione ciborum in uentre contingente, quibus quidem subeunt corrupta, in magnum ulcicum ad finitatem habent. Quibus aut non subeant, his irritatio facienda est, per ea quæ citra molestiis subducunt. Ceterum ita affectis uomitus ante cibum conferant, ex uini potu, & dulci uino ac passio inductis. Considerandum aut ipsi est, ut nullum ni odorosum, aut graueolentem, aut omnino facile corruptioni obnoxium cibum ingerant, sed eos qui boni sacci sunt eligant. His uero qui hoc modo habent, etiam per moderata temporis intervalia uentris subducciones conferunt, per ea quæ moderate purgant.

Vini ad vomitum

De Venere. CAP. XXXV.

Ex Venere hæc commoda emergunt, repletionem carnis, corpus leue exhibet, & ad incrementum promouet, & uiriliter efficit. Circa animam uero, impediri rationationem soluit, & impotentiam iram remittit. Quare etiam melancholicos, si quod aliud, remedium commodissimum est eorum. Redigit item ad moderatiorem mentem, eos qui etiam alio modo infatuuerunt. In morbis puerilis optimum est. Quidam etiam quæ cibos auerfuerunt, ad eos accipiendos promptiores inde facti sunt. Et quidam à semihiper somnum assidua prolatione liberati sunt. Natura uero ad Venerem idoneæ sunt calidiores ac humidiores, acq. hoc magis quam alix in Venere proclius sunt. Minime uero uictus sicca, ac perfrigerata, & ætas senilis, & tempus autumnæ. Oportet itaq. uictum humidum ac calidum esse. Si uero ætas & laborum, & ciborum moderatio. Quemadmodum autem moderati labores conueniunt, sic etiam moderata Venus. Nam & ad opus exercitas, & facilitatem quandam consuetudini exhibet. Requirit autem coitus, si quicquam aliud, etiam alimendi copiam. Quare edulcia quæ multum nutriunt com-

Veneri ad incrementum

Veneri ad incrementum

modo fuerint. Ex piscibus autem polypi. Nam & alias ad Venerem irritare crebuntur, & quæcunq. mollium generis existant. Ex oleribus hominum, irio, crucea, & rapum. Et hæc uelut medicamenta. Ex leguminibus fabæ & cicer, ochra, dolichæ, pisa, supra luculentum alimentum etiam statim implent. Proinde rursus quia status concoquit ac dissipat, idcirco etiam coitus hebetat. Magnopere autem laudo botros uirarum. Humectant enim, & sanguinem flantimplent, qui sane ad Venerem impellit. Qui Venere utitur est, repletiones & cruditates uitet. Sed & lassitudines uitandæ sunt, & uomitus ac purgationes prægressæ. Similiter & alui profluuium repentinum. Nam in ueterem Venus relictæ. At uero uementes Veneris appetentias non laudo, sed tunc magis reniti uideo, & maxime eos qui morbum aliquem habent. Optimum igitur fuerit coitu uti post exercitia, & balnea, & moderatum cibum. Nam & ad robur conuenit, & perfrigerationes ab eo urgentes mitius sunt. Tempus uitem ad coitum opportunum est post cibum uelut dixi, aut somni. Obdormienti enim status sedatur lassitudo. Et hoc tempus etiam commodum est ad liberos gignendos, cum ob alias causas, tum quod mulier dormiens generatam magis continet.

Ratiocinatio

Libere gignit de optimo tempore

Ad impotentem ad coitum. CAP. XXXVI.

Præuidenda assidue ungine illinere oportet, cui pari de radice narcissi modica addita sit, quæ de enido grano, aut pyrethro, aut staphide syluestri, aut scabin eurtico, aut anisi, præhibendum aut est pipere, aut satyrium, aut crucea, aut enicurus, aut omnia simul. Edere uero oportet ante cibum, bullos rubicundos paruos assatos, cum sale & oleo aut scilla mariside parum. Sed & compositis descriptis auxiliis ad hæc utendum est. Quia & lasciuia sitis, præ sæpe legere prodest.

Coitus præparatio

De medicis coitu. CAP. XXXVII.

Quandoquidem ex frequentiore coitu, caries & frigiditas, & siccitas. & debi-

*Veneri immo-
dia* debilius sit corpus, ea quae densant nimirum, & calefaciunt, & humectant, ac corroborant, adhibere oportet. His igitur qui immodicè Venere uti sunt, convenit temperare, tēpere, quieti, somnus multus, donec corporis concitatio remissionem accipiat, & se ipsos ab imbecillitate recolligant.

De fluxu reclinando. CAP. XXXVIII.

*Excessu mi-
nuerit*

Quidam semen multum calidum coacervantes, deinde ad Venerem accedentes, ipsumque exercentes, & corpus debile habent, & stomachi exadum, & attenuantur ac resiccantur. Si vero rursus propter hæc à Venere abstineant, & capite graventur, & anxij sunt. Deinde statim per somnum semen profundentes, eadem perpetuantur. Oportet itaque nihil ex his quae semen augent exhibere, sed & cibos, & medicamenta accipere, quae ipsum corrumpunt. Et post balneum humbos illinere oleo rosaceo, melino, & omphacino. Praestat autem hæc ipsa crassiora fæsta illinere, ammixta cera, & succo aliquo ex perfrigerantibus, semperuiui videlicet, & solani, & coryledonis, & psyllij. Et his quidem per aestatem, alij autem temporibus, num alij, num laetior succo, & lini semine in aqua cocto. Nam & hoc perfrigerantem faciem facit. Sed & lamina plumbea humbibus subiecta, seminis per somnum profusionem prohibet. Et herbae frige facientes cum ruta, & summis teneris uticis uirgultis substratae idem faciunt, uticis item semen, & rursus ledantur. Vitare autem oportet ne lumbi vehementer perfrigerentur, ut neruēnes ledantur.

De perfrigendo. CAP. XXXIX.

*Perfrigendo
radicibus*

Perfrictione multa facia, ita affectos in calidis locis reclinare oportet, illitos cyprino aut irino. Posses uero ubi paululum recalcasci fuerint, datum est piper, & myrrha, cum uino dulci odorato ueteri: aut succo cyrenaius cum uino aut aceto, aut pyrethri, aut calis oriam cum aceto. Alimenta autem exhibere oportet calidius.

De radice à sole. CAP. XL.

*Perfrigendo
refrigerantia*

Adustione in sole facia, decumbere in locis qui prope perflantur conuenit proluere autem faciem, & manus, & crura aquis frigidis. Si uero sihi nexentur, bibere aquam frigidam, quibus id facere in consuetudine exersit. Atque hæc paulatim facere oportet, & non acuatim. Cibum autem accipere modicum, qui facile in corpus distribui possit, atque cum humidum magis quam solidum aut frumentaceum.

De pituita in supercilio reclinando. CAP. XLI.

*Veneri pituita
radicibus*

Siquam in aliquem inciderit, qui nutriendos cibos oblatos auerfaretur, & à cibis abstineret, & si cogeretur accipere, nauseabundus fieret, solos autem acres (si tamen & hoc faceret) admitteret, & neq; his delectaretur, sed uentre inflaretur & nauicaret, & solis rufibus paululum allevaretur, conumperet autē quandoque etiam ipsos acceptos cibos, ea corruptior neque sit in acorem: omnino cognosce summam curationis in his auxiliis licam esse, quae uentris pituitam extergere possunt. Ego itaque noui quem dum ita affectum, à radiculis cum aceto multo acceptis, crassissimæ pituitæ copiam fidem excedentem uomuisse, & euelligit penitus sanum euasisse.

Quomodo quis faciem uenit. CAP. XLII.

*Veneri facie
Rur*

Quandoquidem his qui assidue uomunt multa absurda accidere solent, commodum fuerit modos referre, per quos facile uomere dantur. Nam & pituitam euacuat, & caput allevat, & quandoque etiam prohibet, ut is qui aridius cibum accipit, cruditate non laboret, & qui uinum uberius bibit, non ledatur. Si ne igitur ea quae ingerantur, non acerbæ & sicca, sed partim dulcioris ac humidioris modi, partim acrioris. Inter hæc autē radícula laudatur, & eruca, & salsamentum uetus, & origanum uiride, & cepæ ac porri parum. Vomitus etiam promouent ex leguminibus, pisana mel ammittit, habens, & decoctum fælarum fabarum, & carnes pingues uerum ita ut non solum saccos ipsarum accipias, sed etiam totam molem deuores. Ne itaque

enica

A circa manducationem multum tempus teneas, si uomere uolueris, & omnia per cocturam mollis. Manifestum uero est quod etiam ex uinis eligenda sint dulciora. Hæc enim magis innotant. Sed & potu tepidiorum utendum est. Oportet autem & amygdalas melle tinctas edere, & placentas tunc gustare, & peponis ac cucumeris semen madefactum ac tritum cum melle accipere. Facit etiam cucumeris radix trita cum melle. Qui uero fortioribus uti uoluerit, narcissi bulbum in aqua coquens, & cum hac urinum miscens. Vominum mouet quoque linum unguentum, si quis illius ex eo digitis proritet. Ad uomitionem etiam pertinet, non remittere, neque cessare interuomendum, & os colluere, & faciem posca aut aqua abluere. Nam & dentibus confert, & caput allevat.

De subducendis, et urinum mouendis in fœt. CAP. XLII.

Veteres quidam ad sanationem satis esse putabant, quotidie euacuati per ventrem, & urinas inculpati ac sufficienter, pro ciborum ac potuum ingrossu cœpta. Esti quidem euacuationes pro ratione fieri, laudabuntur. Sin minus, optulabantur missioni quidem, per scandicem & apium, & parum, petroselinum, anisum, calamitum, origanum, ablinthium, graminis ac cardui radicem, rrysilum, adianum, in aqua cocta, ita ut decoctum cum uino biberetur. Hæc enim sanguinem per urinam purgant, & non exigua utilitatem exhibent. Verum uentri optulabantur, tunc ut nihil dantes olivæ magnitudine deuorandam dormituri. Si uero magis subducere uoluissent, de his parum ammiscerent. Commoda autem sunt ad uentris subductionem, oua sorbilia, & ex oleis bergamulæ, & cochlearum iusculum. Et fortassis hæc sufficerent. Maiorem uero vim habet mercurialis in aqua cum sale cocta, & in cibo accepta, & decoctam ipsam in potu. Et sambuci folia eodem modo. Et polypodii radicia desichmas duas salientis inspergere, aut in pituita forbere. Sed & lacus feri cum sale, aut melle, tritum aut quantum heminae mensura. Et galli ueteris iusculum, tum per se, tum cum eniel desichmis duabus. Quandoque etiam aloës ciccerum utrum magnitudinem post coenam sumere prodest. Optimum est & epithymi cum uino potum, post moderatam coenam. Qui uero uehementiore euacuatione opus habet, ueris tempore mane epithymi drachmas ex aceto mulso bibat.

De fœtibus per chylitrem. CAP. XLIII.

Cæterum in his qui aluum ægrè solubilem habent, & quorum stomachus debilis subducens per se non admittit, insula per chylitrem utendum est, pituita in intestino incumbens, his que sunt ex decocto caricæ, & betæ, & nymphi, & radice cucumeris syluestris, & melle, & oleo chamæmelino aut anethino. Si uero siccitas magis inest, his que sunt ex althæa, fœno græco, chamæmelo, & oleo ac modico melle. Et quandoque oleum per se hemina dimidie mensura immixtum, quod opus est præstat. Sed neque hoc assidue faciendum est, ne natura his aduersa, spontaneæ excretionis obliuiscatur.

De glandibus. CAP. XLV.

Vtimur & glandibus sæpe, stercoreum excretionis gratia, & in his quibus id quod per chylitrem immixtum est non excernitur. Formantur autem glandes ex sale tincto, & melle ac nitro. Sed & thymus cocto melle miscetur. Formantur etiam ex resina terbinthina, & nitro, & quandoque etiam grano enidio moderato. Excitant autem morbus. Quapropter oleo partes inungende sunt. Quin & pyrethrum aut piper ammiscetur, & consumuntur resoluta, & dissolutionibus ex frigidityte. At centaurium miscetur pici & cerato, & est commodum resolutis pudendis. In infantibus autem & salis granum inditur. Efficiuntur quoque fœcus cum nitro.

De cæcitate, et ueris uicibus in fœtibus, et in capite decet. CAP. XLVI.

Humores in capite per spuma macramus, si quis modice hoc facere uoluerimus, piper mastichæ ammiscens. Si uero amplius uacuare uoluerimus,

*Urinum mou
entia*

*Terribilior
ad euacu
supra
profficit
chylitrem
subducit
alium sub
ducens*

*Infusum per
chylitrem*

*Mixturæ
conuocant
per uentrem*

*Glandibus
subducit
in fœtibus*

maspyrethrum, aut staphidem sylvestrem mandere iubemus. Sed & ancy-
mones omnis radix, si mandaretur pteutam prouocet. & radice caparis
cortex. Serofum itaq; recememū per talia euacuat. Crallum uero & pi-
nuto sum, sinapi cum aceto multo gargarifficam euacuat: aut fapa origano
aut hyssopo in ipsa cocto. Ego autem hanc ad sinapi cum aceto multo am-
misco. Si uero cerebrū à musco expurgari opus fuerit, acerbis medica-
tis irritantes ipsum perficemus, quoniam aliqua etiam sternutationem mo-
uent. Purgat itaq; per nates anagallidis utriusq; succus, & anemones cul-
tris. & betæ. Sed & cucumeris syluestris foliorum succus naribus infundū-
tur, tum ipse per se, tum cum betarum decocto, aut succo. Verū sternuta-
tio in crudis humoribus circa thoracem & pulmonem, & caput contentis,
non conducta. At oris illitio talis est. Saponem cum betæ lacte illine cir-
ca palatum ac columellam, probe facit. Idem etiam naribus inditur. Sepe
uero usus sum paradi medicamento, melanchio naribus illito, quandoque
peridie acri aceto id macerans, deinde postera die tursus cum aceto totens,
& naribus infundens: quandoq; oleo ueteri idem melanchium tero, & simi-
liter utor. Aug. sic ipso utitur & Archigenes in narium oblatione. Priore
uero cum aceto, Crito utitur in morbo regio.

Operosa facit. CAP. XLVII.

Omnia quæ urinam eiciunt, etiam menses ducunt. radice basilicæ deco-
ctum, perfixæ radix, ruta, chrysanthemum, dictamnū, erucæ semen. Mo-
uent etiam sub diuitia ad os uteri appolita, uelut est ruta trita cum melle, aut
potri succo, aut scordium tritum appositum, aut myrrha trita ex uino, aut
leporis coagulum.

Salsifolia. CAP. XLVIII.

Ex sudorificis est chamæmelon siccum tritum oleo inspersum, ita ut cu-
tis contentis ex eo desiccentur, scisti, pyrethrum, roseti marini semen, an-
isum, similiter oleo inspersa. Nierum tatum & non ualde tenue cum oleo.
Salsi flos oleo permixtus. Succus cyrenicus aqua dilutus, ad desiccationem
corporis assumptus. & cicoris magnitudine in potu acceptus. Similiter &
calamintha cum aqua mista pota, & forinse cuti cum oleo affricta.

De aere. CAP. XLIX.

Oprimus aër est exacte purus. Talis autem fuerit, qui neq; ex stagnorū
aut paludum exhalatione, neq; ex aliquo harastro uenenosam auram
remittente turbatur. Sic autem & is qui ex aliqua cloaca magnam urbem
expurgante turbatur, malus est. Quin & qui nebulosus est, bonus non est.
Quemadmodum & qui in cauo loco undiq; montibus alio conclusus,
nullam auram admittit. Qui igitur hoc modo prauus est, omnem ætatem,
& omne temperamentum similiter ledit, quemadmodum bonus prodest.
At uero circa qualitatem differentia, caliditatem dico & frigiditatem, & sic-
citatem & humiditatem, non similiter se ad omnes habet. Nam temperatis
corporibus, temperatus aër commodus est. Intemperatis, is qui contra-
tiam temperentia habet.

De aquis. CAP. L.

Oportet etiam aquarum uisum ac uisū peritū esse. Males enim uisus sunt
aquæ præ omnibus ferè rebus alijs, ad omnem uitæ rationem. Nolle
itaq; oportet optimam aquam omnis qualitatis exortem esse, tum in sapo-
re, tum in odore. Statim autem hæc & iucundissima est bibentibus, & aspe-
ctu pura. Quum autem & de præcordijs cito secedis, ne querere quiddā me-
liorem oportet. Nam qui in præcordijs morantur, & uentrū ferunt, & in-
flant, & gignant, prauæ censendæ sunt. Neq; enim calefiunt cito, neq; per-
frigerantur tales aquæ. Sed & quæ in ipsa coquantur, tardissime ac petius co-
queuntur. Præstat itaq; experimento talem aquam indicare. Qui uero etiam
per notas cognoscere uolet, ex his quæ referentur indices. Etiam quæ ad
leptotriam conuerſe sunt, & à sole auerte, tedi transiunt sunt & incon-
cussiles.

A cociles: & calefiunt & perfrigerant tardè. Quæ uero ad orientem per
inertum aliquem, aut terram puram excolantur, celerim eiq; calefiunt, & ce
lerime perfrigerantur, eas optimas esse sperandum est. Bonæ sunt & quæ
aestate frigidiore, hyeme calidiores existant. Quidam etiam pondere pro
bant, leues meliores esse putantes. Verum hoc si cum alijs relatis est, lauda
tur: solum autem non satis est, ut si benatum aquarum signum. Leuissimæ
autem uelut Hippocrates ait, sunt pluuiæ, dulcissimæ item ac limpidiſſi
mæ & tenuissimæ, eo quod à sole id quod leuissimum ac tenuissimū est ab
ripitur. Edacip autem sol non solum ex alijs aquis, sed etiam ex mari, & ex
ceporibus. Quapropter etiam facillimè omnium putrescunt, neque ex di
uerſis qualitatibus consistunt. Nemo uero suspicetur pessimam esse aquam
quæ facile putrescit. Alterationis enim facilitas uitæui magis quàm uitio *Aqua facile*
adscribitur. Quare si aqua optimarum aquarum notas habens, facile quoq;
putrescat, optimam ipsam esse putandum est. Quam tam eni in his qui bibe
rè mutant incipit, rancidinis & infusæ, & graui uocis causâ existit. Ex ipsis
uero pluuiæ hibus aquis, æstius & cū continuo de lapsa melior est quàm pro
cellosa. Pessimæ autem sunt à glaciæ & nixæ. Nam circa aquæ congelatio,
nem, quicquid tenuioris partium est exprimitur. Bonum autē fuerit etiam
pluuiæ, & grauolentes, & eas quæ absurdas qualitates habent, per coctum
rari in melius mutare, atq; sic habere, itemq; uitio permiscere, adstringentes
quidem dulciore, reliquas autem acerbiorē. Quidam etiam colare conditi
cissimas, & salas, & bituminosas. At nullæ frigidas post cibum bibere
oportet, & neq; acruatim. Quidam uero cibos etiam ac potus inuenerunt
aduersus aquarum uitia. Et aliqui quidem cicerū decoctum præbunt, aut
etiam ipsam cicer edunt. Aliqui uero crucalidas similiter enim aliquo pisci
culo coctas & fœnitullis eodem modo. Alij uero betas & cucurbitas prius
edunt cum sale & uino diluto.

De balneo. CAP. I. I.

I Audo quidam in frigida aqua lotionem, non dico autem ipsam confer
re his qui uulgari uitia citra delectū uuant, sed solis his qui exactè ui
uant degunt, & laboribus ac cibis prout conuenit uuantur. Satis est aut ple
risq; quandoq; perfrigerari amplius opus habentibus, innare aliquando
per astatem, si iunenes fuerint & carnosī, & strictionibus prius exal elacti.
Sint autem neq; ex Venere, neq; alijs de lassitudine, neq; cruditate, aut uomi
na, neq; ueneris acuationem, aut uigilijs perpeſſi. Periculosum enim est
si quis ita simpliciter utatur. At calidum balneum optimū est & tutissimū,
lassitudines soluens, & plenitudines dilcitiens, exal elaciens, leniens, mol
liens, siccus diffundens ubi cumq; incubuerint, & somnum inducens, & car
nositatem exhibens. Est autem & apulissimum ad usum, & uirō, & femine,
& puero, & senī, & magistratum gerenti, & priuato.

De balneo naturalibus. CAP. I. II.

E X balneis naturalibus aliqua sunt nitrosa, aliqua saluginea, aliqua a
luminea, aliqua sulphurea, alia bituminosa, alia terrosa, alia ferrosa. *Balnea na*
turalia
Quedam uero ex his composita. Omnium igitur naturalium aquarum us
us est siccatorius ac calefactorius in totum, & maximè conueniunt humidis ac
frigidis, priuatum uero nitrosa, & quæ saltem habent, capiti congrua sunt, &
thoraci fluxione infectato, & stomacho humido, & hydropicis, & tumori
bus ex morbis, & puerilis. Aluminea uero sanguinis retentionibus, &
stomacho uomentis, & mulieribus quæ inordinatè purgantur, & frequenter
abortiunt. At sulphurea lenta neruos molliunt, ac calefaciunt, & dolores miti
gant, uerū stomachū effluuiant ac euertunt. Bituminosa autem caput im
plent, & sensus organa ledunt. Calefacta aut per eructationes, & saporis pro
gressu molliunt. Aeriosa uero ori, tonsillis, uicæ, & oculis insigniter cōmoda.
ferrosa autem stomacho & spleni utilia sunt. Oportet autē defectus in aquis
citra auxilium facere, quō uis ipsius remisso corpori allapsa immingatur.

Bonum est & ad anni tempora habere respectu visus ratione constitueret
 & hyeme quiddē pluribus laboribus, ut, & plura comedere, proferunt quā
 constitutio fuerit aquilonatis. Nam si austrina fuerit, laborandum quidem
 est similiter, sed pauciores cibi ac potus exhibendi sunt, & in summa, cor-
 poris liccum faciendum est penitus tempore humidioris, quomodo modum calidi-
 dius in frigido. Ederet autem oportet carnes calidas, & olea, & vinum bi-
 bere copiosius. Verum vere ingruente, alius per vomitus, alius per uenā
 enaqueat, & alius uenam secans sanguinem detrahat, prout quisque consue-
 tus & paratus fuerit. At aestate quies conducit, & laborum & alimentorum
 imminutio; & ut frigidioris modi sint cibi, & potus largo uti, & omnia fa-
 cere quae ad refrigerationem & ad humiditatem conferant. Circa autem
 num uero, quando quidem penitus est inaequalis, & inordinatus, & omni-
 genos inducit morbos, valde caute visum constitueret oportet, ita ut ne quis
 circa frigiditates delinquat, & à Venere ac frigida potione cōducitissimus
 existat. Si mane quidem frigidum aërem, in meridie uero aestuosum decli-
 net, & pomis nō nimis implicatur. Legum enim nō copia solū, sed etiam hu-
 morum visio, & quid situm indicant. Nam & optima ex ipsis, sicut & uis-
 rum hori, ita ut parum, si quis non ante alios cibos accipiat, & cibos cor-
 rumpunt. Si uero presumamus, neque infiam, neque corrumpimus. Ceterum
 frigiditate eadem aëre, pro ratione calida cere corpus oportet, & omnia fa-
 cere uelut hyeme accedens. Quin & bonum fuerit post equinoctium ena-
 cuatione aliqua ex praedictis uti, quo nihil superflui in corpore detentum,
 in hyeme fiat molestum.

Eum qui in negotiis uitam degit considerare oportet, an in priore uita
 exerceri consueverit, aut iam se exercens, moderate talem consuetudi-
 nem seruat ne aegrotet ex eo quiddā assidue probe transierit. Talem enim
 corporis naturam, ad aliam consuetudinem penitus transferre nō oportet,
 in his qui ex multo temporis interposito intervallo aegrotant. Si uero assidue
 quis egrotare uideatur, & hoc ob humorum copiam, scopus tibi super
 totam salubrem uisus rationem, quo moderatus humores habeat: Si uero
 ob humores uitiosos, quo optimos. Ex his igitur qui humorū copiam coar-
 ctauerunt, eos qui statim balneum ingreſſi sunt, postea frigiditate nix, & parum
 moueri exhortabimur. Qui uero iam talia fecerunt, paulatim etiam ipsos
 hinc augere consilietur, utrum de cibis detrahere, & parū nutriendi inge-
 reret. At eorum qui humores uitiatos coarctauerunt, non unus est scopus, quia
 neque humorum uitiosorum una species. Quidam enim frigidiores ac pituitate
 tollentes conseruant. Quidam calidiores ac biliosiores, quemadmodum alij
 ambulatorios. Abstinentiam itaque unicuique est à cibis ac potibus, qui humor-
 rem eum qui in ipsis coaceruat solet, promptē generant. Verum in omni-
 bus his commune auxilium est uentris subductio.

In professionibus facillime quis uersabitur, si uisus sit, & nō ita concen-
 tre ac pertinaciter iter faciat, insuperque aetate facilius molli, latitudinis sex
 aut septem digitorum longitudinis autem non minoris quam quinque cubi-
 torum, lumbos usque ad laterum molli tunicam circumdatus. Sed & haeculus
 commodus est ad professionem. Nam in declinibus locis praemissus, cor-
 pus pronum, quasi conico quodam sustentus. In accliuibus autē, dum quis
 ipsi innititur, motū corporis ad accliuem locum faciliorem facit. Quare
 igitur in professionibus contingens, unctio, & modica cibi alicuius assidue
 oblatio, & potus moderatus, hac hora conuenit: & post prandium ante hi-
 neris ingressum quies. Si uero quis profectici cogatur, & linat, potenter
 nutrum in aqua cum modico sale bibat. Ceterum ardores & solem uereri
 oportet, & ut ne corpus nudum soli exponatur, sed coniectum, ut ac in hi-
 nare

Anete refrigerantiam induetur. Sic enim & lassitudo minus contingit, & relaxa-
rum affectioni nulla similiter incidit. Aqua hyems frigida est, ante profe-
ctionem venire euacuato, & unctione facta, aliquem sanis multum cibi hy-
bernari, & exiguum potum sumere conuenit, & circumdare fascia longior
re non solum humo, sed bene ac probe etiam spinam ac pectus. Vbi uero
quiescit, si in tali recreatione frigus multum fiat, neq. ungi, neq. cibum, ne-
que potum capere melius est, neq. aliam quamplurimam refectonem, si quis in
eo loco permanere uelit. Post longas autem profusiones, & alios fortis la-
bores etiam si quis lassitudinē non sentiat, curare ipsum oportet ueluti sa-
lutaris. Sic enim minus molestiarum acciderit.

Visus ad potum. CAP. LVI

Vomitus qui primum nauis antribus contingunt, neq. facile, neq. uir-
le est resistere, plerumq. enim omnibus prodesse solent. Oportet autē
post uomitū non multa, neq. uulgaria edulia exhibere. Sed aut lente ut sic
ca& cocta, modicum pulegij habente, aut pane trito in uino aquoso ac odo-
rato. potu uero utendum est modico, eoq. aut uiso penitus aquoso, aut ace-
tissimo. Aut lentem coquere oportet, & ubi mollis facta fuerit, probe tere-
re, deinde siccare, atq. sic in uase sic illi componere. Si uero ad longius tem-
pus uomitus fuerit plures, uehementiore cibi fibratione utendum est, &
ipso potu modico, aut aceto multo cum aqua. thymo in ipso macerato, aut
pulegio aut aqua cum polente possint: aut uiso odorato aquoso similiter
cum polente polente. Ceterū ad molestos in nauibus odores, aut mala co-
porea olfacere oportet, aut thymum aut pulegium. Sed & quam minimum
in mare aspiciere oportet, donec ad consuetudinem perueniat quis conuer-
salonis in mari. Ad aquas item respiciendum est, ut neq. turbare, neque
gruescentes, neq. salis sint.

*Reigentem
albus
Vomitus potu
non uis
potum*

De corporis emaciatione. CAP. LVII

Quam ad immodicam carnositatem egressum fuerit corpus, eliquare
ipsum ac emaciuare oportet. Omentum autem est, quod calidior ac
siccior temperatara gracile efficit corpus. Talem igitur in crisiis inducere
conuenit, si ad moderationem reduci debent. Dificili autem quod exten-
sis aetate & acuta, & diuina atenuans, & cuiusmodi medicamenta, & animi
cura, temperantiam calidius ac siccius reddunt, & per hoc, etiam corpus
tenuescunt. Qui igitur sit uictus atenuans, manifestum est. Medicamenta ue-
ro uehementiora sunt, rursus lenia, maxime syluestris unā cum corymbis,
aristolochia rotunda, centaureum tenne, gentiana, polium, & quae ex urinis
atenuibus fortiora sunt, uelut petroselinum. Singula enim haec tum per se,
tū inter se mixta, humores attenuare ac euacuare possunt. Sed & sal ex urinis
uiperis abunde attenuat, & theriaca. discunt autem & atenuat oleum illi-
um, cui syluestris cucumeris radix sit incocsa. Itemq. althaeae ac gentianae,
& panaeis & aristolochiae radix oleo incocsa. Sed & polium & centaureū.
Oportet autem cibum non statim à balneo dare, sed ut prius dormiant per-
mittere. Praestat autem balnei aquam ex diffusoriam uim habentibus esse,
si quidem ex natura talem habeamus, qualis est aqua Mityenensis minus,
salsiorem aquae marinae ammiscere oportet. Erit uero utendum est tenui ac
albo. Quia & frictio sicca per lintea exteriora crassiora, attenuare potest.
At pro excelsiorū ratione, etiam pauciores cibos offerre oportet. prodest
& insipida carnosia. Oportet autem neq. praepotationibus ipsis uti, & me-
lius est semel tantum in die cibum capere quam & corpus fricandum est ni-
tro ac sale aspersore. Nitrum itaq. multum in balneo atenuat. Verum mo-
dicum irritamento est ad bonam corporis nutritionē. Atenuat & haec mi-
xura, piperis & petroselini duplum, asari & anisi dimidium. Haec & ad uri-
nam & ad alium ueniendam, commoda est.

Quomodo atenuat uisum oportet. CAP. LVIII

Quod resuscitare uolumus attenuatos, his uisibilibus dabimus crassum. Eulalia
b a uero

*Picatio
analis*
translucida
vero crassi fuerint, & exercitia tarda, & frictio moderatam, & in sum-
ma, omnia relictis contrariis adhibebimus. Commodum est ipsis etiam picari,
per tres aut quatuor interpolitos dies. Si vero ieiunus lauratur, ante balneum
linteis corpus delicare oportet, donec rubescat. Ex postea frictione dura,
non tamen multo, eum ipillare, quo densum ac durum efficiamus. Opor-
tet autem decoloribus & albescentibus non sensientibus iracundiam indocere,
& commotiones animales.

Quomodo quæ portat corporis dicitur curare possit. CAP. LIX.

*Calida effuso
nimis*
Qui in quibusdam partibus attenuantur, plerique ob diuturnam ipsarum
quietem, aut fracturam deligationis modum, ad hanc affectionem
deveniunt. Oportet igitur facultatem in parte ipsa corroborare, & largum
sanguinem strabere, ex moderatarum frictionum usu, & motibus conuer-
sionibus, & moderata calidæ aque affusione. Hæc autem facere oportet do-
nec pars rubicunda facta attollatur, & antea quam confidat desinere. Quin
& picationem adhibere oportet, iuxta relictos scopos. Vbi vero frigidi-
tatis sensus circa attenuatam partem fuerit, lineta, & aliquo calefactorio medi-
camento, ipsam confricare oportet. Visus autem sum aliquando thapsia, quan-
doque cum melle illinens, quandoque cum cerato.

Signis optimæ temperaturæ. CAP. LX.

*Temperati-
ssimæ
æque*
Temperatissimus est homo, ubi corpore apparuerit exacte medius inter
omnes extremitates, gracilitatem videlicet ac crassiciem, molliciem ac
duriciam, caliditatem ac frigiditatem, humiditatem ac siccitatem. Et in sum-
ma, ubi & naturales & animales actiones inculpatas habuerit. Et ubi item
medius est inter glabrum ac hirsutum, & nigrum colore ac albū. & ubi pi-
los habuerit, dum pauci essent sulcos magis quam nigros. In ætate autem vi-
gere, uisce uersa.

Signis corporum dītemperaturæ. CAP. LXI.

*Temperatu-
ræ simplici-
tatem ac dīpo-
sitionem nota*
Quiaque corpora moderato calidiora sunt, & dentes citius producunt,
& similiter augefcunt. Apparent autem tangentibus calidiora, & pin-
guitudinis minus habent. Verū colore sunt ualde rubicunda, & nigros pi-
los habent, & moderatè hirsuta sunt, & amplas uenas habent. Si uero quis
similis sit pinguis ac crassus, & uenas amplas habeat, hic propter consuetudi-
nem, non natura pinguis est. At frigidioris temperaturæ signa sunt, frī-
giditas ad conactum, glabritudo, pinguitudo. Color autem talibus unū cum
capillis fuluor est. Si uero multa est frigiditas, lividus quodammodo est, &
plumbeus. Sed & angustas uenas habent. Gracilis autem si quis sit, talis nō
est necessitate, sed ob consuetudinem factus est. Sicca uero temperies, &
durior est & gracilior quàm tēperata, & hirsuta. Duricies itaque penitus in se
parabilis est a sicca temperatura. Gracilitas autē non solum sequitur ad na-
turales temperaturas, sed etiam ad acquiritas, ex longa consuetudine factas.
Signum autem duriciæ est æger motus, & quod corpus ex siccantibus licet
cum ac squallidum reddatur. Humida temperatura in cæteris quidem si-
milis est tēperata, sed mollior ac carnosior. Et ab hac inseparabilis est mol-
licies: quemadmodum etiam crassitudo non ad naturalem solum tempera-
turam sequitur, sed etiam si ex longa quadam consuetudine constata est. Pro-
priam autem humiditatis signum, grauari corpus ab humidioribus. Cæ-
terum calida & sicca temperatura extreme hirsuta est, & capitis pilos mal-
tam augefcit, & nigros, & multos in iuuenili ætate habet. Progreffu ue-
ro temporis effusa caluities sequitur. Et uene amplæ sunt, quemadmodum
& arterie magis sunt, simulque uehementissimè pulsant. Quin & firmū, &
articulatum, & musculosum, & pinguitudinis exors est totum corpus, &
cutis dura ac nigrior. At si frigida & humida sit temperies, thorax angus-
tus est, quemadmodum & totum corpus pilis nudum. Cutis uero tenera
& alba, & pilī subtili maxime in iuuenute, & senescentes non caluescunt.
Hæc autem & timidi sunt, & minime audaces, & seigniores. Et obscuras

uenasque

Auena habent. Et crassi sunt ac pingues, & foetoribus ac masculis ambecillibus, & inarticulati. Sed & bladi sunt. Verum humiditate ac frigiditye amplius aucta, color uti cum pilis fulvus fieri uero plurimum augetur, siuidus. Calida & humida temperies, mollior & carnosior est quam optima. Si uero plurimum fuerit aucta, paruedinosa morbis propèe corrumpitur. Si uero paulo humidior, multo uero calidior fuerit, tales moderata paulo molliores sunt ac carnosiores, non paulo autem hirsutiores: sed & ad contactum non paulo calidiores. Nigri aut sunt ipsi pilis, & caro pinguitudinis exora.

Si uero frigiditye cum siccitate pariter fuerit aucta, natura durum, & graue, ac album corpus habet, & non musculosum, ac inarticulatum, & pilis nudum: ad contactum autem frigidum pinguedo tamen ipsa, etiam si graues sint, per carnem dispersa est. At capillorum & corporis color, ad frigiditye mensuram respondet. Mores animae sunt, pusillanimitas, timidi et & tristitia. Ut autem in summa dicam, in coniungentis temperantia semper qualitatibus praedominantis notae praeualebunt.

De capitis firmitate. CAP. LXII.

Paruum caput prae cerebri structura proprium signum est. Magni uero non necessarii bonae. Si enim propter insite facultatis robur, quae bonum, & multam materiam formauit, factum est, bonum signum est. Si uero propter solius materiae copiam, non bonum. Proinde distinguendum est in analogiam, & ea quae ab ipso oriuntur. Figuram quidem, si conueniens est, semper enim hoc bonum signum est. Ex his quae ab ipso oriuntur, si ualidam cernit em habet, et si quaeq; oculis optime dispositum est, & sinerosum in ipso genus uniuersum habitus ac plenus est, & firmum: & si oculi ac rem ipsam habeant. At acuminata capita, defectuosam habet circa occiput aut frontem emendatam, aut uulneris quam conuenit auctam. Plurimae igitur uelut magnum, ita etiam haec capita reprehendenda comperiemus. Raro uero & ex his aliqua bona sunt, formante facultate forti existente.

Cerebri temperantia nota. CAP. LXIII.

Temperatum cerebri animales actiones moderatas habet, itemque recrementis: & minime ab omnibus externis laedetur. Talibus capilli capitis, dum infantes sunt, suffulsi, pueris autem suffusi. Perfectis autem flui sili, modum modum inter exaeque crispas & simplices tenentes, non tamen facile calefiscunt. Si uero calidius moderato fuerit, omnia etiam circa caput, & calidiora & rubicundiora erant. Eruent oculorum sensui expositae. Capilli uero his genitis statim in capite sunt, siquidem multo fuerunt calidiores, nigri & fortes, & crispuli uero non multo, subleui primum, deinde nigrescunt, progressu autem senis calidescunt. Recrementa uero his sunt pauca, & in capite sani sunt. Repletur autem & grauatur capite, hebetate sensibus edulsi ac potioneibus, & odoribus, & forinsecus allabentibus. Tales temperaturae breui somno contentae sunt, & hoc nequaquam proficiendo. At frigidiore quam conuenit cerebri notae sunt, recrementa, plura et ea propria effluxione capilli recti, salubres durabiles, & facile a frigidis causis laeduntur, & effluxionibus ac grauedinibus uisibus compitunt. Ex oculorum uocem uisum effugiunt, & somnolentiores quodammodo existunt.

Siccioris autem cerebri notae sunt, recrementa in meatum effluxionibus nulla, & sensum sinceritas, & uigilantissimi sunt. Et capillos robustissimos, & ciliis ubi geniti sunt, producunt, crispas magis quam rectas. Breui autem caluescunt. At humidioris cerebri capilli simplices sunt, & omnino non calefiscunt. Et sensus turbulenti sunt, & recrementorum copia adeo, & somni multi ac profundi. Ceterum calido & sicco cerebro existente, recrementa liberi sunt, & sensibus integri, ac uigilantissimi: & ciliis caluescunt. Prima tamen pilorum generatio celeritima ipsa est: ac plerumque summa habent pilos nigros, & calidi sunt ad contactum capitis, & rubicundi usque ad uigoris tempus. Si uero humiditas affuerit caliditati, & perura

Capitis firmitas nota

Caput acuminatum

Cerebri temperantia nota

Cerebri temperantia nota

quidem excellunt ambamoderationem, bonus color adest, & calor: & in oculis uisus magnus. Recrementa uero plura moderatè concocta: & capilli recti & subtili, & non faciliè caluescunt. Replenitur autem & grauentur capite, è calcificationibus & humectantibus. Vbi uero ad amplius huiusmodi uiam ac caliditatem peruenierint, morbosum fit caput, & faciliè à calefacientibus ac humectantibus laeduntur. Neque uero diutius uigilare possunt. Postquam autem adormierunt, imaginationibus per somnia turbantur. Et uisus caliginosus est, & sensus non linceri. At uero frigide simulque, ex cerebri temperatura, frigidam ac decoloratam caput faciunt. Et oculorum uenae in ipsa non extant, & à frigidis causis promptè laeduntur. Quapropter etiam inaequaliter sani sunt. Sensus autè ipsi in iuuenute quidem linceri sunt & incul pabulis, uerùm progressu temporis cito marcescunt. Et in summa, omnia circa caput cito senescunt. & capilli ipsi genitici uix emungunt, atque hi macri ac folui. Porro humida ac frigida temperatura cerebri, soporosos & somnolentos efficit, & sensibus deprauatos, & recrementis abundantes, & quibus caput facile perfrigeratur ac repletur, & qui de fluxionibus ac grauedinibus faciliè corripuntur. Non tamen caluescunt tales.

Ventriculi imperfectiones. CAP. LXIII.

Ventriculi
imperfectiones
notae

Ventriculi natura siccioris nosse sumus, si cito siccatiosi fiant, & modicus ipsis potus sufficiat, & grauentur ubi ore, & fluctuationes habeant, si id quod redundat inuacuet, & edulij siccioribus gaudeant. Humidioris autem, si non siticulosi fiant, & ubiorem humorem citra molestiam ferre, & edulij gaudeant humidioribus. At calidior natura uentriculus concoquit melius quàm appetit, & magis quàm dura sunt, & difficulter alterantur. Gaudet autem calidis edulij ac potibus, neque à frigidis quicquam laeditur, si moderatus fiat ipsorum usus. Frigidior autem natura uentris, bene quidem appetit, non autem bene concoquit, & maxime edulia quae regè alterantur ac frigida sunt. Faciliè itaque in ipso accendunt. Et gaudet quidem frigidis, laeditur autem faciliè immodico eorum uso. Ceterum ex morbo effractus uentris in tempestate, in hoc differunt à naturalibus, contrariorum nimirum appetentia, non similia. Si quidem igitur probe concoquit uentriculus, temperatus est. Si uero non concoquit, inæperatus. Verum si quidem nidorosus fecerit ructus, immodicus est ipsi ac feruidus calor: Si uero acidus, uice uersa. Et qui regè concoctilia probe concoquit, corammodus est calor. Debilis autem in his est, qui haec quidem non concoquunt, pilaeque autem coquunt. Considerare autem oportet num ob aliquem humorem aliunde insitum, hoc symptoma fiat. Nam pituitosis ructus acidi sunt. Biliois autem nidorosus, uiscoli, aut peregrinae quaedam qualitates. Communia uero symptomata accidunt, nauisq. Verum si quidem prauis humores in capacitate uentris innatarint, redundant ac uomitu reijciuntur. Si uero in corpore uentris, circa umbilicis ipsius continerentur, inanibus ad uomitum nauis frustra luncinant.

Pulmonis signa. CAP. LXV.

Sunt ex
signis

Non solum uenter siticulosus & non siticulosus efficit, & frigidus ac calidus potus appetentes, sed uiscera etiam in thorace, cor & pulmo, & hepar. Et sane bibentes non statim finire cessant, & frigidus paucus potus sitim ipsorum magis silit, quàm multus calidus. Refrigerat autè ipsos etiam multus uerùm inspiratus, qui nihil alleviat ex uentre siticulosos. Sic autem & qui contrario modo affecti sunt, à frigida inspiratione sensibilibus laeduntur. Et maxime indicium hoc est frigidi pulmonis, sed & pituitam excreantes cum tussi expuant. Verum pulmonis siccitates superfusis uisibus carent, & uocè puram habent, quemadmodum humiditates obscurae & rursus uocem efficiunt, & ubi amplius aut acrius loqui uolunt, superfusitates ipsis incurrit.

Pulmonis
imperfectiones
notae

Cordis nota. CAP. LXVI.

Coris rabidioris signa sunt, respirationis magnitudo, & pulsus ueloci-

Atque ac densitas, quæ doq; audacia, ac furiosa ferocia. Est etiam ipsæ thorax hirsuta, maxime pectus, & quæ circa præcordia his propinqua sunt. Magna uero ex parte, & totum corpus calidum, nisi hepar magnopere relaxetur. Quin & thoracis amplitudo, caliditatis nota est, nisi & hic magnopere cerebrum renitatur. At frigidus cor pulsus habet moderatis minores. Et tales timidi sunt natura, ac pusillanimes, & segnes, & glabrum ipsæ pectus est. Siccus autem cor pulsus efficit durus, & animi concitationem non facilem, sed feram & ægrem sedabilem, & plerumque totum corpus siccus, si non hepar relaxetur. Humidioris autem signa sunt, pulsus molles, & mores ad iram proclives, ac faciles sedabiles, & totum corpus humidius, nisi hepar obstituerit. Calida potior ac siccæ, pulsus duri sunt & magni, & ueloces ac densi. Et respirationis magna & ueloces ac densæ. Et hi omnium maxime hirsuti sunt pectore, & circa præcordia. Verum ad actiones impigri ac animosi, & audaces ac tyrannicis moribus præditi. Nam & ad iram celeres sunt, & in ipsa peritæcia. Si uero humiditas cum caliditate præualuerit, melius quidem hi hirsuti sunt prædictis, uerum ad actiones expediti. Non tam ferus est ipsorum animus, sed solum ad iram proclius, sed & pulsus magni & molles, & ueloces ac densi. Humidioris autem ac frigidioris cordis pulsus sunt molles. Mores pusillanimes, & timidi ac pigri. Sunt autem hi pectore repulsi nudi, & minime hirsuti sunt, quemadmodum etiam ad iram non sunt proclives. At frigidum ac siccum cor, pulsus duriores ac paruos facit. Hi omnium maxime ab ira alieni sunt. Verum iram iram conseruant. Sunt autem pectore maxime omnium depiles.

Hepar temperamenti nota.

CAP. LXVII

Hepatis calidi note sunt, uenarum pluitudo, flava bilis copiosior. Temper autem algoris etiam atra. Calidior est ipsæ sanguis, & propterea etiam totum corpus, præterquam si cor relaxetur. Præcordia & uenter hirsuti sunt. Frigidioris autem note sunt, uenarum angustia, puerita copiosior, sanguis frigidior, totus corporis habitus frigidior, nisi à corde calefcat præcordia & uenter pilis nudi. Sicciioris uero, sanguis crassior est, & paucior, uenæ duræ, & uniuersus corporis habitus siccior. Humidioris autem note sunt, sanguis copiosior & humidior, uenæ molliores. Sic & totum corpus, nisi cor relaxetur. At uero calidi simulq; siccæ hepatis signa sunt, præcordium hirsutissimum, sanguis crassior simulq; paucior, & amara bilis plurima, in uigore quo ætatis etiam atra, uenarum amplitudo & durities. Sic & totum corpus calidum ac siccum. Nam caliditas ex corde proficiscens, frigiditatem ex hepate proficiscentem superare potest: quemadmodum etiam frigiditas caliditatem. At siccitatem hepatis cor humidius ad contrarium mutare non potest. Manifestum itaq; est quod ubi amborum principiorum temperata in idem concurrunt, totum corpus exacte iuxta illas afficitur. Calidum uero ac humidum hepar, minus quam calidum ac siccum, præcordia hirsuta facit. Verum plurimorum sanguinem, & uenas magnas, & ha hirsutissimum ac calidum, si non cor resistat. Si uero amplius utriusq; qualitatibus naturalem modum exserit, facile parit in uenis ac malis succi morbis tales corripuntur. & hoc adhuc magis, si plurimè uicia fuerint humiditas, paululum autem caliditas: Si uero uice uersa, modici uicia fuerint humiditas, plurimum uero caliditas, uisiosi humores minime in ipsa giugunt. Frigidus autem ac humidus hepar, præcordium depile habet, & sanguinem plurimissimum efficit, nisi cum uenarum angustia. Et totum corpus similiter frigidus ac humidus, si non à corde ad contrarium transferatur. Frigidum uero ac siccum hepar, corpus modici sanguinis, & angustarum uenarum facit, & frigidus quoq; & præcordium pilis nudum, nisi & hic cor superaret.

Tertium temperamenti dignitas.

CAP. LXVIII

Tertium temperamenti calidum, uiscerum est, & eundemq; ac masculinum

Cordis temperamenti nota.

Heparis temperamenti nota.

Uenis quædam à corde emittuntur.

*Testes dipo-
nomiterius
notis*

lorum generationi aptum, & cito genitales partes hirsutas facit, contingit autem & vicinas partes frigidius uice uersa. Et humidum quidem multum seminis est ac humidum. Siccum autem paucum ac crassum. At calida & sicca temperatura moderate, crassissima seminis est ac fecundissima, & celerime ad coitum stimulat animal statim ab initio. Tales itaque celerime hirsuti fiunt circa genitales partes, & omnes circumcirca filias, sursum usque ad umbilicum, deorsum usque ad media femora. Mulrum igitur concitata est talis temperatura ad Venereum, & celerime satiat, & si cogatur, leditur. Si uero humiditas caliditati copuleatur, hirsuti quidem minus tales sunt, sed magis femine abundantius non tamen plus quam alij appetunt, sed multa Venere minore detrimento sufficiunt. Si uero ambo & humiditas, & caliditas, multum fuerint uisita, neque sine noxa in Venere abstinere. At si humiditas se frigidum temperamento testes fuerint, partes circumcirca pilis nude sunt, & rursus Veneream agere incipiunt, & neque ad actionem proclives sunt. A quo sunt autem & tenuis est ipsa semen, & infecundum, ac foeminarum generationi aptum. Siccum autem & frigidum temperamento simile quidem est in reliquis superiori uerum crassius est ipsa semen, & omnino modicum.

De teste.

CAPYT LXIX.

*Singulari par-
tem tempera-
mentis notis*

Singulari in nobis partes propriam quandam temperiem ac uim habet, & omnium notas nunc dicere non est necessarium, quia in finem fieri sint, compendiarie doctrina hic insinuita. Quum autem de his dixerimus, quae maxime pro reliquis totam corpus sibi coadiungunt, etiam de alijs per eandem methodum rationationem facere iubemus, ita ut ex his quae excernuntur, & reliquis ipsarum actionibus ac symptomatibus, temperamenta ipsarum cognoscamus. Tempus itaque iam potest ut ad intemperierum totius corporis correctionem, sermonem conuertamus.

Calida corporis intemperiei correctio. CAP. LXX.

*Temperamen-
ti calidi cor-
rectio*

Quandoquidem in calidis intemperaturis his superat, si quidem deorsum ipsa subierit, manifestum est quod nihil moliri oportet. Si uero ad supernam uentrem feratur, per uomitus ipsam euacuae, post exercitium, ante cibum, ab accepta aqua tepida. Melius autem ab ipsis exercetur, non uelox & concitatum exercitium, sed rarius ac mollius. Quidam uero uelhermenter calidi, neque omnino opus habent, sed satis est ipsis dramulatio ac balneum. Hi autem & post cibum balneis gaudent. Qui uero cum siccitate calidi sunt, humectantia diuina opus habent, ex humectantibus edulsa, & balneis, & abstinentia exercitorum concitatorum ac multorum. Quare per astutem & citius lauentur, & rursus secunda uice post cibum. Prodest his etiam frigidae potus maxime autem contraria est siccis temperamenti Venus. Abstinere etiam ipsos oportet maxime in lassitudinibus, & ardoribus, & curis ac uigilijs. At humiditatem autem temperatam, in puerili aetate, morbis ex defluxione, & plenitudine, ac putredine corripuntur. Opus itaque exercitijs pluribus, & exactis in uenterculo concoctione, & per urinas excretionem. Quapropter si etiam ante cibum his ac ter laentur. Naturalibus autem calidis uisuntur maxime opem ferant. Sed & ea quae defluunt in corpore procurare oportet, per balnea, & exercitia multa, & per excretiones ante cibum per urinas ac uentrem facias. Nihil autem uetat & apoplegmatis, plenitudo in capite detrahentibus, aliquando & purgatiuis uti. Eadem istem boni succi, & utriusque urinae pronitantis potus.

*Temperamen-
ti humiditatis
correctio*

*Defectus in
corpore*

Frigida intemperiei correctio. CAP. LXXI.

*Temperamen-
ti frigidi cor-
rectio*

Frigidum intemperie tres sunt differentiae, quarum pessima est siccitas. Quod enim temporis progressu senescensibus contingit, hoc statim ab initio adest. Itaque humectare ipsos oportet ac calidificare. Continget autem hoc exercitijs moderatis, & alimentis humidis ac calidis, & uini calidioris potu, somno uberiore, & prouidentibus nobis, quo recrementa quae quotidie in corpore generantur, omnia excernantur. Venus autem omnia siccior

A sicciores lædit, & maxime eos qui cum siccitate frigidi sunt. Solis autem caliditas & humiditas innoxia est. Pyatæ sunt etiam frigide intemperature cum humiditate, & hæc maxime illudis morbis contrariis. Prodest autem ipsa illius, & exercitia plura, & uictus attenuatus, & unctiones moderate calidiores. Qui uero frigidiores quidem sunt natura, moderate autem habent temperamentum siccitatis ac humiditatis, eorum caliditatem excitare ac corrobore oportet, & in totius uictus ratione, quod ad humiditatem ac siccitatem attinet, id quod medium est eligere.

Sicca intemperies correptio in acrimonia, uel ut exempli causa. Distinguitur etiam in liqua

nam intemperies.

CAP. LX XII.

Sicca intemperies quædam est, ubi solide essentie similitudo corpora sic-
clora sunt, quæ etiam incurabilis est. Altera siccitas est essentie ex hu-
more compositæ. Adhæc tertia est, quæ propria humiditas ex qua partes
nutruntur, penitus perditur. Continetur autem hæc in omnibus animalis
partibus, insitit roris in ipsis dispersa. Hanc autem ipsis partibus apponere
impossibile est citra alimentum, & propterea difficilissima saltem affectionis
curatio est. Alia uero est iuxta partem arterias ac uenas consistens. Hæc siccitas
curare conuenit, ita ut singulas similes partes, ex humedante alimen-
to, propria humiditate impleamus. Balneum igitur commodum est tempe-
ratum, ægro diutius in aqua moram trahente. Post balneum uero statim lac
dandum est aluminis decoctum multum. Oportet & nielis tepidi panem la-
uamille, & postea quiescere permittere, usque ad secundum balneum. Tunc
autem fricare oportet moderate ac pigre, an exacte confectum sit dactyl
lac, ex rusticibus ac uetustis mole confectura facta. Moderati autem est, tem-
pus à primo balneo usque ad secundum, horarum æquinoctialium quatuor aut
quingenti tertio ipsum lauare uelut. Sin minus plura. Et sunt illinere ipsam
oportet oleo, antequam induantur à singulis balneis. Si quidem igitur lacte
defectetur, & à secundo balneo ipsum dabimus. Sin minus, psillanem ex-
actè coctam, aut siccam insitit psillanæ preparatam. deinde rursus quiescere
iussim, ad tertium balneum ducesimus, aut contra ad eorundem. Panis uero sic
probe preparatus, elibantes, pitrus. Obsidam autem ex piscibus petrosus
aqua degentibus quispam, aut asellus ex fure albo. Quo uictu summa
de cibo discit concorsu facili, & nutrens, minime uictus ac superflui-
tibus abundans. Potus autem sit uinum aquosum album purum, modicè
aque amissionem ferens, modice adstringens. Maxime igitur siccitatis
hæc curatio est. Verum moderate ita exquirit uictus, non habent opus, &
pleniorum dietam sufficere licet. Ponatur autem similis priori siccitas, sed
amixta sit ipsi moderata frigiditas, in hac ad calefaciendum materiam mu-
tationem faciens, & relaxis apponemus, in lactis quidem usu plus mellis.

*Temperantia
in siccitate
psilla*

*Hæc æquinoctia
balnea*

Vinum uero minus priore æquosum dabimus. Sed & ipsa edulia calidiora
danda sunt, non solum ex naturali temperantia, sed etiam à recentibus quibus-
te. Et nardinum uinguenti aut mastichinum frequenter illinendum. Quod
si frigiditas multa sit unæ cum siccitate, primum quidem affectionem grauissi-
mam esse scito, & que agere contrigi possit. Verum ipsæ uere, & per se mel-
lego ac desumato. Vinum autem elige uetustius. Optimam autem phar-
macum in talibus est id quo assidue picatores utuntur, & ex ipso trahunt il-
linere oportet, & dum adhuc calidum est auellere, prodest autem talibus o-
tiam puer carnosus condormiens, ut semper superueni uentrem edingat.

*Siccitas cum
frigiditate*

*Frictio per
macram ipsam
picato*

*Siccitas cum
caliditate
Lactis et alii*

*Caliditas cum
humiditate*

Misceatur autem consequenter ad siccitatem moderata caliditas. In hac
primum uictus dandus seruabimus, ita ut mel prolixi non gustent. Vinum
autem accipiamus minime uictusum. Edulia uero tepida, & lactosa hoc est la-
cte reposita exhibebimus, & uentre amplicius aut melius oleo illinemus.
Ceterum hos contentiosius refrigerare, periculo non uocat, quam febrili-
bus quodammodo hæc sit affectio, ubi caliditas redundat. Ponatur po-
terò rursus preualere calidam intemperiem, amixtam autem esse ipsi humi-
ditatem

ditatem. Talem intemperiem aque frigidae potu curamus. Commodus autem est adstringentium eduliorum usus. Sont & hæc citra caliditatem au-
Humida sola
Humida et
frigida
 libera. At humida intemperatura sola consistente, siccantia edulia, citra caliditatem ac frigiditatem, opulantur: & ad hæc inopia confiterorum por-
 rum. Humidae vero cum frigiditate intemperature optime medelæ sunt, acia geminata dicianur autem his etiam adstringentia, absq; hoc ut mandu-
 scite frigida claudant. Optima uero medela: & his est modicus potus, & hic ex
 uinis uehementer calefacientibus. Atq; intemperierum quidem ex qua-
 litatibus abortarum, etulom di curationes existant. Quando quidem ue-
 ro humiditas in capacitatem uentris contenta, aut in uenicis ipsius imbibita,
 intemperaturam efficit, commodum fuerit etiam de his dicere. prior itaq;
 affectio si quidem semel constitierit, per uomitus purgata facile sedatur. Si
 uero rursus ex alia quadam, aut alijs partibus influxerit, exacta cognitione
 opus habet. Curatio uero statim sequatur. Vniuersam enim curationem lo-
 co affecto adhibere oportet, prouidere autem in tantum solum, his que sus-
 cipimus, ut non facile influentia suscipiant. Id uero contingit per adstring-
 genus, & per ea que totum corpus ad bonum habitum perducunt. At ue-
 ro uisitos in uenicis uentris humores, per moderatè purgantia educimus
 quale est aloë, & medicamentum ex ipsa constans, plera confectio ab amar-
 tudine appellata. Si uero uiscosa pituita uentri fuerit infarsa, prius ipsi-
 danda sunt que hæc secant. Deinde sic purgandum. Si tamen ad hoc aptus
 sit, radicalia accepta uomat. Quod si neq; uiscosus neq; crassus fuerit hu-
 mor, sufficit etiam à pituita succo uomitus, & ab aqua multa. Bibatur etiã
 abundanti succus in aqua multa. Porro ad hanc proportionem etiam intem-
 peries in alijs partibus facias curare oportet, ita ut humoribus idoneam effu-
 sionem inuenias. Si uero neq; effusionem habeat pars sensui exposita, per
 resolutionem in uaporem euacuare oportet abundantes in ipso serolos at-
 que reliquos humores: quemadmodum etiam, si spiritus flauosus fuerit
 id quod continetur.

De alimentorum facultatibus. CAP. LXXIIL

Q Vum de alimentorum facultatibus doctrina, pars sit tractationis tuen-
 de sanitatis, iam quoq; ad prædicta de illis subiungemus, paucis qui-
 budam ante particularem de ipsis doctrinam præmissis. Nam si quid aliud,
Attenuantia
et laxantia
 alimentorum facultates nosse oportet. Que igitur attenuantem uim habet,
 transiit in carum ab oburatione liberant, & uiscosa impacta detergant,
 & crassa secant ac attenuant. Verum his qui diutius in ipsorum estu perseue-
 rant, serosas ac baliosas superfluitates congregant. Et si adhuc amplius quis
 immoretur, atrabiliaris sanguis redditur: proinde ab assiduo ipsorum usu
 abstinere oportet, & præsertim eos qui biliosus habent temperamentum.
Crassifacientia
alimenti
 Solis enim his competunt, qui pituitam, & crassum crudumq; ac uiscosum
 humorem concrauant. Que uero crassifacientem uim habent, abunde
 quidem alunt, & si in uentre ac hepate cōuenienter cocta fuerint, boni suc-
 ei sanguinem generant. Verum splenem & hepar oburant. Ex his autē ali-
 qua sunt solum crassi succi, uelut lentiscula: quædam uiscosa, uelut mala æ.
 Quibusdam ambo conigerunt, ut & crassi succi sint, & uiscosa, uelut testa
 interiecta. Securiq; itaq; est attenuans uisus ad sanitatis præseruationem, q-
 ita qui magis crassifacit. At quum potum ille nuntia, firmatq; ac robur cor-
 poribus non addit. Et oportet aliquando etiam multum nutrimentis moderatè
 exhibere, ubi quis indigentiam deprehenderit. Maxime uero citra pericu-
 lum hæc acceperint, qui exercitijs dediti sunt, & qui quantum uolunt dor-
 miunt. Omnes uero qui ante cibos se exercere non possunt, crassi succi ali-
Optima et utilia
 menta fiant, sed neq; ociosi talia alimenta admetant. Maximum autem
 malum ad sanitatis custodiam, ocium perpetuum existit quemadmodum su-
 pè modo de rationis motu maximum bonum. Que uero edulia medium, inter
Media et utilia
 crassifacientia ac attenuantia habent, omnium optima sunt, & moderatim
 compa-

A compage sanguinem generant. Tale igitur alimentum corporibus nostris
conueniens est. Nocturnum autem id quod in aliis fieri est, quod semper fuge-
re oportet. Sed & uarietas alimentorum, utare melius est, & praesertim si ex
contrarijs sunt fauētibus. Nam accepta nō conueniēter ed-coquantur.

Varietas cibo
horum ualeat

Delebitur. CAP. LXVIII.

De skribent: CAR. LXVIII.

L Actuca manifeste refrigerat & humectat. Quapropter etiam somnifera est. Quoniam vero etiam in oleribus existit, probe nutrit, & boni succi sanguinem gignit. Sed & Incubus frigidi ac humidi temperamenti est, sed minus quam lactuca. Malus refrigerat quidem, sed non manifeste magis autem humectat. Unde etiam ventrem subducit. Hoc autem etiam ob utilitatem quam in se habet. Beta exurgendo alium subducit. Quare etiam in stomachum mordet, si amplius edatur. Obscurat autem huius & solenem.

Bratifica bis cocti edunt, ventrem cohibet. Semel autem non dicitur
da, & cum oleo, garo, aut sale accepta, magis subducit quem ad modum sine
eos ipsius magis quam lentius succus purgat. Adhuc autem magis mari-
bus. *Bratifica*

THE NEW YORK CAR LIVERY

B Liliaceae, amplicia, maluae & herae planta humida est, alparagus autem siccus. Rapum autem & cinapi, radícula, nascentium, pyrethri, braffica, & alia calida, plantam siccam, alparagum autem humidum habent. At uero iraticorum plantarum alparagi, & palustris & hontensis, & qui à bryonia est, stomacho quidem commodi sunt, & urinam cunctuacram parum nutriendi. Si uero concoquantur, magis nutriunt quàm oleum alparagi. Similiter & chamaedachnes asparagus.

CAP. LXXVI

B Vniuersum quod & rapum appellatur, his coctum in cibo acceptum, non minus quàm alie plantę natat. Verum si assidue accipiat, crassum facit gignit. Bulbi adstringunt, emergunt, appetendam cibı faciant, stomachi corroborant, & ulcēsa in thorace probe educunt. Verū his cocti sunt magis, sed minus probe educit amaritudinem abiciens. Generant & semē, & Venerem stimulant in uberiore usu, flatus quoq; facili ac tormina inducunt. Qui vero cum oleo & gero eduntur, iucundissimi sunt, & flatus nō generant, & probe nutriunt, ac facile concoquantur. Pastinacę, dauci & ceteri radices, minus quàm rapa nutriunt, calidę autē & aromaticę palum sunt, & uni-

& urinam clem. Ab uenibus autem & malos succos gignant, & commu-
 ni radicum ratione egrè concoquantur. Quidam pallinacam syluestreſ dau-
 cum appellant, quæ magis urinam promouet. Radicula attenuatoris ac
 calida est facultatis. Verum ante cibum edere ipsam oportet, cum aceto
 aut garo, uenanis subducendi gratia nequaquam post cibum. Cera, allii
 & porrum, acrem uim habentia, calefaciunt corpus & attenuant, & crassos
 in ipſo humores secant. Et his cocta quidem parum nutriunt, non cocta au-
 tem, omnino non alunt. Allii tamen magis oburationes aperit, ac difficul-
 forium est. Ampeloprason sicctis est quàm porrum, utpote syluestre. In
 summa, ex oleis quæ cruda eduntur, magis uisiosum succum gignant
 quàm cocta, & amplius superfluum humiditate participant. Quæ uero ad res-
 positionem, auria aut acida auria afferuntur, stomacho commoda sunt,
 & appetentiam excitant, & crudos humores secant. Vetiù egrè concoquis-
 tur, & abutendi bus prauos succos gignant.

De liberis et frugibus. CAP. LXXVII

Tiber sic cum qui ex ipſo redditur, quid tibi exortem habet, frigidior è
 autem & crassum. Arſungi frigidi sunt, & pinguetiores, ac mali succi. Ex
 his autem bolesi sanocentiores sunt, & qualitatibus exortes, probe cocti. Ser-
 uandi ordinis sunt. Ammanita. Ceterum à reliquis frugibus abſtinendum
 est. Multi enim ex ipſis letales sunt. Sed & ipſi bolesi, si crudiores edantur,
 sæpe periculi causa existunt.

De fermentis. CAP. LXXVIII

Ex fermentis appellatis chondrus probe nutrit, & uiscosum succi ge-
 nerat. Verum lous prauus est, quoniam prompte crassescens in concor-
 ctus manet. Melior autem est succus ipſius totius probe cocti, inſtar perſa-
 nae. Alia in reliquis condro ſimilis est, magis aut aluum cohibet. Ter-
 tium coctum in cibo acceptum egrè concoquitur, & flatuosum est, si uero
 concoquatur, alimentum fortissimum exhibet. At si in panem cogatur, fla-
 tuositas & difficultatem concoctionis deponit, obfermentum & salis par-
 ticipationem. Verum ex panibus magis alii ſiliginem, deinde ſimilaceum.
 Tertio loco ex toto collatus, cui nihil furfurum decessit. Sordides autè par-
 tis minus quidem nutrit, sed magis per uentrem ſubit. Amylum parum nur-
 trit, cum etiam panis lous. Hordeum frigidum & exterioriam uim ha-
 bet, & coctum quidem uelut puſſina humidat. Tostum autem uelut in por-
 lenta ſiccatur. At polenta in æſtate antebalneum pota ex aqua ſitum ſedit.
 Panis hordeaceus ſtabilior est, & parum nutrit. Maza egrè con cor-
 quitur, & flatuoſior est quàm hordeacei panes. Verum ſi mel addatur, alui
 ſubit. Avena calida est & parum nutrit. Milium & panicum, frigida ſine
 & ſicca, & parum alunt, & uentrem ſubunt. Per omnia tamen milium pani-
 co melius est. Oryza egrè concoquitur, & parum nutrit, & alui ſubit. Pri-
 ſina ſic coquitur. Vna pars ipſius ad quindecim aquæ partes inieſtitur, ole-
 umq; moderatum amiſcetur, & poſtquàm inſa muſt, etiam acetum addi-
 tur. Vbi uero exactè cocta est, etiam ſal tenuis inditur. In quibusdam por-
 rum quoque anethum ipſi amiſcunt. Similiter autem uelut puſſina, etiam
 Avena, & chondrus coquitur.

De leguminibus. CAP. LXXIX

Ex leguminibus lenticula mali ſucci est, & arè bitemparis. Verum ipſa
 quidem, & maxime his cocta uentrem ſubit. Decoſit autem ipſius, cum
 oleo & garo potum, uentrem promouet. Ammiſcere aut oportet ipſi thym-
 bram, aut pulegiam, propter flatuoſitatem. Fabæ ſunt, flatuoſæ aut
 exſerforiæ. Faba Aegyptia noſtrate ſaba humidior est, & ſuperfluitates
 gignit. Piſum laxum quidem est, non tamen ita flatuoſum. Cicer flatuo-
 ſum est & exſerforium, & ſem en gignit, & Venerem ſtimulat, ac calculos
 atterit. Tostum uero flatuoſitatem deponit, ſed egrè concoquitur. Lupi-
 ni egrè concoquantur, & difficile aluum ſubeunt, & crudum humorem
 gignant.

A signant. Forum grecum calefacit, & ventrem promouet, si ante cibum accipiat. Ochri & phaseli pre macerati radices producant, alibi subducunt, ante cibum cum garo accepti. Ermentum magis quod fecerim grecum. At phaseli, qui etiam dolichi appellantur, si integri cum siliqua uerdes edantur, magiscrementitiam superfluitatem generant.

De fructibus fugacibus. CAPUT LXXX.

Cucurbita frige facit & humectat, & aluum subducit. Modice autem nutrit. Pepon totus quidem mali succi est, & frigidus, & humidus, & tenuior. Si uero non concoquatur, etiam choleram efficit. Semen autem ipsius urinas citat, & calculos in chonibus acribit, & in totum abunde exeret. Melo pepon minus quam pepon omnia hanc possidet. Cucumis autem seminis pepone frigidus ac humidus est, uerum magis urinam citat, & quod concoquatur, ac mali succi est, etiam si concoquatur. In summa uero omnes fugaces fructus frige faciunt, & humectant, parum nutriunt, & mali succi sunt.

De fructibus arborum. CAP. LXXXI.

Ficus & uire uelut principatum inter omnes pomorum ac autumnales fructus obtinent. Nam & minus mali succi sunt, & magis nutriunt. Ex his autem sicus meliorem succum habent, & magis alunt, & alibi subducunt, urinas citant, & rheum expurgant, praesertim ualde manent, ac ipse carit. Flauis esse autem sunt, & sanguinem non bonum signant. Quapropter etiam pediculos generant, si quis frequentius ipsis utatur. At uire si non secedit, neque concoquuntur, sed & crudum humorem generant. Si uero secedant, mo deratius sunt. Uire passae calidiores uis sunt, & stomacho commodiores, & magis nutriunt, minus autem aluum subducunt. Mora quae & syncamina, ualde humectant, perfrigerant moderate, & aluum subducunt prima accepta, & non ualde stomacho incommodant, sed parum alunt. Cera sa quae dulciora sunt, aluum subducant, sed stomacho incommoda sunt. Quae uero adstrictione participant, minus stomacho nocent, aluum autem subeunt. Eadem ratio etiam in uitis, moris, ac pluribus alijs habetur. Et in summa, quae adstringunt, prima si sumuntur in cibo aut potu, ante aliam cibum, uenitissimum. Quibus uero ob debilitatem uenter cohibetur, his si acceperint ea quae molire solent, uelut olera, aut pisces, aut huiusmodi quaedam, & postea ingesserint adstringentia, per hoc quod corroborant haec ipsam, dorsum propellunt, & ad excretionem excitant. Pini fructus, siccus appellatus, boni ac crassi succi est, & probe nutrit, non tamen facile concoquitur. Persica mali succi sunt, & accedunt ac facile corrumpuntur. Quapropter prima danda sunt, eo quod prompte subeant, & non eorum partur per moriam in uentre. Praecoxia & Rhodacena & Armena, meliora sunt Persicis. Neque enim accedunt, neque similiter corrumpuntur. Sunt autem & iucunda. Mala dulcia alia sunt calidiora, & facile in corpus distribuantur, & praesertim si assentur, aut coquantur. Acida uero frigidiora sunt, sed humores in uentre magis secat. Austera stomachum roborant, & uentrem subant. Et his adhuc magis cydonia. Pira magna ac matura, adhibe etiam magis alunt. Mala punia frige faciunt, ac parum nutriunt. Mosca & sorba magis adstringunt, & fluens aluo commodum sunt. Palmae stomacho commodant, si non ualde fuerint pingues, uerum aluum sustinent, & crassos ac uiscosos humores generant, & capitis dolorem inducunt. Olia uero drupae stomacho nocent, pinguem succum generant. Colymbades autem multum nocent, si ante cibum sumantur, appetentiam excitant, & aluum subducunt & amplius quae cum aceto & aceto melle preparantur.

Nucere regiae minus alunt quam uellanae, & magis stomacho commodant. Virides nucee humidiores sunt, & aluum subducunt. Arilleas si quis aqua materiam interna membrana denudet, consimiles ipsis uiridibus essent. Amygdala incidendi ac attenuandi uim habent. Quapropter uiscera

c & tho-

Infusa & thoracem expurgant, & adhuc magis ea quæ amara sunt. Similiter etiam *Dioscorea* passiva, & amplius hepar oburatione liberant. Damascena uenter subdugant, si ante cibum edantur cruda, & in aqua multa cocta. Scirrae *Silique* agere concoquantur, stomacho incommovent, & parum alunt. Silique *Sycamora* agere concoquantur, & aluum fistunt, & malum siccum gignunt. Sycamora *Cereus* perfrigerant & humectant manifestè. Citrei mali externa pars acris est, & difficulter concoquitur. Quæ uero uetus caro ipsius est, non tria quidè, sed & ipsa agere concoquitur. At interna pars siue acida, siue aquosa fuerit, multum frigefacit. Glandes alunt non minus quàm frumenta, & uentrum difficulter concoquantur, & crassi succi sunt, ac tardè transiunt. Castaneæ per omnia his meliora sunt.

De animalibus, & primis uolatilibus. CAP. LXXXII.

Volatilibus A Nimis uolantia alimentum minus quàm quadrupeda, & præsertim *Pyrgis* uires exhibent. Facilius autem concoquitur ipsarum caro, & magis à perdice, & attageta, & pullo columbino, & gallina ac phasianæ. Arturderum caro, & merularum, & aucularum parularum, inter quas sunt etiam pyrgi, à uariis appellati, durius est. Et his adhuc magis turturis, & palumbæ, & anatis caro. Multum autem difficiliter concoquitur, & durius ac fibrosior caro patonis est. Verum anserum & struthocamelæ caro, omnibus rebus difficilior concoquitur, & superfluitatibus abundat, exceptis alis. Hæ enim non minus quàm aliarum animum boni succi sunt. Grauem autem caro fibrosa est & dura. In summa, iuniora uolantia uentris humidiora sunt, & ciliis concoquantur, & magis alunt, ac per aluum subeunt. Cocta uero assis ac in sartagine frictis facilliter præstant. Et quæ ex siccis ac mentanis locis sunt, facilius concoquantur, & superfluitatibus carent, magis quàm ea quæ in palustribus nutriuntur.

De æst. CAP. LXXXIII.

Cuonibus Gallinarum ac phasianarum ova omnium optima sunt. Anserum autem *Volatilibus* & struthocamelorum non bona. Ex omnibus autem recentia uentris meliora sunt. Ex nemola quidam magis nutriunt. Sorbilla uero magis subeunt, & iunctum asperitates leniant. Reliqua omnia agere concoquantur, & tardè transiunt, & crassum succum gignunt, exceptis suffocatis appellatis. Hæc autem sunt cruda cum garo & uino ac oleo sabacta, & in duplo uasè moderatè cõpacta. Talla enim facile concoquantur, boni succi sunt. Pellicana autem sunt in sartagine fricta.

De pedestribus animalibus. CAP. LXXXIII.

Cornu gale E X pedestribus animalibus suilla carnes reliquis edissis magis assit, eo quod & sapore, & odore, similitudinem quandam ad humana corpora habent, uelut quidam qui per ignorantiam humanas carnes gustarant, cognouerant. Alimentum autem quod ex illis contingit uiscosum est, & non facile discitur ac transiit. Quilla caro superfluitatibus abundat, & mali succi est. Caprina uero est & mali succi. Pessima autem est hircoræ, & ad comeditionem, & ad succi bonitatem. Bobula uerbosissima est. Leporina crassi succi, sed minus quàm cõssa ac habita. Cervina dura est, & difficulter concoquitur. In summa, recentia animalia ac iuniora, humidiora sunt, & molliora, & facilius concoquantur quàm uetusta. Ita & castorea non castratis, & saginata gracilibus præstant.

De partibus animalium. CAP. LXXXV.

Tartarum E Xeremur partes neruosa sunt, & pinguis diuis exortes, & ex carnes. Et propter ea uiscosæ sunt, & parum alunt, & uentrem subducunt, exceptis uolatilium extremitatibus, propter multam siccitatem. Rostra & aures cartilaginosa sunt, & agere concoquantur. Lingua laxa est, exanguis, ac pauci alimentum. Glandulae iucundæ sunt & fratribus. Verum iucundiores sunt quæ in mamma existunt, & maxime suum, ubi plene fuerint lacte. Hæ etiam nutriunt non minus quàm carnes. Rhenes & testes uiciosi odoris ac *Asporis*

A saporis sunt, & agrè concoquuntur. Verum faginatorem gallorum testes iucundi sunt, & bonum alimentum corpori præbent quemadmodum raurorum, & hircorum, & arietum, agrè concoquuntur, & mali succi sunt. Cerebrum pinulosum est, & crassi ac mali succi, tardè transit, agrè concoquitur, stomacho incommodat, & nauseam parit si uero probe concoquatur, satis nutrit. Medulla pinguis & iucundior cerebro est, sed in reliquis similia. Pinguedo & adeps parum nutrit, & stomacho nocent. Cor & hepar crassi succi sunt, agrè concoquuntur, & tardè transeunt. Sed iuliam hepar reliquis melius est. Splen prauis succi & atrabilarius est. Pulmo facilius concoquitur uelut laxus, minus alit nutrit, & pinulosus est. Veniculus, uerus, & intestina dura sunt, & agrè concoquuntur, & pituitam generant. In summa, syluestrium animalium alimētum sic est, & minus superfluitatibus abundans quàm domesticorum. Sanguis omnis difficulter concoquitur, & præsertim crassus ac atrabilarius, qualis est bubulus: Leporinus autem uelut iucundissimus in pretio est, & multis hic mos est, ut ipsi eum coquant cum hepate. Quidam etiam cum alijs uisceribus coquunt. Aliqui & iuuenis porcelli sanguinem edunt. At caprarum sanguinem ab aliquibus edierim Homerus nouit.

De lacte.

CAP. LXXXVI.

I Acti concoquatur, nutrit quidem, sed gingiua & dentes ledit. Quare post ipsum acceptum, primum aqua mulla, deinde uino adstringente, os colluere oportet. Capitis etiam dolorem inducit, & præcordia ac uentrè inflat, & in reñibus calculos generat. Et quod quidem liquidius est, minus nutrit, sed magis aluum subducit. Crassius autem uisceris, magis nutrit, & minus subit. Moderatum autem compage caprinum est: quemadmodum sanè equum crassius. Et statim quidem post partum, tenuius est. Progressu autem temporis crassius ac deterius fit.

De lacte porci.

CAP. LXXXVII.

I Ac bibens ab alijs cibis abstinere debet, donec concoctum fuerit, & detorsum secesserit. Præstat igitur mane bibere recens mulctum, & ab ipso accepto, cibis abstinere, & tunc quoque laboribus nimis aliquid detrabere. Nam in laborantibus necesse est ipsum accipere. Quare leniter deambulare melius est, & inter in uigilantes quiescere. Sic enim lactis primum secedit, eo autem excreto, aliud bibat. Et si hoc secesserit, rursus aliud. Ab initio igitur probe purgat, non quidem ita multum de reliqua mole, sed quæ intrusæ sunt in uentre. Postea uero tam ingreditur in uenas, & optime nutrit, & non amplius per aluum secedit. At uero in biliosis fluxionibus, & in colliuationibus ad uentrem marantibus, lac coctum dare oportet. Coquere autem oportet primum leniter ac paulatim, ut ne pars quædam diffundatur pars uero consumatur. Postea uero magis ac magis coquere, cauendo ut neque ambura, neque caseum ex ipso factas. Optime uero canebis hoc, si & molliter coques, & quod moui disparatur undique derades. Mouere autem oportet ferula leui ac tenui: & si quid ad olla habita ebuliat, etiam hoc spongia repurgare. Sæpe enim hinc etiam reliquum corruptum est. Hoc igitur modo uelut dictum est, lac coquere oportet, donec a qualiter crassius ac dulcibus credo curat. Quin & per ignitos filices in lac immisos exhaustitur ac consumitur id quod in ipso est tenue ac serosum. Sed & hoc alui fluxionibus, & maxime biliosis conuenit.

De lacte asini.

CAP. LXXXVIII.

Serosa lactis pars si caseosa, uel uementiore ad ignem inulentiore ac nō fumofum coctura separatur. Deinde per colum, aut panniculum exactè excolatur. Et ad seram quidem in modum, aut accuum nullum modum, aut sal ammisceatur, & ad uentrè subducendum exhibetur, in uigore ætatis consistentibus, usque ad sextario eorum duorum mensuram. lenioribus autem, non minus sextario. Cæterum lac per ignitos filices immisos, aut

Sanguis equi

Lactis uisceris

Lactis porci ad purgandum

Lactis coctura modus

Lactis ignis

Lac fissum

per ferri immisionem crassifaciam, & ad dysenterias, & ventris fluxiones recte dari potest.

De testa. CAP. LXXXIX.

Capsulae **O**mnis capetus aeris est, & solum exaltat, & agrè concoquitur, & mali succi est, & calculos generat. Mellior autem est recens, & laxior, & mollis, & iucundus, & moderatè salis participans. Contrarius uero pessimus.

De pelago. CAP. XC.

Pisces in claustris **Q**uod omnis piscis frigidioris ac humidioris sit temperamenti, manifestum est. Verum omnibus alijs praestant petrosi appellati, ut qui facile concoquantur, & boni succi sint, & moderatè humectent, ubi non habuerint carnem duram. Verum ex non petrosis, pelagij multi praestant his qui in limo nutriuntur, aut ibi ubi flumina in mare incurrunt. Deteriores autem his sunt, qui in stagnis, & mari stagnante aluntur. At particularem Caput ubi pelagius fuerit, moderatè iucundus est, & minus agrè concoquitur, & bonum succum gignit. Verum sanguinem tenuiorem ac debiliorem generat. Similiter etiam Lupus. Sed & Mullus ipse si pelagius est, durior alijs piscibus ac firmitior est, & facile concoquitur, & alius, & iucundus est, & non pinguis.

De testaceis. CAP. XCI.

Pisces testa **P**isces qui testa integuntur, salsum & crudum humorem generant. Ex his autem ostrea mollissimam carnem habent, & magis subeunt. Champeverus, & purpura, angulus, spondyli, buccina, cochlear, & quicunque talia durioris, quae molli testa integuntur, uelut gannari, paguri, cancri, locusta, & squillae, agrè concoquantur, & nutriunt, & ventrem sistunt, si saepe in aqua dulci coquantur. Omnibus autem testaceis succus inest, qui uentrem subducit. Quare etiam coelestis tenuioribus. Atquum haec duram carnem habent, quae agrè cōcoquantur, & nutrit, ac malum succum generat, quidam iusculum per oleum ac garum condientes, ad alui subductionem ipsorum super. Carcerum Echini siue erinacei moderatè perfrigerant, & modicè alevant, & usinam eient.

De mollibus. CAP. XCII.

Mollis pisces **M**ollia piscium genera, uelut sunt, polypus, sepias, loligines, dura sunt, & agrè concoquantur, & magis polypus. Saluum autem succum modicè habent. Si uero concoquantur, modicum alimentum corpori praebent.

De cartilagineis. CAP. XCIII.

Cartilaginei pisces **E**x cartilagineo genere torpedines, & pastinaces, mollem ac iucundam carnem habent, & cito subeuntem, facilemque cōcedu, aut nutriendam. Raris uero & leuissimis, & squatis, ac huiusmodi alia, duriora sunt, & agrè concoquantur, & magis nutriunt. Nam in uniuersum animalia quae durum carnem habent, & agrè cōcoquantur, & magis alunt. Vbi uero concoquantur, multum ac solidum alimentum exhibent.

De cetaceis. CAP. XCIII.

Cetacei pisces **C**etacea uelut balenae, uisulae marinae, libellae, delphines, & magni thumi, duram & agrè concoquilem ac crassi succi carnem habent. Si uero sile afferuntur talia, moderatiora sunt. Sed & ex alijs piscibus qui humidiores sunt, & superfluitatibus abundant, etiam ad inuiscerationem magis idonei sunt. Verū in salisamenis talis est differentia, qualis est piscis ex quibus sile

De uisceribus. CAP. XCV.

Visa faculatem **Q**ui sanitati studet, eum etiam uini facultatem cognoscere oportet. Et ueni in summa, omne uinum nutrit. Verum ruber & crassum magis quidem nutrit, non autem boni succi est. Dulce uero & ipsam quidem nutrit, non autem stomacho cōmodat. Adstringens autem stomacho quidem cōmodat, agrè uero dissolvitur, & minus alit. Adhuc uero minus, albidum. Optimam autem uinum est colore fuluum. uetustius autem calidius est ac liccius, quā nouum. Haec uini facultas est in summa. At uero uinum calorem

rem qui in nobis est salutis, & propterea concoctiones meliores sunt, & singulis bonis. Alimentū autem deducit, ut quod quoquo uersus penetrat. Quapropter & ex morbus attenuator, habiores efficit. Nam & ciborū appetentia facit, & pituitam attenuat, & bilem per uenas expurgat, & bonū colore inducit, sed & animi halantatem ac incunditatem conciliat, & robur exhibet. Atque horum quidem bonorum causa est uinum moderate potum, contrariorum uero, immodicum. Et propterea ebrii mutantur, & delirant, & in grauem somnum delabuntur. Quare sagere immodicū adeo uinum oportet, quinquam longiore temporis intervallo inescipino, liberaliter bibere cooducat, purgationem enim per uenas largiam mouet, & si dolores profundit. Melius autē est adhuc etiam uomere, aqua nullā prorsum pa, ne ne minimum quidem ab ipso laedamur. Qui uero uini potationi indulget, reliquo cibo non ualde se expleat. Dum nec oporat, interm brastiam edat, & bellaria gussies, praeteritā amygdalas. Hæ autem etiam capitis dolores leuant, & uomentibus nequaquam moleste sunt. Praestat quoque abstinenti cremorem ante potationes sumere, prae omnibus enim crapulam maxime auerit. Si uero aliquis ex uino morsum percipiant, frigidā aqua bibenda est. Et posthinc rursus abstinenti cremor sumendus. Deambulationibus item ac frictionibus, & balneo, & pauciore cibo reficiantur.

De uino et aqua misce. CAP. XXVI.

Uinum
moder-

Uinum uinum

Aqua misce

Mel coctum magis nutrit quā aham subducit. Non coctum, uice uersa. Et frigidū quidem ac humidū temperantur confert, calidū autē in bilem transit. Sed & aqua nullā non ualde comoda est amara bile abundans, utpote in bilem transiens ipsa. Conducit itaque in talibus naturalis quosdam dare aquam nullā. Incommoda est & his quibus uiscera facile laeduntur. Preparare autem aquam nullā oportet, uel octupla portione aquæ ad uel amittit, atque sic coquere donec spumare desinas. Assiduè uero spumam ab ipsa auferre oportet, statim simulq; uisio orta apparet.

De somno. CAP. XXVII.

Consequens est ut post omnia de uisibus ratione relata, etiam de somno quiddam dicamus, eo quod etiam postremis omnium plerumq; admittitur. Somnus itaq; ut breuiter dicam, animalium facultatem quiescit, bona humiditas cerebrum rigante contingit. Quod si recte admittatur, multa bona facere potest. Nam & cibos concoquit, & humores excoquit, & dolores mitigat, lassitudinesq; lenit, & distensionum laxitatem efficit. Sed & animalium affectionum obtinuationem inducere potest, & emouentis rationē corrigere. Tempus somni optimū est post cibum. Sed diurnus non omnibus commodus est. Non enim sufficit ad perfectam ciborum concoctionem id tempus in quo dormiant. Interrupta autem ante tempus concoctionis, ex meridie surgentes sepe ructum acidum habent, sepe etiam flatibus implentur. Quidam enim fluctuationes habent, nili aut ob consuetudinem, aut quod sufficienter dormierint, hæc ipsis non sunt. Optimi uero sunt somni nocturni. Ex natura enim noctis humiditas, & quies, ad somnum procliu, concoctionem perfectam efficit. Nam post nocturnos somnos, maxime ad excretionē festinamus. Terminus igitur temporis somni sit, ciborū perfectā concoctio, quæ est ex ructibus, et uentris contractione cognoscitur. post quæ neq; uigiliæ inuiles sunt, recrementorū ex concoctione segetibus efficiētes.

De uigiliis. CAP. XXVIII.

Somnus est
quæ facilius
sunt animalia

Vigilia ob eff
dum est
moder

Vigilia quæ in aegrotantibus sunt, aut ob dolorem, aut ob febrem, aut symptoma aliquod acutum sunt, curationē in tractatione febrium habebant. Verum nunc de sanorum uigiliis dicendum est. Si igitur aut tristitiam, aut curam, aut aliquam animalem affectionem uigilant, primi quidem tristitiam, & id quod molestum est, quantum eius fieri potest, recedemus, postea etiam iucundorum sonorum auditu, cogitationē ab illis abducemus. Et quidam sanæ sonum aque placidam ad hoc machinantur, quod

c 3 declinat

delinunt ad fomnum deducuntur. Sed & balneis maxime uespertinis, ubi probe decoxerint, utantur, & uestis humectant, uelut lactuca & similibus. Et papaueris nigri quandoque folia uirida obsonis ammiccant. Et piores concoctus faciles edant, uisnoq; uberiores, tenos, non uestulo utantur. Vbi ne ro inclinati uolunt, rola ceo caput ungant, aut oleo in quo papaueris caprea aut mandragoras infusa sint. Quin & anethorum oleum non uestulum ex fomnicis est. Noui & post pregressam lassitudinem, quietem deperisse succedentem fomnum induxisse. Sed & coitus moderatus idem hoc efficit. Alii si aut caput aut pedes perfrigerentur, facile in fomnum delabuntur. Si uero ob multitudinem, aut ualidiam cibi, stomacho grauius uigilant, nam & hoc factum esse nouimus: quemadmodum rursus alij praeter consuetudinem a cibo abstinentes, aut modicum cibum capientes uigilant: considerare hoc, & causam recte oportet.

De super gran. CAP. XCIX.

Super pro-
fusio

At si uice uersa in profundum ac alium fomnum delabuntur, à frequentibus balneis ipsos arce bimus, & à perfrigerant inunctione. Apophlegmasitica autem pueritiam per os detrahentibus utemur. Et in fomna, ad calidiorum ac sicciorum & modicam uictus rationem ipsos transferemus, quam hanc affectio à frigidiore magna ex parte, & humidior materia ceteram perfringente, oboritur.

Diocles epistola praefatus. CAP. C.

DIOCLEES ANTIGONO REGI PALTEN.

Antiqui regi
praefatus

Quando quidem cōsigit tibi, ut omnium regum maximus Medicus sis, & plurimo tempore uixeris, omninoq; philosophis peritus sis, & in mathematicis disciplinis primas teneas: arbitrans sum eam philosophiae partem, quae de sanitate tuenda tractat, regiam esse, & adieci prius in peritioribus praescriptis tibi, unde morbi hominibus oriuntur, & quibus praecedentibus signis, & quomodo quis ipsis optulari possit. Nam neque temper

siue

has unquam in caelo consilii poteris, non praecedentibus signis quibusdam, quae nautae, ac reliqui multi experiri homines sequuntur: neq; affectio in hominis natura unquam consilii poteris, non signo aliquo praecedente. Tu uero his quae à nobis dicuntur persuasus, certitudinem ipsorum assequere.

Humor corporis
re partu IIII

Humoris corpus in quatuor partes diuidimus, caput, thoracem, uentrem, uiscera. Quam igitur affectio circa caput diuisa natura est, uentigo praesignificari solet, & capitis dolor, & in supercilijs grauitas, aut uisus, temporum pulsationes, oculi mane uident, cum uisus hebetatione, nihil ostendunt, & dentium gingivae amolluntur. Quum itaq; huiusmodi quippiam praesignat, caput purgare oportet, nullo quidem medicamento, sed hyssopo aut origani capitis bus acceptis, tritis, ac in colla cum passis aut sapis hemina dimidia seractis. Hoc ieiunius sorbens os eo collat, & gargarizando humores detrahe. Hoc curatio non est alta leuor in affectionibus circa caput. Optimum est & sinapi aqua multa calida dilutum. Hoc ieiunius sorbens gargarissa, & humores detrahe. Ceterum caput coniectum ptyalaceo re oportet, quo liquata penita facit effluxioni obedit. Qui uero ista signa negligunt, his hi morbi succedere solent, lippitudines, glaucomata oculos, rum, aures rumpuntur, sinum in collo sunt, cerebri corruptio, grauedo, angina, capitis ulcuscula manantia a chores appellati, terebines, una, capulorum defluxio, capitis ulceratio, dentium dolor.

Thoracis uer
boni praefatus

At ubi circa thoracem quid sanum est, ex his aliquid praesignificare solet. Sudor contingit per totum corpus ac thoracem, linguam crassam habent, saliva uis amara, aut huiusmodi sputa, sub costis aut scapulis dolores sunt circa ocellationem, huiusmodi oris stilidui, angilia, suffocationes, siccitas, ex fomno animus tristis, perfrigerationes pectoris & brachiorum, manuum tremor. His autem hoc modo praedenter auxiliari oportet. Vomitus si quisquam optime à coena abque repletionem

*A*stione, siue medicamento. Commodi sunt & reuani uomitus, quos aliqui uocant syrmaſinas. Oportet autē eum qui ita uomere uolet, radicula tenuis praefumere, naſturtium, enſeas, ſinapi, portulacā, atq; deinde accepta aqua tepida, sic uomere. Qui uero talia ſigna contemnant, etſi hi morbi ſue codere ſolent, pleuricus, per igneumonia, melancholiſta, febres acutae, phrenitis, lethargus, febris ardens ſingulariſſa. Poſtquam uero circa uentri affe-
ctū aliqua diutius eſſiſtere parat, ex his aliquid praefignat. Alius prius cor-
torquetur, & ipſa in ſeipſa turbatur. Cibi ac potus amari apparent, gēua grauior, humos fleſcere non poſſunt, dolores ſunt totius corporis, circa occaſionem, torpor erutum, febricitulae parat. Quam horum quid praefignificat, alium mollem praeparare oportet cum uicis, abſque medicamento. Sunt autem plura & ſecura, ex quorum uſu ſanari non poſſis. Betā a qua multa coctae, alium coctam, malua, cumieta, mercurialis, placentae ac dulcēria ex melle. Omnia enim alium ſubducunt. Si uero aliquid ſignus augetur, citi ſuccum ad omnia decocta ammiſceas. In cunctiora enim fluat, & periculo uacat. Comoda eſt & braſſica leuiſſa aqua multa cocta. Huſus ſoci uſu bibitur cum melle & ſale, ad quatuor heminarum meſuram. Ciceriſſi quoq; uenter cocti aqua, pota ſecundo, eodem modo facta. Qui uero talia ſigna negligunt, has affectiones incurere ſolent, alui profluuium, dyſenteriam, hēteriam, uoluium, coxendicem, febre tertianā, podagram, ſyderationem, hamorhoidē articulare morbum. Porro ubi critica uelicam ali-
qua affectio diutius conſiſtere uolet, huc praefignant. & pauciſſis cibis replet
ſi ſibi uidentur, flatuſque ſunt, naſus, decoloratio totius corporis, ſomni graues,
urinae laeues, & uix prodeuntes, tumores circa pudenda ſunt. Quod igitur
tale quid praefignificari, uicis eſſe cibis odoratis ſecuriſſime auxiliari oportet. Licet autē ſcoriſculi & apij radices macerare in uino albo odorato, & hoc
bibere deſiderat ſeruum mane duorū cyathorū meſura, cū aqua in qua eū
maduit dauca, ſmyrnium, beletis, quae quid talium habuerit omnia enim
profunditatem ciceri maceratoꝝ aqua pota cum uino, cocti modo. At ne-
gligentibus talia ſigna, huc ſucco dēre ſolēt. Aqua intercus, ſplen magnus,
hepatia dolor, calculus, rheuſi affectu, urinae ſiſſitidum, uentris repletio.
Cetero in omnibus talibus ſignis, in ſanabiliſſis curatioſes adhibere oportet, maioribus efficacioribus. Scilicet aſteribi etiā de murationibus temporum
per annū, in quibus ſingula ſiūt, & quae in corpus aſſumere te oporteat, & a
quibus abſtinere. Incipit aſter ſolſtitio hyberno. Solſtitii hyberni augeſcit
in hominibus deſluſus, ſonſ, ac hēditas, uſq; ad æquinoctiū æſtū. Oportet
igitur cibos calidiores aſſumere, & potius bibere, & uinū meracius bi-
bere, & ab origano macerato potare, & Venere uti. ſunt autē ad æquinoctiū,
dies nonaginta. Acquinoctiū uerū augeſcit in hominibus pituitū, & dulces
ſerofos languinis humores, uſq; ad pleuſi ortū, utere igitur odoratiſſimis
& acerbis cibis, & labori deditiſſi, & Venere utere. Sunt autē uſq; ad pleuſi
dam ortū, dies quadraginta ſex. Pleuſi ortus augeſcit in hominibus bilem
fuluſ, & amarus ſerofos humores, uſq; ad ſolſtium ſiſſi. Vtendū itaq; eſt
dulcibus atq; ſolucitibus, & q̄ minimū coctandū. Sunt autē ad ſolſtium ſiſſi
pūm, dies quadraginta quinque. Solſtitii eſſiſſi augeſcit in hominibus bilem
atram, uſq; ad æquinoctiū autūnale. Vtere igitur aqua frigida, & odoratis
omnibus, & q̄ minimū Venere utere, aut minore ſc̄ione q̄ de Venere ſcri-
ptum eſt, admice. Sunt autē ad æquinoctiū autūnale, dies nonaginta tres.
Acquinoctiū autūnale augeſcit in hominibus pituitū, ac tenuis fluxiones,
uſq; ad Pleuſi occaſum. Oportet igitur fluxiles denſare, & acutius ac
odoratiſſima exhibere, & q̄ minimū uomitū facere, labori deditiſſi eſſe, &
a coctis abſtinere. ſunt autē ad Pleuſi occaſum, dies XLVI. Pleuſi occa-
ſus augeſcit in hominibus pituitū, uſq; ad ſolſtium hybernū. Proinde acerbissi-
ma exhibere oportet, & uinū bibere q̄ ſecundiſſimū, & proguibus uti, ac
labori deditiſſi eſſe. Sunt autē ad ſolſtium hybernū, dies quadraginta quinque.

Syrmaſinas

Ventri affe-
ctus pro
fectusVulſa melle
nam pro
fectusTemporū
aſteribi
potē eſſe

In hoc libro totius tractationis secundo, de febribus totus sermo habetur: primum quidem de his quae conferunt ad signorum cognitionem, et totum ipsarum curationem. Deinde de uariisq. speciebus febris generatione ac curatione. Et tertio loco de consequentibus ad febres symptomatis.

Præfatio de febribus	Cap. I	Ardentis febris curatio.	Ca. XXX
Quot & quæ capita in febribus morbis inquirere oportet	Cap. II	Febris ex Erysipelatis affectione cognitio ac curatio	Cap. XXXI
Principiū morbi quod dicat.	Ca. III	Hæcticarum febrium cognitio.	Cap. XXXII
Vnde cognoscendū salutaris ne sit morbus, aut perniciosus	Cap. IIII	Hæcticarum febrium curatio.	Cap. XXXIII
Vnde cognoscimus acutū, acutissimum morbum	Cap. V	De semiterianis	Cap. XXXIIII
Quomodo priuilegium an iudicabunt morbus, aut soluetur.	Ca. VI	De popularib. morbis.	Cap. XXXV
De indicatoriis diebus	Cap. VII	De pelle	Cap. XXXVI
Quod indicatoris signa in principio apparentia mala sint.	Cap. VIII	De his qui ob crudorū humorum copiam syncope incidit.	Ca. XXXVII
Quomodo futurā iudicationē præuolueri oportet	Cap. IX	De his qui obtenuēs humores syncope incedunt	Cap. XXXVIII
Quomodo instantem iudicationem cognoscamus	Cap. X	De alijs occasionibus, ob quas syncope fiunt	Cap. XXXIX
Quomodo factam optimam iudicationem cognoscamus	Cap. XI	De dolore	Cap. XL
De pulsibus	Cap. XII	De colliqutione	Cap. XLI
De alui egestionibus	Cap. XIII	De rigilib. in febribus	Cap. XLII
De urinae significatiōe.	Ca. XIIII	Curatio somni grauioris.	Ca. XLIII
De sputorum notis	Cap. XV	Curatio doloris capitis in febribus.	Cap. XLIIII
Diarræarum febrium cognitio ac curatio.	Cap. XVI	De stomachi affectionum curatione	Cap. XLV
Putredinosarum febrium cognitio.	Cap. XVII	De immodicis perfrigerationibus ac rigoribus in febre.	Cap. XLVI
Putredinosarum febrium curatio.	Cap. XVIIII	De odoribus	Cap. XLVII
Tertianarum cognitio	Cap. XIX	De tussi in febribus.	Cap. XLVIII
Tertianarum curatio	Cap. XX	De sterutatione	Cap. XLIX
Tertianarum spæriarum curatio	Cap. XXI	De ciborum inappetentia	Cap. L
Quartanarum cognitio.	Cap. XXII	De magna fame	Cap. LI
Quartanarum curatio.	Cap. XXIII	De canina appetentia	Cap. LII
Quotidianæ cognitio.	Ca. XXIIII	De siti	Cap. LIII
Quotidianæ curatio	Cap. XXV	De lingua aspera	Cap. LIIII
De Heptidis febre, & rigore ealestere ne sequente	Cap. XXVI	De nausea	Cap. LV
De continuis febribus.	Cap. XXVII	De bilis uomitu	Cap. LVI
Continuatum febrium cognitio ac curatio	Cap. XXVIII	De singultibus	Cap. LVII
Ardentium febrium cognitio.	Ca. XXIX	De alui suppressa ac laxa in febribus	Cap. LVIII
		De sanguinis stillatione, & singultus est maribus erptione.	Ca. LIX
		De animi deliquio	Cap. LX
		Vicerationis circa os sacri curatio.	Cap. LXI

PAULI AEGINETAE REI MEDI-

CAE LIBER II. ~~Medici Physici interprete.~~*Medico Physico interprete.*

De febribus, ex Galeno & simplicibus. CAPVT I.



PRO sanitate tuenda doctrinam, ad egrotantium iam correctionem progredientes, à morbis simularum partium, uelut simplicioribus, initium sumemus. Tales uero sunt maxime qui febriles appellatur. Rursum igitur Orisbasi ex Galeno compendiarie tractatione quam maxime, cum etiam aliorum plurimorum utentium, nos quorūque paucissima quidam relictā apponemus.

*Morbi similes
cum partium
simpliciorum
febris*

Quot & quae capite in febribus maxime morbi inquirere oportet.

tot, CAP. II.

PRIIMUM quidem inquirere oportet, an salutaris sit morbus, aut perniciosus. Et si salutaris, utrum acutus aut diuturnus. Atque haec quidem etiam in alijs uarijs morbis inquirenda sunt. Et tertio, utruma ceruationis iudicabitur, quod maxime febrium proprium est, aut perniciosa sit sollicitudo.

Principium morbi quod dicitur, ex Galeno. CAP. III.

NON idem est capitis dolor, & febris, quomodo necque uigilia, & ciborum inappetentia, et totius corporis grauitas, aut lassitudinis sensus. Verum singula haec aliud quiddam à febre sunt, & febrem annunciant. Febris inuens, & praesertim acuta, nec nos, nec idiotam aliquem latere potest. Datur autem, si ut uolens, etiam ipsam latere, ac mirum fuerit, si uera horam argum latet. Quapropter illud tempus principium morbi esse dicemus, quando manifeste febre auspiciari debuerunt.

*Febris inuens
principium
morbi*

Vnde cognoscendum febrem ac si morbus est perniciosus.

CAPVT III.

PERNICIOSA signa sunt, facies cadauetrosa, nasus acutus, oculi caui, & reliqua ab Hippocrate relata; si haec non ex uigilia, aut uacuatione, aut inedia acciderunt. Et lucis splendorem fugere, aut lachrymari, non ex aliqua externa causa, necque oculis propriam affectionem habentibus: & alteri oculum minorem apparere, aut etiam albas ipsorum partes rubicundas, aut liuidas, aut nigras, aut etiam sordes in ipsis: & in somnis albas oculorum partes apparere, palpebris fortis non commissis, nisi multa euacuatio facta fuerit, aut hoc symptoma ipsa ex cōsuetudine sit: & dentibus fremere, aut derirare, aut siccōs legere, aut leuicas decerpere. Attendendum est & ad decubitum. Nam supinum decumbere, & uelut resolutum, aut etiam de lecto desuere ad pedes, extremae debilitatis signum est. Et adhuc potius, frigidum respirare ex naribus & ore, & pulsam obliuiscere, ac densas, & deficere ipsos. Et iudicare ad animi deliquium, perniciosum signum est. Si igitur omnia relata signa, aut plura ex his apparuerint, aut etiam pauciora, ueram uelut nulla praesente salutis signo, mori eundem non potest. Ac spiratio bona, & pulsus bonus, & mentis ualere, & bene se habere ea quae offeruntur: & facies & decubitus similis sanorum, bona & euasuri signa sunt. Et in summa, quae maxime sunt contraria naturalibus, perniciosi sunt. Quae uero similia, salutaria. Ceterum de promotione ex uicinis, alui egressionibus, & spūti, paulo post dicetur.

signa perniciosa

signa salutaria

Vnde cognoscimus acutum, aut diuturnum morbum. CAP. V.

MORBI tempus ex quatuor notis cognoscitur, ex morbi ipsius motu, ex egrotantis habitu, ex pulsibus, ex febrium specie. Ex morbi motu hoc modo. Si quidem quatuor particularis exacerbationis tempora, citius & in minimo tempore praeterierint, peracutus fuerit morbus, cuius extremus

*morbi motus
morbus peracutus*

terminis

terminus est septimus dies, plerique uero quarto die iudicant. Si uero in ampliori quam hoc est tempore, sed ut non excedat duodecim horarum spatium, acutus morbus est, qui in octavo aut nono die iudicatur. Ac si ad plures horas se extendat, ut principium solum & augmentum, in maiore die ac noctis tempore perficiat, talis morbus diuturnus est. Quod si non habear morbus particulares exacerbationes, sed ab initio ad finem usque, uelut una sit exacerbatio, quemadmodum in febribus continuis, etiam hunc ex acuta esse diuina. Ceterum ex egrotantis habitu hoc cognoscitur, si facies, aut etiam reliquum corpus, moderatam iam habeat contractionem, acutum morbum indicat. Si uero penitus contractum non est, neque confidit, diuturnus erit. Copia enim materiam indicatur longiore tempore concoquenda. At uero ab arteriarum morbo sic. Magna & uelocitas, & celeritas, & densus pallor, acutum morbum indicat, contrarius diuturnum. Verum ex febrium specie cognoscitur, quatenus calida & ardentes, acutum morbum indicant. Molliores & uelut delitescentes enim, diuturnum.

Quomodo praenoscimus an iudicabitur morbus, aut soluetur. CAP. VI.

Extrema relata etiam hoc praenoscimus, nimirum ex febrium specie ac tempore, & fortassis in totam ex febrium specie. Calidae enim & ardentes, & breuis temporis sunt, & per excretionem iudicari tales solent. Molliores autem, & diutius durant, & in abscessus plerumque erumpunt. Et ex relatis manifestum sit, quod non solum quando morbus iudicatur, praenoscimus, sed etiam quomodo iudicabitur. Nam acutis magis per excretionem contingit iudicationes, quemadmodum diuturnis per abscessum.

De indicatorij diebus. CAP. VII.

Iudicatorij dies partim frequenter, & fideliter, ac bene solunt, perfecte item, & manifeste, & cum certis noctis, partim contrario modo. Verum decimus tertius medium quoddam modo locum habere comperitur. Et iam quidem ex ipsis qui iudicare solent, si uel modicum naturae impetum nanciscantur, acut est septimus & decimus quartus. Multi uero, in uoluntariis quidem morbus iudicant, illis autem non possunt. Quin neque omnes boni, similiter boni sunt neque omnes mali, similiter mali. Neque iuxta ordinem, utilitatem aut malignitatem habent. Primi igitur ordinis de numero bonorum sunt hoc modo. Optimus omnium est septimus & decimus quartus. His proxime accedit nonus, & undecimus, & uigesima. Et haec prope accedit decimus septimus, & quintus. Et post hos quartus. Et post hunc tertius, & decimus octauus. Verum his contrarij secundi ordinis sunt hi. Periculosus, & cum periculo & oblique iudicans, uelut ex diametro septimo oppositus, sextus est. Haec autem similiter octauus & decimus post quos duodecimus, & decimus sextus, & decimus nonus. Inter hos autem medium locum habet decimus tertius, ut qui non similiter reijci possit, uelut hi qui in secundo ordine sunt, neque similiter his qui primi ordinis saluare sunt solent. Atque hoc quidem ordine dignitatis Galenus usus est. Verum iuxta numerum ordinem boni sunt, tertius, quintus, quintus, septimus, nonus, undecimus, decimus quartus, decimus septimus, decimus octauus, uigesima. Mali uero, sextus, octauus, decimus, duodecimus, decimus sextus, decimus nonus. Medium autem locum habet decimus tertius. Ex his indicatorij quidam etiam aliorum indicatorij sunt, quos Hippocrates etiam contemplari iussit, & contemplandas nominauit, eo quod iudicationes in alio iudicatorio die futuras, praenudicent, & contemplandas exhibeant. Velut est quartus, qui futuram in septimo die iudicationem praenudicat, si sudores aliquos, aut haemorrhagias, aut etiam similes quasdam particulares euacuationes, aut significantes prius non factas effluas, aut etiam concoctionis signa ostendat. At Galenus etiam sexti indicatorij esse dicit diem quartum, etiam si illi non sit bonus. Verum undecimus decimiquinti indicatorius est, & decimus septimus uigesima. Itaque usque ad decimum quartum diem contemplabilissimum iudica-

Indicatio acuta

Morbus diuturnus

Indicatio per excretionem, per abscessum

Diei indicatorij tertius

Diei indicatorij

Quomodo diei indicatorij

dicationes sunt, proximè uero ipsi accedunt, quæ usq; ad uigesimalium sũt. Quæ uero post uigesimalium, usq; ad quadragesimalium, paulatim contentionē remittunt. Sunt autē primè dignitatis, uigesimalius septimus, trigesimalius quartus, & quadragesimalius. Post hos uero uigesimalius quartus, trigesimalius primus, & trigesimalius septimus. Sed reliqua intermedia multitudo, à uigesimalio usq; ad quadragesimalium, in totum nō iudicat. Quemadmodum omnes post quadragesimalium diem, penitus exelati sũt, concoctionibus magis ac abscissibus, non indicationibus, sequentes morbos. Proinde reliquos post quadragesimalium diem, penitus contemnere uidetur Hippocrates. Scragesimali tamen ac octogesimali, & centesimali uigesimali rationē habet. Post hos autē, alios morbos in septem mensibus, alios in septem annis iudicari dicit, alios ut rectissime est, in duobus aut tribus annorum septenarijs.

Quid indicatio sit, in principio apparentis, male sit. CAP. VIII.

Concoctionis signa nunquā male apparent. Omnis enim cōcoctio natura prævalente contingit, & propterea semper bona existit. At iudicatoria signa quandoq; male apparent, eo quòd iudicatio ambigua est, & modo bona, modo mala contingit, quemadmodū antea de iudicatorijs diebus dictum est. Neq; igitur in principijs, neq; in augmentis, ipsa apparere oportet, sed in uigoris tempore, in quō maxima morbo superior euadit.

Quomodo futuram indicationem præferre oportet. CAP. IX.

Si ageatur, & anticipent exacerbationes, & multo uehemētiores sũt, & per tertium diem significationem de se præbeant, & signa concoctionis in urinis, aut alui egestionibus, aut etiam spiritus compertiantur, omnium maxime breui morbus iudicabitur. Si uero lenitè moueantur, & eadem hora irruant, quotidie contingentes exacerbationes, post longius tempus futuram indicationem expecta. Sed & eorum qui à rigoris uehemēter ferbricitant, ut solutio fiat, fieri non potest, antequā rigor misigetur. Nam hoc nihil remittente, contingere nequit, ut iam uigorem morbus acciperet, quæ propter malitiam minus declinationem sperare oportet.

Quomodo infirmam indicationem cognoscere. CAP. X.

Molestia morbi tolerantiā omnem indicationem præcedit. Et si quidem in die iudicabitur, noctu præcedit. Sin noctu, in die. Et symptomata accedunt, uelut est capitis dolor, qui prius non fuit, & collum condolet, & præcordia reuellunt, & spirandi difficultas repentina, & alia multa difficulta symptomata prius non facta apparent. Et si his cōtingentibus, pulsus non conderit, sed magis in altum tollantur, & uehemētiores fiant, cōfitemur etiam in super iudicatorijs dies, & hic maxime ex bene iudicantibus, non solum futuram indicationem, sed etiam bonū ipsam expecta. Nec uero conderitis inter hæc, si delirantem hominem aut exilitē uidetis. Nam & hæc lantia humorum sursum aeris signa sũt, quemadmodum rursus deorsum alia, & in uentris motus, & tormen circa umbilicū, & lumborum dolor, & murmuratio. Quandoq; etiam alia eiusdem generis signa apparent. Et ad hæc si per hæmorroidas æger uacui confusus, etiam huius circulus tempus concurrat. Similiter & de mensibus, si mulier fuerit quæ ægrotat, nihil absurdū est per talē rursus euacuationē, fieri iudicari non. Sed & sudores, ex prægressis uelut uentiside est madoribus, & præscriptis in die iudicatorio factis, & ex mentis apertione prænotendi sũt.

Ceterum euacuationem per superius partes, & his maxime cognoscere, inspicere enī tam ad prædicta oportet, etiam ægroto in faciem, & si qua in ipsa pars palpitet, aut uene in temporibus pulsant, aut gena, aut nasus, aut oculus rubicundior fiat, magis sperandum est. Si uero etiam in uultu lachrymentur, aut etiam splendores oculis obseruari imaginentur, & manus ad nates a dilbeant, uelut scalpui, tunc quidem non amplius furorū, sed iam illucētē sanguinem uidebā. Vbi enim semel arx iterum scalpserant, erumpit. Morbus autem stomachi, & inferni labij tremor, iudicatorium

Signa concoctionis semper bona

Signa indicationis quando bona, sunt

Indicatione breui futurā nota

Indicatione infirmam nota

nem per uocem sepe nobis indicauerunt. Et haec quidem sufficiunt. Accedunt autem ad haec, & agroti aetas, & natura, spem confirmans, & insuper anni tempus, & praesens constitutio. Si enim adulescens fuerit agrotus, aut alibi natura salubris, aut multus sanguinis, adhuc magis sperabis. Si uero etiam antea ipsi sanguinis euacuatio, aut agrotanti, aut sano contigit, uelut antea diximus, hoc uel solum sufficiens est, ad sanguinis eruptionis spem exhibendam. Quod si etiam tempus anni uideris ualorem, aut non quidem ualorem, sed aliam calidam praesentem aëris constitutio nem, & sepe illo tempore per sanguinis eruptiones fuerint iudicati, & plenam sanguine corpus fuerit, & confectionem excretionum suppressio, & haec spem tuam augere poterint. Similiter autem & de reliquis euacuationibus ratio curari oportet. Si uero horum quidem nihil usum fuerit, uerum molesta morbi tolerantia, in quodam iudicatorio post trigésimum die fiat, & hoc morbo in uigore constituitur, & dolores in quibusdam articulis, aut circa aures, aut etiam in alijs partibus fiunt, aut non quidem dolores, sed sudores particulares iuxta aliquam partem afflictae oboriantur, per abscissum iudicationem explicare oportet, & circa illam maxime partem abscissum futurum, ubi sudores aut dolores, aut tumores facti fuerint.

Quomodo scilicet optimum iudicationem agnoscat. CAP. XI.

Si quidem euacuatio conueniens post concoctionem fiat, & febris soluitur in eo qui iudicatur, & idem ab alijs symptomatibus liberetur, & pro ratione euacuationis coloratio fiat, & pulsus meliorem habeat, & ad exurgendum robustior euadat, & quod omnium securissimum est, bona tolerantia consequatur, haec optima est iudicatio. Si uero quid ex his defectis, tantum ab optima abest, quantum fuerit uis eius quod deficit.

De pulsibus, ex Galeno. CAP. XII.

Pulsus est motus cordis & artieriarum, per distensionem ac contractionem contingens. Pulsus eius duplex est. Per distensionem enim, quae uelut expanditur ac aperitur arteria, frigidus aër ingreditur, uentilans & suscitans nitorem firmitatem. Unde etiam animalis spiritus generatur, per contractionem autem, quae artieriarum extremitates ad medium constringit ac confidit, excretio halitusque sanum superfluitatem contrahit. Haec uero arteriae oblongae sunt uelut cauae, uelut uenae, & duas tunicas habent, una propter relaxatam motum, uelut quod sanguinem & spiritum continent, & emittuntur quiddam ex corde, disperguntur autem per omnes corporis partes. Omnes igitur arteriae eodem modo pulsant, & inter se, & cum corde, ut ex una de omnibus rationem intrare possis, non tamen fieri potest, ut omnium motum quis similiter sentiat, sed eorum quae sunt in excarnibus corporis partibus promptius, obscurius autem eorum quae sunt in carnosis. Neque autem de cunctis, neque uelut commodiorem aliam attigeris, si eas quae ad manum tantum ras sunt omiseris. Est igitur primum genus pulsuum, quod circa motus triplex, & in distensione, & in contractione consideratur. Differentiae ipsius sunt, uelox, tardus, & moderatus. Nam quicquid mouetur, aut uelociter, aut tarde, aut medio modo, in tempore mouetur. Velox itaque est, qui in modico tempore, per modicum spatium mouetur. Tardus, qui in multo tempore, per modicum spatium mouetur. Moderatus, qui medio modo circa motum se habet. Alterum genus est, circa distensionis quantitatem. Quandoquidem enim omne corpus tres habet dimensiones, longitudinem, latitudinem, & profunditatem, corpus autem est etiam ipsa arteria, tres habere & hanc dimensiones necesse est. Verum dum secundum naturam se habet animal, moderatè ipsam undequeque distendi compertis. Vbi uero praeter naturam se habet, aliquando deficit, aliquando excedit aliquid, iuxta quamcumque tandem dimensionem. In hoc autem meminisse oportet, qualis erat pulsus naturalis. Est si quidem laetudine maior et compertior, laetum uocare. Si uero longitudine, longum. Si profunditate, altum. Clarum uero est quod

iudicatio
per abscissi
nota

infirmitas
bona fuisse
nota

pulsus quid
sit

spiritus aut
multa genera
noto

Arteriarum pul
sus considerat
ab his com
modis
Pulsuum ge
nera

quod etiam contrarios ipsa, & naturali minores, iuxta eandem rationē nominare oportet, angustum, breuem, & humilem. Ex his utroque in omnibus dimensionibus similiter ad suam præter naturam mutantur, is qui per minus imminutus est, parvus qui acutus, magnus appellatur. Tertium genus pulsuum est circa facultatis similitudinem. Differentiæ ipsius tres sunt, uehemens, languidus, & moderatus. Vehemens est qui tactum medici robustè ferit. Languidus qui ægrè & debilitè. Moderatus qui medio inter hos modo, quem quidam naturalem esse putauerunt. Nam extra & exercitijs, uehementiorem fieri pulsuum dicunt, qui non si natura sit. Verum his Gale nus se opposuit, non durabilem, sed qui promptè transmutetur, esse dicens eum pulsuum, qui ob non naturales causas uehementior effectus. Qui igitur uehementior est, & non promptè mutatus, hic naturalis & moderatus foret. Quorum genus est circa instrumenti, corporis arteriæ dico, compagem. Differentiæ huius item tres sunt. Aut enim durus est naturali instrumentum, & uocatur pulsus durus aut mollis, & mollis dicitur: aut medio modo se habet, & iuxta hoc moderatus appellatur. Quintum genus pulsuum est iuxta quantitatem humoris arteriæ. differentiæ ipsius sunt, plenus, meius, & moderatus. Nam & omne ma, aut plenum est, aut uacuum, aut moderatum humorē habet. Plenus igitur pulsus est, uelut Archigenes definiens, qui solidiorem exhibet arteriam, & occursum ipsius humore repletam. Vacuus autem qui bullosam arteriæ excitationem facit, ut ad digitum impressionem, progressus per uacuum occurrat. Hæc quinque pulsuum genera iuxta unam arteriæ motum consistunt. Quandoquidem uero qualitas caloris cordis, magis quodam modo manifestè circa arteriam apparere uidetur, uoluerunt & hoc genus pulsuum sextum ad prædicta annumerare. Ex reliquis generibus, nam quæ iuxta unum, aut quæ iuxta plures pulsus sumuntur, est & quod circa quietis tempus consistit, & quod circa rythmum.

& quod circa æqualitatem ac inæqualitatem, & quod circa ordinem ac ordinis turbationem. Quod igitur circa quietis tempus consistit, & septimum est à primo, diuiditur in densum, rarum, & moderatum. Quoniam enim arteria duplici motu mouetur ex contrariis motibus composita, necesse est ipsi etiam duplices quietes coincidere, alteram post distentionem ante contractionem, alteram post contractionem, ante distentionē. quam etiam sensu percipi posse quidam negauerunt. Quare inter duos motus, una quietis media intercedit. Cui igitur multū est quietis tempus, hic rarus est: cui breue, densus. cum mediū, moderatus. Octauum genus pulsuum circa rythmum consistit. Est autem rythmus in summa, habens aut proportio temporis ad tempus. In pulsū uero, si cui aliqui uolunt, temporis motus ad tempus quietis, uel distentionis & contractionis, ad aliquam intercedentem quietem. Verum iuxta aliorum sententiam, temporis motus ad motum, uel distentionis ad contractionem, aut quietis ad quietem, uelut internæ ad externam. Differentiæ rythmi primæ duæ, pulsus boni rythmi, & sine rythmo. Quoniam autem dico sine rythmo, non nullum habentem rythmum dicere hoc enim fieri nō potest: sed cum qui malum rythmū habet: quem admodum sine uoce, & sine collo esse dicimus, cum qui malum uocem, & malum collum habet. Pulsus autem sine rythmo triplex differentiā est. Alius enim præter rythmum est, moderatum habens boni rythmi peruerisionem. Alius alterius rythmi amplius peruersus. Alius extra rythmum, qui bonum rythmum penitus contrampt. Velut exempli gratia, si in puero notas colligere uelis, propriis ætati puerili pulsus iuxta rythmum cōgens, boni rythmi pulsus appellatur. Qui uero rythmum contumpt, sine rythmo. Et contrarius qui quidem propinquæ ætatis rythmum assumit, pulsus præter rythmū appellatur. Qui uero ætatis uigoris, alterius rythmi dicitur. At qui neque huius ætatis rythmum conseruat, extra rythmum nominatur. Notandum genus pulsuum est quod in omnibus relictis generibus reperitur, circa

Pulsus naturæ
in patiente

Rythmus quid
sit

Vocis si pri-
uationem, sed
corruptam
significantes

æqualitatem ac inæqualitatem consistens. Hoc aut in uno pulsus, aut in plu-
 ribus consideratur. Et hoc à plurium congregatione systematicum appella-
 tur, de quo uelut manifestiore primò dicendum. Aequalis igitur pulsus est,
 qui consequenter æqualis est, aut magnitudine, aut firmitate, aut uelocita-
 te, aut aliquibus alijs generibus, aut etiam omnibus. Inæqualis uero est, qui
 consequenter inæqualis est. Si enim uerbi gratia, omnes consequenter ma-
 gnitudine æquales fuerint, æqualis magnitudine talis pulsus uocatur. Si ue-
 ro primus & secundus & tertius æquales apparuerint, quartus autem in æ-
 qualis, clarum est quòd talis pulsus magnitudinè inæqualis appellatur. Ho-
 ius generis sunt, & Intermitiens & Intercidens. Non enim solum circa
 unum aut plures magnos, unus apparet minor: sed aliquando etiam to-
 tus motus penitus perit, & intermitiens pulsus dicitur: Quemadmodum
 alter intercidens huic contrarius, quum expectata quiete intermedia, ue-
 lut superfluis quidam incedit. Si uero secundus paulò minor sit primo,
 & tertius secundo, & quartus tertio, in æqualitate, & hoc ulterius con-
 tingat, tales pulsus Minoritas & Minors, hoc est decurtatos appel-
 lant, à figuris in acutum desinensibus nomen transferentes. Et qui qui-
 dem ex ipsis perpetuo minuuntur, & nunquam à tali affectione cessant, in
 absolutam motus interceptionem desinunt, & uocamus ipsos decurtatos de-
 currentes. Qui uero cessant, duplicem differentiam habent. Quidam enim ex
 ipsis, per uoluntatem eam in qua primum esserunt, seruant semper. Quidam ue-
 ro rursus augentur, aut ad æqualem ei quæ ab initio fuit magnitudinem re-
 deunt, aut ad minorem, aut ad maiorem: atq; hi decurtati recurrentes ap-
 pellantur. Finit eadem in unius pulsus inæqualitate decurtati pulsus, de quib-
 us paulò postius loco dicitur. Ac huiusmodi fassa est congregatoria ap-
 pellata pulsus inæqualitas. Quæ uero in uno pulsus consistit, aut circa unam
 arteriæ partem, aut circa diuersas contingit, uelut in tempore motus, circa
 unam quidem arteriæ partem inæqualitas dicitur, quum aliter inceperit, &
 aliter desierit moueri arteria, circa unum digitum. Incipiens quidem uelo-
 cior, desinens autem tardior, aut uice uersa. Hoc autem trifariam contingit.
 aut cõtinuo manente motu, aut intercesso, aut recurrente & uelut his ferient
 ne. Si quidem igitur continuus manens, & non intercessus, à uelocitate ad tar-
 ditatem, aut uice uersa mutatus fuerit, inæqualiter uelox talis pulsus est, &
 dicitur. Si uero intercessus quiescerit, & de cetero uelocior appareat, decur-
 desiens appellatur, metaphorè à decorede annuante accepta, quæ saluando
 subleuans in aëre consistit, & improuissimè quendam secundum motu priore
 uelociorem facit. At si post differentiationem recurrerit, & prius quàm contrahatur
 peritius, iterum eadem ferierit, talis pulsus bis feriens appellatur. Huius-
 modi uero quippiam & in incutibus fieri uidere datur, quòd mallei ei qui
 dem semel permissum incussit ipsos ferierint, uerum incutis remissa relin-
 quitur, aut etiam tertio feriant. Non solum autem circa motus tempus, in-
 æqualitatem circa unam plagam, in una arteriæ parte fieri contingit, sed et
 etiam circa facultatis firmitatem: non autem circa dimensionem quantita-
 tem: nō enim fieri potest ut idem pulsus in eadem parte, magnus ac paruus
 fiat neq; circa aliud pulsuum genus, sed in partibus diuersis. Ceteri cir-
 ca diuersas arteriæ partes, in uno pulsus inæqualitas duplex fit. Quandoq; e
 continuo manente motu, & circa aliquos digitos arteriæ uelocius mota, in
 xta aliquos tardius: quandoq; uero etiam intercesso, ut aliqui digiti motum
 depræhendunt, aliqui non. Sed & circa differentiationis quantitatem, inæqua-
 litas in pluribus partibus manifesta est. Cuius generis sunt decurtati circa
 unam plagam, & uariantes ac circumuariantes. Si enim circa interiorē di-
 gitum, magnus & qui in gibbum eleuetur pulsus occurrat, hinc innotam-
 tionem minuatur, ita ut circa exteriorē arteriæ partem, ad ægroti pollicē
 minimus appareat, Myurus id est decurtatus appellatur, ad similitudinem
 caudæ animalis murici aut Myuri, quod infra caudæ decuratur ac immi-
 nuatur,

A nuatur. Si vero circa medios digitos, magnus & qui in gibbū eleuetur occurrens, utrinque minuat minor apparet: hunc Archigenes tantum & circumnutantem appellauit, clare declarare uolens circa distentionem breuitatem, cum utriusque extremitatis uelut nuatione. Non enim uelut acutum rectis, sed uelut inflexis utrinque paribus, ad breuitatem contractus est, quum se magnitudine decurtans circa utraque partes. At ubi inaequalitas circa magnitudinem, ut aut maioribus aut tardius contingat assumptis, & undosis, & uermiculantes pulsi sunt. Si uero etiam politus differentiam assumpserit, & conuulsorij, & agitatorij appellari constituantur. Incipiendum igitur est ab undosis, in quibus non simul apparet circa talem inaequalitatem, tota arteria distendi, sed aliqua ipsius pars primo, aliqua secundum, aliqua tertio, alia quarto, motu continuo manente, ad eleuationis undarum similitudinem. Er quidam in directam tendentem undam habent. Quidam ad obliquum declinantem. Er quidam in breui secundum longitudinem dimensione, altitudinem magnam habet: quidam uice uersa. Er aliqui ledum ducunt, aliqui angustiam. Similiter autem & circa uelocitatem & firmitatem inaequaliter se habent. Si uero undosus totus ad paruitatem immittitur, uermiculans appellatur, uermiculi gressus similis. Quemadmodum autem undosum pulsum minorem factum uermiculans excipit, sic uermiculans formicans, quum percutantibus motibus multis, in unum & eundem penitus paruum deflorit. Appellatur & hic est à similitudine ad animal formicam, rum propter paruitatem, nam propter motus speciem. Est enim ualde paruus formicans, quo minor alius non existit. Similiter autem & languidissimus omnium ac densissimus, non tam in uelox, uelut Archigenes putabat. Haec propinquus est pulsus Hecticus appellatur. Quemadmodum enim febris hectica, ita etiam pulsus hecticus est, qui nullam magnam mutationem facit, sed semper similiter manens, connectensque uelut ab initio incipit, & nunquam desinens, toto habitu mortose mutato. At uero conuulsorij pulsi, dum utrinque ab extremitatibus retrahuntur, & tenduntur ac conuelluntur, uelut chorde cuiusdam intente sensum exhibere uidentur. Verum in agitatorij nihil tale est, sed maior in his distensio est, ut quaedam arteriae partes uno & eodem tempore ore sursum ferantur. Et sane motum ipsorum iaculis suis maxime assimilare possunt, quae uehementer emissa, dum ulbrantur ac agitantur, celeriter feruntur. Porro pulsi secundi quippe tam modo se habent, nunc est quum pars aliqua arterie distensa esse apparet, aliqua uero non, diu ore nimirum ipsa apparet. Habet etiam quid agitatorij hic pulsi, & uelox quidem est ac densus, non autem semper magnus. Dicitur enim supra relata pulsi genus est, quod ex inaequalitate generatur, & circa ordinem ac ordinisurbationem consistit. Nam ordinatus ac inordinatus, scilicet inaequalis, inaequalem iuxta circuitus, & in penitus inaequalem, ex utroque segmento generationem habent. Ordinatus quidem circa aequalitatem circuitum, inordinatus autem sursum circa absolutam inaequalitatem. Etenim inaequalis pulsus penitus est etiam ordinatus, si quidem consequenter aequalis ipsam esse diximus. Inaequalis autem non penitus inordinatus. Si enim aequalitatem corrumpat, circuitum autem aliquem seruet, uelut uerbi causa, in quantitate distentionis, si duos contingat fieri magnos, & unum paruum, deinde rursus duos magnos, & unum paruum, & sic consequenter uocabitur talis inaequalis quidem, uerum ordinatus. Si uero ad hoc quod aequalitatem corrumpit, neque ordinem aliquem inaequalitatis conseruet, supra inaequalitatem etiam inordinatus est. Similiter etiam in alijs generibus. Ceterum ex inordinatis quidam per totum inordinati sunt, neque minimum quendam circuitum conseruantes: quidam uero iuxta cuius ordinati. Nam in quantum continuum ordinem non seruant, uocantur inordinati in quantum uero per longum, circuitum quendam seruant, iuxta circuitus ordinati. Velut si contingat duos fieri magnos, & duos

Undosi pulsi

Vermiculans pulsi
Formicans pulsi

Hectici pulsi

Conuulsorij pulsi
Agitatorij pulsi

Secundi pulsi

paruos, dein de tres magnos, & tres paruos, & quatuor magnos, & eorūdem paruos. Et rursus uelut reflectētes, duos magnos, & duos paruos, & tres magnos ac eorūdem paruos. Et consequenter eodem modo illud porro sciendū est, uniuscuiusq; aliorum contrariorum medium quandam esse. Verum & qualis & inaequalis medius nullus est, neq; ordinati & inordinati. praterq; iuxta circūitas ordinatum, medium dicere uolēs, inter ordinatum & inordinatum. Et aliorum omnium medij, secundum naturam se habēt, excepto eo qui inter uehementem & languidum medius est. Inter hos uero aequalis solum secundum naturam est. Alija uero prater naturam, & inaequalis, & ordinatus, & inordinatus. Haec sunt genera pulsuum omnia, & differentiis ipsorum secundū genera. Quidam uero etiam alia duo ad haec annumerā, alterum circa pulsionem arietis, iuxta quod sursum ac deorsum, & ad dexteram, & ad sinistram, maducta esse uidetur, iterum quod circa hoc ut aut manus rursus, aut tardius contingat, consistit. Ex quibus undosos & agitatorios pulsus esse diximus. Et nos quidem breuiter cōpendij ergo, simplices tantū differentias tradidimus. Verum ex relictis si cū illas componeretur, etiam in cōpositis inueniētur. Ceterum consequens fuerit etiam casus pulsus, ut tunc ea referre, ad quas sequitur etiam praenotio quae ex ipsis contingit. Initium autem à magnitudine sumemus, quoniam haec alijs manifestior existit. Magnus itaq; sit pulsus, aut oburgentem ac cessitatem, quae est caliditas in corde redundans, extera appetens refrigerationem, & uelut uentilationem, aut ob corporis gracilitatem, uelut paulo post ostendimus. Augescit autem caliditas, aut propter naturales causas, uelut aetatem uigoris, aut puerilem, aut simpliciter calidum tempus, item & regionem, & temperaturam calidiorē. Aut ob causas non naturales, uelut aërem nos ambientem calidiorē, balnea calida, exercitia, cibos, uinum, medicamenta calidiora. Aut propter causas praeter naturam, uelut intemperiem calidam, aut humorum putrefactionem, aut iram, aut similes. Discernes autem singularem causarum pulsus, ex eo quod de causis naturales, durabilem & quae aggere transmutetur magnitudinem faciunt. Reliquae uero facile mutabilem, ad eam ut etiam adhuc tangente te saepe, aut omnino paulo post, penitus discedas. Et magnus quidem pulsibus propter balnea calida, etiam mollitudo accedit, quemadmodum rursus his qui ob calidam, & maxime cum siccitate cōiunctam intemperiem, tales sunt, duricia. Qui uero moderate se exerceuerunt, aut densi sunt, medio modo se habent circa duriciem ac molliciem. Verum partes circa peccatas calidiores magis habent, quod sunt etiam iratis contingit. At magnis pulsibus ob uinum, aut cibum, aut iram, ad magnitudinem etiam uehementia accedit. Qualesq; uero occultare student iram, aut aliud quid faciunt ab ipsis, cetera medici permissionem: quemadmodum ille qui calidum accepit medicamentum, & calare id uoluit medicum simul cum tactu manus interrogantem: his ad magnitudinem etiam manifesta inaequalitas adest. Ad hoc uero etiam agroti mores ac consuetudo, nō parum conferunt ad dignoscendum. Consuetudo quidem medicamentis dedita. Mores autem improbi, & ad suspicionē eximen dam calidi. Qui uero ob humorum putrefactionem magnus est, is ad magnitudinem etiam contractionē magis festinantiem habet. Ceterum ad hoc ut magnus sit pulsus, non solum necessitas sufficit, sed opus est etiam facultate intrinseca, & moderato instrumēto, iuxta duriciem ac molliciem. Ausa itaque in corde caliditate, ob quam eundem ex relictis causis, primum quidem sit magnus pulsus. Vbi uero non fuisse cent necessitas magnitudo, statim ipsi etiam uelocitas accedit. Si uero neque fuisse erit, etiam densitatem assumat. Parui autē & tardi ac rari pulsus, à contrarijs sunt. At uero ubi à magno & ueloci ac densi, ad contrarios mutatio contingit, nec essitae nimirum deficiente, nō amplius id quod primum in pulsū factum est, etiam primum cessat. Sed id quod posterius acquisiuit, primum abiicit, statim quidem euadens raris, deinde

*Medij pulsus
quorum sit,
et quoniam ad*

*pulsus
causae*

*Magnus pul-
sus quae causae
requirit*

A deinde tardus, postea etiam parvus. Si vero amplius deuenierit ad tarditatem ac paruitatem, rursus rarietas in densitate transit, quo per ipsam necessitas perficiatur. Atque hæc quidem sunt magnitudinis, & uelocitatis ac densitatis, & contrariorum ipsius, pulsuum cause. Coniungenda uero his est, & mutatio pulsus circa unam solum dimensionem. Latitudo igitur solum augetur, propter humiditatem maxime redundantem, aut secundum naturam, aut etiam ab externis causis. Quomodo modò aliusdo propter instrumenti mollietatem, facultate ad hoc coadiuuante. Longitudo uero ob siccitatem, & circumscriptionem carnis eliquationem, manifestè fit, alia dimensionibus collata. Non enim longiorem quam secundum naturam, fieri arteriam contingit, & talem sunt pulsus magis propriè gracilem, qualem appellari, quod admodum contrarium ipsi, secundum latitudinem ac profunditatem solum auctum, amplum. Contrarij autem hæc affectionibus pulsus quandoque inest, & iuxta aliquam, aut aliquas dimensiones impeditur, humilis aut angustus, aut breuis apparens, quum talis non sit, sed ob pinguedinis aliquid in crassitudine, aut carnis, aut membranis impediens. Quandoque etiam totus paruus apparet, quum reuera non sit paruus. Et languidus similis. Et quid dicor? Sepe enim absoluta pulsus interceptio quibusdam esse uisa est per omnes arterias, quum reuera non esset, & præsertim negligentius tangentibus, sed propter carnis copiam laxam moui, qui uere languidus existit. Non enim fieri potest, ut perfecta pulsus interceptio contingat, uiuente adhuc homine: quænam modum rarietas in excarnibus etiam pulsus parui, uidentur esse magni. Eliquato igitur uehementer corpore, & quæ est ea spiritum est arteria, sepe contingentibus summum uentrem, motum significat: & quædam alie in artibus, quæ prius inconspicue erant. Quæ propter omnes causas diligenter animaduertere oportet, ne qua neque laetitia digno. At uero pulsus uehementis præ robore facultatis fit, si nulla ex reliquis causis reuocetur, uelut necessitas exoluta, aut instrumenti duricia. Languidus autem pulsus debilis facultatis uel solius soboles est, etiam si nulla alia causa addit. Nam uehementis pulsus omnibus causis opus habet ad sui generationem. Verum languidum uel sola debilitas efficit. Quia igitur ab initio uehementis est, ad ætatem, & tempora, & regiones, & temperatas temperatas consequitur. Languidus autem ad intemperatas. Qui uero ex languiditate ad uehementiam transit, facultate ex progressa debilitate corroborata contingit. Corroborant autem uel per ea quæ in ipso sunt, ut opore, uel aliorum obocclusionem, aut excretionem, aut iram uel per externa, uel uinum, cibos, exercitia, & quæ intemperatam corrigunt. Exolutam autem facultatem, in edie, iugillie, euacuationes immodicæ, tristitie, curæ, dolores maxime animi, deliquia inducentes, & quæ intemperatè efficiunt. Quidam uero in exercitiis durum pulsam putauerunt esse uehementem. Verum qui ratione, & tactu exercitatus est, eum non seleserit. Nam uehementis per rursus cum magnitudine in alium tollitur, robustè tactus feriens. Durus autem magnitudinem non suscipit, propterea quod arteria ægrè cedit. Durus itaque fit pulsus, propter instrumenti duriciam. Hanc autem frigiditas immodica, aut siccitas, aut tensio ab inflammatione, aut conuulsio efficit. Statim autem ad duriciam, & paruitatem, & uelocitatem, quandoque etiam densitas pro magnitudine, ob necessitatem consequitur. At mollis pulsus ad humiditatem arterie sequitur. Hanc autem humidiores efficiunt, ex his quæ præter naturam non sunt, cibus humidiores, & balnea plura, & somni multi, & uictus delicatus, & animi iucunditas. Ex his uero quæ præter naturam sunt, sopores, lethargi, hydropes, & reliqui morbi pituitosi. Porro plenus pulsus, aut humorum copiam, aut ciborum, aut uini potus redundantiam indicat: quod admodum uacuis contraria, aut enim inedia, aut euacuationem. Quod si caliditas occurrat arterie corpus, multam in corde caliditatem, reliquo corpore perfrigescere: aut conuulsam aliquam arteriarum affectionem significat.

Gracilis pulsus

Amplius pulsus

Pulsus non interceptio potest inuenire hominem

Durus pulsus

Mollis pulsus

fiat, per uolentem motum calefcentium. Verum Archigenes dicit ar-
 rix locum propere in stupore correptis, catochis appellatis, calidiores re-
 periri, uelut quibus conuulsio imminet cum graui in somnum delatione.
 Aratro rhythmiratio siue qualis est in motu ac quiete, totius corporis tem-
 periem indicat, quantum in seipso: aut non magnam mutationem, uelut in
 puerili aetate, & corporibus alioqui temperatis. Si uero longius fuerit quie-
 tis quam motus tempus, caliditatem predominari indicat. Velut in aetate
 uigoris, & his uicinis: quemadmodum sanè in senilibus corporibus aequa-
 liter frigidis, longius est motus tempus quam quietis. Id autem sciendum
 est, inaequalitatem circa rhythmum mensuram esse etiam quae circa uelocitatem
 ac densitatem consistit. Hanc autem uelut materiam rationem ad rhythmum ob-
 tinere. Intermitteutes & intercedentes pulsus fiunt, dum premuntur & ue-
 lut grauatur facultas. Verum intercedentes, minore uisionem deficientes
 maiorem indicant. Et in summa, facultas quae premitur ac grauatur, ad in-
 aequalitatem ac ordinisurbationem, pulsus mutat, tum aliam omnem, tum
 ad eam quae circa uolentiam & magnitudinem contingit. Quam
 uero decurtati pulsus duplices genere demonstrati sunt: aut enim in congre-
 gatoris inaequalitate, aut in ea quae fit circa unum ictum reperiuntur: defi-
 cientes quidem extremam facultatis collapsionem indicant. Reducentes au-
 tem & recurrentes, etiam ipsi imbecillum quidem, sed adhuc repugnantem,
 & resistentem, ac remittentem declarant. Qui uero circa unum ictum decur-
 tati sunt, & nutantes ac circumnutantes appellantur, in his qui paulatim
 & macerant maxime sunt, & in inflammationibus non soluti: imò & in plu-
 rimis quomodo docere marcescentibus existunt, dum corpora circa arterias
 consumuntur. Inaequaliter ueloces & doctae diffantes pulsus, ad febriles
 maxime caliditates consequuntur. Verum si quidem principia diffentionis
 exoluit pulsus, & finem ipsius, ac contractionis principium acceleret, pu-
 tredinem praesentem indicat, natura ad fuliginositatem superfluitatem ex-
 cretionem festinante. Si uero uice uersa, contractionis principium exoluit,
 ad diffentionem autem magis festinet, caliditatem magis predominari sci-
 re refrigerationem appetentem. Consequitur ad hos in febre etiam densi-
 tas plerumque, quandoque etiam magnitudo, si non facultas, aut instrumenti du-
 ritia impedit. Augescit uero arteria duricia, & facultate non debili exi-
 stente, his ferens se pulsus. Arundinosus ad humidiores affectiones maxi-
 me sequitur, & ex his magis ad hydropes subcutaneos, & lethargos, &
 peripneumonias. Vbi uero solutus ineperit facultas, adhuc tamen interim
 modico resistit, undosus in uermiculatam transiit. Extremè uero ipsa colla-
 pta, & hunc formicans excipit. Flecitas pulsus proprietate deficientebus,
 & alioqui marcescentibus adest. Consulionis pulsus fit, neruorum prin-
 cipio inflammatoriam quandam affectionem habente, uelut in phreniticis
 & comitali acie non correptis, quando etiam moriuntur ita affecti, dum adhuc
 calidi sunt, contrario plane modo his qui syncope corripuntur. Illi enim
 dum malum frigidum sunt, adhuc uiuunt. Agitatorius autem se pulsus, quia
 necessitas quidem opus habet magna diffentione, & robur uitale operari
 potest, solum ad arteriarum corpus contradicit, quod per duriciam ad magnam
 diffentionem eleuari non potest quoniam admodum in inflammationibus ma-
 gnis, & diuturnis obturationibus. Porro pulsus secansis quippeam modo
 se habens, in totam inflammationem significat, & maxime alicuius nerui
 se partis. Non minus autem & pleuritidis proprius est, si remissus est, mole-
 lis & facile concoquens dexti intentus, difficilis & aegre concoctilis, quae cum
 debili quidem uisum facultate, acutè periculosa est: cum forti uero, diutur-
 no tempore concoquatur. Aut enim in suppurationem sepe transit, aut ta-
 bidus maror ipsam excipit. Illud autem nosse oportet, quod ad inaequa-
 litatem, ordinis uurbationem sequitur. Raro uero inuenire datur inaequalem pul-
 sum ordinatum. Et sanè minores lationes, inaequales & ordinatos; imo-
 rat,

Comitialis
 in acie affe-
 ctio
 Syncope
 affe-ctio

Ares, inæquales & inordinatos pulsus efficiunt. Atque hæc quidem sunt simplices pulsuum cause ac prænotiones. Ex his autem & componere non difficile inueniuntur, uelut etiam in sermone de differentiis ipse foris diximus.

De ægestione. CAP. XIII.

Alui ægestio optima est mollis & compacta, & quæ tempore consueto, quo in sanitate prodibat, egeritur. Talis autem est subfusca, cum conuenient compage, & non ualde graueolens. Quæ uero præter hæc est, bona non est. Quæ igitur similis colore est his quæ in cibo accepta sunt, & tenuis, & sine humorum exuccatione, & cito progressa, inæstia est. Quæ uero fulua, & metata, in principio quidem biliosiores indicat morbi. Si uero circa declinationem talis excernatur, corpus commodè expurgari indicat. Cum uero pallida, aruginosa bilis nota est. Nigra, aut atræ bilis, aut sanguinis illi hic adusti. Luida, frigiditatem quandam, & interorum partium non leuem mortificationem indicat. Pinguis, colliquesationis pinguitudinis quæ est in corpore nota est. Quæ admodum rursus uiscosa deterior pingui est, & animalis partium colliquesationem indicat. Quæ uero ualde graueolens est, non exiguum significat putrefactionem. In omnibus autem his, si non iuxta acceptum cibum qualitas fuerit eorum quæ egeruntur, hoc modo affectuonem considerare oportet. Omnium uero pessima, & perniciosa est alui ægestio, quæ nigra est, & luida, & pinguis, & cito progressa.

De urinarum significacione. CAP. XIII.

Quemadmodum in alui ægestionibus, sic etiam in urinis, regula sanctorum est, de ægrotis significaciones sumemus. Urina itaque optima est, quæ sanctorum urinis similissima est. Talis autem est subfusca & subflaua. Statim uero & crassitudinem moderatam hæc habet. Quam autem triplex urinarum turbatarum differentia sit, aut enim micæ tales paulò post subsidunt, aut perpetuè similiter manens, aut purè excernuntur, & postea turbantur: ueritas ex relictis mala est, prima moderata, in medio autem ambarum secunda. Quæ uero extremè cruda est, hoc est quæ exactè aquosa est, uelut desperatæ concoctionis symptoma uenali generis est. Vbi uero etiam cito exit, urina profusissima, quod diabetes uocatur, oboritur. Atque hæc ex crudis urinis pessima est: consequens est tenuis adeò ac alba, uelut aqua. His proxima est alia urina, quæ in multis morbis apparet, prope admodum accedens ad uinum tenue ac album. Ab hac consequuntur subpallida. Pallida uero fuerit etiam subfusca, & concoquitur iam pro coloris ratione. Verum & crassitudine in tantum ab aqua secedere ipsam oportet, si probe concoqui debeat, quantum colore. Si uero colorem secundam naturam exactè seruans, subsidens albam ac leuem, & æqualem ac multam habet, concoctionis quidem exactè nota est, uenim copiosum crudum humorem expurgari indicat. Sed & si moderate crassior fuerit, & subsidens etiam aliquam habuerit, non penitus iam cruda est. Si enim aut farinæ crassiori, aut laminis, aut farsari similes, aut luidas, aut nigras, aut pallidas uis uironis, aut graueolentes subsidens habuerit, præter hoc quòd omnis huiusmodi cruda est, etiam aliàs perniciosas existit. At uero urinae boni coloris, simulque aut subsidens albas, & leues, & æquales: aut nubeculas quosdam continentes: aut quædam in medio innatantia facientes, omnium urinarum optimæ sunt, & maxime quarum subsidens talis fuerit: secundo loco sunt, quarum innatantia talia sunt. Tertio, quarum nubecule. Et infumæ, quæ in urinis utiliter feruntur, quanto magis deorsum subsid erant, tanto meliora existunt.

De spumæ urinis. CAP. XV.

Quæcumque spuma subflaua sunt, & subfusca, & subspumosa ac tenuis, solius cruditatis notæ sunt, & nullum grauius malum indicant. Quæ uero metaco modo flaua sunt, & fusca, & spumosa, & cum uisore pallida, uiscolosa ac rotunda, & his magis adhuc nigra, mala sunt. Nam sanguine foetum excepto, quilibet aliorum humorum metacris factis, malam affectuonem

d 4 nom

Ægestione
de urinis

Urina quæ
optima

Diabetes

Spumæ urinis

nem indicat, quæ ex flammæ caliditate ortum habet. Cruentæ igitur spuma^A moderata sine flammâ uero aut acri hîla, horrenda. Verû inspicere insuper oportet etiam educationis ipsorum modum. Si enim facile exspuantur, manifestum est ralia esse bona, contraria uero mala. Perfectæ itaq; cõcoctionis nota est, spiritum seuç, album, & æquale, & compage neq; liquidum, neq; nimis crassum. Absolutæ uero crudinitis nota est, id quod omnino nō exspuitur. Si uero exspuat quidem, sed tenax, cõcoctionis languidæ signû est. Sin autem meracum fuerit, saluum aut flauum, non bonum est. Si uero huiusmodi, aut æraginosum, aut nigrum, perniciolosissimum.

Diæternæ febrium cognitio ac curatio. CAP. XVI

Febrium diæternarum proprium & inseparabile signum est terminatum concoctio in prima die. Sed & caliditatis iucunditas, proprium ac inseparabile tallum febrium signum est. Verum post primum febris solutionem, certior rem cognitionem habebis. Nam & æternarum morbus tunc per omnia assimilatur sanorum morui, quum nulla alia febris ad naturalem statum reuertatur: & ægri bona tolerantia, magnum etiam ipsa signum est. Facile uero his febribus corripiscuntur hi, quibus defluxiones corporis non sunt uaporescæ, sed acæ quiddam, & uelut fumo sumæ habent. Hi autem sunt calidi ac sicci temperamenti, & omnino ex amara bile bñfidi. Hos igitur qui ex lassitudine febrient, pinguius simulq; mollior fricare oportet, ac lauare. Qui uero ob siccitatem, minus quidem illos fricare, sed plus lauare. Ex curis autem, & meroribus, & uigiliis, & ira illapsos, lauare non sepe, sed oleo multo tepido minimum adfrictionis participant parum fricare, & ut mos est lauare. Ex ardore uero febrî correptos, statim ab initio frigefacientibus curare oportet, & balneis pluribus. Minime autem oleo largo, ac frictione. Frigefacientia sint rosaceum, & oleum omphacinum, ab sçp sale preparatû. Verum hæc ipsa uehementer frigefacta sincipiti affundere oportet, & declinante febre lauare. Si uero quis perfrigeratus febricitet, & hunc lauare oportet in declinationibus. At si uia com præcedine ac defluxione febriant, prius quàm concoquantur illæ, lauare non oportet. Verum eos qui ex ardore febriunt, etiam illo præsentè lauare cõuenit. Qui uero ex frigidityte, his caput rigandum est moderatè calefacientibus, uelut est trinum a cernadinû. In quibus autem meatuum cutis cõcoctio febrim efficit, his cõueniunt balnea dulcissimi aquarum temperatarum, & frictio rarefactoria, & exercitia, & uictus succi dulcis. Si uero ob inædium fiat febris, prima exacerbatione inclinata ad balneum inducantur, & oleum plurimum tepidum affundatur, lenissimèq; defricentur, & plurimam temporis in solio calido immorentur. Vbi uero egressi sunt, & uires refecerint, ad balneum rursus inducantur. Et postea calidam aquam bibant, & pisanæ succum, quandoq; etiam lactucæ. & tenere carbis pilæ sumant ex albo iice. Communis autem utilis species in omnibus sit, boni succi, facili cõcoctu, nusquam circa meatus hians. Vinum dandum est aquosum, & aspectus, & facultate. Oportet autem circa primâ primæ exacerbationis febrilis insubum, aliquando horum aliquos nutrire, in quibus corporis intemperies ad caliditatem ac siccitatem emota, febris accendit. Qui uero ex glandularû inflammationibus febriunt, nec interrogant quidem medicum quid facere oporteat. Verû uicinis ex quo inflammatio obort est, prouidentia habita, circa exacerbationis declinationem lauare. Conuenit autem ipsos prohibere à uino, do, nec inflammatio fuerit soluta, & tenuiore uictu uti.

Putridinofarum febrium cognitio. CAP. XVII

Putredinosarum febrium cognitio contingit ex eo quod nulla externa la^A cessens causa præcessit. Sed & quodâ rigore incæpit, neq; ardore, neq; feigore uehementi prægresso, proprium & hoc ipsum est febrium putridarum, quæmodum etiam pulsis compressio. Sic autem nominat, quæ incipientie exacerbatione satis paruos, ac ipsos inæquales habent pulsus.

Hoc

*Febrib. diæp
qui facile cor
ripiscunt*

*Febrib. putrid
la uictu*

*Pulsu com
presso*

^A Hoc enim præcipue talium febrium proprium est. Quin & maxima patridarum febrium nota est caliditas qualitas. Fumosa enim est, ut tactu perirodat. Proprium item maxime harum febrium est, urinam crudicam, & languida concoctio. Magna uero & memorabilis nota effectionis, in primis urinis, nunquam in talibus febribus apparet.

Putrida, siccior, siccior: etc. CAP. XVIII.

Si uires robuste fuerint, febris ex putrida febre statim uena secunda est. Si ab sit cruditas uentris. Verum uiribus debilibus, aut ætate impeditæ, sequentiam non fecabis. Post sanguinis autem euacuationem, putrefacta expurgare oportet, per urinam, uentrem, & sudores. Si uero sua sponte aliquando impetum ad os uentris fecerint, etiam per uomitum, quoque præter naturam irritare non oportet. Eligenda uero sunt materia, quæ citra hoc ut califaciant ac siccant, relatas euacuationes efficere possunt, uelut est pilulæ siccæ, aqua mulla, acetum mullum, fauorum cremor coctus, & apij radix. Quam autem alius non subit, aquam mullam cum oleo per chyserem infunde. At totum corpus rarefacere non conuenit, antequam euacuationem. facta autem euacuatione, rarefacere licet aliquo tepidam habente caliditatem, quale est chamædendinum. In hoc tempore etiam uinum aquosum post omnes excretionem mouet. Et balneum temperatum ex aqua dulci. Ceteri ubi magnitudo febris resistit, neq; uisio, neq; balneo utendum est, neq; unctio-nibus rarefacientibus, sed frigida aqua in his febribus commodè bibitur, si non quid impediat etiam hanc. Si igitur facultates uirium robuste fuerint omnes, & febris ardentissima, & concoctionis signa manifesta, frigida con-silienter danda est. Si uero etiam carnosus fuerit, & constitutio aëris calida ac sicca, & in solium aque frigida ipsum immiserit, non lioetur. Modera-ta uero si est febris, & uires robustæ, unâ cum concoctionis signis, talibus balnea profunt, & uini potus, & rarefacientia ungenta.

Tertiana cognita. CAP. XIX.

Febri tertiana quæ ex flaua bile mota generatur, statim ab initio rigorem non exiguum inducit, qui à quartano rigore differt, eo quod pungi ac uulnerari corpus uideatur. In quartanis autem insulsi uehementem persi-gerationem habet. Verum quotidianas febres neq; præcedit rigor, sed per-frigerantur solum. Est autem & in tertianis ordo pulsuum ex acutus. Inferi au-tem sitim, circa rigorem, uehementem, & hominem perurit, & paulo post in uigore consistit, & calor undique aequaliter extensus est. Si uero mani adhibeas, iuxta primum occursum caliditas multa & acris occurrit, quæ ue-lut cum uapore quodam effertur. Vincitur tamè paulo post sub manu etas qui perseverat. Vbi uero bibitis, statim sanè copia calidi uaporis per cutem exurgit nuncians sudores. Vomitus autem bilis comparat, aut uenter deor-sum erumpit, & biliosa mingunt. Post hæc ad febris quietem desinit, ubi exacerbationis tempus non plurimum quàm duodecim horarum fecit. Eam igitur quæ intra duodecim horarum tempus quiescit, tertianam exquisitam nominamus. Quæ uero diuturniorem exacerbationem habet, eam simpli-ter tertianam uocamus. Quæ autem longissimè extensam exacerbationem habet, exiguum uero interuallum, eam rursus uocamus tertianam extensi-

Tertianam acutam. CAP. XX.

Tertianam exquisitam uelut à flaua bile orientem, humectare ac frigefacere oportet, & quod in uentre consultat, per uomitus, ac deorsum eua-cuare, sed & per urinam ac sudores ita aperta deducere. Venter itaq; molli-bus insulis moueatur. Urinæ uero, apio & anetho in portionibus macera-tis promoueantur. Et si concoctionis signa appareant, confidenter iam etiam abstinentiam dato. Balnea ex aqua calida potabili conueniunt, & neq; nitro, neq; sal, neq; sinapi, in balneis aspergatis sed oleo quàm maxime calido as-fuso circummetra, in solium immittito. eos autem qui balnea amant etiam si-bis laueris, nihil deliqueris. Si uero etiam concoctionis morbi signa appa-

Febris putrida curata

Frigida quæ do danda

Rigor tertiane ac quartane differentia

*Tertianæ exquisitæ
Tertianæ exten-sæ*

Abstinentia potus

seant, non peccatis si saepe laetitia. Vinum prius quam concoquantur mor-
bus penitus prohibendum est. Vbi vero concoqui incipiat, et uae & aquo-
rum ac modicum prima die datus & cibi qui humectant ac frigescenti com-
modi sunt. Abstinendum est à melle, sinapi, balsamento, & natura calidis.
Atq; hæc quidem ueterum curatio erat, & nihil miri est, quam illius tempo-
ris homines in exercitijs, & alimentis usque degerent. Nunc uero ordine
pertransibis, bilis ut plurimum pinxit ammixta reperitur. Proinde plurimæ
tertianæ, aut citra rigorem sunt, aut ualde parvus rigor ipsis contingit. Ita-
que etiam curationis ratio euariat. Neq; etiam balneum, neq; plenior ac for-
tidior aliquis cibus, ante concoctionem tertianarum conuenit, præterquam
panis mace, & oua, & similia.

Tertianarum curatio. CAP. XXII

*Tertiana
feruens*

I Ausre in tertianis sporæ in principijs commodum non est, sed quando
iam signa concoctionis apparent, neq; quoddam nutrit, sed satis est alter-
nis diebus. Quies autem & calefactio partium circa præcordium ipsis con-
ducit, & forbitiones concoctus faciles, & infusa ad internam aluum non ual-
de mollia. Si si sanguinis detractio ne opus sit, neq; hæc relinquenda est. To-
tus uero uicibus itatus, non in totum perfrigerans ac humectans sit, sed ex-
tiam de modo qui magis secer infuper assumat. Maxime autem conueni-
ent ipsa persanæ succus, pipere insperso, aut hyssopo, aut origano, aut nardi
spica. Sed & aqua mulæ pipere inscisa, & coctam bibendam dato, itemq;
alia quæ urinam cient, exceptis uehementer calefacientibus ac siccantibus.
Abstinendum autem maxime post septimum diem dandum est. Quis & acer-
tum multum melis in potu proficis, & aliquid ex his quæ moderate aluum
ducunt. At uotius à cibis acceptis commodissimus est his qui in hac fe-
bre diutiorē moram trahunt.

Quartanarum regilla. CAP. XXIII

*Quartana
uoca*

Quartana insulam facit cum multa perfrigeratione, utpote quæ ex fri-
gido humore, atra bile originem habet. Sed & calorem & ardorem fe-
brilem non habet, uelut tertiana. Imò neq; bilis uotius consequitur. Ad
hæc si tenues, & albes, & aquosa urinae fuerint, quartana febris fuerit. præ-
cipuum uero quartanæ signum est pulsus paruus & rarus. Sed & autumnus
plerumque initium habent, ad erronea febres succedentes, & quandoq; ad
formam per quartam diem maxime reuertentem consistit, quandoq; etiam
per plures dies iuxta circuitus quosdam exacerbat.

Quartanarum curatio. CAP. XXIII

Ex quartana agrotantes leniter tractare oportet, neq; medicamentis ali-
quod forte adhibendo, neq; euacuationem, si non sanguis ualde redun-
dare appareat, quando sane uenam secare conuenit. Vicium autem sanus
exortem & bonum exhibere, & uentrem per consueta mollire. Si uero hæc
nihil efficiant, infuso per clysterem uti, mollibus primis, postea uero acri-
bus. A porcinis carnibus regi prohibeantur, & ab omnibus quæ uiscosa
sunt, & tardè transiunt, & à frigescentibus ac humectantibus edulsis om-
nibus. Vino utendum est tenui & albo, ac moderate calido: balsamento ite-
l & sinapi. Et per dies aliquot, medicamentum ex tribus pipere generibus
constans sumere oportet, & diosporicum appellatum. Sed & si piper solū
ex aqua quotidie accipiant, recte fecerint. Quam autem in morbi uigore
ager fuerit, tunc uicis tenuissimo utendum est, statimq; subindum ut diu
conquiescat, & uisceribus prospiciendum per mollientia & laxantia. Con-
sequenter autem urinam citius utendum, & si concoctionis signa appa-
ruerint, tunc condidendum, & atros humores euacuantibus utendum, non
semel solum, sed sæpè post uehementem autem purgationem, etiam ex ui-
peris medicamentum dato, & alia quæ ad tales febres laudantur, inter quæ
est & illud familiare nobis, & omnium laudatissimum, quod succum Cy-
renæum recipit.

*Medicamentum
ex tribus pipe-
ris generibus.
Diosporicum*

*Medicamentum
ex succo Cyre-
næo*

Quod,

Quotidiana cognitio. CAP. XXXII.

Quotidiana nequaquam cum rigore intrit prima die, sed progressu temporis perfrigeratio magis quam rigor fit. ægræ autem calefcit, & diuturnum incrementum habet. Non tamen ægrotos perurit, neq; multam ac densam respirationem facit, neq; efflare, aut frigidam bibere cogit. Fiunt & pituitosi uomitus, & quæ per uentrem euacuantur, frigidiora, crudiora, & aquoliora. In his febribus comperies. Et circa primos dies minime exorditi, neq; ad febris quietem deueniant. Sed & expallido albidus est huius color. Urinæ uero tenues & albæ, aut crassæ, & turbatæ ac rubræ.

Quotidiana curatio. CAP. XXXV.

Quotidianam curantes primis diebus aceto multo utimur, & his quæ uisum bene promouere possunt. Et uniuersa uisus ratio incidendi uim habeat. Verum circa rigorem uentri prospicere oportet, & præsertim osculo ipsius. Deinde etiam uomere subere, à radiculis ac cibis acceptis, & pituitam subducenribus uti multum ac diu donec sedetur.

De Hepatide febre, et rigore calefcere sequens. CAP. XXXVI.

Vitæa pituita omnium pituitarum frigidissima, si impuresscitur manens, in toto corpore redundans, rigorem calefcere nequaquam absq; febre efficit. Nam in febribus quæ ex humoribus accenduntur, putrefactio quàm maxime febrilem calorem accendit. Si uero putrescat, atque hoc per totam ipsam contingat, quod rarum est, propter immodicam frigiditatem, quotidiana febris causa fit. Quum autem ex dimidio computruerit, non per totum essentiam suam æqualiter, sed partibus quibusdam putrescentibus, quibusdam impuresscentibus, hepatidem febrilem efficit, in qua riget simul ac febriunt. Et impuresscente quidem humoris partes, per totas uenas disper-

siunt, aut etiam per reliquum corpus, rigorem faciunt: putrescente uero febre accendunt, diebus autem hepatidis translatione à nocte in dies & e converso, id est à nocte, & mani factæ quum mitæ quidem appareat mare, horrendum autem sit ubi perturbatum est: ut ab eo quod in nocte, id est leuiter, & in die hoc est calefacit. Proinde & hæc febris quum quotidianarum generis sit, nimirum à pituita oborta, illarum curationi subijcitur secundum speciem, præterquam quod tanto calidioribus ac magis secantibus auxiliis, quàm prædicta quotidiana opus habet, quanto hæc pituita frigidior quàm illa existit. At rigor ille qui calefcere nequit, adhuc magis calefacientibus opus habet quàm hepatidis febris. Medicamentum itaq; ex tribus pipæris generibus, & quod ex calamintha constat, & quod ex succo cyrenæico paratur, his conueniunt. Et quæ ex castoreo ac similibus parantur auxilia. Latiorum autem horum curatione reperies capite XXXVI. de immodico rigore ac perfrigeratione. Porro Iapyxis & humolis, & quæcumq; præter relatas, febres dicuntur, quum ex relatarum genere sint, curationes quoq; de illis dictas ac dicendas exigunt.

De continua febre. CAP. XXXVII.

Febres continuæ eiusdem generis sunt cum singulari intermittentibus: est tertiana exquisita, ardens cum quotidiana, ea quæ quotidie exacerbatur, uerum ad febris quietem non desinit. Sic cum quartana, ea quæ quarto quoq; die exacerbatur. Nam febris ardens exquisita, omnia alia tertianæ exquisitæ signa seruans, in hoc solo ab ea differt, quod cum rigore non intrit, neq; ad febris quietem desinit. Et ea quæ quotidie exacerbatur, omnes notas similiter uelut exquisitæ quotidianæ habet, uerum eo quod non desinit in febris quietem, ab eiusdem generis quotidiana differt. Eodem modo etiam ea quæ quarto quoq; die exacerbatur, sed ad febris quietem non desinit, eiusdem generis est cum quartana. Continua igitur febris est quæ ad febris quietem, prius quàm perfectè soluantur, non desinit. Quum uero nec

declinatio aliqua apparuerit, generis quidem ardentium & hæc febris est, uerum acumine ab ipsa differt.

Quotidiana febris

Pituita vitæa

Hepatitis febris

Hepatitis exorditi

Rigor non calefcit

Lipæis et succo cyrenæico

Continua febris quæ sit

Continens febris frons **C**ontinentium (synochos graeci vocant) febrium generatio ex sanguine est, quandoque torrefactio solum, quandoque etiam putrefactio, ob obstructionem est. Quapropter exacerbatio ipsis ad finem usque una est. Signa vero sunt, pulsus maximus & vehementer, & veloces ac densi, & inaequales, non mor daces. Vinum naturalibus non ita valde deficientes. Curatio est, per ungu sectionem, usque ad animum deliquitum. Si vero talibus uena secta non fuerit, le bricitantes ad extremum periculum deueniunt. Quod si quid prohibeat, ut euacuatio per uenam sectam fieri non possit, alijs auxilijs obturatione liberantibus uti oportet, quae & multitudinem sanguinis euacuant, & febri frons uorem mitigant. Quam uero in ipsis concoctionis humorum uocis uide ris, & neq in principali parte inflammatio aliqua, aut tumor laxus aut durus fuerit, neq pars aliqua frigida, ut ad ipsam lesio irruat ac decumbat, consil denter frigidam dato, & maxime si arger frigida potior fuerit.

Febri ardens **F**ebribus ardentibus haec symptomata accedunt, lingua sicca, aspera ac nigra. Morbus uentriculi, egestionis alui pallida. Anus adhaerens, ut gilig, quandoq uero etiam delirium.

Frigida potus **E**X duobus alterum fieri necesse est, si ardens febris perfecte solui debet. Aut ut biliosi humores excremantur, aut extinguantur. Excremantur igitur per sudores, aut uomitus, aut inferantur aluiam. Extinguuntur per frigida potum, per quem nos omnes ardentis febres curauimus. Verum hac se bre affectos, neq ex aqua solum, neq ex aqua mella sola, uictum instituire conuenit. Sed aqua multa aquosa cocta ipsis danda est. Oportet enim ita ex grotantes ex solis portionibus uictum habere. Balam uero his solis conser nit, qui citra inflammationis aut erysipelatis tumorem febre ardente laborant. Si uero etiam concoctionis signa habuerint, multo magis ipsis conser cet. Qui uero ob salium humorem, ardentem febrem habent, eis non con ducit. Hos uero etiam puluere saeco natrue consermit.

Febri ex erysipelate affectione **F**ebres ex erysipelate hoc est ignis sacri, circa uiscera affectione, cognos sumur ex loci & feruore excessuensi, & dolore uchementi. Insuperq si, ac ardore immodico. Et in summa, ex signis acerrime bilis cum pusco san guine putrefactis. Curare uero oportet hoc modo. Abstineri quidem a bal neo in totum oportet. Aqua uero frigida circa uigorem morbi utendum est maxime continetiosa, hoc est frigidissima. Verum in principio, attendendum ea non est, sed forinsecus imponenda frigefaciencia. Et si nihil effecerint, etiam intra corpus ut ea eger sumat cogendus est. Maxime autem ipsis conueniant lactuca, & quae huius parem uim habent. Forinsecus autem & ipse lactuca soc cus commodas est, imò etiam semperuiui, & quaecunque alia frigefaciant. Optimo uero quam maxime utitur rali. Liqorem alicuius frigefacientis expressum in mortarium inieci mus, cum porulaca. Deinde con trita expri mimus. Vltius uero tempore, ammixta modica polenta subigimus, atq ita in uas indita, in frigida aqua immisso uas perfrigeramus. Et postea lintea duplicata in his imbuta forinsecus praecordia imponimus, non diu immora ri sinentes, sed alia frigidissima imponentes. Mille enim aliquando & olei om

Hebeticarum febrium **H**ebetica febris non in humoribus & spirita solo consistit, sed solidis etiam partibus. Verum doloris exors est, & sebrientes neq sebrere omnino se purant. Neq enim calorem sentiunt, omnibus partibus aequaliter in ipsis excelsus. Duplex uero febrium hebeticarum species est. Quaedam enim ex ardentibus febribus plerumq sunt, aut usq adeo excreant, ut temporis progressu humorem corporis cordis consumplerint: aut etiam manente ad huc multo. Ille itaque non solum hebetice sunt, sed iam etiam marcescere.

A Quæ uero manente adhuc humiditate sunt, hæc cordis corpus occupantes, hunc incenduntur, quemadmodum lacernarum flamma ex funiculo, manente adhuc in lucernis oleo. Et hæc quidem una est ipsarum generatio. Altera uero, quum ab initio statim intrerint, primam generationem diarsis similè sortite, ob tristitiam, & iram, & lassitudinem ampliozem simul cum ardore factam. Has igitur non difficile est curare. Eas uero quæ ad marcorem deueniunt, sanare impossibile est. Et sanè quæ in marcorem incidit Hectica febris, facillimè cognosci potest. Oculos enim immodice cauos conspicies, & gramas in ipsis reperiæ siccas, & squallidam quandam affectionem. Perijt autem & coloris ipsorum uitalis ros, & frons sicca est ac circumscissa. Et plerumq; palpebris nistant, quemadmodum ad somnũ procliuës. Est autem hæc affectio non letum, sed uigilandi impotentia. Et tempora collapsa sunt. Et quod idem aliud quàm ossa & carnes solum existunt, huius denudata pars inspereris partes circa uentrem, neq; aliquid intestinum, neq; uiscus aliquid saluum esse putet, & præcordium uoluntate retractum est, & cutis ipsis extremitatibus arida est. Pulsus gracilis est, & densus, ac durus. Caliditas autem circa primum occursum languida. Verum paulo post uim acrem ac erosiuam declarat. Quandiu igitur aliquid humiditatis seruat, hectica febris solum est. Vbi uero ad id periculi denenerit, ut non amplius quicquid eiusmodi humiditatis superest, exquilius iam marcor consistit,

Marcor ex febre hectica consequens

Hectica febris curatio. CAP. XXXIII.

HECTICA febre laborantes statim ab initio alimento opus habent, propter humorum mordacitatem. Maxima autem medela est uiscus humectans. Oportet itaq; quàm maxime per pituitam suæcum, & per alicuius sorbitiones nutritas, neq; insuper exhibito, ægrum moderate frigida aqua potu curare, ubi neq; inflammatio aliqua ipsi detrit, neq; humorum putrefactio. Et si magnam inde lationem fore coniectes, frigida quidem exhibitionem habere oportet, uerum auxilijs frigefactorijs quæ extrinsecas imponuntur uti. Sed & balnea ita affectis per omne tempus commoda sunt.

Mordacitas humorum hectica

De semitertiana. CAP. XXXIII.

QUUM tertiana quidem cum rigore intrat, quotidiana uero sine rigore, febris quæ ex utroq; mixta est, horrorem inducit, qui rigore quidem minor res est, maior autem per refrigerationem, & sanè dum temperantur ex e minimis consistit. Itaq; neq; absonum nomen huic febre indiderunt, qui hemitriticum hoc est semitertianam appellarunt. Duplex autem est generatio, nis ipsius modus, aut duabus exacerbationibus uno tempore coincidentibus, aut ambabus statim ab initio inter se permixtis. Quam itaque tertiana prædominatur, horridior febris sit, & circa accessionem etiam aliquid rigoris assumit. Sciatim autem talis & calidior est, & ardensior, & quendam bilis uomitum, aut alui egestionem, aut sudorem inducit. Vbi uero altera pituitosior præualeat, extremarum partium frigiditates prædominantur, pauca autem sunt horrores, non tamen fluctuosi sunt, neq; uisciosi. At si æqualis magnitudine fuerint, tertiana intermittens, & quotidiana continua, exacerbationis quidem insulsi cum horrore sit, & quum pituitosa prædominet febris, contractiones sunt ac homores. Si uero calidior præualuerit, acuatim exalescit. Ac talis quidem est semitertiana exquilita, ex æqualiter forti duarum febrium mixtura oriens, tertiana intermitte, & quotidiana continua. Quæ uero exquilita non est, aut biliosam humorem uberiorè habet, aut pituitosam, quæ sanè etiam magis facile curari potest, quæ paucior humor promptè superari possit, tum ab uberiori prædominio, tñ ab artis auxilio. Si enim pituita præualuerit, auxilijs de quotidiana relaxata maxime utimur. Si uero bilis flaua, his quæ de tertiana dicta sunt,

Tertiana mixta minoris curatio requiritur

ita ut in uniuersum aduersus id quod urget insisteremus, & tamen neque alterum omnino negligamus.

e De pot

*Populares
morbis*

Populares & communes morbos nominant eos qui in multis simul incidunt quorum veluti generatio, ita etiam causa communis est. Communia igitur et alia prava, tales morbos pariunt. Communis item aquae vitia, et ponis, & labores immodici, & labores confecti intermissi, in digentiisq; ac repletionibus, ubi vel fumes grassata est, vel largior rerū proventus cōtingit. Sed & locorū naturae communes morbos sepe invexerūt, quādoq; palustriū, quādoq; barathrū vicinū habentū, quod exhalationē venenosā ac praviū remittit. Atq; haec quidem frequenter contingere solent. Verum ambiens nos aer mutat temperamenta, siue immoderatē calidus, siue frigidior, aut siccior, aut humidior fiat. Nam reliquis causis neq; omnes simul obnoxij sumus, neq; per totum diem occurrimus. Aer vero nos ambiens, & extrinsecus omnibus circumfusus est, & per inspirationem amittitur. Necesse autē est unā cum ipsius secundum temperamenti alterationibus, etiam animantium corpora coaffici. Qui igitur haec novit, non solum futuros morbos ex unaquaq; constitutione praenoscet, sed etiam fieri prohibebit, ad immoderata ambientis aeris temperamenta, contrariam nobis rationē excoq̃sita natura. Quae enim igitur corpora propinqua ad hoc sunt, ut morbum aliquem inciderent propter propriam intemperaturam, ea hī simili ambientis nos aeris rēpensura laeduntur. Quae vero contrario modo temperata sunt ad aerem, si pra hoc quod nihil iniuriæ accipiunt, etiam meliora sunt, temperamētū immoderatū contraria immodestia castigant. Et qui hoc novit, sanitate conservabit, contraria corporibus adhibens, quādoq; refrigerationibus utē, si ita opus fuerit, quādoq; calefactionis, ita ut aquae inductionibus, & octo, & ciborum inopia, & potus redundantiā refrigeret, regumētis autem & laboribus, & cibo uberiorē, & potu parciore calescat. Sed & rogo ingenitū extructio ac incensio, aerem ad caliditatem ac siccitatem multum transmutare quis poterit, si ante humidus ac frigidus fuerit, quemadmodum Acro-

*Aëris ambien-
tis tempera-
mentis*

*Aquarum
dilatatio*

*Acro Agri-
gentium*

nom Agnētium fecisse dicunt.

De pestis, et Pestis scriptis. CAP. XXXVI.

*Pestis horren-
dissima*

*Pestis scriptis
morbis*

Omnia horrendissima in peste fieri possunt, & nihil occultatum manet, quædam dno dum in singulis morbis. Nam & deliria fieri possunt, & bilis vomitus, & praecordiorum distentiones, dolores, sudores multi, extremarū partium frigiditates, profluvia alui biliosa, tenuia, flumosa. Urinae quoque, renares, biliosae, nigrae, malas subsidentis habentes, & ea quae in merdō innatant pessima, sanguinis de naribus effusiones, ardores in thorace, linguae torrefactae, sinuulosi sunt, anxij, vigilantes, convulsionēs volentes, & alia multa prava. Si vero solerti ingenio quid praestet, si citam pestē praenoscet, attendens & temporibus pravis, & a uicis hominum ad sanitatem non conducenribus, & alijs animalibus prius percutenribus. Quam itaque haec consideraveris insuper & illud tecum expendere, quale sit praesens tempus, qualis item universus annus. Hinc enim comperies quomodo illustrationem optime constituas. Verbi causa, debebat esse si recte res fieret, tempus siccum, nunc vero humidū factum est, necesse igitur est per vicium reliccare, quo excedens humiditas consumatur. Habenda autem est & alia cura. Quibus vero superius uenter pluitam habet, uicibus emacquare oportet. Quibus autē sanguis excedit, uenam secare. Commoda est etiam per urinas purgatio, & quæcumq; alia, & quae sit per totum corpus. Si vero etiam ardore affuerit, & flamma ad pectus usq; ascendat, nō alium fuerit, & si iga gloria pectori adhibere, & frigida potum exhibere, non paulatim, pars enim exurit, sed acuatim, ut flammam extinguat. Si autem ardor incensus partes occuparit, extremae uero partes & cutis superficies frigidae fuerint, & praecordium distendant, & uentriculus collisquamata pars superior, partem deorsum mittat, & uigiliae affuerint, & delirium, & linguae asperitates, his calefactionis opus est, quo caliditas ad superficiem

*Frigida potus
acuatim*

A perficiem corporis trahatur, & si quo alio modo fieri possit, ut caliditas ex profundo ad externas partes educatur. Vitendum & hoc quæ præsumitur potione. Abiis partes I. Ammoniaci thymiamatis partes II. myrrhæ partes I. Hæc tria in uino odorato fabæ magnitudine dentur, quotidie uidelicet. Haud scio inquit Rufus, an sit quis qui ex hoc potu non à peste immunitas ac superior euaserit. Hæc quidem Rufus. Verum Galenus ad pestilentes putredines, armenis cū bolum in potu, & similiter ex uiperis theriacam, magno pere professe ait. professe in peste quæ Romæ grassata est inquit, omnes mortui sunt, quibus neutrum horum profuit.

De his qui ob crudum humorum copiam synopes moriuntur. CAP. XXXVII.

Quidam febricitare incipiunt, ex magna crudorum humorū copia collecta, quā cum hoc quiddam uentriculi male affectum est. His insitum est præcordium, & totum corpus maiorem naturalem molem habet. Et color albus ad albidorem & aquosiorē speciem mutatur, alijs ad nigriorem ac liuiorem. Nulli tallum sanguinis detractio citra maximum detrimentum fisci solet, & quiddam opus habent euacuatione. Imò neq; uenæ sectionem, neq; purgationem ferunt, ut qui etiam sine his deterrente animo concidant. Curare igitur ipsos opo nec per frictionē. Incipere uero statim ab initio morbi conuenit, primum à cruribus superne deorsum, per lumbos, rursus superiora. Deinde etiam totæ manus conficiuntur superne deorsum. Postquam autem artus satis calidi apparent, & timor fuerit lassitudinis sensus, oleo laxante utendum est, & huiusmodi autē ab adstringentibus. Hyemis uero tempore etiam discussio utendum est, quale est oleum sicyonii ac chamælinum. De frictis autem iam plurimum artubus, oleum quiddam detergeatur. uerū ad spinam totam progressus fiat, & hæc similiter tricesur. deinde rursus ad crura transgressio fiat, & ex his rursus ad manus, & postea ad spinam, ita ut per totum diem id agamus. Commodissima his est aqua mulla, in qua coctum est hyssopum. Et neq; cibos ipsi, neq; sorbitionem, neq; aquam dare oportet, neq; permittite ut omnino largius bibant, sed sola aqua mulla contenti sint per primos tres dies, ita ut per successionē fricemus, & illud solum tempus remittamus, in quo somnus ipsos occuparet. Si quidem igitur pulsus ipsi ualde paruus, & fortiter inæqualis est, extremum periculum imminet, & facere oportet ea quæ dicta sunt, nihil aliud curiosius conando. Si uero firmitatem moderate habeat, & nō præbideant alia excrementa, insulam per clysterem confidenter adhibe. Si uero superfluitatem impetus amplius quā oportet in uentrem fiat, primum quiddam amplius aquam mullam coquito. minus enim subducit. Si uero adhuc amplius alius subeat, neq; sic sufficere oportet, ueniam pro aqua mulla præstare succum dare. At si adhuc ferri perseueret, sorbitione ex alica nutrire. Quid si debilitatem ex pulso didicerim us, & uires collapsas, panem ex uino diluere dare conuenit, neq; uentre, neq; hepate inflammato. Nam si inflammare fuerint hæc partes, corporis crassus humoribus repleto, desperatus est ager. Si uero quandoq; perceperis satis crassos esse humores, acetū mullum semper pro aqua mulla dato, si quidem ætas est, & aquæ frigide potior sit, æger, frigidum acetum mullum huius dato: hyeme uero calidum. Aduersissima sunt his balnea, & aer nos ambiens nullus calidus, aut frigidus. Hæc igitur faciendū sunt à prima die, ubi ipse inceperis curationē. Si uero ubi iam animo concidunt, uocatus fueris, partibus his de quibus dixi nō inflammatis, panem quidem dato ex uino non mullum, statim autem ad frictionem procedito, & iuxta etiam modum uitior: porro in quibus propter fluxum bilem, quæ os uentris læsit, syncope contingit, frigidum potum assumere oportet, uinumq; tenue, salinum ac uetus exhibere.

De his qui ob tenuem humorum copiam synopes moriuntur. CAP. XXXVIII.

Quidam ob tenuem humorum animo concidunt, curationis prædictis modo curandi sunt. Nam & signa notoria contraria his corporibus. Nutrire igitur

Potio quæ præstata à peste

Bolum armenicum

Synopses ex crudis humoribus moribus

Aqua mulla amplius colla

Synopses ex tenuibus humoribus moribus

igitur paulatim affidue oportet. Sed & hos incurabiliter affectos esse putandum est, quum hepar ipsorum aut uenter inflammationē habuerit, languentibus iam uiribus. In his affectionibus letalis constitutio celeriter fit in facie. Et sane nutrire ipsos ne cessarium est. Similiter etiam superficiem corporis de nare, quomodo modum superiorum rarefacere. Parandus quoque aer frigidus, & adstringentibus inungendi sunt. Cibi dandi sunt non ualde dissoluti. Dandus itaque panis est, & lectiones ex alica, & fructus aulenti qui recte corrumpuntur, tum per se, tum cum pane. Commodum his est uinum aquosum, quod statim ab initio post cibos assumatur.

De eius occasione, ab qua sanare sunt. CAP. XXXIX.

*Syncope et uir-
tuti occasio-
ribus
Cerebri affec-
tione*

Sunt & alie occasiones ob quas homines animo concludunt, quatuor tamen. Dolor uehementis, uigilie, euacuatio immodica, & in delirantibus aliquando ipse motus. His quintam si uoles adde, principiorum intemperiem. Celeritima igitur perniciēs inhiat corde affecto, consequenter autem cerebro, parum uero hepate.

Doloris. CAP. XL.

*Doloris
species*

Dolor igitur stupefactorius ob frigidam sit affectionem: pulsatorius autem proprius est magnae infusae donis. Si uero uelut ab aculeo infixio, aut uelut a trebellio forari se quis pueri, crassi intestini hanc doloris species est. Verū in rethibus cum grauitate quidam dolor est, in uno loco firmatus, circa lumbum dextrum aut sinistram, reuertum magis. In colo uero dolor ex loco ad locum transit. Punctorius consistit circa pelliculas. Pulsans dolor non solum uehementissimis alterius tantum capitis partis doloribus contingit, sed etiam antiquis capitis doloribus, cephalgis appellatis. Est autem dolor perulsans, quum uelut à radice primario affecte partis initium sumens, cito in circuitibus fertur. Dissidentes ueroque dolores, neruorum sunt, quando & dolent, & ad ambas extremitates descendunt. Minime enim ad latitudinem dissidentes dolores nerui ipsi habent. Tenuis autem & stupefactorius dolores inducit membrana sub cute extensa. Quae uero inter carnes sunt membranae, dolores uelut diuidentes faciunt. Sunt enim molles, & ita qualiter inficere, & ipsam carnem ambientes. At circumdantur ossibus membranae dolores profundi sunt, & ipsorum ossium dolentium imaginationem inducunt. Quum igitur nulla externa doloris causa apparuerit, per gressum uisum considera. Aut enim fuerit praeter consuetudinem ociosior, aut cibis pluribus hominibus est, aut multum nutritiis, aut confusa excretio suppressa est. Si enim quicquam horum, aut etiam omnia apparuerint, humorum multitudo causa est doloris. & quam celeritè hominem euacuato. Sic enim cum omni securitate tibi licebit his quae fluxiones repellunt aut, in partibus dolore affectis. Si quidem igitur sanguinis multitudo fuerit quae descendit, statim uena magna secunda est prope affectam partem. Visiosa autem humoribus solis infestantibus, purgatio fiat. Ambohas autem concurrentibus, utriusque euacuationibus utendum est, uenaprius scilicet. Si uero his facili dolor remanet, manifestum sunt est circa partem affectam impactionem esse id quod molestat. Manifesta est etiam euacuatio, per diffusoria funera medicamenta. Eodem uero modo & dolores ob fluxum spiritum obertos curabimus, placentes ipsos magis attenuantibus edulcis, insulasque per clysterem, cataplasmas, arigatoforibus ac fomentis, raras facientes corpus illum continens. Si uero tumor grauius aut promissus dolorem efficiat, tumor catandus est. Si ob mordacem humorē dolor fiat, aduersissima his sunt attenuantia ac calefacientia. Anethum igitur in oleo coctum, dolorem eximit, & somnum inducit, & uiride magis quam siccum.

De caligantione. CAP. XLII.

Caligantio

Quam quid per uentrem excernitur, non a cibo aut potu accepto, sed ex humoribus ex toto corpore in ipsam conuenientibus, quod simile quidem est bilis, quae assidue per uentrem reiecitur, ac per alium secedit differet

differt autē ab ipsa, febris grauius sentia, & quoddam effusio fululor apparet, & crassitudine habet frigiditatem, aliquando etiam oleosam, aut adiposam: huiusmodi idem colliquatio appellatur morbus. Nam recens compacta pinguedinis ac carnis essentia, a febris ardore resolutur ac colliquatur. Dicitur uero perseverante malo, ex ipsis etiam solidis partibus aliquid collique fieri: in hac pessima febre frigide potus remedio est, ex frigidissimo fonte petitis. Talis uero esse oportet etiam cataplasmata, & epithemata refrigerantia, ut thoraci, ut praecordis impolita, perfrigerantes quoque cibi exhibendi sunt.

De uigiliis in febribus. CAP. XLII.

Si uigiliae nimis infestauerint, manus & cetera deligari iubemus, eo tempore quo ad somnum conuertere solent, & uigilare. Tunc autem aperire & claudere palpebras cogimus, donec sufficienter fuerint fatigati. Deinde reperiē soluius ligamenta, & lucernam tollimus, & malam quietem esse iubemus. Quod si fortiter incumbant uigiliis, in exacerbationis remissione facies produenda est papaueris nigri caput decodit. Idem etiam olactionem est. Et papaueris albi corticem totum, tritum, & mandragorae radicem tritam, aequis portionibus, cum uino & rosaceo, in malagmatis formam redige, ac fronti impone. Serpillo item cum meliloto in passio cocto utere, & hoc in ipsis quoque exacerbationibus. Aut trita papaueris caput pane excipimus, cum rosaceo aut cerato imponimus. Sed & cibis quodam modo curior sit, & sorbitionibus papaueris albi semina adiecta sunt, tritum cochleariorum mensura. Olera uero parantur, papaueris nigri si affuerint, solis adfectis quidibus, quantum tribus digitis capi potest: si minus, tria aut quatuor capita siccata simul in cocta existantur. Si uero neque in somnum derferantur, papaueris succo, aut mandragorae succo oblinantur. Sed & elegans quoddam delingendum ex capitibus papaueris componitur, & maxime id quod ex sapa constat, si cochlearij unus aut dimidij mensura bibatur, saepe somnum conciliant. In quibus autem caput non facile repletur, autendum est si uigiliis infestentur, in declinationibus tali suffragio. folij amomi, costij, zamabo, singulorum unciam unam, carpobalsami drachmam unam, styracis, ammoniaci thymiamatis, bdellij scythici, radicia mandragorae, succi papaueris, tantundem, suffuso in lignis cupressinis.

Circa semini grauiorem.

CAP. XLIII.

Faciem spongia posita lactei teporis imbuta detergere oportet, & extremas partes fortiter deligare. Odoramenta adhibeantur incisoriam uino habentia. Et in exacerbationum remissionibus cucurbitae dorso ac ipsis effricata affligantur. Perseuerante uero morbo, etiam si emutatoria in exacerbationum remissione adhibeantur. Sit autem & ciborum materia secunda ac diuidenti ut praedicta, uelut in similitudinis praecipis diximus.

Circa dolentis capitis in febribus. CAP. XLIII.

Capitis dolore in febribus uexante, post conuenientem superfluitu actionem, circa exacerbationum declinationes, unctio capitis utilis est, primum ex oleo communi ac erbo ac erudis adhuc oliuis expresso, aut rosaceo, ammixto ad ipsam etiam ac ero paucissimo, aestate quidem, & in febre ardente, frigido: hyeme uero, & in non ardente febre, calido aut tepido. Coquantur aliquando in oleo etiam serpilli ac polygoni succus. In aestate etiam calices papaueris, aut ipsam papauer, quemadmodum rursus hyeme, peucedani parum. Perseuerante dolore in fronte, si incipit nudum fuerit, cataplasma huic adhibendum est ex polente polline, & polygono. aut ex pane similiter ac rosae, aut modica myrto, aut serpillo. Quoddam etiam puluerem ammixtum magis leuauit. In quibusdam uero etiam quum feruoris sensus efficit, psyllium polentae ammixtum profuit aut etiam per se in coctura ad uiscis formam redactum, & assidue permuratum. Et curandum similiter cum polenta. Sed & aloē cum aceto illinitur. Et myrrha, & ammoniac cum similitur & erocomagma. At pulsantes dolores nati & menta cum pane

et diluit,

diffilat, adhiſſato etiam roſaceo. Si uero ad relata dolor non ceſſerit, priuſ caput ad cuiſ attodere oportet. deinde pinguioribus irrigationibus per totū ipſam uendum eſt. pollea cneurbia aſſigendis ſunt oſcipito, & exurim partes deliganda ac conſtricanda. Commodae ſunt & hirudines appoſitae. Ceterum ſi deſuſio aliqua, aut grauedo illapſa, capitis dolorem accenderit, his quae ad huc proprio loco deſcribuntur auxilijs uendum eſt. Si uero à locis circa ſtomachum uapores exhalantes caput leſerint, etiam his prouidendi eſt, quemadmodum ex ordine ſubſcriptum habetur.

De ſtomachi affeſſionum curatione. CAP. XLV.

Si imbecillis fuerit ſtomachus, cataplaſmata corroborantia potentibus utemur, qualiſ ſunt quae palmulis conſtant, uino, polenta, croco, maſtiche, & aloë. Irrigationes autem adhibebimus ex abſinthio, & oleo melino, maſtichino, nardino, & uino. Et ſi ſtomachus exuratur, ammiſcenda ſunt cuiſ frigefacienda aliqua, ueluti eſt cneurbitae ſuccus, & lactuca, & portulaca, & ſolana, & intybi, & uin acerbe. Si uero aliquid inflammari circa uifcera apparuit, etiam ſe laxatoreſ quidam ammiſcenda ſunt ad irigationes quiſ dem, oleum chamamelinum ac cyprinum: & de adipe, gallinaceo ac anſerino. Bdeſſum item aut ammoniacum, aut ſimilia. Ad cataplaſmata uero, apq ac ſenti graeci ſemen, althaea ac chamameſi ſtos. Et in ſumma, cōpoſitiſ his facultate habeant, ex laxatoria tenuiſ partiſ, & amara, ac adſtringēte.

De ſtomachi perſpirationibus ac rigore ſerme. CAP. XLVI.

Rigor illius qui ſudicatorio modo hinc, redillere non oportet, neq certamen exolueretis & perſpiratione quae ex ſudore oboritur, prompte ſedatur, & nihil moleſtas. Si uero perſeueret rigor, aut perſpiratione (à frigidiore uero & muſta pſuſta maxime oboritur) primum artus pluribus modis conſtringendi ſunt. deinde primum illinendi oleo chamamelino, aut cyprino, aut ſirio. Si uero maiore auxilio opus ſit, piper quoq oleo ammiſcendum eſt, aut roſi marini ſemen, aut adarce, aut caſtorum. Et froſtio mollis totius corporis adhibenda eſt. Quo uero non facile oleum deſuſa, non itaque eſt ceruicium in ipſo liquare. Quod ſi rigor recalcere non poſſit, fortioribus etiam accipiſ ex his compoſitiſ, & dropacibus, ac ſinapiſ uſendi eſt, & alia ſuſuper ſomenta conuenientes excoſtitanda. Sed & actiora odoramenta conueniunt, calaminiſ, poſlegium, hyſſopum. Quia & antifebris acceſſionem, aqua mulſa habenda eſt, in qua piper & ruta ſint cocta. Et ſucciſ cyrenaeſi mulſi magnitudinem cocto melle efformati, duabus ante exacerbationē horis dabimus. Similiter & ſilphij focci. Sed & id quod ad quartanas ex ſucco cyrenaeo componitur, mulſa proſuit. Et qui in olei mulſi calidi ſolij ſe dimiſerint, inquit Archigenes, rigores pertinaciter haerentes excluſerunt. At Galenus ante acceſſionē febris, cutem ab oſono deſfricare iubet, aut calaminiſta ſicca, aut conyzae ſolij & floribus, aut coſto, aut pyrethro, utriſq his eſt oleum: & aut omnino nō, aut ſaltem minus rigebit.

De ſideribus. CAP. XLVII.

Sudores ſudicatorioſ admittere oportet uſq ad ſufficientem euacuationem, ita ut etiam adiuuantes moderata calefactione, ac quiete, ut ſudorē non abſtergeamus. Alij enim alium dicit: & calida oris colluſione ac ſorbitione, & ſomno. Sed & remiſſos ſudores ſimiliter ut ſudicatorioſ adiuuabimus. Quae ipſius ſudores ducunt auxilia, libro primo capite quadageſimo octauo ſufficienter relata ſunt. Poſtquam uero ſudores amplius prona pectore, uene detergere oportet, & tegumenta leuare ac refrigerandum. Laſſitudinem enim inducunt nimium erumpentes, adeo ut ſape ad ſyncopen adduxerint. Tenue igitur ſit amiculum & maſtichum, & aer frigidiſ, ſorminus quoq ac uentiloſo aſſeruantur. Et myrrus nigra, uſa corpori inſpergatur, & ſimiliter galla, & pini cortex. Elaeſtrum item ac polenta, cum uino adſtringente, partiſ ad interitibus imponantur. Et ſpongia poſtea imbuta lacte detergeatur. Archigenes autem & calcem alutam, & ſecem uſq uſam,

uſam,

Allum, nam in his, tum in rigore recalescere nequeit allum. Ambo enim hoc inquit, dum incallescunt refocantur. Irigare enī medias corporis partes subet succo plantaginis, aut coriandri, aut portulacæ, aut brassicæ, quo compactæ sudores arceant. In somno uero, in cinotia terra aqua dissoluta, pinguisiunt linteda, & subijciuntur dorso ac thoraci. Illiendum est autem totum corpus rosaceo, aut melino, aut myrteo, aut lentiscino, aut cera, eis ex his paratis. Idonea enim magis sunt his pingula, eo quod obscuros meatus obturant, humoris transitum prohibentia. Manifestū uero est quod & citius siccior has conducit, & uina moderate adstringentia. Verum in pluribus potionibus, & præsertim humidioribus, & infrequentibus orts collutionibus abstineant. Si uero id fieri potest, etiam gestationes assumantur, in frigidiore aëris constitutione. Extremæ autem partes his maxime perfriguntur. Qui uero per expressionem sunt sudores, isti autem ob dolores, aut conuulsiones coniungunt eos & deligatione, & som extramarum partium, & panniculorum laneorum defriccione leuiter curare oportet.

*Sudores per
expressionem*

De assis in febribus.

CAP. XLVIII.

Tussi in febribus, præsertim cū rigore orientibus, resistere oportet. Nam per tussim instans iam labans alioqui febris erigitur. Dandæ igitur sunt confectiones sub linguam tenendæ, ex melle cocto & coactæ, quæ linguæ subiectæ eliquantur, atq; inde hypoglossita uocantur, & id quod bonam spirationem impedit dissolunt. Tempus usus ipsarum est circa exacerbationē uirgores, & deinceps usq; ad modicum tempus ante accessionem. Deur item aqua nulla cocta. In quibus uero nervosi genus suspèctum non habes, temporis progressu confidenter etiam ac etum mollium dabis. San minus, hyssopi decoctum. Hoc etiam rigentibus auxiliatur. Dabis item castoreum, si febres non sitardens. Hoc & nervorum generi conducit. Eclegmata uero delinguntur ex pini & firbuli nucleis, iride, semine lini, amygdalis amariis, & urticæ semine. Pluræ ex his etiam cibis amuescantur. Sed & resina teretibundina in omo deus. Forissecus aut thoraci, & partibus circa arteriam, lana sulphurata imponatur. oleum uero aurum cum sit, aut trinit, aut anethinum. Ligamentum quoq; robustum in longam deligatam, tussis exardet cohibetis medijs dico, ac extremis partibus. Nec præter rationē est, tussis grata uti staphyde sythuesi, ita ut una cum uitis passis, aut cum massiche manducetur. Quin & extremæ partes defricandæ, contrecandæ ac deligandæ sunt. Deinde uisus exoluenda illa in contrarium protrahito. Si uero ob febres acrimoniam tussis irritat, gargarizate ex aqua tepida utendum est. Sed & frigida sæpe profuit. Conferant & ex posca gargarismi, & ex palmularum, aut rosarum, aut radice dulcis decocto. Visceribus autem ac ipsi cordi ea quæ moderate fruge faciunt imponenda sunt.

Tussis in febribus

Hypoglossita

Lana sulphurata

Defrenata.

CAP. XLIX.

Sternutationes sæpe vexant in febribus illabentes. Nam & caput replēt, & uires prosterunt. Quibusdam etiam sanguinem erumpere faciunt, atq; alias elusini di turbationes inducunt. Quare ipsæ resistere oportet. Irruentem itaq; sternutationem cohibet conficção nasi, frontis, & oculorum, oliscatio it em, & palati diligens frictio, uelut, laterum mollitudo in interos, capitis eleuatio, conuersio ad latus, summan partium contrectatio, in uiscolorum mandibularum frictio, olei calidi in aures infusio, puluini calidi sub mentum subditio. Vitare autem oportet repentinam ex somno excitationem, sumum, puluerē, aciores odores, pipēris, castorei, sinapis, menthe. Lenis est odor malicæ, ac polente. Nam sternutationi elapsum obundit. Idem faciunt & spongia maris nouæ. Cæterum impetu ad sternutationem oboriente, & sternutatione non prodeunte, labia quiescant, & aciores odores assidue experiantur, & mens remittatur.

Sternutatio cohibenda

De ciborum inappetentia.

CAP. L.

Si ob uitiosos humores ciborum inappetentia oboritur, cibi ac potus illi dandi

Inappetentia ciborum

dandi ipsa sunt, qui tales humores detergere, & aut per uomitum, aut per
 infernaliauum excernere solent: aut temperare, & meliores efficere possunt.
 Horum materia habes in precedente huius libro, qui primus est totius
 operis. Si uero ob uriam debilitatem inappetentes sunt, quandoquidē
 omnis uriam faculas propter partium interperiem debilis est, in temper
 riet speciem per contraria curare oportet. Variegationem itaque de inappe
 tentis tractationem, inter stomachica libro tertio trademus. Verum in fe
 bricitantibus statim ab initio appetentiam odoramentis recuperare conan
 dum est, maxime aqua in qua polenta subacta est, aut posca, aut uino dilu
 to, aut fuscus alicalis odorati ac adstringentis decoctio. Vnctione item le
 ni, & moderata totius corporis frictione ac contrectatione, & faciei prolu
 tionē, ac modice aque absorptione. Sed & digitorum immixtio est stoma
 chus laniatus, conuersus quodam modo ad hoc est, ut cibum adminiceret,
 & praesertim ubi biliosum quid aut acetosum eductum est. Post primos dies
 etiam cataplasmatibus forisfecus stomachus inuitetur, quae parata sint ex pal
 mulis, malis, crenantho, ablinthio, aloē. Cibi uero preparantur plures & sim
 plices, & frumentacei, & qui ex alia materia alterationes quasdam habent,
 non tamen procul ab usu febrium recedant, inter quos fructus quoque pomo
 rum numerari possunt, qui non facile acceant, neque ualde dulces sunt, sed
 maturi, & non usque ad siccitatem, sed solum ut appetentiam ad alios cibos
 irriterent. Adhuc autem ipsis dum cibum capiunt, qui lentissimi sunt, & compe
 scere ipsos ac cohibere possunt. Remotis iam febribus, si etiam in refectioni
 bus inappetentia permanent, sistrum coctum cum aceto mulso, & lactuca,
 & olusae maria condite, & capparis, & salisamentum, & bulbi, & quicquid
 stomacho commodum est excogitetur, ita ut & illos cibos in memoria re
 uocent, in quibus dum sibi essent, maxime immorabantur. Deambulationes
 etiam ac gestationes, & uociferationes, & dropaculimi, & frictiones, &
 exercitia assumentur. Sed & perspotationes succi ablinthij, aut aloē. Ace
 ti quoque scillitici myrti mensura absorpta probe facit.

Propo
 sitione

De magnafone. CAP. LII

Panes magnae
 Bolusae

Si uero ad magnam finem, bullionem appellatam, ciborum inappetentia
 deueniat, hoc est ut excellenter animo linguatum, hos retrocabis tum
 alijs odoramentis, tum scillis caribus assatis, & hœdinis. Et in summa om
 nibus nidoroso odorem habentibus, nimirum ubi acumen febrium iam
 praeteriit. Et extremitates ipsorum deligare, ipsosque excitare oportet, & ma
 xillas pungendo, & capillos aut aures uellicando. Remotis autem, panē
 ex uino diluto dabimus, aut aliud quid ex his quae facile distribui possunt.

De cœna appetentia. CAP. LIII

Cœna ap
 petentia

Et si hoc symptoma nō ita ualde in febribus accidat, sed aliquando post
 ipsas, tamen cum alijs, tum ob cognitionem quam ad ciborum inappe
 tentiam habet, non malum fuerit, & de immodica dicere appetentia, quam
 ambe modi excedant. Quandoquidem igitur à piruita acida hæc affectio
 maxime oritur, his quae hanc sciant ac detergent utendum est. Sunt autem
 talia dulcia & salia, & alioqui deterforia calcascentia. Vinum igitur ipsis
 dare oportet burgum, & uindam efficiens, talia autem sunt fusua colore,
 aut rubra, citra a siccitatem. Magis uero dulciora danda sunt, etiam si nō
 sint ut. Quam autem ad prandium accedens, primum pinguis ipsa dare o
 portet, & alia omnia multo olco preparata, nihil austeram, aut adstringens
 habentia. Hæc enim etiam si non palam ipsam impugnent causam, tamē in
 contrariam ad cibos impetum dissolunt. Verum abstinentia ab his, pl
 naria in stomacho collectionem minuit. Et salisamenta danda sunt. Posca
 uero pinguis una largi habet. Si enim longiore tempore ita fecerint, sedantur.

De sci. CAP. LIII

Sciense
 oratio

Si ita admodum parum, propter siccitatem, aut caliditatem partium sic
 ut putandum est, per quas potius humor ex ore ad nentriculum deferretur.
 Et mo

A Ex medela quidem siccitatis, est somnus. Caliditatis autem, uigilia. Aliqui tamen siculofus ex uino fiunt, & ob eduliorum caliditatem, & horum medela est frigida potus. Appetunt autem uitiosas qualitates, quemadmodum etiam cibos, iuxta rationem predominantis uisiosi humoris. Ceterum inextinguibili correptos in, ex qua etiam mortui sunt, aliquando uidi quosdam, qui uiperas dipsidas appellatas edissent & qui uino ueteri se inebriasset, atque hos qui in nauis, in qua aqua deficeret, essent nam qui ex ipsa marinam habere uult sunt, omnes perierunt. At in febribus sum, mitigare solet capitis frigidatio ex frigidissimo oleo, aut rosaceo, quæ cum delaphone in flos salientis aquæ contingit. Optum uero ad suum facilius fluxu nigric semem commanum, & glycyrrhiza appellata, & cucumeris semem ore detentum. Dato etiam situm ex his catapostum hoc. Cucumeris satius drach. VII. traga cantha drach. III. Tragacantham ouorum proclorum recentium albumine dissolue, & ubi dissoluta fuerit, ad cucumeris semem antea tritam adijce, & ex simul tritis ac emollitis catapostis efforma, easq; in umbra secca, & unum sub lingua tenendum præbe, ita ut dissolutum liquorẽ absorbeat. Dato etiam cremorem malorum cydoniorum, aut pironum, aut melspilorũ, aut pampinorum uitis absorbendum aut mali panici succum.

De lingua. CAP. LIIII.

Ingua spectatatem humectare oportet, ita ut seminis lini decoctum re-
gus in ore continere debeamus. Effluetis autem erit, si myxæ cum lini
semine fuerint coctæ. Sed & digitis in hoc succo tinctis, & lingua confictis,
os aqua pura colluunt, aut spongia detergeant. deinde rosaceo illinunt. Sed
& ipsum rosaceum melli ammixtum egregie efficax est. Erporulacæ siue
cus are detentus, & thus qui oblongis inspergitur, aquæ muliermixus pro-
be facit. Et damascenorum, & myrsin, hoc est myxæ ossa in ore retenta, &
linguæ obvoluta, & leuacæ cauliculus. Archigenes uero sal Indicus in-
quis, colore quidem & compage similis communi sali, sapore uero mellito,
lenticis magnitudine, intra diuinum habet, arrosus, uehementer humectare
posse. Decumbant autem in latus: supinus enim decubitus relinquit, & os
claudant. Nam & hære humorem siccant. Sternutaciones quoq; accersant,
omnibus alijs magis efficaciter linguas humectant.

De Nasu. CAP. LV.

Quoniam ab ipso eo quod aliquid quod uisum mouet ingestis, nausabun-
dus sit ager, manifestis esse opinos, ut ratio cin emur prauos humores
utriculum inestare. Quadam uero lancinantur quidem, non autem uo-
mit quicquam, in ipso sancta humore imbibito. Si igitur pituitosi sunt hu-
mores, coquere ipsos oportet, homine in quiete, & inedia, ac somnis serua-
to. Si uero tenuiores, uomitus ipsos efficit, qui aliquando ex pituita succo
contingit, aut aqua multa. Qui uero uiscosissimi ac crassi, attenuantibus o-
pus habent, quale est acuum mullum, & similia. Quod si humiditas praua
in tunica imbibita est, amara ex aloẽ confectio commoda est. Verum quæ
adstringunt, plurimum laedunt. Quemadmodum rursus ubi humiditas mal-
ta est, citra prauam uitationem, quæ adstringunt commodissima sunt. Ve-
rum medicamentum ex aloẽ ad marcorem perducit. At si frigiditas humiditas
est, adstringentia uenitenda sunt etiam calefacientia. Signum
autem frigidam esse affectionem, est non frigus, neq; ardorem sentire.

De bilis uisita. CAP. LVI.

Bilem uomentibus cataplasma adhibendum est ex palmulis, malicorio,
gilla, coctis in uino aut posca, pane assal contrito. Sed & acacia, & hy-
pocistis, & balustium, & thus cataplasmat amittantur. Et cucurbita
cum multa summa affixa magnopere prodest. Cibum uero spe, paulatim
dabimus. Ceterum in his qui atram bilem uomunt, & stomachum infla-
tum habent, spongas aceto acerrimo calido imbutas impone, aut hedere
folia in uino cocta appone.

De sine

*Singulis
causis*

Singulus fit aut ob repletionem, aut ob evacuationem, aut humoribus acerbis stomachum mordentibus, quibus vomitu reiectus sedatur. Multi vero etiam ubi medicamentum ex tribus piperis generibus comitans acciperant, si statim unum in superbia bant, singultunt. Quod vero etiam aliqui cibum corrumpentes singultunt, ex confectis est. Sed & frigore multum singultunt, proinde in his qui ob plenitudinem aut mordacitatem singultunt, iussicentem modicam esse vomitum experiemus. Calefactionem autem in his qui ob frigiditatem. Quum vero ob repletionem factus fuerit singultus, violenta opus habet evacuatione. Hoc autem praestat sternutatio. At si singultus ob evacuationem, sternutatio non sanat. Dare vero singultuentibus oportet, rutam cum vino, aut nitrem in aqua mulsa, aut fefeli, aut daucum, aut cuminum, aut gingiberim, aut calamandram, aut nardum celesticam. Atque hoc quidem sunt auxilia eorum qui ob ciborum corruptionem, aut ob frigiditates, aut ob repletionem singultunt. Verum his qui ex plenitudine singultunt, ob frigidos ac viscosos humores, castorei obolos III. dato ex posca bibendos. Idem etiam fortissecus cum ad stomachum impulsus profectus, cum oleo lycionis aut antiquo. Conuenit etiam acetum scillinum, aut acetum mulsum in potu. Sed & detentio spiritus magnopere commodat.

De deo suppressa et leuca febribus. CAP. LVIII.

*Alue hinc
Et ex febris*

Quandocumque aluum promoueat, in primo libro relata sunt, quantum opus erat. Quandoquidem vero & in febribus hanc humectari cōtingit, de hoc dicendum venit. Multi enim non pro febricitatione, sed propter solam hoc symptoma perierunt. In principio igitur sustinere oportet ea quae predeant, ita ut nihil resistamus aduersus ea quae ex corruptione ac cruditate effluunt. Verū ubi ultra modum euacuatio contingit, cohibere conuenit. Et si quidem acriora prodeant, oportet ea quae exalibentur boni facci esse, & alioqui etiam crassiora. Talia autem sunt, sorbitiones ex alica ac pulina. Sed & balnea his commoda sunt, post morbi concoctionē. Vbi vero piniosiora & fluida feruntur, ut ea ueritas acriores sint ac calidiores cibi, quantum febres permittunt. Tales autem sunt qui ex condimentis casta Goetia parantur. A balneis autem his abstinendum est, si non quid aliud cogit. Quod si debilis sit concoctio faeculis, adstringentibus eductis & narzalla utendum est. Eductis quidem, in quae maxime mala punica, aut poma, aut pira, aut melsilla sint inieciuntur cum his ipsis, & uino tenui odorato adstringente. Auxilia autem ex cataplasmatibus polente, palustrium, ablatitis, rosis, myrti hoc est, & consensilis melleis. Considerandum vero in quibus maxime partibus imponenda sint cataplasmata, circa stomachum dico, aut inferam aluum. Quandoque etiam circa lumbos imponimus. At cruentas excreciones reprimaunt ac refocant cataplasmata ex thure. Aut polente possent cum thure, aut manna, uino aut posca subacta. Acriorem uero humiditatem per infusum chylentis edulcare oportet, quandoque per solam aquam, quandoque per persianam, aut alicam, aut oryzam, aut tragi succum: ut hoc non semel, sed saepe. Postea uero amittenda sunt & rose siccae, aut myrti baccae, aliquando etiam galle. Et eorum una cum rosaceo, & uino tenui adstringite, aut rosati decocto infusum, aut etiam fedi appositum, promptitudine ad excrecendum habebat ac retundit. ubi uero frequē cōtingit ad egerdū faeculio, glomer ex calidis stimulis ad sedē difformans apponant.

De sanguinis fluxione, et sanguinis uerbis expone. CAP. LIX.

*Gloer ex
Fumidior
q̄*

*Singulis
febribus*

Typa q̄

Quandoquidem sanguinis stillatio plenitudinem in toto corpore, aut in capite significat, ob expressionem contingens, aut ob mensuram deficiationem. Amplius autem excretio plenitudinem laxare ac minuire potest. iuxta rationem uero ipsam facere licet inde, unde natura impetum habet. Hac rationatione factis, aut uisui sui in distillationibus quarta die cōtingentibus, per optham uelut mos est, uasa in naribus fructare. Verum nō oportet mor

A rei modico fluxu contentum esse, sed iuxta vires detrudere. Ceterum spon-
taneis in febribus per nares sanguinis eruptiones, si iudicio serio modo sint, *Sanguis
eruptus*
sustinere oportet. Si vero immoderate sanguis feratur, reprimere conari.
Deligenda igitur primum ualide extremitates & aeger ita ligaretur ut
sublime caput habeat. Videtur autem & preparij pudendi uicinis deligatio,
sanguinis e naris eruptiones peculiariter cohibere. Non autem emun-
gis, neq. irris et locum, sed grumum congelari sinas. Et naris spongia posita
inbusa detegatur, & cuneolus ex linteo in narcom unde sanguis erumpit,
indatur, scilicet prius illius ex aliquo sanguinem sistere. A horum modis
camentorum materiam, ac reliquam curationem, in tractatione de locis ab-
fectis, libro post hunc sequenti abunde proponemus.

De animi deliquio.

CAP. LX.

His qui ex cholera, bile superne ac inferne prodeunte, & ob alui proflu-
uio, & propter alias multas & acutatas euacuationes exoluuntur, a-
quam frigidam aspergere oportet, & nares apprehendere, & os uentriculi
condicare, & ut uomat iubere, stomachumq. lancinare aut per digitos, aut
per pinnas immittas. Sed & fortiter multis ligamentis deligare, ubi quidem
per internas partes euacuationes sunt, mandis ubi uero per supernas, cru-
ra. Excogitare insuper in his quibus sanguis erumpit, figuram sursum uer-
gentem extra dolorem. Est & cucurbita affigenda, ita ut ad contrarias his
que euacuante partes retrahamus. Sanat etiam unum aqua temperatum
exolutiones ex acutatis euacuationibus obortas, si non uiscerū inflamma-
tio, aut capitis uehemens dolor, aut affectio aliqua mentem emouens, aut
febris ardens, in morbo crado prohibeat. Nam in his unum magna deni-
menta inducit. Et si quidem restas fuerit, & aeger calidi temperamenti, & a-
que frigide potor, frigida danda est. Sin contra, calida. At uero his qui ob
sudorem copiam animo linquantur, catem deficare oportet, uelut antea di-
ctum est, & statim frigidorum accessus excogitare. Verum fluxionibus
in uenarem nihil horum conuenit, praterquam ut uentri & stomacho cor-
roboramenta adhibeamus, & hos lauemus. Balnea enim fluxionibus in uen-
trem commodissima sunt. Sed sanguinis eruptiones & sudores ueheme-
nter exasperant. Ceterum eos qui ob plenitudinem animo linquantur, a ui-
no & cibo abstinere oportet, & balneis, si febricitarint. In potu detur aqua
mulla, in qua thymus, aut origanum, aut pulegium, aut hyssopum sint deco-
cta. Commodum his est & acetum uisum. Si uero propter prauius humo-
res in stomacho coeeturos animo linquantur, nomere ipsos iubeto ex aqua
& oleo digitorum aut pinarum immissione. Si uomere nequeant, oleum
optimum bibant. Hoc si sepe etiam per infernam aluum euacuat. Sed & ab-
stinetia his prodest. At si ob stomachi debilitatē exoluuntur, his que cor-
roborare ipsum possunt utendum est, uelut antea in capite de ipso dictum
est: & extremas partes deficare oportet, & eos qui ardore exusti sunt, ad
balneum directe, per frigiditatem uero, medice mentium ex tribus piperis gene-
ribus constans, & ipsum quoq. piper dare. Qui uero ob ampliore calidi-
tatem, aut ob solis ardorem, aut quod in balneis moram diutius traxerant,
animo linquantur, eos curabis frigidam aquam aspergens, & ad uentri co-
uerens, & si stomachum fricans, & uiuam ex cibos exhibens. Si uero pro-
pter inflammationis magnitudinem, aut malam febri affictionem, in ac-
cessionum insalutibus animi deliquium incidunt, & perfrigerentur, aut fos-
siter fricare oportet, & calefacere, ac deligare. & uigilare iubere, & a cibo
abstinere. Hec autem & ante exacerbationē scienda sunt. His uero qui
propter siccitatem animo linquantur, duabus aut tribus horis ante exacer-
bationem cibum dandus est, aut alexisuecus, aut panis ex aqua, cum mali
pistici granis, aut pomis, aut piris. Si uero magnam periculum timeatur,
etiam unum detur. Sed & in his qui de repente animo linquantur, ita sci-
endum est. Et ubiq. causam, ob quam animi deliquium coniegit, consi-
dere

*Animi deli-
quium**Figura sursum
uergens**Balnea quibus
commoda ex
inueniuntur*

derare oportet, & aduersus hanc insulare. Quandoq; tamē etiam symptoma-
tis maior cura habenda est, si quidem periculum, aut mortem minetur.

Verrucae circa et faciem curantur. CAP. LXL

*oculi facies
alutatio*

ET haec affectio in febribus maxime diuturnis, propter de orbitis diutur-
nitatem contingit. Quam igitur locus rubicundus fieri incipit, circuli
lanceum instar magnitudinis loco subdomas. Postea uero rosaceam aut myr-
teum ceratum, quod spumam argenti, aut cerasum recipit, imponemus. In-
flammatione autem obortente, panis cataplasma cum isolano, aut polygo-
no, aut plantagine, aut brassica tenera. Si uero ulceratio pascendo proter-
gat, lenticula cocta cum maliconto imponatur.

CAPITA TERTII LIBRI.

*In hoc libro, qui tertius est huius Operis, de affectionibus secundum
locos sermo habetur, cuius initium à summo capite est, & ad extremos
pedes terminatur.*

De alopecia, ophiis ac caluicie.

Caput I

Quae crispas capillos faciūt, & quae
cosdela tingunt. Cap. II

De affectionib. capitis capitis. Cap. III

De capitis dolore. Cap. IIII

De cephalaea, capitis dolore anti-
quo, & de hemicrania, dimidię ea-
pitis partis affectione. Cap. V

De phrenitide. Cap. VI

De cerebri inflammatione. Cap. VII

De cerebri erysipelate. Cap. VIII

De lethargo. Cap. IX

De catocio, id est soporis detentio-
ne, siue uigilante sopore. Cap. X

De remissione memoriae ac rationis,
& de sopore ac sanitate. Cap. XI

De uertiginosis. Cap. XII

De morbo comitiali. Cap. XIII

De melancholia, & insania, & his
qui numine afflati putantur. Ca-
put XIII

De incubu. Cap. XV

De lycrone, aut lycandropia. Ca-
put XVI

De insanibus. Cap. XVII

De syderatione, semisyderatione, li-
ueresolatione. Cap. XVIII

De conuulsionibus. Cap. XIX

De tetano, id est distensione, eiusq;
differentijs. Cap. XX

De tremoribus. Cap. XXI

De oculorum morbis. Cap. XXII

Aurium affectiones. Cap. XXIII

De narium & olfactus affectionibus.
Cap. XXIIII

Ad faciei affectiones. Cap. XXV

De oris affectionibus. Cap. XXVI

De angina, & huius uicinis affectio-
nibus, ubi & de his qui strangu-
lantur, aut alijs quomodocunq;
suffocantur. Cap. XXVII

De grauedine, & dysuria, & de ane-
riasis, ac de uulsi. Cap. XXVIII

De recte ceruicis spiratione, anhe-
lone, ac spirandi difficultate. Ca-
put XXIX

De peripneumonia. Cap. XXX

De sanguinis spato. Cap. XXXI

De suppuratis & tabe. Cap. XXXII

De pleuritide. Cap. XXXIII

De cordis affectionibus. Cap. XXXIIII

De affectionibus circa mammas.

Cap. XXXV

Ad grauem alarum factorem ac ex-
citationem. Cap. XXXVI

De affectionibus circa stomachum,
praecordia ac uentrem. Caput
XXXVII

De uenis inflatione. Cap. XXXVIII

De cholera. Cap. XXXIX

De leuitate intestinorum, & coelia-
ca affectione. Cap. XL

De renelino. Cap. XLI

De dysenteria. Cap. XLII

De colica affectione. Cap. XLIII

De uulso. Cap. XLIIII

De renum ac uellicae affectionibus.
Cap. XLV

De hepatis affectionibus. Cap. XLVI

De malo habitu. Cap. XLVII

De aqua inter costam. Cap. XLVIII

De splene. Cap. XLIX

De morbo regio. Cap. L

De

A De umbilici prolapsu. Cap. L.I	De abscessu uteri. Cap. LXXV
Quomodo quis impubis ac imber-	De ulceratione uteri. Cap. LXXVI
his diu permanens, & de puden-	De cancro uteri. Cap. LXXVII
dorum ac testium custodia, & si	De scierbo ac tumore duro. Ca-
mul pilosobra. Cap. L.II	put. LXXVIII
De herniæ speciebus. Cap. L.III	De mole. Cap. LXXIX
De testium inflammatione, nemq;	De inflatione uteri. Cap. LXXX
scortis, & de alijs ipsorū affectibus	De uteri strangulatione. Cap. LXXXI
Cap. L.IIIII	De uteri prolapsu. Cap. LXXXII
De seminis profusione, & eiusdem in	De obscuratione in utero. Ca-
seminis effusione. Cap. L.V	put. LXXXIII
De scyriali. Cap. L.VI	Non concipiendum curatio. Ca-
De priapismo. Cap. L.VII	put. LXXXIII
De membrorum genitalium impo-	De fissuris, condylomatibus, ac hemor-
tentia. Cap. L.VIII	rhoidibus uteri. Cap. LXXXV
Pudendorum ac sedis affectiones.	De difficili partu. Cap. LXXXVI
Cap. L.IX	De coxendicæ morbo. Ca-
De uteri affectionibus. Cap. L.X	put. LXXXVII
De mensis suppressione. Cap. L.XI	De podagra & morbo articulis, ar-
De nimis purgatione uteri, & san-	thritis dicto. Cap. LXXXVIII
guinis ex eo erupsione. Ca-	Ad perniciem in plantis ac pedibus.
put. L.XII	Cap. LXXXIX
De fluxu menses. Cap. L.XIII	Ad clausos ac callos. Cap. LXXXX
De inflammatione uteri ac declina-	De affectionibus circa ungues. Ca-
tione. Cap. L.XIIII	put. LXXXXI

PAVLI AEGINETAE REI MEDI-

CAE LIBER III. ~~ALPHABETICO~~*Medico Physico interprete.*

DE CAPILLORVM AFFECTIONIBVS.

De alopecia, ophidia, et calidie. Caput I.

VENIAMODVM plantæ aliquæ ob humoris inopiã simile
 delicate corruptuntur, aliquæ vero ob humoris aliem
 ab ipsarum natura attractionem. Ita etiam in capillis fieri
 solet. Nam ob humorum inopiam caligefces contingit. Calidie
 prosperitantes autem humores, alopecia & ophidia, si- ophidia
 gura solum inter se differentes: nam in ophidia serpenti si-
 milis pars laesa apparet: verum alopecias ex eo quod hec
 affectu frequenter vulpeculis insidet, nominaverunt. Iuxta colorem igitur cu-
 tis, redundantem humorem coniectantes, evacuationem per purgationis me-
 dicamentum prius utimur, deinde localibus auxilijs curationem absolvi-
 mus. Si igitur color cutis nigrior aut albedior factus fuerit, per hanc an-
 tidotem purgamus, quæ & purgans, & strabitarium humorem evacuat.
 Si vero pallidior, eam potius ex alopeciamus. Vnde & utique ex his descripti-
 onem in libro de compositis medicamentis reperies. Post totius corporis
 evacuationem apophlegmatismo potuitam per os detrahente utendum est.
 non semel, sed sæpe, ex aceto, limpi ac melle. Melius autem est si in aceto ori-
 ginum quoq; aut pulegium, aut thymus, aut hyssopum maceretur. Sed &
 in alijs circa caput affectionibus, eodem modo utendum est, ita ut pri-
 mum redundantem humorem evacuemus, aut per purgationem, aut per

f utitur

uenz sectionem, si etiam sanguinis redundantia fuerit, deinde sic ad localem curationem procedamus.

Ad alopeciam. Vbi nro preparasti, & linteo aspero, aut potius lana extersisti, & ad ruborem defecisti, verbenae sem in sole cum aceto trita diline. Aut aleyonium asperum unum usum ac tritum, cum oleo lacinarum diline. Aut arundinis radices, aut amygdalae amarae cortice usum, oleo aut adipe urino exceptum diline. Moderata igitur sunt haec. fortiora uero quae ex euphorbio & thapsia, & adreco, cum oleo laurino trita, aut pice liquida.

Aliud. Herinaceorum marinorum testas usas urino adipe excipe, & loco ex nitro preparato diline. Aliud. Piperis, stercoris ouilli sicci, ariosis, seminis croci, singulorum drach. iiii. uerani albi drach. iiii. stercoris murini drach. i. excipe felle taurino, aut hircino aut felle. Aliud, experimento cognitum ad alopeciam. Radicis mandragorae, aristolochiae, radipicant, ceras, picis liquidae, singulorum unc. vii. i. axungiae porcinae non felle, nisi herba cordis siue internae partis parum. Axungiam & ceram coquo donec herba facceat, deinde facta excoctione herbam abiecit, & reliqua ad axungiam adhaerere ac coquo. postea ceram & picem liquidam addito, & consilider in sole utitur Et ubi ulcera ad cicatrice perducta fuerint, caput uulpeculae uncto, & cum ipso aleyonium, anclusis nigrae folia, omnia intra supra illationem superne injecto, quo capiti pilis succrescant.

Aliud. Capitis muris usi partem unam, testarum buccinorum marinarum partem unam, cum axungia porcina in olla coctis utere. potes & sicca ipsa inspergere. Medicamentum ex thapsia, ad omnes ueteres affectiones. Euphorbii, thapsiae, buccarum lauri, singulorum unc. i. sulphuris uini unc. dimidium, uerani unc. dimidium, ceras unc. dimidium, olei laurini, aut cicini, aut ueteris quantum satis est. In fortioribus etiam nasciturus unc. i. & aleyoni unc. i. Hoc nro solum ad alopeciam, sed etiam ad omnem diuurnam perfrigerationem facit. Vbi quoque preparatione per nitrum, & desiccatione utendum est in alopecis. Et pilis assidue radendi. Multos enim nos per solam desiccationem, & assiduam rasuram pilos produxisse. Ad caluiciem & pilorum augmentum, ex Citrone. Leporum uentres quinq; siccatos, in testaceo uase diligenter torreto, & ad hoc certam uisgutorum myrti partem accipito, acaciae fructus, acaciae succi, rubi canini, singulorum tantundem. adiaci unc. iiii. Haec omnia tridito, ac tenui cribro excutito. deinde ad ipsa uini libris iiii. additis, & ad ipsa phocae uindem contundito, & plumbea pyxide recepta seruato. Vnus autem tempore quocunq; uoles ungento dissoluto. Conseruantia pilos. Polytrichi partem i. Jadanii partes i. uino & myrteo oleo excipe ac utere. Aliud. Anemone florem tritu cum oleo illino, eodem etiam pilos nigros facit. Aliud. Verbenacae rectam cum radicibus siccatam ac consulam tenui cribro excute, & ammixto oleo ut frigiditatem crassitudinem accipiat, in uase uaserepone. Et liquida pro oleo utere. Aqua pilos augens. eodem etiam nigrescit. Aquae plumbeae scatur. vi. rhodis Alexandrini sextar. iiii. polytrichi trientem, herbae sabinae trientem Jadanii unc. i. myrti unc. i. cucurbitae siccae unc. i. Hoc ad dies triginti in uase uitreo ma desecratis, his per diem tres dies spatula mouens. Deinde presum in aqua tingere, ac quondam utere. Sed & althaeae semen in balneo astrictum, capillos conseruat ac auget. Similiter & olei althaeae, in quo althaeae semen coctum aut impodium fuit. Pilos attenuata. Foliorum sicci, corticis uitis agrestis albae, pumicis, testarum buccinarum, etiae cinellae, singulorum minam unam. Omnia in ollam nouam crudam immista, & olla luto oblita, in camino torreto, ac trito: & aphromitri minam dimidia, pallis omphaeosis triginta, adiectis ac tritis excipe ac utere.

Aliud. Aphromitri minam dimidium, pumicis torrefacti ming quantum partem, aluminis scissi, tridis siccae, comae myrti syhae tris nigrae, radice bionis, singulorum drach. iiii. lupinorum crudorum molitorum congl. quartam

Axungia
felle
Euphorbia

Preparatio
per nitrum

Rhoda Alexan
drina

Postea aqua

A quam partem utere sine pingui. Ad defluos capillos. Aloën cum uino nigro auffero illine. Aut purpura opercula cum oleo cocta. Aut myrrham & ladanum cum uino, & oleo myrteo. Aut caprinum steruus in testa usum terere, cum oleoq; præfalis illine.

Que in his capitis sunt, et que ossibus inquit, ex Cleopatra scriptis.

Capit. II.

Deficilo prius capite, spondylii radix cum uino meraco capillis illinatur. Aliud. Præfalo ac confectio capite, macem pinam recentem succino, & in cinerem exarito, & in mortarium coniectam terito, myrram ungentum affundens, donec mellis spissitudo fiat, atq; sic illinito. Aliud. Baccarum myrri ac betæ pari mensura utere, cum oleo africanis. Aliud. Crassas utrinq; adani sextantem, in aqua marina ad mellis crassitudinē terere, & ubi capillos urina aut siccina prius confricuerit, & aqua calida abluerit, ad biduum medicamentum hoc illinas, & ubi ipsum continuit ita, tertia die abluat, & siccatos capillos ungento myrteo iungat. Hoc tenebrum facit, & crispum ac nigrum capillum. Crispior autem fiet, si præfalus utatur.

Crispæ capille
faciende

A canis præfuerantia, & alia denigrantia. Olei acerbis sextar. III. spicæ nardi drach. I. uinguis aromatici drach. IIII. floris iunci rosmarini odorati drach. IIII. coquito cum oleo, & seorsim habeto acacia succi unc. I. uino dissolutam ac probe tritam. Quum autem olei tertia pars reliqua fuerit, excolato & ad acacia ammisceito, usculo excipito, ac nitor quodidie illinens.

Aliud. Nucum vitridum corticis quadrantem, radicis sicis quadrantem, uini nigri sextar. III. coquito ad tertias, exprimito, & quod superest cū olei myrri sextario uno commisceito, usus est quotidianus. Aqua capillos denigrans. Gallæ sextar. I. rhois coriarij sextar. II. baccarum myrri nigrarum sextar. II. ligustri foliorum tantundem, cinnamæ manipulum, capiti papaueris tantundem, aquæ sacustris sextar. XII. Ad multos dies præmacerata ad tertias coquito, & prius defriculis illinito. Quin & siccatos capillos cinnoliæ acetabulo uno, & calcei uinæ pari mensurâ illinito. Hæc autem betarum coctum sacro dissoluta illinatur. deinde custodit gratia, betæ folia superne imponito. Et ubi facis diu hærerint, in balneo abluito.

Vt folia pili tingantur, & flani flant. Myrrhæ partem I. floris salis partem I. diligenter terere, & facia strigmenti spissitudinē, præfictum caput medicamento illine, & per diem ac nocte sine, & tunc abluere iube. Aliud. Lupinos crudos cum aqua illine. Aliud. Spumæ argenti drach. I. terre cretice drach. IIII. caldis uiræ drach. I. cum aqua ad strigmenti crassitudinem redacta illine, & betæ folia superimponere ad duos aut tres dies, & abluere. Vt nigri capilli flani flant. Vini becom in balneo strigmenta minutito, & cerati crassitudine facta illinito, ubi dormire uoles, & mane flani sūt.

Terra cretica

Aliud. Ligustri folia in herba lanagis succo macerato, & cremore uti oportet. Tinctura auræ referenda. Aluminis drach. VI. sandarachæ drach. VI. croci drach. II. thapsi quæ tinctores utuntur, quæ Romani herbâ rubiâ uocant, drach. VII. lixiuij pileatorij sextar. IIII. Lixiuum & thapsium cōstatim ad dimidias coquito, & liquorem exprimito, & cum hoc alumen, sandarachâ & crocum diluto, & in uas uitreum mittito. Vius autem tempore præfictis illinito. Vbi uero combiberint, ex fœni græci, ordet, ac cimini decocto abluito, ita ut aqua tepida sufficienti sapone addito prius obleuerit.

Thapsi, quæ
rubra
Lixiuum pile
atorium

Aliud. Fœcem uini uitæ, & oleum balanitarum, simul mixtapillis illine.

Aliud. Saponem Gallicum cum aqua singulis balneis affricet. Aliud ualde præstans. Rhois rubi sextar. I. gallarum sesquialibram. Sæc coris murini sextantem, herbae auri colorem referentis, quam Romani rubeam uocant, sextantem polytrichi fasciculos II. absinthij fasciculum I. In pinarum decorticiorum cyathos II. aquæ sextar. VII. omnia in uas uitreum coniecta, ad dies IX. macerari sinito, per diem bis agitando, uis uero postulat, quod sius est excolato, & in hoc spongiam imbutam capillis affricato, &

Rubiâ auri co
lorem referens

f. a. hunc

humectatos combibere finito. Vbi vero refectati fuerint, sapone in calida aqua dissoluto abluto. Ut pili albi fiant. Verbasca albi florem urticae, & acetosubigito, & ad sinegma ammisceto. Aliud. Verbasca feminis drach. i. aluminis drach. i. corticis raphanorum drach. i. contradiuo, & glistinis taurini drach. iiii. ammisceto.

De afflictionibus capitis.

Caput III.

De porriginibus, seu furfuribus.

Porrigo
furfuris

Porrigo tenuium ac furfurum similium corpusculorum ex capitis, aut ex reliqui corporis superficie eliquatio est, citra exulcerationem. Fit autem uisioso humore ad caput allato, aut pituita salia, aut biliosa, aut aerabilior sanguine. Post emaciationem igitur totius corporis, uelut dictum est, sub scriptis compositionibus utendum est. Cimolia aqua priusmedicata ad bene succum ammiscere illine, & donec teliectur sine deinde albine, & thus cum uino ac oleo tere ac illine, possit die uero staphidum sylvestrem cum oleo illine. Aliud. Nisi, secula uini uis, myrobalanorum singulorum lib. i. staphidis sylvae sitis sesquilibram. Vino dissoluta capiti affricato. Si uero res liquum coepus prurium habeat, sicca. Verum ad humidiores porriginis curia, aut lapinorum decoctio, ad abluendum utere. Huius multam experientiam habeo. Ad psydria & pustulas capitis. Psydria parue ex suberantia sunt pustulis similes, in superficie ac summa cute exantes. Pustulae uero superficialiter sunt ulcerationes, subrubicundae, & asperae. Ambo uero curantur subiectis compositionibus. Spumae argenti drach. iiii. cerusae drach. ii. aluminis drach. ii. foliorum rutae uiridum drach. ii. a ceto & oleo myrtos trita illine. Aliud. Rutam & alumen trita cum melle, capiti praetera illine. Si uero cutis capitis discedat, oleae folia cocta cum melle impone. Aliud. Spumae argenti, cerusae, singulorum drach. xii. sulphuris uiridis drach. vii. cerato myrtos excipe. Ad capitis ulcuscula denotata ac rubicunda, parua papillis similis, à quibus sanies eliquatur. praetera capite, & cum aqua ac nitro praefrictio, sulphure uisq. cum urina humana trito utere. Aut melantheriam cum aceto illine.

De achoribus, ut est ulcus in capite manans, ex capite, id est facie.

Achor

Ex affectionibus quae in capitis cute fiunt, est & Achor, ulcus manans, quod tenuibus ualde foraminibus cuti erodit, per quae sanies redditur uiscosa. Similis ipsi in specie est affectio est, quam cerson, id est saurum uocant, eo quod foramina habet maiora, melleam humiditatem continentia, uelut aquam font. Generatio huius est ex nitro sicca & calida pugnata. Viscum itaq. consiluant ex boni socci cibo, ab omni acri ac salso abstinentes, & praesertim si inflammata sit affectio. Et post euenientem redundantis humoris evacuationem, praetera pila, bis aut ter, aut saepius somentum aquae calidae adhibe, in qua cocta sit myrtos, aut rubus, aut lens, aut lapini amari, aut asparagorum radix. Quae uero amplius sanies fluxerit, salicis folia cum aqua, aut cum lentacula, pro cataplasmate impone. Illusiones autem sint, terra cimolia, aut crenica, aut sumia, aut pompholyx, aut spodium, aut argenti spuma, aut cadmia, aut charta uisita, aut siccum ex charta medicamentum, omnia cum aceto.

Pustulae
leues

Smegmate uero utendum est hoc. Sulphuris, herbae perdictae, & saponis, aequales partes. Composita haec sunt. Spumae argenti drach. xvi. foliorum rutae drach. viii. staphidis sylvae drach. iiii. auramenti futorii drach. ii. cum aceto ac myrtos oleo ad strigementi spissitudinem redacta illine.

Sandis

Aliud. Sandis drach. iiii. myrtos drach. iiii. sulphuris uis drach. ii. mananthus drach. iiii. cum oleo neteri illine. Ad Achoris sanies manans, recrementum argenti, aut plumbaginem tritam insperge. Aliud. ad achoras & humidam scabiem. Rosum rododaphnes tritum, sulphuris uis orientem, picas liquidas orientem, picas siccas orientem, ceram sexuarem, olei myrti quod sanis est. Verum in pueris lacte exoluta illinito.

De scia.

De facie

Ficus nominant eruptiones ulcerosas, rotundas, subduras, rubicundas, *hinc per se*
ad quas consequitur dolor. Nascentur hæptetung in capite, sed & reliquo *eruptio*
corpore. Optimum in his medicamentum hoc est. Aluminis scissi, floris æ-
ris terti, glutinis taurini, singulorum æquales partes, cum dupla æris squa-
ma, tertio cum aceto, & illinito. Commodant & menarum capitis ueste, &
bulbi oculi, & cinis aceto permixtus. Ad siccos in capite ac mento pur-
tulas, medicamentum siccum. Misce drach. 12. chalcitidis drach. 112. squa-
mæ æris drach. 1. aluminis scissi drach. 1. Hoc siccum loto large impone, ac
sine. Sequenti die rursus loto, ac spongia detergo impone. Crassissimum er-
nim ulceris restoriam decidit. Et rursus sequentibus diebus idem facito, in-
tra paucos dies absque cicatrice sanat. Verum non parum uetat hoc medica-
mentum. Ad pediculos in capite. Lupinum in aqua coctum cre-
more conficere sube. Aut staphidem sylvestrem, aut sandaracham, aut am-
bo trita, cum oleo ueteri aut aceto illine. Aut piperis parum, ut ne exulce-
ret, cum oleo. Aut hedere succum cum melle. Aut linapi cum aceto. Aut ce-
driam, aut piceam liquidam, cum alumine. Aut baccharum lauri expressum
in ceritum. Aut oleum raphaninum. Ego autē staphidem sylvestrem cum
aceto & oleo uitam illui, & semper succellum senti.

De capitis dolore.

Caput 1112

Capitis dolor qui grauissimū symptoma est, aliquando ex sola qualitate *Capitis dolor*
in temperata oboritur, aliquando etiam ob humorum copiam, aliquan-
do ex utraque causa. Quandoque uero & ob externam accessionem causam: ue-
lut ob ardorem extrinsecum, aut frigiditatem, aut ebrietatem, aut plagam.
Vehementissimi igitur capitis dolores per actus ac efficientes qualitates
fiant, & maxime per calidam. Qui uero ob siccitatem sunt, uehementiam *Capitis de*
non similes habent. Arida qualitas, quantum in ipsa est, omnino dor-
lore exors est, præterquam si cum caliditate, aut frigiditate, aut humorū co-
pia, coniuncta fuerit. Itaq; de capitis dolore in febre contingente, in præce-
denti de febribus libro dictum est. De alijs uero nunc dicemus.

De capitis dolore ex ardore sole.

His qui caput ex ardore dolent, uisita ad contrarium calida, & siccior sita-
rim ad primum occursum apparet, & oculos rubicundos habent. Gaudent *Capitis dola-*
etiam frigidis perfusionibus acungentis, & ex his opem sentiunt. Curatio *ri causa*
uero his conuenit ea quæ ad dolentes caput in febribus relata est. perseue-
rante uero dolore, subscriptis cataphlasmatibus utendum est. Fronti ac tempor-
ibus adhibita comæ enim, panis ex posca & rosaceo, quandoq; cum amy-
gdalis, aut rosa sicca aut teneris, aut cum menta pulegio ammixto. Aut pa-
nis cum Persici folijs, lacte & ocyum tritum cum aceto & rosaceo. Aut
hedere corymbi aceto oculi, & cum rosaceo triti. Aut ad serpilli in aqua
decoctam, farinam triticam ammisceto. Aut cardamomum tritum ac tri-
tum cum aceto & rosaceo. Aut fermentum cum ro sacco. Aut iris sicca cum
aceto. Singula uero ex his assidue permutantur. Inefficacia enim sunt ubi
diutius moram traxerunt.

Pastilli ad capitis dolorem, ob calidam in temperiem. Croci drach. v.
auramci siccioris drach. x. aluminis drach. xvi. myrrhe drach. viii. ompha-
ci drach. 112. chalcitidis drachmas 112. gummi drachmas 112. uini uisleri
quod facis est. Viere composca. Si uero etiam uigilet ad sinus, ex somnif-
cis aliquid amiscece.

De dolore capitis ex frigida in temperie.

Esigna & curatio eorū qui ob frigiditatem caput dolent, contraria sunt
his qui ob ardorem. Nam & in contraria & decolorata ipsorum facies est:
& frigida neq; gaudent, neq; ex ipsis opem sentiunt. Horum autem cogni-
tiones confirmabant, & uetus ratio, & reliqua eiusdem ordinis. In unguo
igitur sit, oleum rutæ cum, huiusmodi, citum, nardinum, aut etiam balsami
siccus,

foccus, & maxime si crassiores & viscosi fuerint superfluitates. Oportet autem frangere ex hoc illinere, & ex his quoque quae ex pipere ac euphorbio parantur. Dandum est & unguis tenue, & iubendum ut motu amittatur, & balneis calidis, & quandoque etiam nominibus radicalibus acceptis. In quibus uero qualitas est absque humorum copia, diutius durans, uteris & hoc medicamentis, pipere albi drach. ii. crocomagnatis drach. ii. euphorbii recens drach. vii. lili. heronis columbini drach. i. aceti ac erimi quod satis est. Loco praefrictio illine affectam partem.

Dolor qui ab biliosis humoribus caput dolent.

Signa quidem similia sunt his qui ob ardorem. Verum accedit ipsi maior morbus, & faciei pallor, & quandoque etiam oris amaritudo. Acrioribus autem uigoribus, & temperatis calidioribus, & uirgulis aneratis, & his quibusdem si uiam coarctant, haec affectio magis contingere solet. Balneis igitur temperatis, & unguentis, & aquoso potu, in his utendum est. Et uniuersis uisus ratio humidior, ac boni succi assumatur. Ceterum biliosus humor euacuandus est ablinthij cremore, aut per aloem, aut per picturam antidoum per triplam, aut eum modica scammonia, & per campesia ex aloem. Item autem illinatur puluillo croceo, aut trigono, aut aliquo consimili.

De dolore capitis per consensum.

Dolor capitis per consensum

Si quidem ex toto corpore per consensum afficitur caput, illi prospiciendum est, ut & aduersus intemperiem, & contra materiam superantem infusetur. Et si quidem plenius fuerit, & maxime in uenis, uentem se cabimus. Si uero magis qualitas, purgatorio medicamento utemur. At si alicui parti per consensum cohaerent, uelut hepati, aut uentri aut stomacho, haec auxilia adhibenda sunt. Et si quidem calida in ipsis fuerit intemperatura, partem ex uino aquoso dabimus, aut etiam sorbitiones ex alba. Forinsecus autem irrigationes moderate refrigerantes ac corroborantes adhibemus, uel uincta dictum est. Si uero propter viscosos & crassos humores in stomacho consensus, caput doluerit, etiam hoc expellimus, acetum multum bibere exhibentes, cum simplex, tum lustranum. Et decoctionibus ex hyssopo & origano, & calidioribus adhuc quidem haec sunt, & quae magis secare possunt, utendum est. Vomitu item & radicalibus, & irrigationibus calidioribus, & cataplasmatibus.

De dolore capitis ex uino.

Dolor capitis ex uino potu

Si incoctum adhuc maneat uinum, subendi sunt ut uomant ab aqua tepida potu. Si uero etiam post concoctionem caput doluerit, refrigerantibus ac repulsoribus utemur, uelut est resicicum, & per se, & cum aceto, aut herida aut brassica sicco. Sed & ipsa brassica folia calida aqua rigata, & capiti circumdata ac alligata, naturaliter ebrietati resistunt. Quin & seruata brassica edere oportet. Et lentacula his prodest, & praeter ista his qui humidiores uenere habent. Alicam item, & mala punica, & poma ac pectera edant, & aquam bibant.

De dolore capitis ex plaga.

His qui ob plagam caput dolent, si non omnino in superficie plaga consistit, statim uentem se cabimus, & convenientibus capiti irrigationibus utemur, ex his namque uinum oleo dulci imbutis, capiteque ex ipsis confecto. A uino autem & cibis solidioribus abstineant, maxime si febrant. Et in summa, uelut ad inflammationem partium neruorum, & maxime cerebri membranam, curationem adaptabimus. Si uero etiam uultus factum fuerit, & hoc convenienter curabimus.

Medicina ad capitis dolorem.

Cere drach. vii. olei amygdalini quatuor, terebinthinae drach. vii. i. zruginis raris, cinobidis, chalcididis, singulorum drach. i. i. i. pumicis drach. i. i. i. aris uis, aquae stomacalis, singulorum drach. i. i. Si uero durius esse uideatur, oleo amygdalino molliatur.

De cec

De Cephalas capitis dolore antiquo, & de Hemigrania, similis capitis perit
afflictione. Caput V.

Vtriusque harum affectionum perseverans capitis dolor est, qui strepitibus, clamoribus, clara luce, uini potu, & his qui caput replent, odoribus exacerbat. putantque ita affectu sibi caput percuti, aliqui totum, aliqui altera parte, quos etiam Hemigranicos nominant. Et quibus quidem itera calvariam affectio confilicit, his dolor ad oculorum radices pertingit. Quibus autem extra est, circa ipsam calvariam dolent. Dolores igitur cum gravitate, plenitudine indicant: cum morbo, humorum aut vaporum acrimonia: cum pulsationibus, inflammatione cum tensione, si quidem ab his gravitate & pulsu fuerint, spiritus tenuis ac flammosi copiam: si cum pulsu, membranis corporis inflamationem: si cum gravitate, plenitudinem intra membranas existentem. Si vero etiam putrefactus humor calidior sit, etiam cum febre caput dolent. februnt autem omnino & qui ob inflammationem dolent. Proinde ubi totum corpus humoribus plenum est, uenam secare oportet, utrum respectu habito: & insus per clysterem uti acronibus. Si uero adhuc redundare sanguis uideatur, etiam per nares uena aperta euacuetur, si sunt, quantum satis esse uidebitur. Deinde hiera crassata danda est, & deinde utendum a pophlegmaticis si patuit per os detrahentibus, & cucurbitonibus per nares, insus in ipsas eritis appellatis, uelut est elaterij succus, qui cum lacte infunditur aut etiam siccum elaterium, quod insufflatur. Item cyclamini ac porri succus. Composita uero hinc sunt.

Cephalas
Hemigrania

Erithon, partibus indicem
diagnosta

Erithon ad diuturnos capitis dolores, lippitudines, & morbum comitalem. Melanthij drach. vii. salis ammoniaci drach. iiii. elaterij drach. iiii. erith excipe oleo sicyonio, aut irino, aut cyprino, ut cerati crassitudo fiat, & nares inde continge. Erithon quod insufflatur. Cyclamini heri drach. vii. nitri rubri drach. iiii. Si uero pro nitro elaterium conieceris, adhuc melius est, per stipulam insufflato. Vtne quoque epithematia capitis & unguenta, ubi diuturnior est affectio, his. Epithema ad cephalas. Vnguenti lini, p. euecdani, castorij, singulorum drach. i. baccharum lauri drach. ii. ramulorum rutæ drach. iiii. Excipe cerato rosaceo, & naso capiti per totum ipsum impone. Ceterum mulier quædam in hemigraniciis etiam hoc usæ, mirifice successum sensit. Radicem cucumeris syluestris uiridem in ternas partes concisis, & abinthij, in aqua & oleo donec flacciderent coquebat. Et aqua quidem cum oleo calidis afflicta partem moderate rigabat. Radicem autem & abinthium terbat, atque ita trita imponebat. Et per hoc solum hemigranicos & cum febre, & sine febre curabat. Si uero exacerbatio consequatur maxima, ut dolorem ferre non possint, utere etiam his que mitigare, & ex alio euacare ac mensus transmutare possunt, quale hoc est.

mulier
dica

Vnguentum ad cephalas. Succus puecdani drach. xvi. linces papaveris, anisi, hyoscyami, croci, myrtæ, semimoniz, singulorum drach. ii. Unci p. e aceto, & fac pastillos. Vt uero expetere, cum aceto aut posca illine eos qui ob crassos humores, aut spiritum flammosum dolent. Sed & dropace, & linap illo utendum est. Item ex thapsia pastillo. Quin & medicamentum ex abramento scripturum mittit in eadem causa auxiliatur, & utendum est eo in his, uelut in libro de compositis medicamentis dicitur. Sed & hoc mirandum est ad hemigranicos ob crassum ac viscosum humorem. Euphorbij partem i. castorij tantundem, aqua excepta in aurem inde, eam que est à dolore parte, & in balneum innoire iubet, & ubi paululum immoratus est ita affumare, & consueto modo lauare. Hoc modo experientia cognitum est. Non absurdum autem fuisse etiam oleo ipsa excepta, in aurem instillare. Et medicamentum ad coxendicum morbum descriptum, diuturnos quoque capitis dolores, & hemigranicos perfecte sedat. Ad hemigraniam diuturnam. Allij drach. iiii. cere drach. ii. axungine ueteris drach. ii. cantharidum drach. ii. ueluti posita, pernoctare sine. Mane uero pustulam nampe,

Artemi scri
pturij medici
mentum

pe, & parvum appellato emplastro cura. Aljud, Baccarum lau. & de cer-
nearum drach. 12. soliorum rutar. drach. 12. sinapis drach. 1. aqua diluta im-
ponit. At vero his qui huiusmodi causis infestantur eodem illinum hoc est,
adebatur sepe semel ante balneum illinum, cito affectionem percuratur, ita ut
post balneum penitus sanus aeger euaserit. Olei fabini lib. 1. e. ere quadran-
tem, euphorbij unc. 1. Ex hoc dimidiam frontis pars est illinito, iuxta tempo-
ralem ad dexteram musculum. Verum in quibus non multa frigiditas est, gal-
le & crocomagmati aequales partes uino tritas illine. His uero qui ob cali-
dos vapores aut humores caput dolent, medicamenta ex euphorbia ne adhi-
beto. Apoplegmasinus pueri per os detrahens ad cephalicam. Si-
napis triti & in siccum redacti cum aceto & melle tritentur, staphydis syl-
uestris drach. 111. pyrethri drach. 111. rufa, cribrata & mixta, in sole garga-
rillanda praebent. Si uero ob biliosum humorem, aut aliquam intemperiem,
cephalica sit diuturna, antea de capitis dolore rebus utenda est. At si etiam
post hoc dolor persisteret, & neq. cucurbitulis, neq. hirudinibus pretermis-
sis, & distributio per arterias suspecta sit, nihil absurdi est, etiam arteriarum
terro uires sectione uti. Verum in humidioribus etiam balnea naturalia
recte allumantur.

De phrenitis.

Capit. VI.

Phrenitis

Phrenitis membranarum cerebri inflammatio est, aliquando etiam ipso
cerebro simul inflammato: aliquando caliditate praeter naturam in ipso
consistente. Causa uero morbi est, aut sanguis redundans, aut fluxus bilis hu-
mor. Quandoq. uero etiam fluxus bilis superaffatus, & in atram transmutatus,
quando sane grauiissima phrenitis existit. Aliquando etiam cerebrum ex
septo transverso per consensum affectum, per dispersos in ipso nervos, affec-
tionem sustinet. At uero quae circa ardentissimam febrem uigores, &
quae ex illo machi per consensum affectione contingit mentis emotio, phre-
nitis non est, sed solum delirium. Consequitur in his qui proprie phreniti-
ci sunt, uigiliae quidem in totum. Quandoq. uero etiam somnus turbulen-
tus, adeo ut exurgant, & exiliant, & subito clamant, qui quidem ob sangui-
nosa humorem affecti sunt, cum resurget uero ob fluxum bilem, cum sero-
clia: quemadmodum qui ob atram bilem, furiose adeo ut contineri non possint,
obdistanturq. & eorum quae dicuntur, & quae sunt ab ipsis. Et oculos
sanguinolentos habent, ipsosq. siccant quandoq. squallidos, quandoque la-
chrymantem aut grauius oppletos. Et lingua exasperatur, & ex naso sangui-
nis destillationes fiunt, & siccus legum, & festucas ueniunt, & febrem ar-
entem habent per totum morbi tempus, febre in alto maligne latitante. Et
pulsus paruos ac languidos cum quadam duricia habent. Et respiratio ma-
gna est & rara, cerebro primario affecto. Si uero per consensum ex septo
transverso phrenitis fiat, & respiratio inaequalis est, & praecordia reuellun-
tur, & caliditatem multam habent. Sicut rursus his qui ex cerebro affecti
sunt, partes circa faciem calidae, & sublingua incalescent, & plenas uenas
habent. Quod si etiam pituitosus humor amixtus fuerit bilioso, quemad-
modum causam, ita etiam nomen compositum acquirit. Vigilans enim sopor
appellatur. Bilioso etenim humore superante, tales uigilantes phrenitici
ei sunt. Pituitoso uero rursus predominante, soporose rursus in somno de-
libuntur. Vetusiores Galeno catochon, id est soporis detentionem appel-
lauerunt. Catochon uero & catalepsi, id est apprehensionem, recentes.

Cura phrenitis.

Siquidem uires permittunt, uenam cubiti secare oportet statim, & mul-
tam sanguinis detrahere. Si uero delirans aeger manum non porrigat, aut
etiam si porrigat, timor sit sanguinis eruptio nis, dum post euacuationem ma-
nus sepe lancinatur, ex eo quod furiose aeger turbatur: rectam in fronte se-
cantes uenam semel sufficienter detrahimus, & insusis per clysterem utemur,
ex oleo aut rosaceo, cum puluere lacteo. Vigilijs autem superantibus, rosa-
cro, aut

Mentis motus
DeliriumCerebri in
oculisSoporosi-
giansCatalepsi
CatalepsiVires frontis
fistula

Acco, aut rosaceo cum aceto caput inungemus, aliquando calida aqua prius ipsam perfundentes: & medicamentum ex papaveris capinibus dabimus, si non vires debiles prohibeant. Sed & alia ad vigiliis, ex supra relatis huc transferenda sunt. Decumbat autem ager in loco lucem ac temperiem moderatam habente, & in quo non sint variae picturae. Haec enimurbationem inducunt. Ingressantur autem eo ad ipsam amari grati, & commodè compellens, quandoq; leniter placantes, quandoq; etiam austerius perterentes. Alimenti vero primum sit aqua multa, deinde pristinæ succus, & forbutones ex alica, cum aliqua succunda portione, velut est fluorum cremor, aut hydrosolanum, aut rhodomelum, aut dulces hydromelum. Nam quod à Celyria affertur hydromelomelino sum in parvis vasis, reprobandū est: ut quod peiora detrimens quam unum in talibus indicat, & proferum in capitis affectionibus, & ante concoctionem. Et panem ex aqua lotum exhibemus, & inryba ac lactas ac coctas. Si vero uulnus ferrox sit, etiam cruda haec danda sunt, & cucumeris internam partem dare convenit itemq; preponis, & rhodapena, ac consimilia. Ab aqua frigida hos abstinere oportet, maxime si ex sepe transferri consensu, eadem affectionis competerimus. Si vero uirina ipsa ob dementiam, vel ut uerisimile est, supprimatur, sementum adhibebimus, & oleo & aqua calida pedinæ ac uelicam perfundemus. Deinde digitis manus ad locos ad mortis, ad missionem feruabimus. Et decumbentis ipsi reliquam corpus oleo calido illinemus. Nam in quiete, quoties eius fieri potest, conseruandi sunt, si ualde diuites fuerint, ut si famalis conrincantur in manus, uinculis conficti. Vires enim concidunt ex inordinato motu. Sed & propter alium modum, ligamentis pedes prius perfracti constringantur ac conseruantur, reuulsionis uidelicet gratia. Si uero longior, & agere solubilis fiat affectio, ab his quæ soporem inducant abstinendū est, addenda uero ad capitis irigationes ea quæ discutere solent, uelut est acenre succus, aut serpilli, aut calamintha, aut rutæ. Et tunc quoq; erythra in nasum datis utendum est. Post septimam uero diem, si uiscera fuerint inflammata, ex emplastris ex semine linæ, & cruda oedaceae farina, cum aqua & oleo misgabimus. Postea uero etiam cucurbitas leues, aut etiam cum scarificatione adhibemus, tum his ipsis, tum occipiti ac ipsæ. Si uero corpus squallidum & aduersū esse coniectaueris, etiam si adhuc febricitent, balneis aquæ potabilis, & largiore illusione utendum est: & uinum dandū tenuius, ac parum aquæ feræ, ad uisum refoctionem, ac quaquam uentido mentis emotionem ex ipso, uelut paret, futuram. Aut enim non contingit, declinatione instante: aut etiam si fiat, facile sedatur. procedente uero declinatione, etiam gelationibus utendum est, & conueniente uisum refectione. faciendæ sunt autem uisum refectiones, ita ut cantant ebrietas, tetras, ciborum corruptiones, & pre omnibus solis ardoris.

De cerebri inflammatione.

Cap. VII.

Cerebri inflammatio

Cerebrum inflammatum sepe inanescit a dō, aut sature in capite dissipantur. Et dolor maximus ac perfoerans consequitur, & anxietas maxime: & rubor circa faciem multus consistit cum uanitate, & oculi proni sunt, & caput inuolutum. His uenam secare oportet, & de cubito cucurare. Sed & ex naribus, & uenis sublingua, sanguinem euacuari oportet. Viere etiam irigationibus & emplastris ad capitis inflammationes idoneis, quæ humescere ac concoquere possunt.

De cerebri erysipelas.

Caput VIIII.

Erysipelas cerebri

Eri & erysipelas, id est ignis facies, in cerebro, & ager hanc partem dolet caput uotū, & flamas in ipso esse putat. Et facies agrestis frigida est ac subpalpida, & os siccat. proinde ita affectio uenæ secare, & maxime uenas sublingua diducto, & frige factio adhibeto, quibus etiam ad alia erysipela elata uti,

De leberg.

Caput IX.

(mun-

Lethargus qui laeso est partis animæ rationalis, locum quidem eundem habet,

Lebergus

habet, quem etiam phrenitis, cerebrum dico, materiam uero cōstare. Ex
 puita enim humidior ac frigidiore cerebrum perfrigante oboritur. Con-
 sequitur lethargicos febribus debiles, non ualde mordax, cum delatione in so-
 porum. Pulsus huius magni & rari ac undosi sunt. Respiratio ualde rara ac de-
 bilis. Et somnolenti semper sunt, & argre excitari possunt, & difficulter re-
 spondent etiam si interogenus, & obliuisci sunt, ac mente moti. Hiant ad
 fidem, & quandoq; hiantes permanent, ac si os claudere obliuiscuntur.
 Egerunt per aliam pleniq; humidiora. Quibusdam uero uice uersa uenter
 relectatur. Vtinas mingunt quales sunt inmentis. Quidam etiam tremunt
 & eruant. Porro soporis species quatuorcatos appellamus, quum ex eadem
 sit materia qua lethargus, ab hoc differt, eo quod febribus soporem illum pre-
 cedat, & uehementior est; sequitur autē ad lethargum. differunt item in eo,
 quod sopor etiam a multis symptomata sequatur. Nam & ad febrium exacer-
 bationes sepe accedit, & ad morbum comitalem, & ad cerebri compressio-
 nes, aliquando ossa in fractura, aliquando membra uariā custode, aut uisū
 cerebri uentriculū confringere. Lethargus uero propriā quandā consuetu-
 tionem habet.

Cura lethargi.

Permittentibus uiribus etiam hic uenam secernimus. Si uero non permittant,
 insulas per clysterem acerbis utemur. Aegrum autē in domo amplior
 reclinabimus, quē moderatam habet lucem, & caput frigidibus oleo,
 cui callosiorum sit amittat. Quidam pro oleo, rosā cerō cum aceto, uā cum
 castorio utuntur, corroborantes simulq; calcificantes per hoc caput. Reli-
 quum uero corpus, & maxime extremas partes, oleo ueteri illinunt, & cum
 nitro tolo, aut pyrethro, aut pipere, aut grano crudio uellicat. Potest & ce-
 rebrum ex his cum castorio factum in usum aluiant. Odoramenta uero adhi-
 bebimus thymum, aut origanum, aut pulegium aceto tritum. Os autem, &
 partes circa palatum, sinapi trito cum modico melle illinemus, ita ut etiam
 per digitos pauitā affixam auellere conentur. Si uero admisserint, etiam
 apoplegia alio uere aceto melle, cum hyssopo, aut pulegio, aut origa-
 no, aut casti ipso sinapi. In potu uero dato aliquid ex his quae cito transeunt,
 exposita graeci appellant, & maxime diosporici cochlearium unum cum
 poika. In diurnis ac tremulis etiam castorium dandum est, scrupulorum
 duorum aut trium pondere. Si uero copia humoris sit, & non aliud quid im-
 pediat, etiam scammoniae scrupulum unum castorio addemus. Perfricauerit
 uero affectione, raso capite tomentum adhibere oportet ex sale & melle,
 ac similibus in sacculis sinapismis item in capite, & sterutatio oris uti. De-
 inde cucurbitas occipiti affigere, partim leues cum multa flamma, partim
 cum scarificatione. Naturales etiam excretionē assidue ire facere oportebit
 insulas per clysteres, & urinam ciuitibus. Pedes autem oleo rutaceo, aut
 ficario, cum modico castorio igitur. Frequenter quoq; irascenda est der-
 glatio, ita ut calida aqua aliquam ex iocundis potionibus, maxime fau-
 rum cremorem ammixtum, per angustū oris uascula infundamus. Et si alieu-
 bi circa medias partes inflammatio aliqua fuerit, etiam hec curanda est per
 frigationes ac cataplasmata. Nasibus autem admouendum est sinapi aceto
 tritum, aut castorium uisum. Alanur ex pisanis, auenae, aut alieis fuer-
 co, cum aceto multo, aut fuso, aut pulegio, quandoq; quotidie, quandoq; ab-
 teris diebus. Post cibum extremae partes deligentur, aut etiam uisui re-
 fringantur & crura uellicentur, & quandoq; pili ex ipsa uiolenter euellan-
 tur, quo excutunt. Sed & rubificationes facio illi ac crura sepe cōmodant.
 Declinare uero affectione, statim gestationibus cōuenientibus utendū est,
 & ad balneū deducitur, & refectio diata ductus cōuenienter assumatur.

De catacho, id est sopore detentione, seu uigilanti sopore. Cap. X.

Catacho. **H**uius morbi constitutionem in capite de phrenitide iam diximus. Si-
Sopor in *glio.* gna uero ut in firma dicam, communia quodam modo sunt phreniti-
 dis ac lethargi, iuxta uacuationē predominanteē eius tania, particulatim
 autem

A autem hoc. Detinetur zger supinas, extensus, & quandoq; subitumidam ac liuidam moderate facili habet, vel ut lethargici: quodq; rubor in ipsis efflorescit, & supernam palpebram sibi reuulsam esse putant ac emovere, ut neq; nictare possint. Nequaquam autem respirare uidentur, sed uelut mortuus daret. Pullum habet paruam & languidum, & uehementer densum. Eruntq; & alique sup pressa sunt, aut mo dice feruntur. Et qui moderate habent, insusum aliquem liquorem deplurimum. Vixi uero, ad nares relidit. Qui igitur pituita bilem superuente affecti sunt, eos à lethargicis discernimus, eo quod neq; nument, neq; liuidam colorem habet, uelut lethargici, praterquam modo dice sanè, & quod moderate exudant. In maiore uero periculo uersantur, quibus uigiliae malitè addunt, & urina suppeditatur, & spirandi difficultas intenditur, & exudans, & quibus potus ad nares reliditur. Aut si mulier ita affecta fuerit, discernetur ab ea quæ ueri strangulatione correpta est, ex eo quod naturaliter facere uidentur, & loquentes sentiat, & quod excitantur, & uix in somnum delabunt. Aliquando uero soporis detentione, aliud esse dicunt: uigilante sopore, quod non amplius compositum, sed simplicem quandam causam habet. frigiditatem enim & sicciorem materiam, quæ posteriori cerebri uentriculum obtursauit, eam affectione efficere. Quæ correpta zger detentus, in illa figura manet, in qua correptus est, sicut uidelicet, aut sedens, aut clausis oculis, aut uidentibus & apertis. Quapropter etiam catochos id est detentos, ipsos ueteres appellauerunt. Recentiores autè catochen, & cataleptin, id est apprehensionem ac detentionem appellauerunt affectionem ipsam. Curatio uero similis relictis est, sed euarians iuxta symptomatum diuersitatem.

Cataleptici.

Eritunc quoq; uetiz sectionem adhibere oportet, & maxime in quibus facies rubicunda est, quibus rursum consentientibus: aut insulis per chyliferam uel, quandoq; excitantibus, pituita predominantem res quandoq; mitigantibus, bile redundante. Eodem modo etiam aliorum auxiliorum ductus uicidum est, & similiter numendum, quandoq; quotidie, quandoq; alteris diebus. Est autem ualde periculosa affectio, si ob aliquod cibi aut potus peccatum fiat. In his itaq; cogere ipsos oportet, ut itam uolunt, & in cibi contractione custodire, & aluum intrare, & irrigatione uiscerū ex cumino, aut ruta uel. Qui uero propter ebrietatem affectione correpti sunt, post solutū crapulā, humidiorē alimento curantur, talis est praesens succus. Caput quoque consensuentibus illitionibus rigetur, si arctas fuerit, frigidis si hyems, tepidis. Si uero crapula nequaquam soluitur, neq; ad sobrietatem redeat, pro desperato relicto ipso longè sagere oportet.

De amissione memoriae & rationis, ex le sopore & febrilitate. Cap. XXX.

Memoriz amissio aliquando per se contingit, aliquando etiam cum aliqua rationis lesione: quemadmodum etiam rationis lesio per se prius contingit, & deinde memoriz lesio sequitur. Virisq; uero affectis, fatuitas appellata consistit. Causam uero habent communem, consistentem ac confluentem ipsas intemperies. Verum si hæc humida solum fuerit, & memoriz & rationis uitiationem inducet, & torpores, & in somnum delationes, & somnos longos ac profundos. Si uero cum frigiditate, sopores & lethargos. Eodem modo etiam siccatas, sola quidem uigilias inducit cum ebullitate uero, deliria, & phrentidas. Consistunt autem hæc intemperatures quandoq; in humoribus, quandoq; in cerebri uentriculis, aut in ipsius uasis, aut in dispersa humiditate, aut in ipso cerebri corpore, aut etiam musculis temporalibus tale quid perpetiendis. Si uero humores fuerint inter se permixti, etiam affectionem talem inducunt. Verum autem simplex sit, aut composita intemperies efficiens, ex eorum quæ excernuntur specie cognoscet. Nam quod memoriz & rationis amissio, ex frigiditate proveniat, scimus: An uero cum humiditate aut siccitate coniuncta sit, ex his quæ excernuntur

Cataleptici diffinitiones ab aliis strangulatione sunt

Cataleptici Catochi

Febris in capite catochi

Memoria amissa. Rationis lesio fatuitas

nantur

nunquid dicemus, & ex acri habitu ac temperamento, & ex uictus ratione, temporeq; anni ac regione. Curatio. Si quidem frigida fuerit intemperies, calfacere oportet si uero cum humiditate, etiam siccare. Si rursus cum siccitate, humectare simulq; calfacere. Eodem modo etiam in incem, perie calida, refrigerare si uero etiam sic citius sit, etiam humectare. Si cum humiditate, refrigerare si multo siccare. In quibus autem sanguineum humorem redundantem comperit, uenam secare, aut infusa per clysterem uti acris, deinde etiam hieiram dare, & apoplegmatisimis uti, & unguiones adhibere capiti, refrigerantibus ac siccantibus ad oleum amantissis, rosa inquam, ac myrto, & lentisco, ac similibus. Sed & toti corpori prospiciendum est. Si uero ex ardore solis ac lassitudine, oborta fuerit intemperies, utendum est irrigatione capitis ex aceto & rosaceo, & reliquo ductu frigido ac humido, nam albis, tum in cibo ac potu. Si uero sporis species caros ap pellat, ad sanandam, aut obliuionem accedat, etiam hinc prospiciendum est, uelut antea in lethargia diximus, ubi etiam discimus ipso foris exposuimus.

De vertigine. Caput XLII.

Cereb. sporis
fuerit

Vertigo

Vertiginis affectio ex frigido ac uiscoso humore cerebrum occupante constat, unde ex parua occasione promptè etiam hi còcident, quandoq; dum circumagi quædam uidetur forissecus, uelut rotas, aut turbines aut dum etiam ipsi circumaguntur. quandoq; uero etiam capite calefacti, dum commouentur humores in ipso, aut etiam spiritus: Aliquando uero dum anteriores cerebri uentriculi comprimuntur, circa caluarie fracte perforationes. In quibus etiam uehementes dolores fiunt. præcedit autè in his qui ex primaria capitis affectione afficiuntur, dolor in ipso uehementis, & sonus, & aurium sonitus. Et quibusdam olfactus lædatur, quibusdam gustus. Qui uero ex orta uentriculi consensu afficiuntur, eos còsequitur oculi uentris motus, & nausica quoq; concomitantur. Curatio. Vertiginosos in ingressione consistentes excitare oportet, & idoncorum odoramentorum uis, & frictionibus, & consimilibus. Vbi uero in remissione sunt, ad destruendam affectionem, uenam primi secare oportet. deinde per hieiram purgare. Extremopæ interposito, infuso per clysterem acritudinem est, ex centaurei aut colo-cynthis decoctio. Post tales autem euacuationes, leniendum est caput loc aliter, per cucurbitas occipiti affixas cum scarificatione. & post hæc, pituitam per os detrahentibus ac firmatatorijs utendum est. Verum in quibus caliditas capitis, & aurium sonitus est, utpote uaporibus calidioribus per arterias allabentibus, etiam arteriarum sectionem adsumimus recto aëre, quemadmodum in chirurgica tractatione dicitur.

Præterea comiti. Caput XLIII.

Comiti-
alibus

Morbus comitalis qui conuulsio est totius corporis, cum principalium actionum læsione, aliquando in ipso cerebro consistentem causam habet, aliquando in ipsius uentriculis uniuersis. Hæc autem est quandoq; pituitosus, quandoq; acrabiliarius humor. Quin & propter os uentriculi per consensum oboritur, quemadmodum etiam in colicis, uelut in tractatione de illis dicitur. Aut etiam ex illarum partium distributione, uera aliqua frigida ac cerebrum pertinente, aliquando à crure, aliquando à digitis manuum. Visus est quoq; aliquando ab utero in aliqua muliere, quo tempore prægnans fuit, post partum autem sedatus fuit. Fit hæc affectio maxime pueris, & ex his amplius recens editis, postea uero etiam adolescentibus, & in uigore consistentibus: minime autem adultis & senibus, præcedit igitur in comitalibus corporis & animæ seditio inuoluntaria, & tristitia, & familiarum obliuio, & insomniorum uisiones turbulente, & capitis dolor, & repletio capitis assidua, maxime ex iracundia, & faciei pallor, & lingue uitas inordinatas. Quidam etiam ipsam mordent. At in his qui per consensum ex stomacho afficiuntur, etiam ipsius stomachi palpitatio præcedit, &

Præcedit
morbus co-
mitalem

Palpitatio
stomachi

agritatio ac maceris: & in medijs, aut dilatis cibis exacerbantur. Insistente uero iam

A to iam symptomate, collapsio ipsa deripit contingit, & convulsio, & quam
doq; nihil significans exclamatio. Præcipuum vero ipsorum signum est or-
ris spuma, quum reliqua etiam alijs morbis quodam modo communia sint.
Quibusdam autem etiam urina & sterces involuntariè excernitur, aliqui-
bus etiam semen. Quum igitur in aliquibus acutissimæ affectio, cito occi-
dit, tum exacerbationum assiduitate, tum symptomatis vehementia. In quibus
quibusdam vero in longum extenditur, adeo ut si non circa pubertatem, aut he-
mores purgationes, aut impregnationes soluta fuerint; aut si post hoc tempus
contracta inveniunt, plerumq; commorantur, præterquam si convenientem ca-
rationem consequantur. Declinant autem comitiales sufficia hæc, bitumen, la-
pis gagates, cornu caprinum. In cibo vero acceptum hepaticinum, & he-
patis dum affatur odor. **Curatio.** Si adhuc puer infans fuerit qui æ-
grota, nihil curiosum oliri oportet, nam & ætate ad biliosiores affectiores
constitutionem transiente, & uictu ad moderationem commutato, plerumq;
sua sponte affectio sedatur. Oportet autem uictus rationem non solum in-
fantibus, sed etiam nutribus ac lactantibus præbere. Qui uero post pu-
erilem ætate in comitalem illapsi sunt, his convulsas ac distortas partes pin-
guitur irigare oportet, deligareq; ac dirigere. Deinde disparato ore, digitis
aut pinnam olco. Inno illam immittere, ad pluitæ reductionem. Oportet
etiam odoramentis sensum irritare, ueluti pencedano, succo cyrenatico, bi-
tumine, pice, cedra. Post exacerbationes, si nihil impedit, urendum est ue-
næ sectione in cubiti flexura. Si uero nihil remittat exacerbatio, extremæ
partes sinapismo iriganur, & cucurbitæ præcordijs affigantur. Si neque ad
hæc remissio contingat, minimum spei est. Et tamen confidens medicus ca-
storium peruisi ori infundat, & cyrenaticum faccum gum melle & aceto.
Et per sedem infundat centaury decoctum, aut colocynthidis. Qui uero exor-
gunt ab ipso morbo comitiales, post refectionem, purgatione per hieram ex-
uacuari sint. Atq; hæc sanè est recentis & acuti morbi comitialis cura-
tio. Consequenter autem quæ ad inueterati destinationem commodant tra-
demus. Affectus itaque iniquæ potius diu continere oportet. Et in curationis
aggressionem non illecare, si nihil prohibeat, & interpolis quatuor aut quin-
que diebus corpus reficere, & sic purgatorio medicamento curare, maxime
me quidem ueratro nigro, aut colocynthide, aut certe scammonia. Opor-
tet autem ueratro circa internam partem talem ac cribratum, atq; melle
cyathis quinque uel sex inspergeretur melle cocto. excipere enim modico pi-
pere. Colocynthidem uero electo semine, medullam adhuc habentem pos-
sio exple, & per totam noctem sine. Mane uero passam euacuatim bibendum
præbe. Utendum etiam purgatorio medicamento ex ueratro albo, est autè
hoc. Baccarum lauri depuratorum drach. ʒ. iiii. pipæris albi drach. ʒ. iiii. aly-
piadis drach. ʒ. iiii. ephorbij drach. ʒ. iiii. ueratri albi drach. ʒ. iiii. hæc pro
manice præbe, cū passio quod est in colocynthide. probe per uomitus pur-
gat, post sufficientem purgationem, lauare ipsos oportet. Tertio post die
cucurbitæ affigendæ sunt cum scarificatione præcordijs ac dorso. Deinde
melis diebus interpolis, & corpore refectio, hiera ex colocynthide danda
est, postea capiti ac occipiti cucurbitæ affigantur. Sequens die cataplasma
adhibeatur ex pane cocto in aqua mellea, & contrito cum amygdalis amar-
ris, aut serpillo, aut menta, aut calamintha, aut ruta; & ad tres dies hoc faci-
endum est. Et postea caput radatur, & pencedano succo in aceto dissoluto,
in quo spondylium coctum est, illinatur. Interpolis autem rursus aliquot
diebus, & corpore refectio, antidoti ex colocynthide obolos ʒ. in aqua
mellea dato. Et rursus interpolis diebus antidotum dato. Deinde sternuta-
torijs utere. Et post quinque aut decem dies castoreum in aqua mellea præbe.
Et rursus interpolito tempore centaury & colocynthidis decoctum per ely-
therem infunde. Deinde rursus hieram præbe, & consequenter pinitam per
os & nares detrahentibus utere. Deinde sinapismum capiti adhibe. Oportet

Veratri nigri
preparatio
Colocynthide
preparatio

Medicamentum
punitis seu
pinitis

Acidum Item acrimonia est tempestatem uti, prodest his & acrimonia multum & illucum
quod quodidie bibere. Et mel in qua scilla contrahit cochlearij mensura. Vichus
ratio ratio his convenit incidendi ac attenuandi vim habens, & proinde cappar-
is is & salamentum assidue in cibo competit. Absit ine autem à carnibus,
 & leguminibus, & uino largiore, Venerisq; multa, ac à balneis, & hincapi,
 & à potu statim post balneum, praestitum uini metaci. Vianur excretisq; &
 incisionibus, ita ut postremum omnium caput deficiat.

Curatio comitalis ex stomacho oborti. Si uero stomacho primario af-
 fectio sit, bonam concoctionem aegroti prospicere oportet, & cir-
 ca tertiam horam panem diligenter preparatum exhibere, ex uino diluto le-
 uiter adstringente ac albo. Dato etiam his de medicamento ex alo, his aut
 ter singulis annis. Noui autem inquit Galenus, puerum quendam, qui om-
 nino non correptus fuit à morbo, ex quo radice praeuig gestabat magnam
 ac recentem partem de collo suspensum. Sed & agariet comitalibus pro-
 dest, scilicet ac spondyliq; semel ac radix. Et aristolochia rotunda ex aqua pos-
 ta. Auxiliatur etiam his magnopere scarificatio cruruli frequenter adhibeat.

Curatio comitalis ex aliqua parte oborti. Quum symptoma funari est,
 ubi senserint partem, siue manus sit, siue pes, Iaqueo superpositam partem for-
 titer apprehendere oportet. In remissionibus autem curationem moliri, ex
 uisioris medicamentis aliquod parti adhibendo, uelut est lepidium, & quae
 ex cantharide constant, & limella. Accurum quoq; multum balianum comi-
 talibus magnopere prodest, particulatum materiam excuties. Post omnia
 relata, & theriaca, & balnea naturalia, lo cum habent. Per totam uero uitae
 tempus caueant maxime cruditatem, & nutimenti ingestionem ante con-
 coctionem, & cibos crassos, & cibi dilationem, & uehementem ad Ve-
 nerem impetum, & multumini potum, & potum post balneum, uelut dictum
 est, praestitum uini metaci, & uina ualde uiscosa ac crassa, & acris odorami-
 ra, & quae caput replent, & ne insentem insipientes ex alto, & ne diutius mor-
 ram trahant in balneo, & ne caput ardori solis exponant.

De melancholia, et infima, et haec quae sunt effectus potantur. Caput XXIII.

Melancholia Melancholia delirium quoddam est citra febrem, ex atrabilario humore,
 re, qui mentem occupant, maxime oriens, quandoq; ipso cerebro pri-
 mario affectio, quandoq; una cum toto corpore permutato. Sed & tertia me-
 lancholiae species est, quam si nosam & hypochondriacam, id est praecor-
 dialem nominant, ex inflammatione praecordiorum circa stomachi obo-
 ra, quae aliquando atram quandam pratum, aliquando etiam de humoris
 essentia partem, ad cerebrum transmutant. Signa omnium communia sunt,
 timor, tristitia, hominum uersatio, & quod ponant aliqui se animalia bruti
 esse, & illorum uoces imitantur, aliqui uero uasa testacea se esse putant, &
 ne frangantur timent, & quidam ex ipsa capiunt mortem, quidam uero rur-
 sus uiuentem moriuntur. Itaque semper ridens, aliqui plorant. Quidam
 uero etiam putant se ab aliquibus maioribus possessis impeti, & fura-
 ra praedicere, uelut numine afflati, quos etiam priuatum numine afflatos no-
 minant, propria uero signa melancholicorum per consensum totius corporis
 sunt, gracilitas corporis, & nigritas, & hispiditas, & habitus atrabilis-
 rias, aut ex natura, aut acquiritis, per caras quasdam, aut uigilias, aut uis-
 riorum ciborum ingestiones, aut haemorrhoidam aut mensis suppressio-
 nem. Hos autem qui propter praecordia melancholici sunt, cruditates decla-
 rant, & acidi ructus, & ardor ac gratus ipsorum, & quod reuulsus est praecor-
 dialem, & aliquando etiam inflammatis, maxime circa tria. Deinde ubi
 haec maiora sunt, sequuntur melancholica symptomata. Et haec leuantur
 concoctionibus, aut excretionibus, aut scaribus pluribus, aut uomibus,
 aut ructibus. Nullo uero ex his, aut omnino paruis ex ipsis contingentibus,
 signa melancholica apparentia cerebrum primario affici indicant, ex atra-
 bilario humore. Si uero aliquando flauis bilis nimis afflati, multum in
 atram

A atram fiat, infantiam, maniam appellatam, inducet: in qua ferino modo fur-
runt, adeo ut eos qui minus provide cum ipsis conuersantur interficiant.

Curatio. Res igitur qui ex primaria cerebri affectione melancholici
sunt, per balnea assidua, & boni succi ac humidam uitum curare oportet,
una cum conveniente animi iucunditate, extra aliud auxilium, ubi nondum
ob temporis longitudinem, humor affligens difficulter euacuari potest. nam
si contra habet, fortiores & magis variegatas medelas adhibere oportet.
Purgare igitur ipsos consentit ab initio, epithymo, aut aloë. Horum enim
etiam modicis singulis diebus acceperint, maxime prodest, & leniter sub-
ducit. Purgatione igitur facta, uelut dictum est, ablinthium dandum est, ita
ut modo herba in aqua maceret & coquas, & inde cyathos duos exhibeat
modo succi drachme dimidium aqua liquificta, ac assidue prebeas. Sed
& aceti a ceruina parum insuper surbeant omnes iturus, plerique etiam ob-
stina in hoc cuncta edat. prestat autem aceto ammixtam esse scillam, & po-
llium, & tenuem aristolochiam. At uero ubi in incipientem morbum pro-
pter totius corporis consensum, uelut dictum est, in ceteris, & corpus fuerit
compactum, omnino à uentis sectione incipiendum est. post sectionem autē ue-
na amfectis uiribus deorsum purgare oportet, per cucurbitam syluestrem,
& per ustrum nigrum, medicamento dato. Sed & hemorrhoidum ora a-
periemus, & mentes prolicitemus, si ob horum suppressionem affectio fue-
rit oborta. Commode sunt etiam urinae cienses facultates, & sedoris pur-
gationes. Si uero ob precordiorum afflictione consistit affectio, etiā
horum curam habere oportet, & fouere ipsi irrigando, rutæ, anethi, ablin-
thij, pulegiæ, seminis uiridis, & baccarum lauri decoctio. Nam hæc & dolo-
res mitigant, & fluxus minuunt. Coquantur autem in oleo, & imponantur.
Habent etiam horum cataplasmata, ea quæ ad fluxus faciunt, apium, aut a-
nison, aut cuminum. Nec malum est & cyperum, & iridem, & rorem mari-
num, in cataplasmata addere. Si uero da uero sunt hæc, ut dies incumbant, ex-
tremam per diem, & ubi estum accepit, & ubi solutus adhuc est. Postquam au-
tem detraxeris, aliud experimentum, sanam laram imponito. Sed & cucurbi-
ta utere, ad fluxus quidem, leuibus ad dolores uero & inflammationes scar-
rificatione facta. Ceterum curationi attendendo, neq; sinapis obliuiscer-
re, utereq; etiam acibus singentis, & dropacibus, & indorio, & ad uen-
trem. In inueteratis poro optimi auxilium est purgatio ex ueratro per uo-
mitum. Visus autem omnibus melancholicis boni succi, & moderatè hu-
midus conueniat, ita ut ualent herbulas ac ceruinas carnes, & lenticulam, &
brassicam, & cochleas: una item crassa ac nigra, & in summa, omnia quæ
atram billem generant.

Curatio infantie. Infantentes quoq; similiter ueluti melancholicos cur-
abimus: priuacim uero horum capiti rosæ eam, & acetum ac rosæ eam ad-
hibebimus. Et uena ipsa secta, per pieram antidotum purgabimus. Hirudi-
nibus quoq; ad caput utenur. Maxime autem ipsis prodest hippomarathi
radix ac semem, si in aqua bibantur. Bryoniz item radice drachma una. cū
aqua quotidie. Si uero dehydrantes ad purgatoria medicamenta bibenda in-
ducere nequeant, ammiscenda sunt ipsa latentes, quandoq; edulsi ipsorum, ni-
miam buccellis, aut carich, aut paleisulis quandoq; citi potibus, præ om-
nibus uero aut uinciantur in lecto, ut ne mali quippiam faciant sibi ipsis, &
hi qui ad ipsos accedunt: aut intra portam cancellatim textam cōclusi, in
lecto ex alto suspensi, in altum attollantur.

De uento. Cap. xv.

Phialæp id est in eubum, aliquis uero nominatum, & dicunt, aut ab eo
quod hi qui in hac affectione constituti sunt, aliquem sibi insilire ac in-
combre imaginantur. Themison uero de decimo epistolarem libro Pinga-
lionem id est Suffocatorem nominauit, à suffocando uellicet nomine im-
posito. Constitit autē circa caput, & assidua cruditate labo rantes. His

g uera

infantis

Alia est qui
dicitur

Alia est qui
dicitur

Atrom bina
generata

Phialæp

Themison

vero qui in hac affectione constituti sunt, adest reger moris, & corporis sensus in somnis, suffocationis imaginatio, & uelut irruente aliquo oppressio, cum exclamandi impotentia, aut uociferatione nihil significante. Quidam uero imaginantur etiam audire se cum qui in ipsos irruit, & Venerem appetere, uerum fugere, digitis ad apprehendendam contrahis. Cauendum igitur est malum ab initio. Nam ubi diu durat, assidue nosse firmiter, magnos morbos, syderationem, aut insaniam, aut comitalem denunciat, ubi ad caput ferat causa. Quae enim comitales interdum, ea incubo oppressi dormientes perpetiuntur. Oportet igitur uenam secando, & purgationes adhibendo, totam affecti corpus evacuare. Maxime autem opitulantur his ueratam signum draconis unius pondere, si scammone obol. iiii. ammisceas, & quaedam odorata, anisum, daucum, petroselinum. Sed & ex cucurbita syluestri ltera magnopere auxiliatur. Est autē Russi. Vicias sit tenuis, & flauosa uitare oportet. Opitulantur ipsi & pzonae semitex eo uero quin decim grana nigra cum aqua tria, assidue bibenda dato.

De Lycanthropia. Cap. XVII.

QUilycanthropia contripitur noctis exeant per omnia lupos imitantes, & ad diem usq. circa monumenta uersantur. Cognosces autem ita affectus ex his signis, pallidi sunt, & obscure uident, & oculos secos, & linguam liccissimam habent, & saliva ipsis omnino non prodit. Sunt etiam sinituloli, & tibias eo quod frequenter impingant, incurabiliter ulceratas habent. Ac talia quidem sunt signa. Verum nosse oportet melancholiz speciem esse lycanthropiam: quam curabis tempore a cecissimis uenam secas, & sanguinem usq. ad animi deliquium vacuas, & boni facci cibis agrum nutrens. Vtatur etiam balneis dulcibus. Deinde lactis sero ad triduum usus, etiam purgatione per hieram ex colocynthide iterum atq. iterum utatur. post purgationes autē, theriaca quoq. e uiperis uertur, & reliqua quae de melancholia dicta sunt adhibebis. Inuadit uero iam morbo, irigationibus somnū inducere solent uetis, opio quoq. nates illi in diu ad somnū se conuertit.

De amoribus. Cap. XVII.

AD cerebri affectiones etiam amores adiungere, nihil absurdū est, quum cure quaedam existant. Cura autem aham affectio est, ratione in motu delassante constituta. Constantiū autem amantes hanc, Oculi caui sunt, & non lachrymantur, uerū apparent uelut uoluptate sint repleti. Et palpebrae ipsis frequenter mouentur, & quum reliquae corporis partes non collabunt, soli oculi in amantibus contrahuntur ac concidunt. Pullus autē amantium proprius nullus est, uelut quidam arbitrati sunt, sed qualis est curiosorum. Vbi uero citius quod amant recordatio incidit, aut per auditum, aut uisum, & praesertim de repente, tunc anima turbata, pullus alterari coningit, & neq. aequalitatem secundum naturam, neq. ordinem conseruare. Hos igitur eriles & uigilantes, quidam ignorantes affectionem, illicite & quiesce, & uenul utū con sumptent. Verum sapientiores comperto amore, ipsos ad balnea, & uini potum, gestationesq. ac spectacula, & ad audiendas fabulas animi ipsorum abducunt. Quibuscum uero etiam timorem impendere oportet. Nam qui semper amoris uacant, agere desinentem affectionē habent. Oportet igitur & contentiones aduersus aliquos excitare, pro utraque lingua delecta propellat, & in totum ad aliae curas rationem transferre.

De syderatione, seu syderatione, seu resolutione. Cap. XVIII.

COMMUNI nescientiam principio affectio, quum ex hoc omnes corporis partes simul & motum, & sensum amiserunt, apoplexia id est syderatio appellatur affectio, ita ut simul etiam principales actiones laedi sint. Si uero circa alteram partem obscuratio fiat, semisyderatio & resolutio uocatur. At si circa unam aliquam partem laesio consistat, illius partis affectio dicitur. Itaq. Hippocrates ait, syderatam ipsius uisum fuit. Seruatur igitur in syderatis breuis quaedam respiratio, quae si multum a naturali & maxima

A maximam affectionem inducet. Si parum, breuem, pessima uero est quæ insensibilis, aut etiam cum magna uolentia contingit. Constituitur autem affectio acruatim, frigida pituita principalissimos cerebri uentriculos implente. Si uero medulla spinalis principium totum ita affectum fuerit, omnes infra faciem partes resoluentur, ipsa illata manente, eo quod sensum & motus partes quæ in ipsa sunt, à cerebro accipiunt. Si uero ex dimidia parte, semisysydatio illarum partium oboritur. At si ossa, sinus passantur, aut anterioribus cerebri uentriculis intemperiem adeptus, aut meatibus in ossibus, quæ insar coli sunt, obstratis, talis affectus contingit. Syderati itaq; faciem sine uoce, sine motu, sine sensu, absq; febre, præcedit affectionem, capitis acruatus & acutus dolor, & uenarum iugularium eleuatio, & uertigo, & ipsi oculos obuerantes, & extremarum partium frigiditas præter rationem, palpitationesq; totius corporis, & æger motus, & denique stridores inter dormiendum. Munguæq; uelut æruginosæ, & nigrae parua, & sanæ crassæ similes subsidentiam habentia lotia. Contingit autem affectio circa ætatē senilem, pituitosioribus temperamentis, & tali uictu usis. Si uero quandoq; in iuuentute, & tempore ætatis oborta fuerit, magnam necessitatem indicat.

*Dentia frigida
dormiunt
dormiunt*

*Syderatio est
incurabile*

*Oleo sulphuris
tutus*

Vide prius

Curatio. Syderationis affectio nunquam, aut raro curatur. præsentem enim mortem minatur. Si uero etiam soluta fuerit, plerumq; cum partis alius corporis resolutione discedit. Eis itaq; qui quomodocumq; curari possunt, statim uena secunda est, & si remissionem aliquam habuerint, repetita sectione detrahere sanguinem oportet, eadem aut sequenti die. Ventri quoque acrisusio per clysterem subducere, muria ac melle permixta. Deinde oleo multo sulphurato totum corpus illinatur. Et caput oleo chamæmelino, aut anethino, in quo coctum sit spondylium, aut calamita. Instillanda est quoq; aqua multa. Et odoramenta adhibenda, opopanax, ligapænum, galbanum, aut castoreum. Oportet etiam ore uiolenter aperto, digitum aut penam immittere oleo imbutam, ad effundendum ea quæ in ipso hærent. Perungenda etiam est sedes his quæ statim educunt, dandumq; aceti nullam, aut aqua multa in pota. Venitur item pituitam per os detrahentibus, ex thymo aut origano coctis in aceto. Remissione uero contingente, cenerum & succulentum, & qui facile distribui possit, cibum exhibebimus. At uocis priuatione permanente, & uiribus permittentibus, etiam cucurbitas oecipis affigemus cum scarificatione, & si fieri possit etiam præcordijs. Deinde gestentur sella, aut lectica, aut penili lectio. Frequētius etiam adhibenda sunt stimulatoria, & pituitam per os detrahentia. Post diem decimum quartum ad reliquas gestationes perducemus, & uocis ac loquelæ curā habebimus, & ueterem fauorem tremorem dabimus, cum micis panis, aut alica. Et postea dandum est etiam modicum de hiera. Post uigelimam primam diem ad balneum ducemus, & uitam uetas bibendum dabimus, calida aqua instillata. Et de cætero per balnea & unctiōes faciemus resolutiones. Degant autem si id fieri possit, in maritimis locis.

*resoluitur
curatio*

Curatio resolutionis. At si resolutio fuerit partium omnium, aut aliquarum, citra principalium actionum affectionem ac lationem, etiam hic morlesantem humorem euacuarē oportet, qualiscumq; tandem fuerit. Deinde danda hiera, quæ & castorei partem habet, tinctio factio à dimidia drachma, cum paucis melle & aqua calida dissoluta, aut per se, aut pipæris scrupulo dimidio addito, deinde quatuor diebus interpolitis exhibebatur drachma per se, & postea sesquidrachma, deinde duæ & tres. Et rursus totidem diebus interpolitis dentur drach. iiii. si modo æger sumere possit, adiectio mellis cochlæario uno. Ipsi autem partibus imponere oportet medicamenta quæ dant discussoria, cum his quæ rubescere possunt, adiectio ad hæc castoreo, aut pipære, aut pyrethro, aut rosamariu semine, aut euphorbio. Ad hæc profusa singulis diebus ex oleo rutæ, aut sicyonio, aut ueteri. Cibi sint frumentacei, sorbi, ules, aut alioqui concocti faciles, & non recrementici. Cucurbitæ

cucurbitae affigantur partibus resolutis, si multae fuerint, particulatim: si paucae, uni. Post cucurbitae cataplasmata conueniant ex pice, aut resina, aut manna thuris. Optime uero facit artemisia simul cocta, & calamintha, & conyzia, & nitrum. Ammifcatur & aquae parum, quae & ipsa in coctura consumatur. Alias rursus subducatur per aloem, aut polypodium, aut scammoniam, aut per palmem ex colocynthide. Fiant etiam pingues illitiones ex oleo uenusto, in quo scilla inueneratur ad dies quadraginta ad solem. Si uero hoc non adlit, coques in oleo scilla sextantem, & illines. Aut rosamarinum semine similiter preparato utere, & ceræ unciam adde, ut ne distibui. Quod si etiam galbani, castorei, euphorbiae, adarces, & nitri, singulorum semuncia addetur, medicamentosius reddetur. Commodat etiam exquisitè batrachium herba, si in oleo cocta ad solem inueneretur. portiones conueniunt, castorei drachma, opopanaxis magnitudo fabae deglutita. Mistic facit & sagapenum cuius magnitudo in aqua mulla. Et castoreum cum opopanaxe. Et succi cyrenalis mistic magnitudo. Prodest & ex tribus piperis generibus antidona. Vtemur etiam acopis calefacientibus, & pituitam per os detrahentibus post decimum quartum diem, solidiorem usum exhibemus. Emula oboriente utilitate, ad balneum ducemus. Post erigelimum, dropacem adhibere conuenit, & ad balneum ducere, & de cetero cataplasmata ex sinapi imponere, ita ut in his quibus & motus, & sensus perierit, attendamus ne nimium aduramur, eo quod sensum non habent. In his autem qui sensus participes sunt, rubificationes solum adhibere oportet. Verum postquam intumuerint, ad balneum ducere oportet, & ceratis mollibus curare. Sed & haec ueniunt utantur, & a radiculis praesumptis. Gesticentur quoque scilla, aut curra, qui manibus aut fugo trahantur. de cetero uero ad naturalia balnea ducantur. Victus autem conuenit siccior, & medicus potus, & frictio. Siccior itaque cibos edant, & sitim quantum possunt ferant.

De resoluendis per laxationem, aut distensionem.

Quandoquidem partes resoluntur aut conuulsantur, aut laxantur: & hoc aut a repletionem, aut ab euacuatione, rursus attentione opus est, quando sanguinem detrahendum oportet, & quando non. Et deinde in laxatis, astringentia ad laxantia ammifcere, & frictionem intentam facere. In contrariis autem, laxantibus solum uti, una cum hoc ut molliter fricemus. Habeat autem oleum in laxatis, parum nitri, & fecis uini uisae trite additum, persundantur autem uelementer aqua calida, & maxime marina, in qua coctae sint lauri baccae, aut urticae geminae, aut lampybus, aut tale quippiam. Si uero aestas sit, nare etiam in mari. Rubificationes autem his maxime conueniunt. Proinde cedantur etiam partes fenulis, aut urticae ramusculis. Si uero permanent resolutio, carnem in eorum articulo mediam laxatam attrahere oportet, & ea uersis partibus ac tenuibus manusculis utere. Contractis autem partibus assidue dropacem imponere oportet.

De resolutione in singulis partibus cunctis.

Resolutio parum quae ex nervi diuisione contingit, incurabilis est. Quae uero ex intemperie, aut humore aliquo oboritur, in eorum quidam ex relictis remediis faciliatibus opem sentit. Sunt autem & propriae quaedam ad singulas ex ipsis, quas subiiciemus. In his igitur qui cuncto modo conuulsentur, maxillam in contrariam partem per capillri deligaturam reducere. Conuenit & sanguinis detractio uasis sub lingua, & cucurbitae primo uentriculo affixae, & pituitam per os detrahentis, & purgationes per uarium infusa. Nolle igitur oportet non eam maxillam quae distorta apparet, resolutam esse, sed oppositam. At si deglutino resoluta est, cucurbitas mepe affigere oportet, & medicamenta distillare ex castoreo, & sagapeno, ac lacte patibico. prodest & aerium gargarismus. Si uero lingua resoluta est, secunda sunt in ipsa uentis, & cucurbitae mento affigendae, & apoplegmatis ex sinapi utendū, & exercitijs linguae. Quod si uocis instrumenta resoluta

sunt,

^A si nunc, dioraci adhibere auxilia oportet, & spiritus detensione, ac uociferatio-
ne uni. At in superfluum, aut palpebrarum resolutione, unctiões si-
militer prosunt. Ad finem uero etiam futura sursum uersas. Si uero uelica
resoluitur, effluue supprimantur urinae, siue inuoluntariis excremantur, pedi-
mi & intercedunt inter anum & scrotum, medicamenta adhibeantur. In
sedem uero oleum rutaceum infundatur, aut sicyoniam cum butyro, & ca-
storiae & galbano, aut opoponace, aut sulphuris. Sed & in uelicam trans-
missa haec per colem, magnifice profuerunt, aut etiam sola sufficerent. Quin
& ex centauro ac colocynthide in intestinum infusa per clysterem, cum
oleo sicyonio commoda sunt. Commodant etiam urinam ciensia in potu,
& castorium similiter. Et prae omnibus, catheteris instrumentum immitten-
dum est, in his qui nihil urinae emittunt, & infusus, & cataplasmata ex la-
xantibus adhibenda. In his autem qui inuoluntariis excremant, astringen-
te ductu utendum est per corroborantia auxilia. Cibis uero siccis, & aquis
frigidis potu. Verum in resolutionibus, etiam rubificationibus, & naturalibus
balsmeis frigidis utantur. Ac uero eos qui in spina resoluti sunt, ex uul-
nere, aut casu, aut luxatione uerticuli, si letalium signorum concussiones
adint, curare impossibile est. Si uero coles resolutus fuerit, his quae ad ue-
sicam relata sunt utendū est, & ad easdem partes, & ad lumbos. Insuper aur-
tem & tenciginem ciensibus utemur. Incommodum his est lac, caseus, & reli-
qua quae placet, lactuca item, & reliqua olera. Recto porro intestino resolu-
to, in quo aliquando inuoluntariis sterces excreantur, aliquando supprimi-
tur, si demutandum est, & quandoque per clysterē immittenda, nunc ea quae
adstringunt, uelut est eupressi, lenicci, rabi de coctum nunc ea quae laxant,
uelut est adeps suillus, & aserinus, & oleum maluarum interdum autem mor-
dentia, uelut est muria, aut colocynthidis, aut similia decoctum. Nihil e-
nim ita ad motus prodest, uelut uaria moliri. Si uero frigiditatem sentiant,
etiam acopon ex euphorbia oleo dilutum per clysterem immittatur. Ca-
terum areas resolutas, cum communi curatione, & ciantur, ac fricentur, & ex-
tendantur iuxta relatum modum. Plurimum enim ipse in frictione sicut est.

De resolutione ex alio morbo orta.

Nostri aetate colicus quidam morbus homines uexans, in quo absoluta
motus priuatio in artibus consequentur, & maxime in his qui superstites
euasuri essent. Verum sensus tactus illisus conseruabatur, uelut uersimile
est, iudicatoria quodam transiitione ex alio contingente. Unde sua sponte
redijt plerique motus temporis progressu. Qui uero difficilis curati po-
uerunt, his simpliciores ex relatis distillationibus profuerunt. Praecipua uero
ad ipsos comperta sunt aeopa, & id quod ex populo nigra fit, & quod ex
abiete parant. Multis uero etiam corroborantia, & moderatē frigefaciens
ia magnopere profuerunt.

De consensibus. Caput XIX.

^A Diuersionem de resolutione, de conuulsionibus sermo consequitur, ^{Consensio}
eo quod ambo uentrum sunt affectiones. Quapropter etiam de tremo-
ribus consequenter dicetur. Quam igitur ab initio, aut non longè post in-
itum morbi, exorta fieri conuulsionem permanent, ex repletionem genera-
tionem habent. Quin uero post sudores multos, aut uomitus, aut alui ege-
stiones, aut sanguinis eruptiones, aut uigilias, aut famem, aut motus multos
& uehementes, ob euacuationem sunt ac consequuntur. Et ubi aliquē
sanum de repente conuelli contigerit, necesse est in repletionem fieri. Si uero
ex febribus ardentibus resiccata fuerit totum corpus, & nerui, & dein-
de ob siccitatem conuulsi fuerint, maximum hoc malum est, & ferè in-
curabile. Primum igitur delegare oportet partes, quae coneruantur ita
ut cedant, & inordinatis resistere moribus, defricare quae oleo rutaceo,
aut sicyonio, aut ueteri, aut aliquo huiusmodi, & aquam nullam praebē-
dendam dare. Et qui quidem ob euacuationem conuulsantur, oleo, aut

*Ventriculus
motu resolutus.
Exordia
resolutus
Vesicae res-
oluta*

*Catheter in
procuratus*

*Spina resolu-
ta
Catheter in
lato*

*Intestini resolu-
ta*

Artus resoluti

*Colicus morbus
in corpore
Eius*

Consensio

aqua & oleo calido perfundendi sunt. Nulla autem re prohibeente, etiam ad balneum abducimus, ut per iterum solo utemur, cum oleo ac frictione mollissima. Nutriemus ipsos sorbitionibus ex chondro & alica, & vinum tenue, aquosum, & quod facile distribuere dabimus, praeferimus si febrant: tunc enim pessime succo utemur & somnam conciliabimus. At vero convulsiones ob plenitudinem, aut inflammationem abortus, curabis plenitudine evacuationis, inflammationem autem proprijs ipsius auxilijs persanando. Fit etiam consensio quum uomentis vehementius lancinantur. Opisthotonos autem consensio acanthij radice, & spinarum albarum semen potum, itemque spinarum Aegyptiacarum. Sed & centaurij tenuis succum quidam bibendum dant, quum ob repletionem consensio contingit. Non solum autem bibendum dato, sed etiam forniculis ad cutem illinito castoreum cum oleo scyronio. Si uero non sedatur, cucurbitas affligito cum scarificatione, si quidem crura contrahantur, ad coxas & alius uentriculum: manibus autem consulis, & dorso, & primo ipsius uentriculo, & ei quod humero superincumbit. Si tamen toto corpore ab affectione immuni, labium contrahatur, aut palpebras, aut lingua graue tympanoma putandum est, & quod magnos timores afferat, etiam si affectus partes paruas esse uideantur. In his igitur detractiones sanguinis ab occipite, & a primis uentriculis faciendae sunt.

De tetano, et eius diffinitione, et quibus diffinitis. Caput XXX.

Tetanus

Tetanus quum & ipse consensio quaedam sit, uelut compactio corporis, & maxime spinarum muscularum obortur, ex frigido humore intrinseco ac fossilis concreto. Unde affecti neque seipsum necedere possunt. Verum quum in anteriorem partem corporis, partes tenduntur, affectio Emprosthotonos appellatur: quum in posteriorem, opisthotonos. Vbi uero aequaliter in utraque partem tendantur, tetanus affectio nominatur. At pectus has affectiones tensionem & distensionem esse dicit musculorum ac nervorum circa collum, per quos inclinatio, & nutus, & conuersio capitis contingit. Verum si circa posteriores colli musculos consiliat affectio, opisthotonos ex contingenti uero circa anteriores, emprosthotonos dicitur circa utroque, tetanus appellatur. Causam autem repletionem esse dicit musculorum, ex spiritu & aere crasso ac nebuloso. Dicit autem frigidi uisum ipsum esse ac congelatum, & propterea agere mobilem. Unde non sicca potius his formata, sed humida conuenire. Atque haec quidem sunt tetani differentiae. Ceterum curatio communis quaedam est, & iuxta has differentias non euiat. Opisthotonos igitur omnium auxilium ipsis est febris insuper accedens, quae ab initio non fuit. Signa horum sunt respiratio suspensibilis, & pulsus rarus ac paruus. Et quandoque etiam risus Sardonius ipsis contingit. Et rubor in facie est, & oculi ipsis in mole maiore apparent. Et aut omnino non mingunt, aut uelut aqua ipsis emittitur, aut urina suberuenta, bullas quasdam habens. Et aluius reficiantur, & vigilantes sunt, & per consensum sibi saepe periclitantur ne ex lecto excidant. Et quandoque etiam singultire incipiunt. Et dentium caput, alij scapularum nexus, & lumbos. Quidam ex ipsis etiam membra sunt. Facit porro affectionem, quanquam raro, etiam lassitudo, & haemorrhagia, & grauis oneris eleuatio, & casus, & uulnus, & ulcus & plaga, & alia quae eandem lationem nervi inducere possunt. Curare uero ipsam oportet uelut convulsiones ex euacuatione abortus.

Curatio tetanorum. Qui tetanica diffinitione consensum, in principio sectionem adhibeant, & partes lanas oleo imbutis tegant, scyronio, aut castoreo cum oleo uteri. Aut etiam uescam amplam oleum calidum habentem tendinibus imponant, & cucurbitas cum scarificatione. Nam sic uescitae sunt. Affligantur autem & ceruicet, & utrinque ad spinas, & musculi inferioribus pectoris partibus, & praecordijs, & ad uellus ac rhenam locum. Nec parca detrahendum est, ita tamen ut non aceruatim detrahamus, sed particulariter. Sudores autem lanas oleo imbutis excipere ac abripere oportet.

Act, ut ne lateret nobis non animadvertentibus perfingrent. Si vero diuturnus fiat tetanus, his in die in olei solum demittantur, non tamen in ipso moram trahant. Nam olei solum, maxime vires exsoluit. In potu danda est aqua mulis tepida ad dimidias decocta, & panactis drach. i. ro bustis, in miris, obol. i. i. aut minimum obol. i. Nam quod stomacho incommodat, id in ipso quae uereri possit. Dandum est & ammatacum, & succi cyrenaei cuius magnitudo, cocto melle oblita deuoretur: & radice silphij cochlearia ii. tribus aquae mulis cyathis inspersa dantur, aut cum ipsius decocto. Aut myrrhae drach. i. ex aqua mulis, aut hyssopi decocto. Minime omnium uero offendit, & efficacissimum est, ut deus castorij cochlearia ii. aut iii. diuisa ipsius copia. Non enim offendet etiam si post cibum ex ipso dederis. Sed & ipsum potum, & reliqua, lenes ac paulatim accipiant. Nam quod difficulter deglutiunt, in nates potum relinunt, unde uicinenter lancinati ad conuulsionem iritantur. Sedes oleo rutaceo cum opopanace dilinatur, & eadem per clysterem immittantur. At uero frigida aduersionem, uelut Hippocrates dicit, quam maxime temeraria sit, & propterea a posterioribus damnata, etiam nos reprobamus. Vnguentum. Nardini sextar. i. cere sextantem, folij amomi, & ysaach, mastiches, singulorum unc. i. castorij, adares, euphorbij, piperis, singulorum unc. i. spice nardi, opobalsami, singulorum unc. i.

Solum olei

Frigida aqua
solum
dabit

Potio ad opisthotonicos. Radicis panactis, piperis albi, costi, myrrae, succi papaueris, singulorum aequales partes, daso araci magnitudine ad summum, facit & ad recta ceruicis ipsantes. Sit porro uisus his attenuatus, & qui facile coqui ac distribui possit, & penitus finire crementis.

De tremoribus. Caput XXXI

Tremor in uniuersum quidem ob nervorum debilitatem fit. Hoc autem testatur senilis aetas. Verum particularium multae causae hunc efficiunt. Nam & ob frigidam si inemperaturam, & ob frigida aquae potum, & praesertim in febribus intemperatam acceptam. Insuper et ob frigidum ac uiscoforum humorum abundantiam, & ob copiosioris uisus usum. Qui igitur ex delictis palam tremunt, ab his quae laeserant abstineant. perseverante uero tremore in febribus, primam totum corpus oleo subdno arigena. Verum in accessionem remissionibus, uetusto aut sicponio. Extremas uero partes praedilata, lenis mollibus integantur. deinde affigantur occubites, à primo articulo usque ad ipsos & lumbos, intestis antea partibus una cum praecordij, cruda ordeacea farina. Tegantur autem & haec partes latris ueteti aut siccyonio oleo imbutis. Si uero diuturnae fiant febres, alternis diebus in olei, aut aquae & olei solum insidiana, & mollibus frictionibus utantur. Si uero affectio prorogetur, & frigiditas sit suspecta, aqua mulis cum castorio praebibenda detur, & calida locis gestatio fiat. Ceterum cibum qui facile coqui ac distribui possit dabitur, primum forbilem, postea etiam uolucres, & pisces mollis carnis. Solus autem febribus laeuent, ita ut frigida solum, & uini potum nitent. At si efflorem ac uiscolorum humorum copia fuerit, secantibus & attenuantibus utendum est: quale & hoc est, rursus ramulorum, spondylii, singulorum quatuor tribus digitis praebendi potest. castorij, niri, singulorum obol. i. i. Daso quondam cochlearium unum cum aceto mulso, ad triduum infundis. Auspanactis & piperis, singulorum grana v. in aqua mulis cyathis uno bibendo praebe. Simpliciter uero quae tremulis praebenda dantur profunde haec castoriana, leporis cerebrum in cibo, althaeae radicis decoctum, damasij foliorum drach. i. i. i. in aqua mulis, eupatorium cum aqua. Si uero praedominetur frigiditas, etiam solim ungento, & acopis ad resolutiones descriptis, & unctionibus ac rubificationibus utemur, exercitijs item ac distractionibus. Hos uero qui ob uisum potum tremunt, à uino abstinere oportet, donec penitus liberentur.

De colorum morbis, et primis de dolore, et Calore. Cap. XXXII

Quoniam dolores uehementiores in oculis sunt, considera ex quibus causis affectione

Tremor
causaDamasij
foliaOculi morbi
et ac affectione
natura

ctione oculum dolere contingit in inflammationibus. Aut enim eo quod mordentur uehementer ab influentium acrimoniis: Aut quod replete uni-
 ce tenduntur: aut propter crassorum humorum, aut spirituum flatuosorum
 intensionem, dolores uehementes in ipsis fiunt. Morbus itaque per purgatio-
 nis uacuando curare oportet, & cui candidum infundendo. Concoctio uero
 iam inflammatione, & corpore à sepe efflutatibus libero, conuenientissima
 his sunt balnea. At inflammationes ob repletionem, & per sanguinis eua-
 cuationem, & per uentris subductionem, & infernarum partium frictionem,
 curare conuenit. Intensiones autem, toto corpore praeuacuato, & humo-
 rum momento deorsum reuulso, consequenter localibus discussorijs cura-
 de sunt. Fomenta igitur ipsis adhibere oportet, & fœni græci de coctum in-
 fundere. Verum in quibus intensio est sanguinis crassi in oculorum uenar-
 um, circa pleitudinis affectionem in toto corpore, his uini potu utendi est,
 quod & percalefacere potest, & euacuare, & oburationes referre.

De turbatione, & opthalmia, & est lippitudo, proprie appellata.

Turbatio oculi. Turbatio quidem humiditas est oculi, & caliditas cum rubore propter
luna nigram, quæ non ex corpore, sed ab aliqua forissecus causa contingit, ue-
 lut à sole, fumo, puluere, uento. Quare etiam ciuissime soluius, dum causa
Collyrii. sum mouetur. Et & lippitudo quædam perturbatio, non solum forissecus,
alio sed etiam intra manifestam causam obortens, & permanens usque ad tertium,
Lippitudo aut quartum, aut quintum diem. Curam autem facillime, forissecus intensionis
 custodia, pauci cibi usui, aque potui, de ambulatione, & facili alui solutione.

De inflammatione.

Informatio Si uero inflammatio relicta fuerit in oculis, post totius corporis euacua-
uolens tionem, subilectionibus utendum est, per ea quæ humorum aliationem repel-
 lere possunt, & irritationem mitigare, quale est collyrium Nili ex rosas, aut
 etiam Chiacum, & Nardinus. Inflammata uero tunica agnata, collyrijs moy-
 nehomeris ab unius diei usu appellatis utendum est, cum cui candido infa-
 sia. Poltridie si non inflammatio intendatur, nardinum illustratur. Fomento
 uero utendum est ex decoctio melilosi ac fœni græci. Quod si crassus sit hu-
 mor qui lippitudinem facit, medica meretis utemur quæ neque meatus obda-
 cunt, neque humores crassos faciunt, sed diffundere, ac exacer-
 nere possunt uelut est collyrium Chiaci. Si uero circa caput impacti sunt hu-
 mores, encurbata occipiti affigatur, aut scarificatio fiat, aut hircodines fron-
 ti adhibeantur ad dolentem oculum. Et cataplasma fiat ex pane puro aqua
 madesfacto, cum modico rosaceo, aut ex polenta in caputum papaueris de-
 coctio cocta, eodem modo. Sed & efficacior utendum est cataplasmate, ex
 croco, & meliloto, & palmularum cartibus, & coriandri folijs tenetris, &
 quorum utrellis attatis, & melle panis sapa madesfactis, & modico rosaceo,
 contritis his in papaueris capientis decoctio. Sed & papaueris semel aliquan-
 do ammiscemus, doloria sedandi gratia. Si uero magna sit doloria necessi-
 tas, etiam opij minimum quiddam ammiscendum est. Verum circa maxi-
 mum dolorem, reprobanda sunt quæ torpescunt. At si moderata fuerit in-
 flammatio, aloem per se, aut aqua, aut oui candido dissolutam illine. Quo ue-
 ro etiam paratum sit auxilium. Croci drach. vi. aloes drach. xvi. gummi
Diapras col- drach. i. x. aqua plantali excipe, & collyria effinge. Quin & ex croco dia-
lyris croci appellata collyria, ad lippitudinum initia commoda sunt. At in qui-
 bus tumor est latus & exalbus, & circa palpebras, & circumtunica agna-
 tam, circa tunica lesionem, bene facit & liquida uocata collyria, quæ
 ex croco, & atramento futorio, ac melle parantur. Sed & hoc optimus est.

Collyrium liquidum dolorem excludit.

Medianter & coactaria, melle Attici, sacci fœni græci, æquales singulorum
 partes, coquito ad spissitudinem mellis, deinde per specilli nucleum lase ca-
 put summum ambos angulos contingit.

Ad illud

A

Ad fluxionum fluxiones impetuosas.

Ad fluxionum impetuosas allationes in principio conducit inedia, & aqua potus, & pre omnibus Veneris abstinētia. Et alius suberahanus, & posca aquosa facies prolatur, maxime si feruens fuerit fluxio: Sān minus, aut tramento satiorum cum melle, frons & palpebre illinantur. Quidam vero a tramento futurum aqua dilutum proluendum exhibent. Verum in his qui absq̃ inflammatione fluxione infestantur, aut cum inflammatione, tamen ut supra caluaria structura affectionis consistat, agglutinatorijs utendum est in fronte, simplicibus quidem, ut si solis viridibus, aut rubi sacco, aut portulacæ, aut malorum cotoneorū succo, cum tenui polenta, aut galla tria cum uino, ac tenui polenta, aut cicuta, aut psyllio cum aqua, aut solano, aut cochleis unā cum testis trais impositis à tempore ad tempus: & in summa adstringentibus & perfrigerantibus. Compotius autem his. Pollen tritici, & myrrha, aut thau, cum oui candido illinantur. Aut samia terra cum myrrha, & manna, similiter cum oui candido. Verum in frigidioribus fluxionibus, sulphuris uini, huiusmodi, picis, & colophonis, singulorum drach. 11. Musæ item pastillas, & Asteri, & conuulsiues probe cepeflunt. Et theriaca uino adstringente diluta, & frons illis, frigidas fluxiones sistit. Hæc tamen etiam posca magnifice his prodest. Supra ipsam uero oculi, lanam, aut lintheum tenue oui candido imbum in tempore. Et caetera recens similiter oculo impositis, acres maxime fluxiones cohibet. Ex collydia sistens appellata illura, & aquosa instillata, hoc faciunt. Si uero per profundum, & sub caluaria consistat humor, & ad longum tempus extendatur, post uniuersales cura curationes, & erethis, & apoplegmasibus, ad parietē detrahendum utendum est, & rasura, & rubricationibus capitis. Verū in his etiam chirurgia in capite assumunt, uisorum uidelicet et dissectionem, & arteriarum sectionem, & hypostaphisum, & circum caluaria incisionem, & cusionem in uertice ad os usq̃. Sed & cucurbitæ sincipiti affixæ cum scarificatione, in fluxionem reuolare possunt. Signa uero fluxionum extra caluaria sunt, distentiones uisorum circa frontem & tempora, & uelut uinculum capitis. Et quid siccantia agglutinatoria profunt. His uero non presentibus, infusione moram trahentē, & sternutamentis aliquando uexantibus, sub caluaria humorem esse putandum est.

De Chemosi.

Chemosis dicitur, quum pre inflammatione uehementi, ambæ palpebre euerse fuerint, ut oculi utraque ipsas cōtegantur, & candidi oculi sublimius fuerint quam nigrum, & rubicundum, & multam nigri partē occuparit. Curare uero ipsam oportet uena sectione, & medicamento purgatorio, & collyrio ex oleo albo, & spodiaco, cum lacte muliebri, aut candido oui. Eodem etiam oblinendæ sunt palpebre, & tempora, & frons. Fomentis quoque & cataplasmaris utendum est mitigatorijs. Remanente uero inflammatione illinantur actiora, uelut est uiride ex rosæ.

De sigillatione et infestatione.

Sigillatio est ruptura uenarū membranae agnatae, ex plaga maxime oboriente. Instillare igitur ipsis oportet sanguinē palumbi aut columbæ, aut lac muliebri calidū modico thure cum ipso trito. Aut muriam instilla, & praesertim quæ est ex Cappadocio sale. Et fomento utere ex decocto hyssopi. Verum ad tumores circa oculos factos ob plagas, facit fomentum assiduū ex posca, & spongia ex posca incumbens. Medicamentum uero illitioni accommodatum hoc est. Lapis specularis uisus, & columbinū steruus, aquis portionibus uino, aut aceto trita. Cataplasma autem sit ex caseo rectū, aut raphani cortice, aut uua passa exemptis uinae eis diugulis in posca, aut in aqua multa. Eadem faciunt etiam ad inflationes.

Ad inflationes pruriginosas, et subra lippitiam.

Inflatio tumor est palpebre laxus. Scabra uero lippitudo, pruriginosa palpebre

Fluxiones in
oculis impetuo-
se

Chemosi

Sigillatio et
infestatio

Infestio
Lippitudo
Scabra
palpebre

palpebrae scabies est, ex salso ac nigro humore oborta. Conueniunt igitur ipsa posita, & linctum de coctum, itemq; rosarium, ut his somenta fiant. Cetylum autem liquidum hoc. Aeris drach. ʒ i. misyos tosti, myrrhæ, singulorum drach. ʒ i. croci drach. ʒ ss. papæris drach. i. uini chii, & passii cretici singulos un felle yanthum coquito ad mellis spissitudinē. Hæc est strassistrati pancretiflos ab omnimoda uisitate appellata, faciens etiam ad anginā, & ulcera in ore, & in pudendo, & ad auris dolores. Inungant autē & oleo palpebras, ubi dormire uolent. Abstineant ab acidis, & salis, & acerbis.

De duri lippitudine, & de strassistrati.

Lippitudo dura Lippitudo dura durities est, & difficilis oculi motus, cum dolore ac rubore, citra humiditatem. Couere igitur ipsos assidue oportet spongia ex aqua calida. Et ad fomum iureis imponere palpebris ouum cum rosaceo, aut ualeris adipem, ita ut frigat, & indurantis. Tegatur autem & ungatur caput, & alius subducatur. Lippitudo uero sicca, est pruriginosa, oculorum affectio, citra fluxionem. Curare oportet ipsam balsatis, & unctio nibus, & boni succi uisus. In communi uero utrisq; obueniunt medicamenta acris, ut & lachrymas prouocans, per quas & durities remittetur, & scititas humectabitur. Talis autem est & pancretiflos strassistrati, & collyrium diacenteton appellatum, & quod straxioticum uocatur.

De palpebrae euerfione.

Palpebra euerfio contingit, aut ob cicatricem, aut ob nimiam carnē excrecentem. In diuturnis igitur euerfionibus ob nimiam carnem excrecentem, erugine rosam solam adhibere aut plumbum usum & locum aut utraq; pariter, eruginem & plumbum admooue. Nam ex cicatrice obortam palpebra euerfionem, si quidem omnino curatur, chirurgia sanat.

De Agilops & Anchilops.

Agilops Agilops abscessus est in supermagnum oculi angulū & nasum, qui & nim pitur, & in fistulam abit, si neglectus fuerit, usque ad os ipsum. Priusquam uero in stilus eruperit, abscessus, Anchilops uocatur. Bene igitur faciant glaucium & crocus, si cum perdicidis succo imponantur. Verum assidue alterare oportet, & ad transmutationem non peruenient. Aliud. Alia cocta in aceto, & probe uita, non solum incipientes, sed etiam in pus transmutatos sanat, & numpit, & ad os usq; subit. Huius usu non modo Agilops, sed & Anchilops curabis. Aliud. Rura facias cum lixiuo pronolactio, ex cinere calce adiecta parato trita, cocta ac impoita, ualde probe extirpat agilops, & ad os usq; subit, ab infimo mordens, postea non item, & quod mirū est, neq; cicatricē indecoram inde ferunt. Aliud. Coctileas est uelitis niras impone, aliquando etiam aloē & myrrhā ammiscet, aut ita q; in pus agilops transmutatus fuerit. Sed & postq; suppuratus fuerit, ipsam

De Trachoma, & Cyloph, & Tyloph.

(resoluit.)

Trachoma Trachoma asperitas intra palpebram est, huius intensio ut uideat in ciliis ras habeat, sycolia si fucus similitudine uocatur. Vbi uero diu durauit & cal lūm contraxit, cylosia id est callositas nominatur. Collyria itaq; utendum esse, ut eo quod ex uino, nam eo quod ex duobus lapidibus paratur. Sed & ipso humectare lapide per aquam longē ac subiecto, palpebra consistat. Quin & Harmation collyriū, cum medico cygnario, aut eo quod ex croco coctum, ad hæc etiam scabris lippitudinibus citra exulcerationem conda citā intra palpebra illinatur. Si uero durus sit callus, & hic non cedat, in uelam palpebram per pumicem rademur, aut per sepe testam, aut sic for ipsa, aut etiam per instrumentum blepharoxyston ab hac opera appellatum.

De granulosis.

Grando oculi Grando lentis humoris circa palpebram concretio est, cui ammoniacum aceto mium cum galbano illinere facit & terebinthina cerato excepta.

De Oculis.

Oculodolum Oculodolum ab eis ciliis paruum est, iuxta palpebrae marginem oblongum. Oportet

A. Oportet igitur ipsum cera alba fouere, aut de melle capite abiectio, reliquum corpus aspiccare, aut ordei cremore perfundere.

Ad pediculum palpebre.

Expurgatis prius pediculis, aqua marina tepida proluere oportet, deinde marginem subscrispo medicamento contingere. Aluminis scilicet partes 11. diaphydis silyacis partes 1. tritis utere.

Pediculi palpebre

De Madrophi, aut milphosi.

Defluuium pilorum palpebre hanc affectio est. Possit totius igitur corporis curam, inegmatis calli blepharis, ab ornandis palpebris vocant, utere. Aut terre suspiditidis, croci, celicæ, ladani, singulorum æquales partes terere ac utere. Aliud. Subij tofiloti drach. 1. plumbi usti loti drach. 1111. croci drach. 1111. nardi Indici drach. 111. tritis utere. Hoc etiam scabiosos oculos sanat. Aliud Neapolitanum, ad milphosos, & diurnas palpebrarum affectiones. Subij cademip, chalcitidis, milphos peregrini, singulorum partes æquales, cōquandito crassiore modo, & melle subacta terere, ac tritis unitor.

*Madrophi
milphosi
calli blephari*

De pilosi.

Pilosis crassities est palpebrarum callosa, rubicunda, quibus contingit etiam saepe pilorum defluuium. Propter relata igitur etiam hoc sanasse facit. Sæpius murum usum ac melle contritum illine.

pilosi

Ad pilorum superciliorum defluuium.

Oleo aut adipe aserino siliis digitis plumbum confricato, & hoc illinere. Aliud. Hoc etiam subnigros facit. Nuxes auxillanas usas cum capris auturino adipe confricato. Aliud. Hoc etiam ad barbaum alio prelo facit, hyoscyami drach. 11. Herconis murici drach. 1. polytrichi drach. 1. unguenti lini cochlearia 1111. Ad reliqua probe trita unguentum ammisce, & fomento prius adhibito illine. Si uero præteritis, magis efficax est.

Alapocia barbae

Ad pilos palpebrarum purgentes, Trididisti appellationem.

Pilis pungentibus præuulsi, lo cum sanguine ranarum per se sitim illine, aut cum cinere chamæleonis albi. Aut cinicem sanguinem, aut fumarie inter ordeum nascentis succum, cum gummi. Aut tellinatum salis cinerem, cum cedria. Aut loci cinerem. Aut alumen liquidum, phosinum appellatum. Aut ricini hanc oculi sanguinem. ualde efficax est.

Trididisti

Ricini à cast

Pilos agglutinantes.

Pilos inter se refractos glutinat bitumen, masliche, colophonis, glutinatum, cochlear glutinosis.

De canthi in angulo magno incrementum ac decrementum.

Enanthis naturalis in magno angulo canthi incrementum appellatur. Et rursus huius decrementum Rhicea. Incrementum igitur his quæ ad palpebre euerfiones relata sunt, & sensibus usum, aut corrodentibus consumpseris, non tamen totum, ut ne rursus decrementum fiat: sed ad naturam usque magnitudinem. Decrementum uero, tota quidem carne consumpta, aut à parum artificiosa chirurgia, aut per medicamenta, incurabile esse scias: si uero pars ipsa immixta sit erit, moderate adstringentibus & in cūmantibus ipsam remanentia. Quisiam sunt quæ sunt ex croco, glaucio, & alio. Bagallaria ex croco, Erhyoscyamos in uino coctus ac impolitus, & modicum alumen cum uino.

*Enanthis
Rhicea*

De alceribus.

Vicerum in oculis genus quidem unum est, differentie uero particulares plures. Nam quod in coniformi membrana cauum, & angustum ac punctum ulcus est, Borbriam id est fossula cognominatur. Quod uero latius borbrio est, minus autem profundum, Celoma vocatur. Argemon autem ulcus dicitur in insidiis circulo obortum, circumscissa occupata, ut circa exterum insidis partem rubicundam appareat. Circa internam uero album. Ipsi cauma uero ulcus est sordidum, & impurum, ac crustosum, quod dum repurgatur, sæpe humores in oculo diluant. Sed & alia plures ulcerum differen-

*Vicerum
borbriam
Borbriam
Celoma
Argemon
Ipsi cauma*

h uæ

sive sunt, de quibus in comuni dicemus. Si igitur cum inflammatione uel
 oes confecerit, etiam enatio per ea quae inflammationem mitigare ac con-
 coquere possunt, scienda est, unum cum proprietate quae ulcus requirit. Ta-
 lia uero sunt collyria, libyanum, & cygnus, & pelaria appellata, & aliter, &
 similia: & quae ex amylo, terra samia aliter dicta, & ceruisa componuntur.
 Omnibus autem magis dolorē sedare nouimus collyrium Nitamonis, sed
 in ipsius usu non diu immoramur, propter uchemenē stupefaciendū facul-
 tatem. Optimum est & collyrium ex decoctis, quod neque habet uis stupefa-
 ciendi. Si uero cum fluxione ulcus fuerit, ex collyrijs ad illam commodis
 aliquod ammiscemus, quale est quod ex hydia fit, & chiacē, & cygnus
 fuluus, & quaecumque repulsiuam non mordacem uim habet. Quod si fordi-
 da ulcera fuerint, a qua mollis moderate aquosa, & foeni graeci decoctio ute-
 marum, tum per se, tum cum collyrijs ad hoc faciensibus, acriterbus quidē ul-
 ceribus existensibus, Scueriano, & eo quod ex foeni graeci succo paratur
 abseribus ad, dialinymis & nardinis. Verū purgata ulcera probe ad cicat-
 ricē perducere solet collyriū Cleon, ad hoc quod etiam cicatricē cōcolorē

De prolapsu oculi.

(efficacit.)

Prolapsus Prolapsus est pronūta tunica aciniformis, ex corrosione, aut ruptione
oculi corniformis tunicae oborta. Quae sanē ubi adhuc parua est, ut musca capiti
Myocephalon similis sit, Myocephalon uocatur. Amplius anemauēta, ad acini uisū
Staphyloma similitudinem, Staphyloma. Plurimum uero, ut ultra palpebras excedat, Ma-
loma lom. Si uero callosum factum fuerit, hoc clauus appellatur. Si igitur modice
Clauus ad capitis muscae similitudinem prolapsus factus fuerit, restringentibus
 ac repellentibus compositionibus utendum est, chiacē uidelicet collyrio,
 & salco, & nardino, & Theodosio, & eo quod ex olea frōdibus fit, & quod
 ex cornu. Spongiam quoque posca aut uino adstringente, aut rosarum deco-
 cto imbutam, aut etiam pleniam, extra compressionem deligare oportet.
 Principatum autem habet ad prolapsū, & ulcera omnia, olympiacum siue
 olympus appellatū collyrium, cum succo oleae, aut polygoni, aut polij. La-
 dem haec etiam Malis conducunt, & staphylomantibus, prius quā in albes-
 cent. Vbi uero alba aut callosa facta sunt, incurabilia existunt.

De suppurulenta.

Suppurulen- Suppurulenta fit aliquando corniformis tunica, quandoque per profundi-
ti oculi dum, quandoque in superficie, ut ungui simile figura pars sit. Quare etiam affe-
Pagetur oculi ctionem unguem appellant. Scopus igitur curationalis est, aut pus discutere,
 per ea quae moderatē hoc faciunt, uelut ista aqua mulla, & foeni graeci suc-
 cus, & quae ex ipso parantur collyria, & Libyanum, & quae ex thure fiunt.
 Aut compere & repurgare per fortiora, qualia sunt collyria dialinyma, &
 hygidium appellatum. At uero ad purulentos abscq̃ ulceratione, etiam hoc
 liquidū collyrium utendum est. Amentis fusorij, croci, singulorum drach.
Pagetur oculi ʒ iiii. myrrhē drach. i. iii. mellis libram i. Quin & postula quam sic com-
 formis tunica emanat, humore quodam sitas ipsius subexcoriante, parā
 lentiorum curationi subijciat. Liquidum Bassi, ad oculos suppurulentos.
 Croci, aloes, myrrhē, suppurulorum unc. i. uini quadrantem, mellis optimi se-
 xtingentem. Crocus cum modico uino tenetur deinde aloē, & myrrhā, & ubi
 crassa facta fuerint, adjectū mel, & unita in uireo uase reponit. Vtere au-
 tem his in die. Si uero res urget, iter. Nam oculum simul & purgat, & incur-
 nat, ac cicatrice includit.

De cicatricibus et albuginibus.

Cicatricibus Quae in superficie in oculis sunt cicatrices, quidam hoc ipso nomine so-
Albugines lum cicatrices, quidam Nabeculas uocant. Quae uero in profundo con-
Nabeculae stant, albugines. Plurima modelae sunt ea quae afflicta detergent. Nabeculas
 itaq̃ anemones succus diluget, & panis centaury succus cum melle. Diu-
 erimones autem cedris amittat, & res solum aqua trium uelut collyrium,
 & collyria extensoria, quale est aliquod ex cornu fit, & quod Rinaron ap-
 pellatur,

Apellana, & Hecatombe, & similia. Albugines uero nitrum cum oleo ueteri nitum diligenter, ac illam, probe extēnt. Et sepius testa usta, & cum melle trita. Ex collyrijs autem hoc probe & leniter extergit. Mamera, ammoniac, *Mamera* & thymianum, myrrha troglodytica, stercoris crocodili, singulorum aqua rosales partes. Fac collyrium & utere. Aut crocodili terrestria stercus aqua tritam, ac in collyria reda sumilline. Bene autē siccetis, si salem Cappadociensi aqua dissolueris, & cū hac aqua collyria ad albugines cōmoda instilla uena.

Quatuor instillare.

Galla, acacia, singulorum drach. iiii. stramenti futorij drach. ii. utere. Collyrium uero hoc. Florum mali punici, id est cythoracum, atramenti futorij, acacia, gummi, singulorum drach. iiii. sibi, gallae, singulorum drach. ii. tere est aqua. Si flores mali punici non adlāt, membrano sum illud quod inus inter grana in malo punico cū admisce.

De pterygia.

Pterygium, unguis à quibusdam uocatus, nerosa est tunica agnatae & *Vapula* *Pterygia* minime, enascens quidem ab angulo, progrediens autem ad coram usq. Vbi uero nimiam aucta fuerit, etiam pupillam tegit. Magna igitur & diuturna pterygia per solam chirargiam excinduntur. Recensiora uero & moderate magnitudine, etiam exteriora auxilia consumunt, qualia sunt quae ad aspretudines ac albugines adhibentur. Ex simplicibus igitur sunt res usitae, aut atramenti futorij cū felle porcino probe haere facite. Efficacius autē hoc est. Atramenti futorij parē i. gummi parē dimidium. Vino trita illinimas, aut etiam collyria formamus. Quidam etiam fel capri cū melle mixtū instillat.

Ad pterygia, et pupillam ualida, et breuiter usitata, Corbis.

Lapidis magnetis, aeruginis rase, linopidis, ammoniaci thymianatis singulorum drachmas iiii. croci drachmas ii. mellis Arctici cochlearij dimidium. facit & ad albugines.

De carbunculato et carbunculo.

Carcinoma est affectio tunicae, unisiformis, quae dolorem habet, dissensio *Carcinoma* nem, ruborem tunicarum, dolorem puncturum usq. ad tempora, & magis si concitilli fuerint. Cibum etiam non appetant, & acerbis exacerbantur. Et est haec affectio incurabilis, & tamen lenire affectus oportet lactis pota, & frumenta cocta ac uisita boni succi edulionum exhibitione, citra omne acrimoniam; & collyrium teneriori infusione, uelut est ipodiatum. Scuerianum, & similia, prauidendum quoque est ut bonam sit totius corporis temperamentum. Carbunculato uero etiam ipsa malignum ac crustosum ulcus

Carbunculo *lato*

est, aliquando in bulbo, aliquando in palpebra, quemadmodum & in dissimulata corporis partibus consistens. In bulbi igitur carbunculacionibus, ab initio per clysterem circuecare oportet primum, deinde per lac coctum moderate purgare. Postea fomento per spongiam adhibito, strinam eni aut tritici in aqua mulla coctam imponere, & aliquando etiam iridem tritam addere & oculum lacte eluere. Si uero proferpentalcera, lenticulam cum melle imponere, aut cū malis cydonijs coctis. Si uero amplius de pascendo proferpant, oleosilla cocta, aut malicorum coctum in uino, tritum cum melle. At si data nōne proferpant, & crusta elapsa, per dicendi medicamenti impositionem, & parit lacis ulceribus, cataplasma ex uicillis ouorum afficit, cum croco & melle tritis imponere oportet, usq. ad cicatricem inducām. Medicamentum uero hoc est. Spodij drach. iiii. myrrhae non ualde tostae drach. iiii. obolos iiii. Trita in uino amaro donec siccata fuerint, passum creti est uetus ammiscere, & simul trita liquida pyxide fictili excipe, & instange. Ceterum ad carbunculos in palpebris, malum punicum ac idum totum concisum in aceto coquitur, & haecidum factum ac probe tritum in lintest induro ac untor, bis aut ter permans in die, & semel in nocte.

De Myriaph, et ad pupillam Alutone.

Quum pupilla colore quidem nihil alterata apparet, uerum multo sanior *Myriaph* *h* *1* *quam*

quibus pro naturali modo, & quandoq; usum in totum impedit, quandoq; multum, & quæ medentur ab ipsis omnia minora esse possunt. Mādrasis appellatur affectio. Causa vero eius superflua quidam humor est. Curare igitur ipsum oportet uena in cubiti flexura secta, aut purga non est in manus, dactylum in angulis uenas diuidere. Deinde cucurbitam occipiti affigere, & aqua marina faciem & oculos proluere. Si marina desit, muria aut posca uti. Medicamentis uero ad pustulas conuenientibus utendum est.

Drachmæ sex.

Tabet oculi Tabes affectio est pupillæ, quæ angustior & hebetior ac rugosior fit, & quæ uidetur maiora his apparent. Causa autem est densatio à siccatate magis oborta. Differt tabes à macie in hoc, quod tabes angustiores pupillam facit. Macies autem totam oculum minorem ac humiliorē efficit. Curare hos oportet exercendo, & diligenter fricando, & caput, & faciem, & oculos, & facie aqua proluendo, & caput unguento aliquo calefactorio unguendo. Oculi uero rari faciente & aciore medicamento substantius, quale est subterpess. Ammoniaci drach. i. crocomagmatis drach. i. i. croci drach. ii. aeruginis drach. i. i. i. trita in aqua in collyria efforma ac utre.

De Nyctalop.

Nyctalopon Nyctalopos dicunt, quum interdiu quidem uidere contingit, occidente uero sole obsecutus, & nocte penitus nihil. Curare igitur & hoc oportet exercendo, & de cubiti flexura, & de angulis deinde purgando, aut per clysterem uacuando. deinde pennis per os detrahenda, & theriaca uiscera moruenda. Dandum est ante cibum hyssopum bibendum, aut ruta. Si uero nō cedat, rursum dandum purgatorium ex scammonia ac castoreo. Oculi uero blentur melle despumato, & claudantur, ita ut etiam comprimant ipsos ad coarctandum stilum liquorem. Aurum uero uili partes i. i. salis fossilis partem i. trita cum melle stilito. Aliud. Hepar hircinum assato, & faciem inter assandum collectam illine. ipsum uero hepar edendum prebe. Et dum coquitur ut porum oculis aperitis admittere tubo.

De glaucoma & suffusione. Ex Raso.

Glaucoma Glaucoma & suffusione ueteres utram quandam affectionem esse putant. posteriore autem glaucoma humoris crystallini affectione esse putauerunt, qui pro humiditate ad glaucodinem transmutaretur. Suffusiones uero esse præterfusionem inter tumorem corni formem, & crystallinum huius morem. Nant autem omnia glaucomata incurabilia. Suffusiones autem sanantur, sed non omnes. Curandi igitur sunt qui suffusione tentantur, antea quàm consistat affectio, sanguinis à cubito detractione, & purgatione, & insula per clysterem acrioribus, uelut sunt quæ sunt ex centaurei aut cucurbitarum decocto, & alia solutione frequentiore. Alliganda etiam cucurbitæ ne ipsio cum scarificatione. Oportet etiam aquâ bibere per os nem uictum, & uis cibis tenuantibus progressu temporis conferri & pennis per os detrahentibus uti per aliquot dies. Quibus uero uidentur hec oculis obuectantur, ex uisioso aliquo humore, aut na poribus biliosis, aut aliis, his aurum ex alio medicamentis affundit dabimus, aut etiam per hoc purgamus. Ad oculos uero medicamentis utendum est primum simplicibus, uelut melle, & oleo, cum corniculi succo. Postea etiam compositis, quale & hoc est. Sagapeni drach. ii. succi cyreniaci, ceræ albi, longiorum drach. v. i. tenuius in mellis hians oculo. Nos autem inquit Orisba suus, sub scripto utrimq; succi cuscudum, chamædrys, corynepodis, linguloni paribus portionibus continia. Faciunt etiam collyria, & quæ ex succo lignandi parantur, & proteus, & Thalasseri appellat, & quod sit ex opobalsamo. Sed & quæ ex his præparantur prodelle solent. Et corniculi decocti in principis assatum prodell. & quod ex succo casia, & opobalsamo, & melle, ac oleo, & gummi thus.

De suffusione ac hebetudine.

Obscuratio Obscuratio est perfectum ut plurimum uidendi impedimentum, citra manifestum

A manifestam circa oculum affectionem? Hebetudo uero est obſcuritas uidentis, ab occulta aliqua causa oborta. Curatio cōuenit ei communi ea quæ est ad ſuffuſos relata. priuatum uero, ſanguinis ab angulis euacuato, & huiusmodi nam ad tempora admodum, & infernarū partium inſiſtiones. Temporis progreſſu etiam ſeruatorſus utendum eſt, & omnibus diuiniſionibus, & ſubſtitutionibus, primum quidem ex melle & oleo partibus portionibus. Deinde ſubſcripto cōpoſito. Croci obol. ii. ſellis hyenæ drach. i. piperis communis grana l. xxx. x. y. ſucci ſenſuali drac. x. y. ammoniaci thymiamaris drach. i. ſiccis tritis cū ſucco mellis coſchlearia iiii. adde. præpara, & tera pyxide exopteis uerè. Ante illudonē fouet oculos ſpōgia aqua marina calida imbuta.

De Strabismo.

Infantes ex natiuitate ſtrabones, curantur lanis faciei prætentis, quo in diſcedunt inueniuntur (eſt enim ſtrabismus conuulſoria affectio muſculorum balſum mouentium) & lucerna è directo poſita, & nō ex obliquo allucenre: & ubi ad matrem oculi nutrimus, floceos panicles agglutinare angulis ad tempora oportet, quo ad illos intenti oculos corrigant.

De expreſſis oculorum.

Expreſſuntur aliquando oculi, ut prominentes permanent. Eſt igitur quibus ex ſtrangulatione expreſſi ſunt, uena in cubiti flexura ſecanda eſt. Si uero aliquo alio modo id acciderit, purgatio facienda eſt uicario nigro, aut ſcammonia. At uero expreſſiones oculorum ex doloribus partus, ſæpe quidem purgationes in partibus ſuccedentes ſoluant, quare hæc procurare oportet. Verum in uis poſt uenæ ſectionem, ſi non ſedetur, cucurbitam occipiti affigere, & lanam melle illitam imponere, aut floccū cum aqua, ſuperneq; linetum duplicatum leniter deligare. Conducit his etiam aqua marina frigida faciei affuſa, & intybi ac polygoni ſuccus cū papaueris ſucco illitus. ſicem alia quæ conſtringere ac contrahere poſſunt.

De Confuſione.

Confuſiones ex plaga obortas, uenæ in cubito ſectione, & totam oculum replendo ſanguine recens maſſam turturæ, aut in illius penuria, columbæ, curare oportet. Deinde lanam mollem, oſo cum uino ac roſæ eo conquaſſato imbutam imponere, ac deligare. Poſtea die idem faciendum eſt, & tertia ſemeninam adhibendam, & lac inſiſtendum, & quæ commodant imponenda. deinde ſubſtituenda quæ ad ueteres affectiones pertinent, quæle eſt collyrium chiacum.

De Myopia.

Myopes dicuntur qui ex natiuitate ea quæ propinqua ſunt uident, quæ uero longe diſtanti, cernere non poſſunt. Incurabilis eſt autem hæc affectio, præ uſu ſpiritus debilitati oborta. Ceterum ſenes contrariam habēt his affectionem. Nam quæ propinqua ſunt non uidentes, procul diſtanti cernunt.

Aurium affectiones, ex præteritis de dolore. Cap. XXXIII.

Aurium dolorem ob frigidiſſimam obortū, & ex tempore, & ex prægreſſo uſu, aut etiam ex agnatione, ſi ex lacceſſe aliqua externa cauſa obortus fuerit, edoſſe & ex eo quod dolor in profundo firmatus eſt, citra grauitatem, aut diſtentionem, aut ſeruorem, calefacientibus auxilijs curabi mus, oleum rutaceū calidum, aut nardinum, aut laurini calidum, aut amirracium, aut ſoliaſum, aut ſpēcium, aut comamine cum euphorbio, aut piperis, aut caſtorio: aut congeſſu uocatum ungrentum, aut opoballamum, in auditorium mecum inſiſtentes. Sed & oleum in quo coctum eſt allium aut cepa, inſiſtendum prodeſt. At uero dolor ex calida intemperie, in quo ſeruorem quendam, citra grauitatem aut diſtentionem ſentiunt, contrarijs curandi, albuſque uiriditatem inſiſtens, quemadmodum in oculo, & lac muſliche cum aliquo dolore ſedante collyrio, aut perdicladis ſucci cum modico roſaceo, & ipſum roſaceum, aut acetum ac roſaceum, aut ſolani ſiſſici, aut cortaudi, aut aſphodeli: aut oleū in quo inſiſtina uera, aut aſelli circa

h. j. hydris

Enochianus
terre *causis*

hydris nascentes, incocti sunt aut amygdalinum oleum per se, aut buccinis
nibus uitis in ipso coctis. Hoc naturaliter efficax est. Verum dolorē
ob uiscosos ac crassos humores, & ex capitis, & ex auditus ipsius grauitate,
& pergresso uicini cognoscat. Dissensio uero sola extra grauitatem, flansio,
sum spiritum qui exitum non habet indicat. Utendum igitur est in uisq;
medicamentis oburatione liberantibus ac incidentibus, uelut est aphroni-
trum cum aceto & melle, & scilauillam cum oleo communi aut amygdali-
no, & porri ac cepae succos tepidos cum melle. Aut origanum cum melle
ac laetie muliebri tritum in illa. Ad fortiores uero oburationes, sel capri-
nam cum porri succo in illa. In quibus autem dolor multis & diuturnus,
& auditus grauitas adest, utendum his est, uelut est draconis succus, & an-
& bryonia, & similia. Priusquam uero ob spiritum dolentibus sanosum, cu-
rabitur aqua calida prius lenefacta, & ad aurē appellata maxime pere pro-
dest. Si uero grauitas, & dissensio simul exstet, & dolor pulsatorius fiat, aut
etiam uexer febris, aurem inflammatam esse scito. Et pro omnibus utendū
est uenae sectione, deinde lo meorum sciendam si frequenter cum oleo dulci
calido, per auricularium specillum lana obducimus. In illandus autem est
in meum, & anserinus adeps, & uulpinus: Aut regum medicamentum
conrosaceo, aut cypripio, aut uino. forinsecus imponenda sunt quae miti-
gant ac edere quere possunt. Quod si dolor cogat, his quae moderate sentum
respectu cūm utemur. Non enim exiguum est periculum, quum cerebrum
uicini sit auditorio nervo inflammato. Probe igitur hoc mitigat, opij par-
tem i. castorij partes ii. cum laetie muliebri, aut ovi candido, aut uino dyl-
ci, tepidarum in illa. Sed & croceus pathicus, & Ather, & Phalonis anafidus,
sepe his profuit. Oportet autem si frequenter fomentum adhibere, aut ex o-
leo communi, aut ex aliquo calido ungento, ita ut in hoc ipso lanam ma-
factam auri imponas, & nequaquam quantum eius fieri potest, inflamma-
tas partes contingas. Perseuerante uero dolore, & in pus transiuro, utere
medicamento ex lini seminis succo, in illandus ipsum dissolutum cum rosa-
ceo aut chamemelino. Porro si ex aqua medicata in auditorio meum con-
tenta dolcant, si quidem multa fuerit, per os, aut etiam per stipulam, ipsam
exurgere oportet. Si uero modica, hac exteris per auricularium specillum la-
na obductum, oleum quoddam tenuius partium instillare, aut rosaceum,
aut ovi candidum, aut lac muliebre. Calida uero omnia moderate esse op-
portet quae auribus adhibentur.

Ad uicini cum inflammatione.

Vitruu
inflammati

Lycii & papaneris succo partibus portionibus trita cum melle immittit.
Ad dolorem uicini, ex per, ex auditu grauitate.

Amygdalas depurgatas XX. aphroni drach. i. i. opij drach. i. i. thuris
drach. i. i. croci drach. i. i. galbani drach. i. i. myrrhe drach. i. i. aceto tri-
ta in illandus, si dolor adest, rosaceo dilutari pure fiant, uino mulso aut ace-
to multo si auditus grauitas sit, aceto. Verum recentia ulcera glaucium cu-
rat aceto solutum, & collyria quae ex ipso fiant, & quae ex rosia, & croco, &
myrrha, appellationem habent. Quae uero pure manant extra dolorem, res-
crementum sepi cum aceto sub canaliculo tritum.

Ad sordem ducunt.

Sordem ducunt
inflammati

Nitrum aceto dilutum cum aqua salum de, & deterfione facta, nitrum a-
ceto dilutum cum rosaceo instilla. Aliud ad sordes. Nasserium, & ne-
triparum, caricis exemptis granis excipe, & facta sode collyria in aurē in-
de, & per uicini cutem. Ducit enim sordes multas, & abunde leuat. Facit &
ad canis excrescentias, dolores diuturnos, & ulcerationes aut aloas, duris,
myrrhe, singulorum diachmanum, cassios drachmas quatuor, cum a-
ceto in pastillos effundunt. usque autem tempore, aceto & rosa-
ceo solutos instillat. Item Andronis pastillum, &
Nero, & Nula salicpnam.

Ad ducunt

A

Ad fluxum uicere.

Cedriam melle mixtam illine. Aliud. Misy usum ac tritum infunditur. Cæterum ante eorum quæ infunduntur usum, aures per auricularium clysterem eluuntur posca, aut aceto mulso, aut uino mulso, aut decocto aliquo ex repulsores, uel ut lenticulæ, aut rosarum.

Ad cruentas aures.

Eluio quidem ciliatissimi decocto, infusato autem polygoni succi cum paucissimo aceto. Auriculæ, aut amurcam, aut acaciâ, aut porri succi.

Ad ceram excrescentem.

Nitrum cum aqua calida, unâ cum tris squama, ac sindaracha, æquis portionibus infundito, crusta uero indurata melle repurgato.

Ad ceram excrescentem.

Eluio absinthij, aut centaurei, aut porri decocto ciliatissimo, aut cum capsa, ris foliorum atridij ac fructus succi, aut cedriam, aut urina humanam veterem, aut ueneram albam cum melle, aut calaminthæ succum, aut scam montanæ cum aceto, aut absinthij succo. Oleum autem mentui instillatum ad summum usque emergere ipsos facit. Melius tamen est oleum & acetum. Sed & ad ilabenna auribus animalcula hîdem utere.

De caliditate et frigiditate in aures illis.

Lanam circum specillam obuolutam terebinthina, aut gummi, aut aliquo glutinoso tingito, & sic ipsum extrahito. Si uero non concesserit, olei calidum frequenter mentui instilla. Ex si non exsident, aut relictum fuerit, adhuc alijs modis utere, uelut in chirurgiæ referetur.

De fontibus aurium.

Si in febribus, aut hæc indicationibus sonitus fiat, nihil moliri opus est. Itæ enim plerumque sedantur. Si uero etiam post morbum permansit, fomenso ex absinthij decocto adhibito, acetum ac rosaceum infundito, aut raphani suc cum cum rosaceo, aut urtati nigri cum aceto. Verû ad diuturnos sonitus, ob crassos ac viscosos humores obortos: cognosces aut hoc ex eo quod non ueruatim, sed particulatim consistant aceto & nitro ac melle colluto. Aliud. Veratri nigri drach. ii. castorei drach. ii. croci drach. iii. nitri drach. xvi. fac pastillos, & aceto tritis utere.

Ad fluxum pituitæ ac bilis.

Euphorbio cum oleo cyprino nîro ac calefacto nitro. In his autem qui ob multam sensus subtilitatem, uapores aut fluxus asseri sentiunt, castorium & cicuta semen, nitrum cum aceto instilla.

De auditus difficultate ac frigiditate.

Quæ ex nativitate, aut etiam post nativitatem quidem, uerum diuturnissimæ & perfectæ surditates consistunt, incurabiles sunt. Quæ uero non perfectæ, diuturnæ tamen, & hæc incurabiles sunt, aut uelementer agere curari possunt. Quæ tamen ob biliosum humorem sursum repente consistit, cum causationibus per medicamenta bilem dacentia non difficulter sanauerit. Quidam uero etiam sibi sponte liberantur ab affectione, hile ipsi subitus egressa. At ob crudos ac crassos humores consistentes surditates, aut auditus grauitas, uenæ sectione curato, aut omnino per hieram purgato, utris etiam pinxitur per os ac nares detrahentibus, & balneis naturalibus, ut aquæ marinæ. Ad mecum uero auditorium instillare conuenit, & ea quæ ad sonitus descripta sunt. Præcipuum uero hæc. Vinû capræ, & fel caprini. Aut fel per se solû instilla. Aut ruy succi cû melle. Aut castorei cû oleo urtino. Aut ocypti medicamenti cû unguento nardino. Aut fel caprini cum galbano. Aut hoc, castorei drach. ii. nitri, ueratri albi, singulorum drach. i.

Ad aurium confluxum.

Hippocrates monet ut nihil ipsi adhibeamus. Quandoquidem uero ob ipsis affectis saepe cogimur, utendum his est. Myrrhæ, aloës, thuris, acacis, singulorum æquales partes, cum aceto uatoni caudido illine. Aut

h 4 paus

Auri cruenti
tuteCera in aures
excrescenteVerminatio
in auresAuribus
lappis

Sordibus aurium

Auribus diffu
sionibus

Surditas

An inuente
tute

panis calidi intemam partē, cum melle in pſa conuſam impone. Aut hoc, bituminis, thuris, aloſe, carniū cochlearum, bulborum Aſiaticorum, ſingulorum æquales partes aceto tritu impone. Si uero inflammatio oboritur, cataplaſma ex ſeſimo impone, aut ex alica cum aceto cocta. Sint autem leuia cataplaſmata, & cura deligationem: aut leuiter deligantur. Et lana oleo imbuta mentui auris indantur.

De parotidibus.

Parotida Parotis affectio eſt glandulaſci circa aures, quæ ſit dam iudicatorio modo in febribus, materia quidam de capite, ab impactis in ipſo humoribus, quandoq; de reliquo corpore expellitur. Si quidem igitur adhuc in profundi hærere parotis, non in molem attollitur, aduſabimus naſiſi attractoribus auxilia adhibentes, aut etiam cucurbitam apponentes, aut frequentibus ſomentibus utentes. Nam ſi in profundum regerit materia, periculum nō uulgare ſequetur. Si uero inflammata in tumorem attollitur, uigile uerſa mitigare ac conſequere poterimus utemur cataplaſmatibus, quale eſt quod ex ſarirna ordeacea, aut triticea, aut ſeminis lini, cum aqua muſſa, aut lacni præco, aut althææ, aut chamæmelis decoctio coquitur. Itemq; quod ex ramice & æxungia non falſa paratur. Si uero etiam ſanguis tibi redundare uideatur, cucurbita ipſum uenæ ſectio, uſitatis præſentis permittentibus. Vbi uero tumor non diſcutitur, ſuppurationis medicamentum utendum eſt: quale eſt triticea ſarina, cum caricarum decoctio ac oleo. Itemq; ex polline conſians, & quod ex fermento paratur medicamentum. Tranſmutato autem abſceſſu, aut per ſectiōem pus excernimus, aut acri medicamento rumpimus: quale eſt quod ſmilum appellatur, & quod ex allipe paratur. Ceterum meliores parotidas etiam ſomentum ex maria diſcutit, & ex apyrano medicamentum. Hoc etiam tranſmutatum iam pus diſcutit, ad hoc dolores maxillæ ſedat. Verum ad inueteratas parotidas, huc humorū aut purpurarū niſtarum cinerem, cum melle aut æxungia imponemus. Aut hinc aqua marina coctas. Aut marubium cum ſale. Induratas autem iam molliſ emplatrum Maſſaræ, & Aniobarzanſum. Optimum eſt & quod ex ſucco ſeminis lini parat. Ante hæc uero, cataplaſmata ex ammoniaco imponenda ſunt, ammiſta pice liquida, aut adipe tantino, aut helio, aut ſityrac, aut medulla cœruſina.

De acrium acorſionis affectionibus. Cap. XXXIII.

De acrium acorſionis affectionibus. Olfacendi facultate læſa, ſi quidem uox illæſa conſeruetur, anteriorum cerebri uentriculoſi affectionem eſſe ſuſpicandum eſt, qui aut ob naturam intemperiem læſi ſunt, aut ob uitioſorum humorum copiam. Si uero etiam uox ſimililæſa fuerit, laborioſior quodammodo facta, propter olium coliformiam obturationem, affectionem factam eſſe ſuſpicare, atq; hoc eorum ſus a uitioſis quibuſdam humoribus. Vbi igitur cerebri intemperiem per ſepe relata compereris, contrarijs auxilijs utere. Humores autem per detrahentia pituitam per os euacua, & per ea quæ ſoniter euacuant naribus indita. Et odoramenta adhibe remota partium, quemadmodum in deſcriptionibus. Si uero plenitudinē totius corporis deprehenderis, hanc prius euacua, aut per uenæ ſectiōem utere, aut per purgationē per hærſam. Aſpice etiam in polypode & Ozæma utere. Deinde etiam localia auxilia adhibe. Et theſſiæ ſape pota magnifice profuit. Et autem polypus tumor præter naturam in naribus obortus, eſſentia ſua ſimilis polypſi carni. Huiusdem eſſentiae eſt etiam caruſitas in naribus præter naturā producta. At ozæma ulcus eſt putrediniuſum, ex acrimia humorum inſitæ proueniens.

Ad polypum et caruſitatem.

Cantharide aqua Squamæ aris drach. VII. atramenti ſutorij drach. VI. ſandarachę drach. III. ierami nugu drach. II. Inſuſſa acutere ut optimo. Nam in tredecim diebus utilitatem ſuam manifeſte declarat. Facit & atramentū ſutorij cum aceto. Aliud. Maſticeij drach. X. atramenti ſutorij drach. X. chalcitidis drach. VIII. ſellis tauini, anomi, myſthæ, calamitiliæ, marubij ſingulorum

A loci drach. IIII. croci drach. II. uerani albi drach. IIII. uere secco. Aliud. Diphryge trino nates contingit, & linamento ex ellychnijs nates distende.

Ad Orem.

Misyos, chalcitidis, myrrhe, singulorum drach. VII. stramenti sutorij drach. VI. alumini scissi, gallie, squame aris, singulorum drach. IIII. alumi nis rotundi drach. II. thuris drach. I. aceti fectar. I. coquito hoc totum in aq. reo uale, & mellis spissitudine in linamento utere. Aliud. Aeruginem, & squamam aris, æquis portionibus sicca a diabeto.

Ad uerum quatuordecim.

Myrrhe, acacie, amomi, singulorum drach. I. melle cocto excepta, ad summum narium interseptum agglutinari iubeto. Aliud. Amomi, myrrhe, rosarum siccarum, singulorum æquales partes ungetio nardino exce,

Naribus pro
uolentia

Ad uerum alia.

Cerise lib. I. spumæ argenti quadrantem, recrementi plumbi quadran,

tem, aut plumbi grani. Sinz autem omnia lota. Excipe uino & oleo myrteo.

Ad uerum de oleo appellata.

Spumæ argenti drach. IIII. nitre recentis drach. IIII. alumini scissi drach. II. cinas duas, oleo myrteo & aceto excipe.

Uerum de oleo

firmatioris.

Veratrum album, cistitium, piper, herba saharia, cyclaminus, euphor,

firmatioris

bium, aurum, cumini, herba firmatioris uocata, singula per se, aut simul omnia. Non autem infusillare oportet, sed penna aut digito penitissime mari

bus indare. Si uero siemulatio redundet ex medicamento, sedare oportet infuso nardino, aut rosaceo, aut oleo dulci. Offactu uero sedant & erositatio

nem, anisum, ocymi fessura teste. per omnia autem succindum est caput

iniegmati ex nitro & pumice: aut etiam appellato Asculapio utendū est,

& supone Constantini, & sale Cappadocico, & similibus.

De sanguine ex naribus erupione.

De sanguinis ex naribus in febribus erupitione, dictum est libro secundo

Sanguine ex
naribus erup
pro

in illarum tractatione. Verum de ea quæ aliter quomodoque sit, & simpli

citer agere supprimi potest, nunc dicunt. Chalcinidem tritam linamento ex

ellychnijs, aut priapi forma, aqua modestacio excipe, ac naribus inde. Aut

oui testam usam, & gallie dimidium ipsi ammicæ. Aut hycio Indico eodem

uge. Aut stercore aluini usi cinerem infusilla. Aut expressum de aluino ster

core succum infusilla. Aut lapidis moluris usi & aceto extincti usi portem ol

faciat. Aut etiam mæstus obducere hoc utere. Manna thuris partem I. a

lois partem dimidiā, candido oui excipe, & per linamentum ex ellychnijs

utere, fontifecus leporis pilis ad silitonem appositis. Aur lysimachium ap

pellatum in nasum indito. Aut cucurbitam leuem, magnam, & per fucuetan

lysimachii

Rugis drac
da la
11.111

Ad fac

Ad faciei nigredinem.

Nigredinis faciei Iridia, pilinae, fabae frefae, singulorum sesquiquartarium. Salis ammoniaci, ei, comiti cernui uili, ammoniaci thymiamatis, singulorum sextantem. A, qua dissoluta in passillos efforma, & resas aqua tritos, ante balneum illine. Aliud. Prilinae, erui, thuris, fabae frefae, iridis illyricae, aphronitri, colli, singulorum ex ceteris quartam partem. amygdalas amaras x x. efformato cum candido ouorum & lacte aluino, & utere uelut asceca dictum est. Facit etiam passillus pepomantis.

*Peponantis**passillus**thuris**colli**Leuigatus**Ad maculae faciei, et lentiginis.*

Terrae cinolice tostae facie hemina dimidia ō, aphronitri tosti drach. viii. farinae erui drach. iiii. ramentorum fellis taurini drach. viii. trita affricato. Aliud. Fecis uini drach. x. farinae erui drach. x. fabae frefae drach. x. ueratri albi drach. v. aphronitri drach. x. akryonij drach. x. tritis cōlricato.

*Ad supellata.**supellata*

Postquam ab initio quidem faciei graeci decocti, posica uero etiam meliloci decocti sumentium adhibueris. collirium Nili ex rolis aqua diffusum illine. Deinde collirium ex myrrha. Si uero nihil efficiant haec, collirium ex sandice usum illine. Aut hyssopum cum aqua impone. Aut hyssopo in lin, teolum illigato, & calida aqua instilo, sumentium adhibeto. Aut cum acris mura senero. Et raphani corticem cum melle tritum imposito. Hoc etiam ad diuturno facie. Ceterum ad supellatae et leuodines inueteratas, tordyli partes ii. terrae familie parte i. cum melle impone animaduertens ne exulcerentur. Aliud desiccatorium. Hyssopi, diapliae, callig, singulorum drachmas duas, cere drachmas duas, terebinthinae drachmam unam. Impone cauens ne exulcerentur, & propterea assiduè tollens.

Ad Verru.

Vari parui ac duri sunt circa faciem tumores, eos aceto maulo illinito ac confricato. Aut spumam argenti cum terebinthina, & modico oleo albo tritam, illane affricando. Auratum scissile cum terebinthina. Aut amygdalas amaras aceto tritis affricato. Ad callosos uaros hoc facit. Saponis gallici drach. quatuor. thuris, ammoniaci thymiamatis, singulorum drach. i. Aqua diffusa illine, & post horam ablue.

Ad uerru, pilos, et affricandis faciei.

Cerae drach. x. cerebini drach. i. uisgi drach. ii. oleo affuso eliqua, to, & hoc faciem conficato. Radie itus eodem tollit. Aliud. Papauer mirum, aut pulegium cum sale & aceto imposito.

*Crustae faciei et faciei ruborem, et lentiginem.**Crustae faciei*

Croc, radice erythrodani, succi, thuris, myrrae, singulorum drachmas ii. excipe adipe uululino & oleo masticino. Deinde illinito, & tempore interposito spongia calida imbuta detergito. Conueniant autem haec ad faciem in medicamenta etiam reliquo corpori.

*De oris affectionibus, et primum de dentibus. Cap. xxvi.**Oris aff-**tionis**Dentibus dolent*

Dentibus dolentibus circa gingivarum inflammationem, aliquando in ipso proprio dentis corpore, aliquando in nervo qui ad ipsos deferunt, dolorem esse coniungit. Vehementissimus igitur opus est medicamentis, & propterea plerumque ipsorum ex a ceto acerrimo preparantur. Verum gingiuis ob ipsam inflammationem dolentibus, optimum medicamentum est oleum leuiscinum temperatum ore detentum. Sit autem recens. Nam uetussum maximo deterius est recens, quisto uelut antea ellit. Seruetur aut & hic cōmunis ratio, quod praecuratum est esse oportet humorē in toto corpore redundantē.

*Ad dentium inflammationem.**Dentium in-**flammatio*

Qua colligat a ceto in quo cocta singula, aut halicacabi radix, aut hyoscymni semen, aut folia, aut pulegium, aut folia iue cas, aut caparis radix, aut myrti folia, aut posium, aut eius uicinis syluclitri radix, aut rursus folia cum aceto maulo, aut cortex cernui, aut etiam acetum scissile cum.

cum

A cum hyssopo. In cōtrosum uero dentem, styracem cum oplo indito. Aut galbanum, aut sulphur uisum cum lycio. Aut hyoscyami seminis cocti uaporem admittat per infundibulum. Sed & Philonis antidotus denti oblata dolorem eximit. Si uero fluxione infellentur dentes, myrti, & lenassici, & galleg decoctum colluant, aut rhois Syriaci, & balaustiorum, & mallicosij. Insuper gito autem salis partes ii. aluminis uisti & aceto extinxi ac triti partem i. Deinde uino colluant. Cruentis uero gingiuis alomente nne tritum in sperge. Aut aloem cum uino colluant, aut ubi radicem uino terrefactam, aut rhoen Syriacum. Cruentis autem & fluore uexatis gingiuis, thumi sal fumentum in olla exurto, ut in carbones redigatur, & cinere consingito. Si sit autem commotus dentes aloē inperla, aut chus Syriacus, aut alumen scissile, aut galla, aut rubi radix, aut per se, aut cū uino cocta. Aliud. Nucis uiridis cortice terito, & in liquorem ab iplo expressum, myrrham Minnaram, & alumen scissile iungito, & simul uncto. Vñ uero eximente infundit, & ad gingiuas immittit, ad dentes dolentis partem, & sanabitur. Aliud. Allium, & piper, & staphidem syluestrem trita, linteis excipe, & in paruos globulos efforma, ac sepe permuta. Hoc humorem in capite purgat, & dentes curat. Aliud. Ad dentes mobiles, & gingiuas fluidas, & ad omnen nomen in ore prosperendo depascentem. Chalcidius iostig drach. xii. cadmiz drach. viii. ut ere sicco cum aceto.

Ad dentem curat dolorem tollit radice.

Fasinam cum thymali succo inposito, & super eñ hedere folium addito, & ad horam linito. Sua sponte enim coneretur.

Dentifricum etiam ad parulis.

Dentifricum

Aluminis plinthisidis trientem, salis ammoniaci trientem, myrrhæ, costi, pyrethri, singulorum drach. iiii. piperis grana lxxx. Aliud. Sulphuris niui, piperis, aluminis scissilis, singulorum æquales partes.

Ad parulis, et Epulis.

Parulis est inflammatio circa partem aliquam gingiutarum, quæ non sola suppuratur. Suppurata uero scalpello uenæ sectione diuisa, linamento disparatur. Epulis autem est carnis excrecentia ab inflammatione, circa initium dentem motarem, aliquando cum febre & dolore. Opus igitur habet compressionem. Quare utendum est ærugine rasa per se, aut cum pari galla. Aut fori combusto, aut omni alumine uiso, aut galla per se, aut squama aris cum aceto trita ad sufficientes dies, ac reficere.

Dentifricum.

Parulis Epulis

Antholochitæ radix uisa, cornu cerui uisū, cum modica mastiche. Aliud. Sal albus melle subactus, & huiusmodi inuolutus ac uiso, donec ad carbones redigatur. Aliud. Buccina sale impleta ac uiso. Cochleæ terrestres uisæ cum melle. Lance succidit uisæ cum modico sale. His singulis grati odoris gratia ammiscetur, tunc odorati rotundi flos, aut nardi spica, aut folium malabathri, aut cyperus, aut iris. Aliud, quod dentes dealbat, & gingiuas ad stringit, & in eundem odorem inducit. Pamiæis, salis rossi, iris, singulorum drach. iiii. cyperi drac. v. spicæ nardi drach. i. piperis drac. vi. melle utere.

Ad dentium stuporem.

Ad dentium stuporem facit portulaca cōmansa, aut oleum crudū affricit, aut amara in arceo uase ad mellis compagem cocta, & in ueterata mista.

Dentium stupor

Ad dentium durtum.

Dentibus detritis commodant, baccharum lauri, aluminis scissi, antholochitæ clemastridæ, singulorum æquales partes.

Ad gingiuas corrosas.

Floris rosarum drach. viii. gallarum drach. iiii. myrrhæ drach. ii. Ceterum erosas & fluidas gingiuas sanant si colluantur hinc. Lac alinum, liquorum oleæ decoctum, aceti scissilicū, succa uero si admoueat uisæ rubigo ferri, mali punici flores. Ad tumidas uero & carnis excrecentes facit portulaca

lacini

lacc succus ore detentus, olinarum columbadam muria, oleum crudum calidum, aut lentiscinum, aut melinum, amurca. Sicca uero, ferrugo, aut zrago, aristolochiae radix, planaginis semen, diphryges, atramentum suarium testum, mali punice flores.

Ad labia rupta.

Labia rupta Amurcae etiam illine. Aut hoc. Adipe anferi, cum melle & terebinthina, et qualibus portionebus, floris rosarum, orisypi, rosacei, singulorum parti.

Ad rotundas appellatur.

Ranunculus Ranunculus tumor est inflammatus, sub lingua consistens, maxime in pueris. Conficito itaque locum ex misyos, & aeruginis rase aequalis partibus liccis. Ad menium uero utendum est emplastris, anthero, aut ipharrio, aut parhygro ex oculis. Verum in adultis uenit sub lingua prius secerit. Aliud. Facit & ad feruida ora uleera. Aeruginis rase, gallie, chalcitidis, singulorum aequales partes. Hoc cum pullo etiam colligi potest. Aliud. Farina crui cum uelle ubi prius deficiueris, gallam nitum cum melle illine. Aut rosarii flores similiter. Aut olei foliorum decoctum colluunt.

Ad tonsillarem inflammationem.

Tonsilla in inflammatione Si quidem in febre influmata sit tonsilla, & columella, gargarismi conueniant ex decocto surfurum, aut rosarum, aut palmarum, aut myxarum, aut lenticulae. Remittente uero inflammatione, aut decrecente, mel ad ipsa decocta ammiscendum est, quod in principijs facere non oportet, neque in augmentis, ut ne acrimonia sua fluxionem aliquam astrahat. Si uero suppurata compantur, aqua multa per se gargasileur, aut cum lentium aut rosarum decocto, ita ut in his pericuerimus usque ad perfectam solutionem, aut etiam stomacum collationem exhibeamus gargarisandam. At si pessifera ulcera in tonsillis fiant, utendum quidem est etiam praescriptis. priuatum uero exhibendum est medicamentum ex moris, cum aqua calida. Aut aqua multa habens florem rosarum iniperium, aut colium, aurthodem, et quare licca, aut incocta. Aut glaucij foliorum liccorum decoctum. Est quidem hoc amari. Verum optime facit, si faciem quemadmodum in collyria utimur, ita aqua multa solueris. Ipsas aut frustis usus optimus est si siccas insusilleris, aut cum digito admoveas per. Conandum uero est ut eminus non adhibeamus manum, aut ualde leniter obtingamus. prodest & pastillus Andromedus. Ceterum post institutiones ab his factas, gargarisandum est glycyrrhizae decocto, aut gargarismus dandus, qui paratur ex uino scybelico, & croco, & mastiche chio, & myrrha deinde etiam ex amylo & ragaechia. Postquam autem nome depressa sedata est, gargarismo ex lacte ac terra sancta utendum est. Aliud ad anastasia. Malum puniceum dulce una cum potamine cotundito ac exprimito, & succi partes sex ad unam mellis ammisceris, & ad mellis spissitudinem coquito, ac illinito. Aliud. Gallie omphacis sextantem, aluminis scilli unc. 1. salis ammoniaci tosti unc. 1. sicca admodum ueto. Aliud. Gallie drach. 7. misyos drach. 11. salis tosti drach. 7. uteris sicco. Est autem Amias tumor durus tonsillarum.

De Columella.

Columella in inflammatione Columella influmata utendum est gargarismis ipsidem quibus ad tonsillarum inflammationem, & moderate adstringentibus, qualis est malum puniceum succus per cochlearium, aut per instrumentum unum leuande. commodum subiectus, & per se, & cum melle satis cocto. Aut radice dulci ad mali puniceum succum ammixta. Facit & radice dulcis succus cum melle. Reprimunt autem & lapis hermoleus, & phrygius ustus, & Ageraeus, & medicamentum ex lapide phrygio ad pudenda descriptum, & terra samia, & cretina, & lino pis, & lemnia, & omphaciam per se, & cum aliquo ex relatis, & ipsius Aegyptiae fructus, & alumen scillum. Verum rosarum semen, & folia, mitiores efficaciam habent. Adhuc autem mitius est gummii, & tragacantha, & sarcocolla, & amylium quibus utendum est ubi magis compressa fuerit, dum

ab ad-

A ab adstringentibus conftringitur. Atq[ue] aequalem crassitudinē habet, quam sanē columella vocant, gargarismis sciendū est his qui ex myrrha, & croco, ac cypero parantur. Virande uero cōdones, & illusiones per pinnam potius fiant. Compositum facit hoc. Rhois syriaci drach. viii. croci drach. iiii. colli drach. viii. seminis rosarū drach. iiii. facit & ad gingiuas. Porro filum sanū purpura marina infectū, quod obligatum est collo utpere, & plūm[us] strangulatū, deinde pro amuleto appensum est, misceat quodammodo iunct tonillas, & colli affectiones, uelut Galenus testatur.

*Coll. quod aipe-
ram strangula-
uit*

Ad strangul. ex aer. crispior.

Porti folia cōrasi imponito. Aut spongiam nouam picea cruda tinctam comburito, & trita utitor. Commodē uero ualde sunt etiam collusiones, rosarum siccatū aut uiridū decoctū frigidū, aut pampinorū uitis, aut soliorū lentis, aut rubi, aut maiorū cydoniorū, aut rhois, aut uinaceorū, aut lentū.

*Strangul. ex
aer. crispio*

Dracul. & huc uisus est Rhodan. ab er. & h. qui strangulatur, aut alia

quodammodo, & p[er]ficeretur. Caput XXXVII

Internis faucium musculis inflammari angina fit, quæ synanche appellatur. Externis uero, quæ parasyanche. Eodem modo interni summi gutta-
ris musculi inflammari eam efficiunt quæ cynanche uocatur. Extremi uero eam quæ paracynanche. Consequitur ad omnes recte ceruicis spiratio, & dolor cum spirandi difficultate. In aliquibus etiam febris, ruborq[ue] faciei ac colli, & in quibusdam tumor. Et os apertum habent, & deglutire non possunt. In cynanche hieis quandoq[ue] etiam suffocatio sequitur. Fit etiam in pueris raro tamē talis affectio, colli uerticulus ex elapsu ac discessu afficitur. Verum illorum uelut incurabilium curationem non aggrediemur. Reliquis uero si sitim uocem de cubito secabimus, & non accuratim euacuabimus, sed sepe copia parua. Nam ex acruata euacuatione si in animi deliquit incederint, suffocationis periculum succedit, acruatim confluente materia ad affectum locum. Si uero non sitim lenentur, uenit etiam sub lingua se-

*Angina
Synanche
Parasyanche
Cynanche
Paracynanche*

B candæ sunt, aut etiam ipsa lingua scissanda, si prominenter eum tumor apparcat. Alius quoq[ue] acriori infuso per chyliferum eluctanda est, & pedes aqua calida persundendi, & deligande fortiter extremitates, & colli m-
tegendum lanis succida, aut etiam oleo imbutis, & cataplasma ex cruda ordeacea farina imponenda. Ab initio gargarismis utantur ad tonsillarū inflammationem relata, aut simpliciter medicamentis ex moris, cum rhois decocto, præstat autem ex syluestribus moris esse id medicamentum. postea uero etiam compulso ex moris, aut medicamento ex nucibus iuglandibus illinantur. Vigente uero morbo, etiam muri parum ammiscendum est, aut sulphuris uisui, nisi acrimonia aliqua id prohibeat. Sed & catinū siccus acidum tritum, & cum melle illitum, optimum est medicamentum, & moris me quod album est. Et syluestrium hirundinum cinis codena modo. Si diuturna fiat affectio, & illusione ex brasa, hoc rurs[us] syluestri utendum est: ita ut quandoq[ue] exoluamus, quandoq[ue] intendamus ipsius facultatem, aliorum medicamentorum amixtione. Cucurbitæ quoq[ue] aut hirudines adhibende sunt morbo & collo. Et fortioribus gargarismis utendum, ex iride, hyssopo, melanthio, abrotano, glycyrrhiza, caricis in aqua mulla coctis, aut rurs[us] succo cum lacte, aut sinapi cum aceto mulla. Si uero ex his aliqua acrimonia oboletur, dandum est ipsa oleum optimum calidum, aut rosaceum per se, aut euis p[er]sane succo, aut foenigræci succo gargarissandum. Alimenti si aqua mulla ad remum usq[ue] diem. Post quam p[er]sane succus, cum aliqua ex iunctis portionibus. deinde etiam ouorū uiridiū liquidū. Et ex alica fortioribus utendum est deglutitione directiore eandem, & cibis aptioribus congruis. Declinatione uero apparente, ad demutationem & balneum ducemus. Locos autem ex cerato rutaceo integemus, & reliquos efflorū uictus ductu congruenter utemur. Ex his uero qui strangulantur, ma-

Strangul. catinū

Strangul.

denat. Alij uero reuocantur aceto & pipere infusillato, aut uinice semine in aceto acerrimo trito. Laboriose uero admittunt, quare cogere oportet. dissoluantur autem circa collum ruboribus, statim dissoluantur, & relaxantur. Sicut hinc etiam in nasofragia, & in summa in omnibus qui suffocantur. Resolvatur enim horum calor.

De grandine, et lepra, et de otitis, et de tussis. Caput XXXVIII.

Comune habent hae affectiones hoc, quod superflua humiditas ex capite ad inferiores partes defertur. Et ubi quidem hanc ad nares transit, grauedo appellatur affectio. Vbi uero ad fauces & palatum, simpliciter deffluxio. Si uero ad summum guttur ac asperam delabatur arteriam, ut membra maque hanc intrinsecus ambit exasperetur, raucoia uox fit, & rauco, & arteria affectio appellatur. In quibus non solum ex capite, sed etiam per uolumentem uoluntationem, & frigidi spiritus inspirationis, a spiritus inflammationis conseruietur. Diuturno uero facto morbo, & fluxione ad thoracem ac pulmonis partes delabente, tussis obortantur malignae. Sed & ob intemperiem super tussis fit, quandoque calidam, uelut in febribus, quandoque frigidam, uelut in aquiloneis constitutionibus, quae etiam sicca magis exiit. Quin & aliorum morborum symptoma aliquando fit tussis, uelut pleuritidum, hepaticorum, rabidorum, peripneumonicorum. Calidus igitur in diuturnis tussibus, grandinum quaedam educationem à thorace factam esse narrat. Alexander etiam lapidem quendam grauem, qualis est qui in urinae meatus nascitur, in diuturno tussi educum esse dicit, atque inde quoque tussim sedatam esse. Nos autem in sanguinis reiectione lapidum excretionem uidimus, uelut ubi ad eum locum deuenerimus, exactius referemus. Quis igitur ob ardorem habens grauedinem, aut deffluxum, his caloribus sensus circa partes contingit, & tenuium humorum fluxus per nares, & per os, ruborq; circa faciem & nasum. Qui uero ob frigiditatem, his distentio fit paruum circa caput & frontem, & collisum meatum obturatio, ut uox superius per nares perferre non possit. In diuturniore autem affectione etiam tussis accedit, & pituitae educio, aliquando cruda & liquida, aliquando cum uore pallida. Quibusdam etiam febris accedit, quae quidem ob ardore affectus nihil prodest, ob frigiditatem uero affectus concoctionem efficit.

Curatio lepra, et grandine.

Si quidem igitur calida intemperies predominetur, auxilia continent ea quae competant capiti dolentibus ob eiusmodi causam. Sed & balnea uiuendum est, & calida uberius perfundendum est caput. Cibi uero his conueniant scorbules, & oua sordida, & amygdalae, & dulciana liba, & sesama, & coryzae, & amygdalae, & nuclei piperis nuclei, & quae ex lacte sunt placentia. Ex uinis dulcia, & non utriusque. Ex capitibus papaueris medicamentum delinquo, & composita ad haec auxilia. Si uero frigida fuerit intemperies, & morbus agri solubilis, medicus cibis assumatur, & capitis illitio per calida & tenuium partium ungenta, manducum ac rutaecum. Irinum uero non solum illinendum est, sed etiam naribus instillandum, quae etiam intrinsecus thure, & myrrha cum oleo illinenda sunt, & praesentim in his qui grauedinem ex frigiditate habent. Quibusdam etiam odoramenta per linthei combusta, aut melancholia, aut cumino, combustis & lintheo illigatis profuerunt. Et cyphi sentia cum olfaciant, & frontem illinant, cui etiam unum ex emplastris inflammationem arcensibus applicetur, uelut est lecium, aut Oxerum, aut Narthorum, aut Athenae appellatum. Verum ad deffluxum ob frigiditatem etiam habere cyphi conuenit. Thoraci uero illinendus est balsamifacetus, pipere, & calidus, etiam per lanas facetas cum syraxe, & irino, aut anethino. Cibus etiam calidioribus ac concoquentibus utendum est. Ma-

teria uero iam concocta, etiam apophlegmatibus per os pituitam detrahens ipsa conuenit, & inegmata capitis, uelut

capo Coniunctus, & castillata.

Arteria:

Arteriarum curatio.

Arteriæ uero qui & raucoſi appellantur, conueniunt quidem & reſta, *Arteriæ qui ſunt*
 ta, priuſum uero ubi inflammatoria eſt aſſectio, circa arteriam & ſummam
 ipſius partem, in principio meatus obducenſibus utendum eſt auxilijs, do-
 nec inflammatio moderatio fiat. Talia autem ſunt quæ ex paſſo eretico, &
 tragaantha, & gummi, & amylo parantur, & pinguium palmularũ deco-
 ctum: & radicis dulcis cum ſapa, ad mellis compagem: & hypogloſtidum
 ab eo quod linguz ſubijciantur, appellatum uſus præ omnibus uero à ui-
 ni potu abſtineant hoc tempore. Vbi uero moderatio facta fuerit inflamma-
 tio, minum dulces ſumant, & forbetionibus ex melle & lacte, cum amylo aut
 pane ſiliginaceis, ex amygdalis utantur. & huryrum ſumant. Humiditate
 uero in partibus reſiſta, ad ea quæ magis exurgunt deueniendum eſt,
 uelut cſi faba freſca dicta, & quæ ex melle parantur, & braſſicæ, & porrum
 probe coctum: Medicamenta uero calidiora, & quæ ad ruſſum faciunt, ex ſar-
 pa de caricis coctis, & thure, & iſide, & terebintina, & ſyrace, & galba-
 no, & pîpere, & cinamomo ac calia, & his ſimilibus.

*De iſide.**Sape ex ſar-
pate*

Sed & ruſſes eodem methodo curare oportet, ita ut hoc ſolum reſpiciamus, an etiam ob aliarum partium ſiant conſenſus, uelut gurgulione, aut capite deſtillante: ſi ad alios morbos acciderint, ut etiam horum quanti fieri poſſit prouidentiam habeamus, iuxta reſtatam ac referendum modũ. At compoſitorum auxillorum expoſitio conſequenter ſubiecta eſt.

Capitula ad deſtillandum er iſidem.

Styracis, myrthæ, opij, galbani, ſingulorũ partes partes paſſo excipe, aut per ſcruſa in ſila ad erui magnitudinẽ redige, & tres, aut quatuor, aut quin quæ eruiſmodi pillulas dormitiũ ſuero præbe, & paſſum in ſuper forbeat. Hæc ad acrem & tenent fluxionem faciunt. Aliud. Seminis hyoſcyami drach. XII. nucleorum nucis pineæ drach. VI. croci drach. II. Excipe ſapa aut paſſo, & utere. Eclogema. Mellis unc. i. huryri ſemina cſi, ſimul cocta dato, & hyſſopi, ac ficuſi, & nucleorũ nucis pineæ, & iſidis decoctũ forbeat.

Capitula ad terebinthas.

Styracis drach. VI. myrthæ drach. II. terebintina, galbani, opopana-
 cis, iſidis, ſingulorum drach. II. pîperis albi, niſi, ſeminis hyoſcyami, ſucci
 papæ eruiſi, ſingulorum drach. i. Cura aliquem liquorem in ſila coctus, in
 cucuporia effingito, & uelut dictum eſt utitor.

Ad galbani effectum, & iſidem, & ſtyracem.

Amygdalas amaras deſtillas XXV. ſeminis lini roſti drach. IIII. traga-
 canthæ drach. II. nucis pineæ nucleos XXX. oſi in ſermento obſito aſſati
 utrellum. Tragaantha aqua maceratur. Totum uero paſſo excipitur. Si ue-
 ro etiã ſomas noctis fuerit craſſus, mel propaſſo ammiſce, & maxime in quib-
 ſus educi quid opus eſt.

*Galbani effectum
ritus
ſtyracem
Vnde ſapa
ſtilla**Arteriarum hypogloſtis ſub lingua tenenda.*

Ad uocẽ abſciſſam, raucoſos, & cruſta reſecantes. Tragaanthæ drach.
 VI. gſmi drach. VI. myrthæ drach. i. thuris drach. II. pîperis albi grana XX
 croci drach. i. ſucci radicis dulcis drach. VI. palmularum III. carnem, paſſi
 eretici quantum ſatis eſt. Faci etiam ipſe ſolus tragaantha ſuccus ſub lin-
 guam ſubſitus. Ceterum pro radicis dulcis ſucco, ipſius coctæ decoctum
 ad ſpũſitudinem reductum, quadruplum reſciſitur.

Arteriarum ſines deſſo, conueniens etiam phlegm.

Porri capita VI. ad tertias coquito, & ipſa quidem abſcſito, ad aquam ue-
 ro abſcſ ſuccum ammiſceto, & mel, & oſorum prius coctorum utellos III.
 ſimul coquito, anethi ramulis agitando.

*Phlegm**Ad iſidem.*

Pulegij ſextanem, nucleorum nucis pineæ, ſeminis enici, ſeminis lini,
 ſingulorũ unciam unam. pîperis albi niſentem. Excipe melle cocto. Aliud.
 i. Hyſſopi,

*Hysopi, pulegij, pipæris, singulorum unciam unam, petroselinū unc. 2. mel-
lis licet inam unam.*

Concoctio sic datur et talis.

Mellis drach. xvi. arebinthinæ drach. ii. galbani drach. xiiii. simul cocta ad fabarum magnitudinem, & ad nucis ponticæ magnitudinē effor-
mato, & his succis utantur. Aliud. Tussimficam curant & arteria ea, &
aquæ aliquando sorbitio seructis. Nam ob crassiciem pituitam non edi-
centes, ex humectantibus opem ferunt. Conuenit ipsi etiam hysopi, &
iridis, & nucleorum nucis pinæ decoctum.

Pulvis sic fit ut dicitur ad pleuriam tussim.

Syracis, pipæris, massicis, petroselinū, singulorū unc. i. Mandarachæ sicut
pul. v. l. buri bac. cast. i. melle excepta sufflato prunis iniecia, ut tussis per in-
fundibulum suum inspiret. facit ad quomodo docuimus per refrigeratos.

De ressa utitur sicut dicitur, aliter non, per spirandi difficultatem.

Capitulum XXXIX.

spiratio ressa
ceruicis
subdoli
orthopneæ
spirandi dif-
ficul
Quia citra febrem spiritum densum habent, ne ut hi qui uelociter euan-
rescant, hos à symptomate anhelosos nominant. Eisdem uero ab eo
quod thoracis figuram totam erectam seruans, ob timorem ne suffocentur,
orthopneicos id est ressa ceruicæ spirantes uocant. Fit autem affectio cras-
sis ac uiscosis humoribus, cartilaginosis pulmonis partibus infartis. At spi-
randi difficultas communis symptoma est, & his & alijs pluribus affectioni-
bus accedens. Cæterum anhelationum curationis scopus est, consumere
crassum ac uiscosum humorem, per attenuantia ac extinguentia medicamen-
ta. Acetum igitur ipsa conuenit scilicet, & acetum mullum ex hoc pa-
ratum, potum. Et ipsa scilla affata intra ceteris melle. Et ex antidosis hiera. Et
purgatio assiduæ ex medicamentis fortissimè. Et uocatus ab acceptis rapha-
nis, & anisolechia rotunda pota, centaury magni radix, sphondylii semina
& radix, calamisthæ coma, hysopum, iris, melanthium. Afellorum sub hy-
dris degentium sextarium in sicile uis coniecto, & ad prunas torreto, de-
albatus autem terito, & melle cocto exceptos, myrti mensura ante & post
cibum dato. Si uero necessitas urgeat, etiam uenam ante omnia hanc secar-
to, & pro uiribus euacuato. Alius quoque infusa per chylerem trahitur. Ca-
taplasma uero extrinsecus thoraci imponatur ex ficis, & liliaceis ac horde-
acea farina, resina, cera, & melle adiectis. Insuper gatur ipsi etiam iris & man-
na statim non inutilis est & cruda hoedæacea farina cum resina, cera, iride,
& manna. Vnguentis autem utendum est calidioribus, arno, anethino, ru-
taceo, priuatim uero hoc, pumicis partem i. fecia uini uisæ partes iiii. ane-
nici partem i. floris amei roandi odorati partes ii. aleyoni partem i. aphro-
nici partes ii. uisâ cribrata unguento exopto, & ex hoc partes circa thora-
cem conficere. Sed & malignantis utendum est, quæ terrosos humores tra-
here possunt.

Anethis potant.

Polii, abrotani, cassiæ, chamæpityos, ammoniaci thymiamatis, singu-
lorum æquales portiones melle subactas dato. Alia. Quidam aphroni-
tri cochlearium unum in tribus aquæ mulis cyathis dederunt. Alia. A-
phroni tri drach. ix. pipæris drach. i. liliij drach. 4. Dato cochlearium cum
aquæ calidæ. Alia. Cassiæ, ammoniaci thymiamatis, singulorum drach.
vi. pipæris grana xl. liocape passo, & fabæ magnitudinē præbe cum aqua
mulla. Alia. Sinapis drach. i. spume niri, obolos iii. elaterij diachalcon,
hoc est uboli dimidium. Toti hoc in pillos viii. digere, & duos ad dies
duos præbe, purgant enim firius citra molestiam. Verum in his qui suffo-
cantur aphroni tri drach. iii. cum aquæ mulis cyathis iii. præbe. & aliquan-
do cum cardamomo, & statim auellunt. Facit & ad excedendum morbum.

De peripneumonia. Capitulum XXXX.

Peripneumonia
Peripneumonia inflammatio pulmonis est, plerumque ex defluxibus forti-
bus, aut anginis, aut anhelationibus, aut pleuritide, aut alijs morbis ob-
ortum.

A cciens. Quandoque uero ipsa per se affectionē auspicatur. Sequitur hos spirandi difficultas, febris acuta & ardens, grauitas & tensio pectoris, impenus & perceptio multae repletionis circa faciem, materia salsum uersis impetū faciente instar ignis. Rubicundae igitur ipsae apparent mae, & oculi rament, & euis supercilijs incumbens deoriam natat, & corolliformis tunica subpinguis apparenti uero signa ad maiorem ardorem inclinant, inflammatio enim sacri ignis naturam in pulmone habere putandum est. In his igitur qui ex transmutatione aliorum morborū ad hunc deueniunt, uenae sectio nem reprobare oportet, & praesertim si diuturni fuerint, aut etiam ab initio uenam fecerint. Verum in remissionibus iussum per clysterem in aluum mittatur, quae egregie subdaci potest. Et cucurbitae affigantur ad pectus & ad latera, si nihil prohibeat, atq; haec multae cum scarificatione. Aut si statim ab initio peripneumoniae affectio auspicetur, permittentibus numeris ad hoc requiescat, uena secetur. Sin minus, etiam his saltem cucurbitae affigantur, ita ut pro uiribus sanguinis coactionem faciamus. Sorbitiones autē accipiant ex pessana, aut alicuius succo, cum mellis aut ex amygdalis amaris, cū similibus aut alicuius potione aliqua ammixta, hydromelos, aut si uiciorum cremore cocto, aut hydrosolano. Commodeum est & beryrum recens tritum cochleariorum mensura. Praebant autem sicum cum hyssopo decoctam, aut tritis coctis in aqua mella. Aut uitis trite cochleariorū II. mensuram inspersam aquae melle. Hoc etiam deorsum purgat. Verū ad uisum conseruationem, frequenter potant aquam melleam per se, & cum nucleis nucleis pinis, & cucumeris semine. Verum ad totam thoracē ac costas latera imponere oportet ceratū cyprinum tridem inspersam habēs. Aut ceratū ex oleo rutaceo & tride sicca. Aut id quod ex cera, resina, melle, butyro, calypo, tride sicca, & unguento nardium praeparatur.

De sanguinis spatio. Cap. XXXII

SI quidem ex ruptione uasorum, sanguinis spatum fiat, multas euacuabuntur: & quandoque ex manifesta causa, uelut casu, clamore, ac similibus; quandoque ex obscura, uelut plenitudine, aut immodica frigiditate. Nam frigidum uenarum raptorum esse Hippocrates ait. Si uero ex corrosione, non acruatim, sed paulatim sanguiniseductio fiat, acribus quibusdam ac prauis eductis progressis, aut inedia, aut a cri deluxa. At si ex uasorum apertione, ex relictis nihil, praeterquam plenitudo aliquando praecedat: uerum uicibus humidor ac calidior, & balneorum immoderatus usus, & in ualde calidis locis habitatio, hae causa apparebit: & neq; in inflammationibus, neq; in febribus, neq; in doloribus erunt ita affecti, uelut hi qui ex corrosione. Imo uice uersa lenius ferent, dum ut par est euacuantur. Si uero etiam hemorrhoides, aut multibres purgationes suppressae fuerint, etiam à periculis liberabuntur. Eadem bona cōtingent etiam his qui ob plenitudinē ex ruptione euacuuntur, praeterquam si propter uleus, aut immodicam euacuationē laedantur. Ceterum sanguis ex corrosione euacuatio, nunquam ad bonum conuincit. Et si quidem per uomitus efferatur, manifestum est quod ex locis circa stomachum aut uentrem fertur. In quibus etiam per sedem descendens quandoque euacuatur. Si uero cum tussi, à partibus respiratorijs. Verū si qui dem spumulosus fuerit & subalbidus, & per intervalla efferatur, circa doliq; ac compressionem, ex pulmone ferri indicatur. In quibus progressa temporis etiam febris continua sequetur, & maxime in his quibus ex corrosione: & de pulmonis essentia aliquid, aut cartilaginosa pars, aut uena efferatur. Noui autem aliquem ex his qui sanguinem ex pulmone expuunt, progressa temporis cum maxima tussi, & sanguine copio, quatuor aut quinq; lapides expuisse asperos, uelut tribulos, magnitudine uero siliquarum trisi aut quatuor pondus habentes: & statim quidam allevatus est, paulo post uenit in tabem transiit, & moruus est. Si uero aliquando pituitosaeductio fiat, cum leuote tussi, aut etiam excretionē, & quod efferatur spumulosum fuerit

Spatum sanguinis

Frigidum uenarum raptorum

Lapides cum sanguine

ac leae, ab aspera arteria eductionem esse scito. At si niger fuerit sanguis & grumolus, & doloris significationem circa locum de se praebeat, de rheumatismo indicatur, transumptione per pulmonem aut guttur contingente, quae uero cum excretionem contingit elatio, ex partibus circa faucibus per palatum educitur. Si uero aliquando in capite deflueret, cum irritatione aliqua ac tussi emittitur, defluente ipso ad summum guttur, & arteriae caput, ita ut rursus sursum efferatur. Verum in his plerumque aeris defluxus, aut capitis dolor, aut grauitas praecedat. Contingit etiam aliquando per palatum sanguinis euacuatio, & propter hirsutinem deuorantem, & adhaerentem in aliquo eius loci parte. Sed de hac in tractatione de uenenis dicitur.

Curatio. His qui ob defluxum sanguinem spunt, statim uenam secabimus, si hoc ualde acris fuerit defluxus, & moderate pro uiribus detrahemus. Extraneas partes deligenitur ac confricantur cum oleo ueteri calido aut siccyonido, capite excepto. Cibus datur frumentaceus, cui additus sit succus allicus ex austeris, ueluti mali panici, pomorum, pirorum: aut illa ipsa simul coquantur. Dormire uero uolenti pulillum ex succino dato. Et tertia die mellis coctum parum delingendum dato. Si uero haec superata fuerint, morbo diuturno lecto, raso capiti medicamentum ex siccore syluestrium, columbarum impone, & post tres horas ablato pharmaco, ad balneum ducto, nequaquam illinens caput. Deinde sorbitionibus nutrito, ad somnum thetacen antidotum dato. Et ubi rursus postidie dederis, similiter confricato totam corpus, capite excepto. Huius autem ceratum ex thiapsia imponendum est, aut aliud quoddam. Et rursus sorbitionibus utendum, perseverante malo etiam cucurbitis adhaeretur affigatur. Si uero ualde acris defluxus fuerit, uerum lectio reprobetur. Cibus uero & auxilia antea in capite de defluxu relatis utendum est, & his quae paulo antea relata sunt commodis. At his qui ob frigiditatem sanguinem spunt, thoracem eleuare oportet cum his quae simul hucant. Et medicamentum ex duobus pipere generibus dare, uel cum pulillo ex succino. Sed & qui ex respiratorijs partibus, obruptionem aut apertionem uisoram, sanguinem educunt, his uena secanda est, si non sanguinis copia feratur. Omnes poro decumbere oportet in loca ad aetrem expolitis, in lecto immobili, figura sursum uergente, ita ut uident ne hemerem respirationem, & ne loquantur. Affectis autem locis insistentiae sunt spongiae ex posca repida. Post septimum diem lanx succidit cum rosa cato, aut myrtus, aut lennicio, quandoque cum aereo, quodque cum uino austero. Si uero multa elatio contingat, pollinem & maneam thuris cum aereo imponeamus. Aut alumen, & acaciam, aut malicorium, aut gallam cum aereo, aut palmulas cum posca & malis cydonijs coctas in uino austero. Posca uero etiam emplastrum ex salicibus imponendum est, praesertim si moderata elatio existat, per os uero accepta haec faciunt, portulaca comesta. Liliacior aut succus ipsius est potus, balauitum, rabi fructus, & flos, quercus mellebramosa sub cortice pars, & quae sub putamine glandis est membrana. Maxime uero his coctis utantur sagi autem & illic membranae effractiores sunt sanius alter ad omne sanguinis spumam facit, lennium sigillum, lapis haematites lenissime tritus, cum succo mali panici, aut polygoni. Quantitas autem lapidis sislerup. i. Composui uero haec faciunt. Pulillus ex succino, & qui ex corallio constat, & qui ex Aegyptia spina, item pulillus sicus ex terra aere lennium sigillo, corallio, symphyum & amylo, omnia aequalibus portionibus. Verum in his qui ex corrosione sanguinem spunt, & maxime defluxu praegresso, etiam opij partem dimidiam admiscemus. Sed & si medicamentum quod accipit samij aetheris, lapidis agerathii, lennium sigilli, aequales singulorum partes, commodum est si duorum cochleariorum mentura bibatur in duobus cyathis succi plantaginis. Aliud: scilicet lennium drach. xvi. samij aetheris drach. xviii. amyli drach. xiii. sic cocollae drach. iiii. gummi drach. ii. puluill ex his siccis cochlear. i. cum decocto

A decocti palmularum cyathis duobus datur. Sorbeant etiam poscam frigidam, aut palmularum aut malorum, aut pirorum, aut uitis pampinorū, aut eiusmodi cuiusdam decoctum. Cibum uero accipiant uires urgent, circa secundam aut tertiam horam. Sin minus, circa quartam. Sit autem panis lotus ex aqua frigida, aut alica, siue chondrus, cum aliquo ex succis astringentibus, uelut mali punice, aut myrti baccarum, aut ompha comelide aut oua forfida, aut placentæ ex lacte cum aliquo ex adstringentibus. Ex oleis rhus inrybum, cicchorium, plantaginem sumant, cocta cum oleo crudo & aceto. Ex fructibus, mala, pira, m espila, mala punice, corni fructum. Potus non febrientibus sit uinum aquosum, modicum, febrientibus aliqua ex relictis potuonibus, aut hydromelum cybasticum. Ad eos uero qui sanguinem vomunt, eodem ductu utendum est, solum ut uitemus ne frequenter cibum capiant. facile enim hi curantur, eo quod auxilia que prebibeant, ita tim ipsi pareibus unde sanguis erumpit occurrunt. Porro si sanguis in uentre in grumos coactus fuerit, coagulum bibatur, maxime leporinum, aut lipululum sicculū cum aqua, aut thymus, aut thymbra cum aceto. Aut etiam per hac scillum euacuetur, aut per aloē. At in his qui de palato per scra tionem sanguinem spuant, gargaritiis ex adstringentibus utendum est: & fronti ac capiti adhibenda ea, que his quibus ex naribus erumpit sanguis adhibentur. Atq; hæc est sanguinem spuentium curatio, quam studiole facere oportet, propter instans ex immodica euacuatione periculum. Nam copiosa ei, qui euacuatur, quemadmodū in his quæ maciuntur, breui mortem inducit. Si uero affectio perseveret, transiionem ad tabem minatur. Omnibus igitur secundam rationem peractis, & desinente sanguinis latrone, reficere ipsos oportet, ita ut piscem exhibeamus, & ex iuuentulis sinibus pedes, & cerebellas, & corpus conficemus, ac iubeamus ut uisum aliquid balnearum usum, & uini potum, & iracundiam, ac Venerem.

Cyathis & palmulis
decoctis

Sanguis gra-
uissus in uentre

De suppuratione ex uale. Cap. XXXII.

Suppuratio in uisceribus thoracis partibus, aut circa membranam succin gentem costas consistit, quandoq; ob sanguinis educationem alere ad ei cariem non perducit: in quo etiam tabes statim sequitur, si ex pulmone eductio fiat: quandoq; inflammatione progressa, deinde ad abscessum permutata, ac rupta quemadmodum in pleuritis etiam aliquando contingit. Aut etiam ob coactionem ex capite abortam. Signa igitur suppurationis quæ adhuc colligitur, sunt, grauitas thoracis, & tussis insignis sicca cum dolore, quandoq; etiam cum humiditate, ex qua etiam leuari libi uidentur. Etsi hres ab initio ipsi sunt debiles, & inordinatæ, ac quæ regre iudicantur. Vix uero prope ruptionem est abscessus, uelut in febriant eam quod dum non ure, & in ser loquendum impelluntur dum i spiratione uexantur. Rupto autem abscessu, pus educitur, quandoq; parum, quandoq; feculentum. Et aliquando sursum rumpitur abscessus, quando etiam periculisior est: aliquando etiā deorsum. Et in quibus deorsum rumpitur, partim ad uentrem & inclinam transiunt, partim ad uellicam, transiunt per uia sa quodam ebeingente, februnt autem semper hectica febre, usq; ad repurgationem. Quæ si non diligenter pro curetur, cito in tabem transi suppurationis, pulmone ulceratione sustinente. Quæ tam consistente, & genæ hæscunt, & circa frontem ac collum exudationes sunt, & carnes colliquefctæ, & ungues incuruantur, & pingues, & exalbidi, aut ualde pallidi apparent. Ceterum affectione prædominante, & uenter exturbatur, & præcordium reuelliur. Et siis ipsos diutius tenet, & cibi inappetentia, & quod effertur sursum, ualde graueolens est.

Suppuratio
thoracis
Tabes

Curatio. Oportet igitur primum quidem suppurationis conuersionem adimare, & per spongiarum fomēta, & per cataplasmata ex farina hordeacea, cum caricis coctis, & modica resina, & columbino simo, & nitrac hilibisco. Ad uariaruputionem etiam decubitus ad latus non affectum. Sorbe

Sanguis sig-
nate suppu-
rationem

autem ex intervallis aquam mulsam, & possant succum cum melle. Qui vero robustiores sunt, etiam hyssopi ac thymi decoctū bibant cum melle. Adhibeat item in perionem salamentorum elus, & hiene ex colocynthide cataplasma ad somnum accepta. Vbi vero pus excrevit corpori, rursus dandū est hyssopi decoctum, & iridis ac glycyrrhizae, sunt autē haec cocta in aqua mulsa. Aut glycyrrhizae trita cum felino. Cataplasma sit ex polline, in aqua mulsa & oleo cocto. At si ulceratio agrē repurgetur, compositis utendum est. Ubi est quod ex maribus pariter simplex ac compositis, & quod ex eruo, & dodecatheon, & phloxena appellatum. Verū ad tubum dilapsis, porum capitarum in afflicta aut peliane forbitionibus eliquatū dato. Simb etiam per se bus coctū dandum est. potus sit aqua pluvis, & aqua mulsa ex illa parata. Ab initio vero remissionum, cataplasmata adhibeantur ex lini semine ac polline, cum decocto fœnigraci aut maluae, oleoj ac melle, & folijs altheae. Tempore vero progressu, ad ceram transieundum est ex butyro, & cyprino, & laurino, & iride. Sed & Minalese emplastro utendum est. Thorace vero fluxionibus infestato, emplastrum ex salicibus imponendum est. praebant etiam ansea relata ad suppuratos simplicia, & quaedam ex compositis. Ceterum tussī grauter obvenisse, thymum & hyssopum cum glycyrrhizae succo melle cocto excipe, & efformata sub lingua tenēda praebe. Conueniētissimae etiam Mithridatis Antidotae ex intervallis, & quae ex uiperis parantur. Optimum quoque his auxilium est Armeni bolipotus, & Anadotus. Esdra non minus quem praedicta.

De pleuritide. Caput XXXIII.

Pleuritis **Q**uae proprie pleuritide dicitur, inflammatio est membranae intrinsecus costas succingentis, cui adest ipsiusmodi difficultas, & tussis, & febris continua, & dolor pestingens usque ad claviculam, & praecordij. Discernes autem pleuritidem ab hepatis inflammatione, nam & in illa omnia haec apparent; eo quod in pleuritide punctivus est dolor, & tussis aliquando sine spūtu, quando etiam crudus indicatur morbus, aliquando vero etiam spūtus effertur, quod indicat humorem morbum efficientem. Rubicundum enim & saccharentum educitur, sanguine redundante: flavum vero & cum pallore subviride, bilis quaeammodum rursus album & subspumosum, pituita in acerbissimo vero humore, nigrius, & pulsum durū, & secantis quīpsam modō se habentem habens. At in hepatis inflammatione, neque punctivus est dolor, neque pulsus adeo durus. Sed & tussis semper sicca, & sine spūto est, & facies decoloratio apparet. Quaecumque vero pleuritides propter exteriorum musculorum sunt inflammationē, quae sunt neque proprie sunt pleuritides, in his una cum hoc quod neque tussunt, neque spūtant, neque durum pulsum habent, si quis manus affectum locum contingat, dolent agrosi, & si non fuerit discussus, tumor suppuratus ad hoc devenit, ut foras secus incidatur, quū pleuritis ex membranae costas succingentis inflammatione oborta, ad hoc non deveniat. Illa enim si non fuerit expurgata aut foras, aut intus, in suppurationem, & multo prius in peripneumoniam transit.

Curatio. Si quidem igitur ad claviculam dolor se extendat, vena ipsa secunda est. Si vero ad praecordium, puniendum. Recensiores autem omnia ista venam secūtu, ut sit ut arbitrorurbationem ex purgatione. At viribus non permittentibus, ne curum faciendum est, sed acibus per clysterem in tussis utendum. Et si quidem moderatus fuerit dolor, post insusum danda est ipsa aqua mulsa, & possant, aut aliter succus. Declinante vero affectione, potum ad succos insuscipiant. Aut calaminthen, aut pulegium, aut urticae semen, cum melle delingant. Verum vehementes dolores post evacuationem mitigandi sunt, ana calida, aut sulphurata imposita, aut etiam fomentis ex malis, aut fursibus, in taxulis admodum aut per calidam aquam, aut oleū in oleo calidum, aut quīpsam modō succide imponentur cum oleo, ac vino marinis, & quam ammixtam habere, aut tale ad ipsam interio. Aut cataplasma ex medicis

Tussis graui

Hicque infla
mato diffini
pleuritidePleuritis ad
mLana siculor
rata

dicamento ex feminibus adhibeatur, cum decocto chamæmeli, & alchææ, caricæ, indis & ablinthij, cum modico melle, & oleo rardino. Circa quartum autem diem sorbonibus nutritis, cum paulo melle, post septimæ diæ elegma ex amygdalis & urticæ semine, in melle cōstitis dabimus: & quod ex butyro ac melle simul coctus sit elegma, & hypoglottide ex melle cocto utemur. Epithematis uero, & graueolente, & eo quod ex simpliciho paratur, & rutæo emplastro, ad locos dolentes utemur. Sed & bulbi cum axungia ipsi lini saepe facta fecerunt. Infusumq; ex butyro ac terebinthina ipsi per clysterem immittant. Ex efficacioribus autem elegmatis dabimus id quod ex nucleis piceæ, amygdalis amaris, semine lini, nucleis pineæ nucis, & amylo, singulis æquis portionibus, cum melle paratur. Vigilijs si infestis, nam medicamentum ex capenbus papaueris delingere conueniet. Antidotis item & Athanasia ac alijs ad hoc compolitis utemur. At post decimum quartam diem permanere affectione, cunctis ipsa affligamur, & in uicibus teniore conferuntur. Et postea declinatione facta, ad balneum ducantur, ita ut frigidum inteni, & solidiore ac pleniore uisū utantur. Si uero non discussa succingentis costas membra ante inflammationē, transmutationē ad pus ostenderit, supra relatis utemur.

Ad dolores laterum sine febre.

Lateralis dolores sine febre sanant hellebium, & cossus, ad brassicæ conuallium ascorum cinerem, & adipem ammiatæ. Est enim hoc medicamentum fortis diffusoria facultate præditum.

De cordis affectionibus. Cap. XXXIII.

Cor ipsam pericardii affectione affectum, longe ab eo abest ut medicocessum aditum admittat, etiam mortem inducens, & in inflammationibus ipsius, & in igne sacro, & in temperamento uehementi in acutissimis febribus, & in sanguinis eruptione, ubi uulneratum est circa sinusum maxime uentriculū. At ex consensu affectum, & ex cerebro, & hepate, & ore uentris, missisq; ac timore, & alijs pluribus, animi concisionem, syncope nappellatam inducit, quæ acruata uisum collapsio existit, & exolutionibus ac animi deliquijs, & pulsuum paruitate, & extenuatum paruum perfrigerationibus, & exudationibus cognoscitur. Atq; hæc sanè etiam ipsa uentris non admittit, si fortis existit. Si uero uires adhuc aliquo modo consistunt, aliquando auxilium ferunt. Sed & palpitaciones cordis uehementes saepe sunt, ob sanguinis in ipso copiam aut letuorem. Hoc uero calefactum quiddam, magnam ac densam efficit respirationem, frigefactum uero paruum & rarum. Quomodo igitur cordis syncope in totum corrigere oporteat, in febrium symptomatis libro secundo diximus. Tantum tamen hic addendū est, quid inualecente symptomate, post extremarū partium deficiētes, & uulsionē, & pauimentū purificationes, ac reliquum refrigerantium ad reuocandam uiam ducim, inspergenda est exudantibus corporis partibus myrris trita, aut terra cimolia, aut succinum, aut malicorium cibus thuris manna, aut similia terra cum gummi. Extremitates pariter perfrigeratis usq; ad inguina ac sub alba, cataplasma imponendū est ex linapi, aut pyræthro, aut adarce. Cibum sit sit panis ex aqua, aut ex uino frigido diluto, pedes fusi, arisculi, ac rostra uolucres, omnia frigida. Capiti ac frontillitendum est omphacium, aut aliquid adstringendi uisū habēs cum gummi, aut i osanum decocto. Cataplasma conueni præcordijs & stomacho, ex palustis, rosæ, oranthæ, acacia, hypocistidæ, aluminis.

De palpitacione cordis.

Noti quendam inquit Galenus, qui singulis annis uero tempore, palpitacionis cordis sympēma patiebatur. Et postquam tribus annis expertus esset uenæ sectionem sibi commodam, quarto anno uenam secuit ante quā symptomate comperecerat, & correptus non est, atq; sic consequenter seculi per plures annos, unā cum hoc quod conueniente uisū utebatur. Autamen

& hic

*Cordis priuati
æ affectio des
ignata*

*Syncope quid
sit*

*Palpitaciones
cordis*

*Historia palpi
tacionis cordis*

Et hic mortuus est ante senectutem, quemadmodum & alij omnes, quorum aliqui in febris acutis a ceruicis in synopen collapsi, similiter mortui sunt, aliqui uero ipsorum etiam citra synopen, syderationis modo, strepente uitam cōmutauerunt. Plerique uero ex ira affectis iracundiam agerant inferiorē quidam annis quinquaginta, uerum quadragessimū annum transgressi.

De affectionibus circa mammam.

Cap. XXXV.

*Mammam
afflicti*

Post partum lac saepe uelut in casum concredens, inflammationes circa mammam efficit. Ab initio igitur his utendum est. Spongiam tenerā posca tepida imbutam ac expressam imposito, ac appositē deligato. Aut palmulas cum pane & posca tritas. Aut ouo toto utendum est, cum rosaceo ac modico cerato. Aut alumine & pſyllio, cum coriandro. Aut pomulacē impone. Aut lapidem pyriten cum cerato imposito deligato. Distentione uero aut granulose contingente, panem ex aqua & oleo, aut uino mulso imposito. Aut panem cum perdicidae uridi, unct cum cerato, bis in die. Aut linum fabaceum cum aqua multa, aut sapa. Si uero granulosam nō ferant, irrigatione ex oleo dulci calido utendum per molles lanas. Fomentum autem ipsis adhibeatur ex aquae calidae uapore, aut fœni graeci, aut althaeae, aut seminis lini decoctio. Caraplasma ipsis imponatur ex pollincem lini semine, aut ex fœnograeco cum aqua multa, aut ex sesamo cum melle aut butyro trito. Reprobare utro oportet mammarum existimari, ut quae per fascium amplius ad ipsas attrahit. Declinante inflammatione, cerata adhibeantur haec. Etiam donec flaccescat in oleo coquito, & ipsam quidē abscedo, ad oleum uero ceram cōmoderantem adijcitis ac unctis. Aliud. Ouum crudum uitellos decem, ad ceram ammisceto, quod habeat ceræ sextantem, & unctis dimidiū, & rosaecci trientem, & ad haec cum spatula agitata, munda quantum admittere possunt affunde, & rursus spatula agitata ntere. Ceteri ad mammarū duricias facit emplastrum ex mille, & omnia mollientia medicamenta. Si uero tumor ad abscessum uentur, his quae ad parotidas relata sunt & quae in tractatione de abscessibus referentur, utendum est.

Ad rigentem et crescentem mammam cum malignitate.

Vinum Adri-

Vini Adriaci boni sextar. xx. chole coriarij lib. i. pulularum eupressi lib. i. gallie omphacinae nigrae sexuncem. callis sexuncem. Connusa in uino ad dies decem macerantur. Deinde coquantur, & spatula expressa agitantur, ad dimidiū ferunt per artis consumptionem. Et tunc quidem herbe reiectae uentur. Si uero eas autem ad mellis spissitudinem coquantur, & uale uisero, excipitur. Vtere in ulceribus proscipendo depascensibus mero. Si uero crassius fieri, uino humescent. Accommodatum est medicamentum, utpote cuius usus aduersus nomas in mammis resistere possit, & ad aures pontilentes, & gingivas humenates ac putridas, & dysenterias. Mitigat etiam dolores hae dilutus. Alii porro mammarum ulcerationes communia reliquis ulceribus modo curandae sunt.

Mammae congestio.

Mammae con-
gestio

Cuminum in aqua tritam mammis imposito. deinde spongia ex posca extrinsecus imposita, pectus fascia confringito. post triduum uero ablato cumido, illi bulbos cum melle mammis imposito, & deligatos rursus ad nidum misito. Aup hoc ter in mense facito. Aliud. Cicutam tritam ad dies novē impone, & spongiam uelut dictum est, extrinsecus adhibe, & paucis interpositis diebus idem facito. Quin & coctis Naxiae dum ferrū in ipsa acutur de ieiunio, mammae uirginum consentat.

Ad grauem alorū fœores ac emolliationem.

Cap. XXXVI.

Alorū fœor

Alumina liquida partes ii. myrrhae partē i. uino dissolutis utere. Aliud. Phlegmaginem uisam & uino odorato extinctam, cum uino terito, modica myrrha adiecta, donec strigementia fiat crassitudo, & unctis. Aliud. Spumae argenti drachmas xvi. myrrhae drach. ii. amomi drach. i. uino ex-

cipe.

Acipe Aliud. Aluminis liquidi drach. viii. amomi, myrsinæ, spicæ nardii, singulorum drach. iiii. uino tritis utere.

De afflicto stomacho, præteritis et antea. Cap. XXXVII.

DE ciborum quidem in febribus inappetentia, & de fame magna, ac de causa appetitû. hæc de stomachi debilitate, ac animi deliquio. Et insuper de siti, singula, nausea, ac syncope, in tractatione de febribus lib. i. hinc præcedente sufficienter dictum est, nec tempestiuu est rursus de hisdem sermonem instituire. Ceterum inflammationes oris uentriculi & hepatis, adstringentium ammissionem opus habent. Si enim quis per solum laxaculum ductum caret periculum utor inducet. Oportet igitur siue oleum fuerit id quod affunditur, siue cataplasma, aliquid ex adstringentibus ammiscere, uelut est absinthium, nardium aut melinum uingium, aut malum cydonium incoctum. Ceratum uero quo assidue utor hoc est. Ceræ albe unc. i. æstare uero drach. vii. aloës, mastiche, singulorum drach. i. olei omphaci, aut melini, & nardini, usus tempore quantum satis est ad compagem. Si uero amplius adstrictione opus sit, ut neq. cibos retineant, ammiscetur etiam omphaci drach. i. aut succi absinthii tantundem, & tertii insuper hypocistidis & cenanthes & rhois succus. Cerati uero copiam aurgere oportet, pro reliquorum pharmacorum numeri proportionem. Diuturnam autem iam inflammationem ac indurescentem, magis uaria medicamenta adhibere oportet, quæ & aromata quidam habent, & molliora, ac dilectioria, uelut est quod ex mellisoto paratur, & philagrianum, & odoratum dictum & uiridis lapiditis torques de collo suspensus, ut stomachum contingat, magnifice prodest. At in calidis stomachi intemperamentis, & ardore, cum exolutione aut animi deliquio, aut aliqua ciborum inappetentia, ex qualicumq. causa, excepta febre, frigidam aquam dato cum uix acerbis succo, aut malorum cydoniorum de coctum, aut pampinorum uitis, aut cucumeris semen tritum cum frigida. Stomacho uero imposito uelut cum aqua frigida pleni, aut cucurbitæ ramenta. Sed & catapota sitim exsternia danda sunt, uelut capite deliti dictum est. Refrigeratorium autem & corroboratorium humecti stomachi hoc est. Foliorum rosarum siccatum drach. vii. succi glycyrrhizæ drach. iiii. Excipe uino dulci, & hæc catapota sub lingua tenenda. Verum in his qui ob priuam crassitudinem, calefacientibus ac leuantibus opus habent, commodum hoc est. Corticis radicis fœniculi sextantem, a ceni sextis. Aloës quadrantem, mellis lib. iiii. Radices cum a ceto coctæ expimentur, ac requiescant & mel additum ad compagem coquantur, & tunc aloë trita inspergitur. Dato cochlearia tria cum aqua. Quiddam siue aloë ipsum præparant. Et medicamentum ex calaminta in his commodum est. Quibus autem cibis acerbis, coriandri seminis drach. i. uelut potentiam aquæ inspersam bibendam præbe, aut mastiche cochlearium i. aut lactuce albe seminis cochlearia duo. Compositum uero hoc, pipæris drach. i. seminis anethi drach. iiii. cumini drach. iiii. trita dato cochlearij mensura ad somnum, in uino diluto. At in his qui bilem generant aram, & stomacho inflatis, in aggrissione spongas imposito acerrimo aceto imbutas, post hæc uero si permaneant affectiones, alumen cum are trito melle exceptum imposito. Si hæc autem inibi fuerit. Aut mentam potui insper, glo. Quibus uero stomachus inflatur ac distenditur, his calaminta de coctum ammixto melle, ac modico pipere dato. Verum ad stomachi subueriones, succi nucleorum mali punici acidi partes iiii. succi mentag partem i. coquito ad spissitudinem, & ante cibum, myrsinum i. dato.

Ad stomachi inflammationem.

Acetum scillinum, aut oliuam muria conditam insculum, aut oliuæ frondium decoctum collatur. Aut etiam minimum quid ex ipso deglutatur præ omnibus uero facti aloë aqua diluta. Verum ad eos qui cibum non continent, quos ueteres priuatum stomachicos nominant, fœni graeci farinam, & maluræ

Ventriculi ac hepatis inflammationem adstringentia requirunt

Lapidis uiridis

Cibis in stomacho calidus coactis

Stomacho inflato

Stomachi subuerio

Stomachi subuerio

Stomachi quibus & maluz semen utrum siccum, melle ammixto pro cataplasmate impone. A Ceraum uero facit, ex cera, olei lini lico, & castoreo.

De ciborum inappetentia.

Ciborum inappetentia Ciborum inappetentia est ciborum auersatio, aut intemperie in stomacho existente, aut humorum redundantia. Calidam autem intemperiem cognoscis ex, & siti, & molorolis ac cernosis uelcibus, si coacti aliquid edunt, & ex eo quod frigidiore, & concoctui difficultia, magis concoquere possunt. In gida uero contrarij. Neq; enim sitium, neq; frigida sustinent, & rectum acidum aliquando habent. Qui uero propter humores, cibos auersantur, qui quidem obtruncs ac moedaces hoc patiuntur, stomacho morbum percipiunt, & nauseam magis, & siliunt. Quibus autem computruerint humores, aliquando etiam febriunt. Qui uero ob crassos ac uiscosos humores, morbum & sitim omnino uiam percipiunt, uerum commune lymphoma omnibus est nausea. Verum si in cavitatē uentris fuerint humores, etiam hos ipsos reuocant. Si uero in tunis ipsius intus aut imbuti, nascuntur solum, non ueniunt, praterquam cibos si forte assumperint. Qui igitur ob ealidam intemperiem cibos auersantur, his uisus ex refrigerantibus consistuendus est, & maxime ex his quae parantur cum aceto. Pars igitur ex possea dare his conuenit, & ipsam poscam hibendam, & lac acidu, & apud Romanos Melcam appellatam. Est autem obfusum quoddam ex lacte, & iuryba, & lactucas, & aliquando etiam frigidam aquam, omnia moderate iuxta praesentis intemperiei opposicionem. Nam immoderatus horum usus non solum non prodest, sed etiam iucurabilem sepe facit affectiōnem. Qui uero ob frigiditatem, eos contrarijs sanare conuenit, ita ut uinum uetus hibendum praebemus, & conditum, & hydroparum, & anis ac raze & per mollius decoctum. Erpiper ex aqua calida comunt, aut etiam ipsam ex uerbis piperis generibus medicamentis, aut quod ex calamitha paratur. Dabis etiam thriacem ex uiperis, quae neq; his qui ob humoriū copiam cibos auersantur, incommoda est. Allium uetulus & ut cibis, & ut medicamentum, commodum est. At si ob humorum copiam ciborum fistidiam suas, tenues quidem & mordaces euacuabis, aut per uomitus, aut per infetnam alium. Vomunt igitur lactibus, intemperatam aquam, aut aquam uulsiam aquidamque perhibebunt. Melius autem hanc humectantes cibos dederis, uel ut pusanē succum, aut ouorum uulsiōs. Verum quomodo quia esse uomat, libeo primo dictum est. Si uero ager difficulter uomat, melius est ad infetnam uenire, materiam promouere, uelut uac temperato cibis hos praebum edendo, purgatorium autem medicamentum sit, aut ex aloē amarum appellatum, aut ut quod ex malis cydonijs paratur ac recipit scammonium, aut quod sit ex rhodomelico. Quod si fieri possit ut circa scammomoliam, ex aloē copia magis ipsos euacues, melius feceris, propterea quod scammomolia est stomacho inlesta. At uero crassos ac uiscosos humores ciborum latidum suducentes, aut emulsi ac lico abis per acetū uulsiūm, & quae ex hoc, & muria componantur, uelut est apparis, uisua linapis, & similia. Nec uero in comoda his sunt ea, quae ad eos qui ob frigidam intemperiem cibos auersantur relata sunt, & maxime post euacuatiōnem. Euacuabis autem ipsos per acetum uulsiūm luthandum. In infetnis autē callicere ac corrubere ac stomachū potentiū utendum est unguentis ac malagmaris, quae huiusmodi maxime, & quod ex uita acerba paratur, & thriacem appellatum, & emulsi ac emulsi. Ipsum emulsi uero Batum, & odoratum, & similia. Exercitia etiam ac frictions maxime adhibeantur. Ceterum his qui agere concoctui ac cibos auersantur, propter humorem frigidum ac humidum, aut tales intemperiem, quae ex malis cydonijs paratur conuenient, dico autem quid sit huiusmodi uinum appellatur, & quod ex succo sit malorū, & quod ex cantharis ipsū uinum, & quod ex uitis preparatur. Malagmata uero thriacem, & quod ex uita acerba succo paratur, & Batū, & polyarchion, & quae

A & quæ eiusdem cum his generis sunt. Si uero ulcus est in stomacho aut uentre, ab omnibus abstinendum est acerbis cibis ac potibus, & medicamentis. Vendum autem mitigantibus, uelut sorbitionibus abig oleo, & his quæ ex amylo fiunt, & terra semina, & linnio sigillo, & hoc ac melle pascuissimo, quo ultra mollescitatem perpurgant. Epithema cõuenit ex palmulis, & malis cydonijs ac polenta. Ceraunus ex melino aut rosifero cum ammoniaco, & iure. Et Nilæi epithema, & emplastrum ex salicibus, ac lichenis. Cognoscet autem ulcus, ex eo quod sanguis, aut pus, aut etiam ulceris rectorum nomen refertur.

*Stomachi aut
autoralis*

Ad exolutos ac debiles stomachos, & propterea non coquentes, aut etiam cibum uomentes. Aloës, masuicha, mastiches, styractis, singulorum sexan-
tem, ablinthij septem, ceranthes quadrantem, glucini sexansem, melini
quadrantem, uini quod satis est. Quidam etiam cythreos & rosarum, singu-
lorum sextantem. Trium hęc purpure aut lana excipiuntur, & stomacho im-
ponitur. Quidam etiam ceræ sexansem adulescentes, epithema ex ipso faciunt.

Resolub

Ad uulnerosos stomachi affectiones, hoc est tuchementes ac cõuulsorios dolores, optimum medicamentum est Amazonum polillus. At uetus des-
criptionem, itemq; reliquorum stomachicorum compolitorum maceriam, reperi-
as libro ultimo, in tractatione de cõmpolitis medicamentis.

De uentre inflatione. Cap. XXXVII.

Flatum in uentre generatio, humoribus aut cibis, per tepidam caliditate
in uapores dissolutis, contingit. Nam frigiditas eo quod attenuare ac dis-
soluere non potest, nihil flatum gignit. Vehemens uero caliditas, non at-
tenuans solum, sed etiam discutiens, flatus collectionem impedit. At minor
caliditas, diffundit quidem ac transmutat cibum, uerum defectuosius, atq;
inde est flatum generatio. Conuenit igitur ipsos per calefactionem medica-
mētā attenuare, cumino in oleo cocto, & apio, & spondylis, & diaci semine.
R Si uero frigiditas affectioni adest, ruta, & lauri bacce, & melanthium,
& feniculum, in oleo coquantur, & ammiscetur bitumen, ac oleum lauri-
num. Quod si etiam inflammatio doloribus adit, pro calefactionis uentris la-
xationis, anethum coquens, ac miscens adipem gallinæcum ac aserinum.
Facit etiam ad inflationes, polij fasciculus coctus, aut calaminchæ decoctum,
ammixto modico melle, & piperis drachma una. At per hęc quidē uehemen-
ti dolore terrore adhibenda sunt. In mediocri uero sufficient somones ex mi-
lio. Ceterum cucurbitis bene magna umbilicem complectens, sepe ac ex-
uatim symptoma submouet. Prodest ipsis etiam calorum post ex posca,
& fornicis cum oleo lyconio impolium: & si cum torminibus est inflatio
nes, ipsis sanat. Sed & talis nullus usus & potus, tormina ac inflationes sa-
nat. Aristolochia item sananda. Venti dolor ex ob alui obstructione, aut in-
flatione ob crassiciem, aut ob frigiditatem, uinum meracius potum post ci-
bum sanat. Si uero somnus accedat, etiam perfecte ipsas summouet.

*Ventris
flatus*

*Flatum pa-
ueratio*

Tormina

De cholera. Cap. XXXIX.

Cholera immoderata est uentris ex turbatio, & infernè, & per uentum
contingens, propter assiduum ciborum cruditatem. Fit autem cruditas
quandocq; ob multam ciborum prauitatem, quandocq; ob prauorum humo-
rum redandantiam. Si quidem igitur nauseat, & lancinatur arget, manentibus
adhuc cibis crudis in uentre, aquam tepidam ipsos bibere iubebimus,
ac reuomere, digitis aut pennis immixtis. Adiuuanda est etiam uentris ex-
cercitio. Post superfluatorum euacuationē, quiete & calefactione partium cin-
cipra cordia curandum est, per oleum dulce cum modico uino, aut per ma-
sichinum, aut nardinum, si hyems fuerit: & ut dormiat permittendum est.
post perfectam autē concoctionem, balneis utendum est, & cibus boni fa-
ci. Si uero euacuatio immoderata fiat, sufficit in principio etiam ea quæ
libro secundo de uentris ex turbatione dicta sunt. Perseuerat uero lationis
imprei, & uentre collabente, & pulsi immixto ac denario, cataplasma ad-

*Cholera quæ
fi*

k bibetur

hibeatur ex palmulis, cū cenanthe, & acacia, & hypocisthides succo, ac ma-
 licorio. Detur autē aqua moderate frigida cyathus sorbendus. Melius au-
 tem est si decoctum fuerit rosarum, aut cenanthes, aut rhois, aut pampino-
 rum uitis: aut mali punici acidodalis succus detur, modica menta inper-
 ta. Si uero acriora fuerint quae excernuntur, ardor eq̃ ac sitis ac cedente, cucu-
 meris semen dandum est cum aqua cyathis tribus. In quibq̃ ac lactucas co-
 ctas in posca, in cibo accipit. At si lationis impetus sili non possit, uinum
 aliquod austerum dandum est, non febricitantibus Palmarianum, aut Ami-
 notum, aut spathites, aut omphacomelites. Febricitantibus uero ex malis puni-
 cis, rhoies appellatum, aut myrtilis, aut Cebyraticum hydromelum, & in
 potu, & cum melleis, aut aliter, aut chondro. Si uero frumentacea edulia aue-
 rentur, ex fugacibus fructibus aliquos manducantes, melspila uidelicet, aut
 pira, aut mala cydonia, aut mala punica, id quod carnosum ac durum est
 expuant. Quod si cibum non continent, eucubitam maximam leuem sibi
 macho affigant, & hac incumbente ex aliquo ex relictis nutrantur. Cete-
 rum ad conuulsiones contractions, oleo imbuta linetola calida muscicalla
 circundare oportet, & cerata liquida, quae & castorei, & sicyonij quid ha-
 bent. Ante haec uero, artus calidi aqua perfundantur. Si uero uigilijs uexen-
 tur, ad uigilijs descriptis utantur. Et si uires non prohibeant, medicamen-
 tum quoq̃ ex papaueris capitibus bibendum de iure. Declinatione uero co-
 tingentia, ad balneum perducantur, & refectantur pullis gallinae cae, aut co-
 limbae, aut pedibus suffis, aut similibus. Quin & alui profusum, quod
 ciborum corruptum est, plerumq̃ sua sponte sedatur, si non alantur ipsi usq̃
 ad perfectam concoctionem ac curationem eorum quae corrupta sunt. Si
 uero perseveret, utendum est his quae ad choleram relaxant.

De leuitate intestinorum, q̃ uelut effluunt. Cap. XL.

QUam duplex sit intestinorum leuitas, altera ob superficialitatem intesti-
 norum ulcerationem, quod ut aliqui sentiunt, ob cicatricem ex dysente-
 ria plerumq̃, aut ex alijs inflammationibus obortam. Altera ob siccitatem cibū re-
 tinentem in uentre oblationem secundam differentiam arbitror cum celiaca
 affectione copulandam esse. Nam in hac, debili existente uentre ad con-
 coquendos ac distribuendos cibos, leuita & cruda ac liquida egeruntur, ab-
 quo in omnibus fluxione laborante. Verum in leuitate intestinorū, & transi-
 ens ciborum uelox sit, & cruditas magis intenta est, ut acceptus cibus ma-
 nifestus fiat: & per haec maxime à celiacis discernuntur. Imponendum igit̃
 ut ipsis est linis semē cum palmulis. Egregie facit etiam lenacū & rubus,
 si in aceto mullis coquantur. Si uero etiam inflatio adest, cuminum & ane-
 thum, & ruta ammiscantur. Aegrescente autem fluxione, addeimus etiam
 mala cydonia, alumen liquidum, acaciam, hypocisthidem, gallam, aut quae-
 dam ex his, aut omnia. Cetera faciunt ex oleo myrteo, cum aliquo uino ad-
 stringente. Epithemata autem calidiora, & quod ex haecis lauri parantur, &
 quod ex semibus. Magis autē adstringit, & quod ex cenanthe sit, & quod
 ex uinaceis, & Anrylo inscriptum. Sed & id quod Erythron inferbitur mi-
 rifice facit. Diuturno uero euadente morbo, etiam dropsa ad uentrū uten-
 dum est, & cerato ex sinapi, & ipso sinapi. In potiones coarctantur, simpli-
 cia quidem, plantaginis semen, runcis semē, malicorium, sorba sicca, uita
 amara acerbis sicca trium obolorum pondere, febre caentibus cum uini
 austeri cyath. vi. febricitantibus cum aqua plantali. Minus autem stomachū
 offendiit uentriculus gallinarum siccus potui inspersus. Sed & utinam cieme-
 ta, apium, adiantum, & similia si bibantur, fluxionem transferunt. Ex com-
 pelis autem est sigillum polydri, & pallidus ex succino, & ex spina Ae-
 gyptia, & Clidion appellatum, & ex seminibus constans. Sed & hoc opti-
 mum est. Seminis runcis syluestris unc. i. seminis plantaginis unc. i. suc-
 ci hypocisthidis drach. vi. gummi aut acetici drach. i. i. Excipe malorū cy-
 doniorum decocto ad tertias redacto. Aliud. Cumini, pipere, rhois sy-
 ricac

A rīace, balauftij, ſingulorum unc. iſ. malicorij unc. i. ſilphij unc. 3. aut polue-
ris eius ſicci drach. i. Inſpergitur in potum, aut aceto mulſo ammiſcto dato
mane ac uſque. Aliud. Myri haccarum nigrarum cochlear. iſ. amiſſa,
roſarum ſeccarum, cenanthes, ſingulorum cochlear. 3. palmula xx. ſae pa-
ſtillos, & præbe drach. i. cum aqua aut uino diluto. Theriaca quoq; e uſpe-
ris optimam hīs auxiliata eſt. Cuius ſi actis & bilioſa eſt excretio, & alica,
chondro, & oryza, ac ſimilibus ſit, ita ut adſtringentium quidiſam coqua-
tur, parum, maſura cydoniam, aſepila, & ſimilia. Coctum quoq; hac hīs con-
uenit. Potus autem uel uini aquoſum tenue, aut aliqua ex ſecundis ſitpo-
tionibus. Si uero pinuſioſiora excernant, ad cōtraſta cibum tranſmutamus,
& ſemina quædam ſtomacho grata ammiſcemus, anſum, aut cumini, aut
apū ſemen. Sed & lenticula hīs cocta ſepe ipſis proſuit, comelle eſt modico
actio, aut aceto mulſo. Beſſice quoq; & ipſe hīs coctæ. Præſtat aut ſec un-
dam ipſarū coctari in poſca facere. Vinū uero uentiloſius ac calidiuſ bibā.

De teneſi.

Caput XLII.

Teneſmus aliquando dyſenteriam præcedit: aliquando etiam ipſe ſolus
non diu durans ceſſat. Eſt autem affectio ad excernendam promptitu-
do, quæ differri ac deſeruari non poteſt, niſi educens præterquam pauca
cruentū aſpectum habentia, aut etiam macoſa, quæ ſere totius morbi ſunt
cauſa, & inflammatio huiſmodi morbi in inteſtino recto oborta, incumbens
ſtercoris ſuſpicionem ipſis præbet, quod excretionem quærat. At uero Ca-
lenuſ nartat etiam lapidem quendam per ſedem excretum eſſe, circa teneſ-
mi affectiones. Serpe uero etiam ob ſtercoris obturationem in tenui inteſti-
no conſiſtentem, teneſmus ſequitur eſt, ex adſtringentibus & meatui ob-
ducentibus amplius augetur. Verum ex inſuſis per clyſterem actionibus,
uelut eſt aqua mulſa cum ſilicant ex aliquo alui molliſſime per os accepto
uelut ſunt damiſcena, aut carice, mercurialiſ, ſerum lactis: ſtercore excre-
to, ſtatim ſedatū. Cuius igitur etiam modi cauſam teneſmo oborto, conuenit
inflammationem cruda ordeacea farina calida, & irrigationibus ex uino,
& oleo myrteo, aut roſaceo, aut omphacino, ad lumbos ac peſcinem adhi-
bitis mitigare & mucoſi quæ in inteſtino recto inſeſſa ſunt, per aquæ mulſæ
inſuſum detergere. Sed & muria inſuſa per clyſterem ſepe quod opus fuit
efficit. Satis autem eſt uſuſ drach. vi. in hominam calidæ aquæ inſeſſis
muria fiat. Mitigare uero oportet dolores ac diſſentiones, per inſeſſas ſceni
græci, aut malicæ, aut ſeminis lini. Serpe uero & hac inſeſſis ſuccellum ha-
buit. Rubi, myrti, ſtoris mali punice, lauri & caprelli ramulorum uiridiam,
ſingulorum æquas portiones coquoſo in aqua. Eſt autem Marceſſi. At in
profundo ſi eſt inflammatio ac irritationes, ſtrumetacea ſucci cum aliquo
adſtringente cocti inſunduntur. Sed & oleū dulce inſuſum & pluribus ho-
ris retentum, dolorem ſoluit. Si uero frequens ad egerendum ſurtreſſio fiat,
etiam gloſmerem ex ſtaminibus calidis ſedi apponant, aut furfuris calidos
in ſicculum deligatos, aut ſpongiam, aut tale quippiam.

De dyſentia.

Caput XLIII.

Dyſenteria eſt exalceratio inteſtinorum, quandoq; ex teneſmi tranſmu-
tationis, aut ſilicuius ex relatis alui exurbationibus orſi habent: quan-
doq; uero ipſa affectionem aſpicatur. Et in ipſa excretiones ſunt primū
bilioſæ, nariæ. Deinde pro ratione cruentæ, & ad ſinem ſaniſſæ, quales à
mortuis corporibus deſluere ſolent. Quæ uero ab atra bile inſiſſi ſunt dy-
ſenteria, letalis eſt, cum exalceratione cauteram indicans. Si igitur ulcera-
tionis ſigna ſtercori ammiſta excernantur, cum doloribus ac torminibus: in
tenuibus inteſtinis ulcerationem eſſe ſcitis, quæ auxilliū per os acceptus ma-
xime opus habet. Si uero ſine mixtura ſtercus exeat, craſſorum eſt inteſti-
norum ulceratio, quæ inſuſis per clyſterem magis cedit. Quum uero mulſi
ſanguinis uocant. Excernunt tamē quandoq; etiam ſanguis nigricans quā

Teneſmi

Lapide excre-
tuſ in teneſmoMuria parat
de modisGloſmeris ex
ſtaminibus
aſit

Dyſenteria

Cancer excre-
tionis

promatur sua, & splendidus, hepatem probe concoquente alimentum quod distribuitur. Quin & ob debilitatem reteritricis aut alterantricis ipsius facultatis, excernuntur per uentrem similia carniūm cecens mīstaturam lo-
hepatis de-
fectus
 turis hepaticam autem hanc uocant dysenteriam, de qua in sermone de he-
 patibus dicitur. In communi igitur his quae ad coeliacos, & alias praeter natu-
 ram excretionē, relata sunt, utendum est. Primum uero leuesum sigillē,
 etiam depascendo proferentem eam dysenteriam sanat, & porum, & per
 clysterem infusum, in cecum prius per aquam mullam dato, deinde per mu-
 rum. Si portula ex succo, commodus est dysentericis potus. Et ipsa portu-
 laca cocta in posca comesta. Conuenit etiam plantago, & rubi fructus ac fo-
 lia, & radices albae decoctum, hippuris ex aqua aut uino pota, & succus
 ipsius. Mori immaturus fructus siccatus, & hoc magis rubi mora similiter
 siccata. Sicant etiam fluxiones per aluam, cum aceto cocta & comesta. Me-
 lius autem est si miscueris ipsas aliqua ad dysenteriam commoda, & in sir-
 tagine fricta ad edendum dederis. Valulissimū est ad haec omphacium, eius
 rubrum, & succus ipsius, malicorium, galla, utinae ca, mīstipila, myrti baccae, cor-
 na, cochlearum integram ustarum cinis. Compositi uero hoc. Cochlea-
 rum cineris partes 1111, gallarum partes 11, piperae pars 1. In puluillū re-
 ducta obfusa inspergito, aut in aqua, aut uino albo bibenda dato. Genero-
 se auxiliatur hoc dysentericis, quibus nondum putredinosis factum est ul-
 cus. Sed & catum qui ossa comederunt stercos succum, cum lacte per can-
 dentes silices immixtus seruetur. Porum, magnopere prodest. Composi-
 ta uero, pallillus ex spina Aegyptia, & Philippi pallillus, & qui fit ex cor-
 nu ceruini, & qui ex seminebus, & trigonus. Et ex macere catapota admi-
ex macere
catapota
 tanda sunt. Optimus est & hic, opij, croci, lycij, indicij, acaciae, rhois, thuris,
 gallae, hypocistidis, malicorij, myrrhae, alois, singulorum aequales portio-
 nes aqua excipe. & obol. 11. praebe. Aliud. Rhois drach. ʒi. gallae,
 malicorij, singulorū drac. 111. dato cochle. 1. ex uino. Aliud. Rhois drach.
 ʒi. gallae, acaciae, gsmi, singulorū drac. 11. opij drac. 1. dato drac. 1. in uino
 dilato. Uolegma uero ipsis conuenit hoc. Myrsi nigrae baccarum sextar. 1.
 rhois syriacae sextar. 1. palmularum Thebaicarum lib. 11. carnis matorum cy-
 doniorum lib. 1. mīsta punice acida cum ipsis corticibus x. Vini adstringen-
 tis sextar. x. 1. coquo ad tertias, & excolato ac infuso mellis lib. ʒi. & ad
 ipsam uinum coquo ac deligenda dato. Manifestum uero est quod enī
 exasperata ex adstringentibus erunt, quorum materiam habes infusa au-
 tem per clysterem dysentericis commodant, propter tenesmos uexantes,
 succos oryzae, aut aliorum, aut alicuius huiusmodi, cum adipe capriūm aut
 hircino, & quae in capite de tenesmo relata sunt. Si uero sanguis defluat,
 infundatur succus polygoni, aut plantaginis, cum acacia, aut hypocistide
ex hypocistide
plantis
 de, aut tali quopiam. Aut resurgat, etiam ex sanguine sistentibus aliquid
 infundatur uelut est cinis lazarum succidarum, aut spongiae nouae, pice li-
 quida, aut sanguine hircino, aut alumine liquido, aut theriacis alimini suc-
 co imbuta, & ulla. Sed & Andromae pallillus bonum medicamentum est,
collyria sibi
datus
 & blasia interposita, & cōlimpes. Sed & subditicia collyria ex efficacissimis
 existunt, maxime in quibus etiam dolores circa excretionem sunt. Vlcere
 uero depascite circa haecina consistente, quod & fecore, & putredine
 eorū quae excoquantur cognoscimus, & quod non statim ab initio, sed post
 tempus fiat, crustam indurcentibus infusa utemur. Velut sunt pallilli fac-
 tici appellati, & qui ex choira fit, & biethynus, & thronus, & qui ex sub-
 repaen, perennacule, aut alicuius ex adstringentibus decoctum, per cly-
 sterem infusa. Sed & hoc infusum ex his est quorum multam experientiam
 feci. Omphacitidis illud est autem catum illud ex quo quercina glans ena-
 scitur, quo coriorij ununtur, auripigmentū, symphyti, thous syriaci, singulo-
 rum aequales portiones. De his comissa cochlear. 11. excipe sicco oryzae,
 aut succo anclousaeque spūosum & lauum ac nigrum solium habet, quam
 cōbat.

A chierospelethron, id est iugerum porcinae uocant & candido ouero, ita *Aschepiogra*
ut de singulis ex aequo sextantem, aut quadrantem accipias, & per clyster *non potest*
inunire. Epithemata uero faciunt quae ad colicacos secta sunt. Sed & uentris
illitiones, quae adstringentem ac siccantem materiam habent, cum aliquo
ex glutinosis, gummi, thure, glutine, polline, in his quae cataplasmatis simi-
les sunt locum habeant. Cibis his ab initio sit lac ouis permixtum deinde
ex frumentaceis forbitiones, per se, & cum lacte coctae. Ipsum quoque lac mo-
derate coctum optimum est. Olerum uisus non est necessarius, tamen gu-
standa denarius, seris cocta, inrybus, & plantago, & brassica his cocta: & ex
fructibus adstringentes, caribus ipsorum spuro reiectis, aut his quae alius
intestina exasperare possunt. Si uero multa fuerit calida intemperies, etiam
inrybus crudus datur. Et aquam frigidam forbeant. Reliquus uero potus sit
aqua plenisalis. Languente uero stomacho, etiam uinum, potest uero etiam
de uolucris siccioris & concoctu faciles sumant. Et balnei uanior dul-
cibus. Si uero ab ipsis fluxione infestetur, spongiam magnam panis sili-
ginet micas, uino Alcalonico, aut aliquo adstringente calido imbutas, per
totum superiorem uentrem imponito, deligato, atque sic lauare iubeto.

De colica affectione.

Capit. XLIII.

Colon quod crassi intestini pars est, exortum quidem à dextera lateris
mollitudine habet, fertur autem ad sinistram, nisi sit cinguli. Verum dor-
lores huius grauissimi sunt, ob plures causas. Aut enim ob crassum ac pitui-
tosum humorem intra tunica ipsius interclusum: aut ob spirituum crassum
ac flavosum, qui transire non habet aut ob intestini inflammationem, aut
ob acres ac mordaces humores. Qui igitur ob crassum ac pituitosum hu-
morem dolent, his dolor per totum abdomen in profundo sentitur, maxime
circa coli sinem, doloris sensu uelut à terribili perforatione contingente.
Tormina autem hos uexant, & ructus, & nausae, & uomitus omni generis, ma-
xime pituiti. Et uenter ipsis sistitur adeo grauior, ut neque status pertranseat.
Excretum uero quandoque stercois bubulo simile uidetur, leue, & lacu plenum.
Praecedit in his maxime frigiditas ac crassi succi eduliorum assidua inger-
tio, repletioque ac cruditas, & otium, & quae his consona sunt. His autem
qui ob spirituum flavosum dolent, tensionis magis sensus contingit. Qui
uero ob inflammationem, seuoris in loco sensum percipiunt, & febris ad-
est non ingenerosa, suppressioque stercois & urinarum. & pulsus uexat cir-
ca uentrem, & sitis ac uenter hos infestat, & nausae, & bilis magis uomitus
nihil alleuantes. Et in summa, grauissima haec est ex coelestis affectionibus,
transicionem ad uoluum minans. At ob acres ac mordaces humores do-
lentibus, quemadmodum etiam his qui ob inflammationem, ardor, & sitis,
& uigilae adiungunt. Febris autem omnino, aut minus grauius illi, & ac re-
laxum erant, & biliosa egerunt, & saepe in alui egestionem magis dolent.
Et calidiorum eduliorum ac potuum ingestione magis exacerbantur. Do-
lores igitur ob frigidos & uiscosos ac crassos humores sanare conuenit, non
uoluntate calfaciendo. Nam calfacientibus multo dissoluantur, & ma-
gis instantur tales humores. Conuenit igitur ipsos secare ac decoquere per
ea quae flammam discutiunt, & attenuant, ac siccant, citra uoluntate calidi-
tatem, ab initio morbi. Stercoribus igitur ex uentre per conuenientem infu-
sa prius eductis, infundenda est oleum, in quo coctum est cuminum, aut
ruza, cum adipe asinino, aut gallinaceo. Aut radicem rucae cum syzygiis
decoctum, cum myrrina drach. i. & melle, ac oleo. Sed & oleo saepe comu-
ni infuso, pituita uitrea coequeceta statim dolorem sedauit. Si uero ob dolo-
ris uchemeniam, etiam infusum retineat, glandula indurata ex melle, cumi-
no, nitro, nata semine sicco. Aut brassica caulis probe derasus, & muria ma-
ceratus. Aut brassica cinis melle subactus. Aut colocynthidis uita cum mel-
le, & nitro, ac cumino. Sint autem glandulae digitorum sex, quo masculum
adstrictorium transgrediantur. Illinatur etiam lodes cyclamini succo, cum

Glandula uen-
tris subdita

melle & nitro. Aut centauro cum melle & nitro. Dolore per se ueritate sua
 pra relata infundatur resina terebinthinae sine. i. aut opoponacis drach. i.
 aut galbani drach. i. i. i. bituminis tantundem. cum nitri drach. i. & aquae
 uuae. i. & olei frutacei quatuor unci. aut amplius. Irrigationes autem partibus
 dolentibus adhibeantur ex oleo rutaceo, aut anethino, aut sicomijo. Cata-
 plasma sit ex medicamento trispermo, cum cumino, bacca lauri, apii semi-
 ne. Epithemata sine & quod ex seminibus constet, & quod ex bacca lauri,
 & quod ex mellito paratur, & polyarchiam. Insidiant aut in decocto fo-
 nigraei, althaeae, chamamelis, anemisi, anethi, lauri, & similia. Sed & in
 oleum calidum, aut aquam & oleum demitron di sunt. Portiones sint ablin-
 thium & cuminum, aequis portionibus. Aut panax cum aqua, aut castorei
 & anisum. Aut piperis drach. i. cum aceto melleo. Dolore uero non reme-
 tente, medicamentis ex tribus piperis generibus bibendum datur, aut rhe-
 riace. Sed & sinapismo & dropace utendi est in remissionibus, & balneis
 naturalibus. A balneis autem aquae potabilis abstineant, nisi ob doloris ab-
 stinentionem cogantur, quando sanè praemixto aliquo ex relatis medicamen-
 tis lauare oportet, & habere ut calorem admittat intra feruidos parietes, in-
 spersis quibusdam nitrosis inegmentis. Si uero dolor uehementis est, etiam mo-
 derate mitigantibus utendum est. Vetus est pastillus ex castorio, cum insu-
 ssum, tam potus, & medicamenta eiusdem generis. Nam uehementia supe-
 riora uitanda sunt, ut quae ad breue quidem tempus erigunt, danturnio-
 rem autem affectionem faciunt, eo quod materiam crassescens, & intesti-
 ni meatus densant. Attenuata uero iam pinata, per huiusmodi amarum ipsos pur-
 gamus. Aut per haec cataplasma. Aloë, euphorbiae, grani caudii puri, scammo-
 nis, singulorum aequalis partes. Dantur huius serapuli ii. Visus autem ca-
 lidior ac siccor hīs conuenit, ut qui ab initio huius abstinent, postea uero
 etiam aerium etiam assumunt. Portiones igitur hīs dandum est cocti cum con-
 ditio, & apium, & asparagus palustris, alium crudum, maxime hīs qui haec
 non molere admittunt. Et ipsum Conditum bibant, & panem ex ipso acci-
 piant, postea uero etiam reliquiboni succi & eo cocta faciles cibi ipsi den-
 tur, ita ut uentri repletionem & cruditatem. At si fuerit spiritus flatuolus
 qui dolore efficit, post in iusa, & portiones siccis discurrentes, etiam cucur-
 bitae maxime leues ignita, per totum superiorem uentrem affixae, ad cura-
 tionem saepe suffecerunt. Si uero inflammatio in intestino sit, uentrem in cu-
 bid flexura secabimus. Esi urinae difficultas inualecat, etiam eam quae ad
 melleosum est secabimus, & relatis auxillis utemur, exceptis acerbis & ue-
 hementer purgantibus. Verum mitigantibus magis insulas, & cataplasma-
 tis, & irrigationibus, & demissione in oleum utemur, cucurbitaeq; etiā his
 affigemus. Ceratum quoque superiori uentri imponemus, quod habet centi-
 quincentum, olei chamamelini sextantem, rosae ceti sextantem, faling fabae-
 eae unci. i. uicillos ouorum v. cum sacco seminis lini strito. Visum autem
 tenuem & febricitantiam, ipsis constitimus, usque ad inflammationis soluta-
 tionem. Quod si ob acres & mordaces doleant humores, infundatur ipsis
 oleum in quo coctum est forumgracei, aut althaeae, cum simpliciter adipe re-
 centi anseris aut gallinae. Aut etiam pessima succus cum rosaeco, aut suc-
 culentis lini. Datur ipsis in potu amara ex aloë anisodora. Et balneo utantur
 aquarum dulcium. Et cibis fortilibus ex alide, aut pessima, piscebusq; petro-
 sis. Et in summa totus uentus humidior sit ac frigidior. Abstineant autem ab
 aeribus omnibus edulibus ac pharmericis, & ab irrigationum ac cataplasmatum
 fomento, uinij, potus, & praesertim ueteris. Inualecente uero dolore, etiam
 sedum stupescientibus utendum est. Minime enim pre alijs haec affectio-
 nes ledunt, ut quae tenues & mordaces humores crassesciunt, & moderate
 perficerent. Porro arbitror etiam eam quae nunc inualuit colicam affec-
 tionem, ex calidibus humoribus periculi esse, quae ab Italia quidem regio-
 nibus initium coepit, sed & in alijs multis Romanae reipublicae locis grassa
 est

Paracetoli
 di balneum

Conditum

Colicae affectio
 tempore Pauli

At est, petilenti quidam distributione: in quaplerisp ad morbos comitiales, alijs ad aruam resolutionem, seruat sensu, quibusdam ad ambo, delapsus contigit. De qui quidem ad comitiales delapsi sunt pleriq perierit. Qui vero ad resolutionem, plerq seruari sunt, uelut in indicatione causa translata. Sic igitur agrotantes medicus quidam in Italia curauit, incredibili quodæ ac remeratio frigidissimo uicū constantio. Lactucas enim ipse exhibebat non coctas, frigidificans ipsas, intybadj similiter supra saturatam edenda; uinas item & mela, & pices duræ carnis, omniad testa interea, & pedes bubulos, & bulbos, & similia, non solum potensia, sed & tactu frigida. Vinum uero raro, aliquando tamen dabat, & frigida aqua miscibat. Sed & frigidi aquam, aut etiam poscam frigidam dabat, ab omni alio calido ac medio cibo abstinens. Ex plurimos hominibus, præter omnem opinionem sanauit, & ex his aliquos qui iam ad comitalem, aut resolutionem delabi corpissent.

De colica.

Cap. XLIIII.

QUum acutissima & dolorosa affectio sit uoluitus, habet quoddam symptoma periculo gratus. Nam superati miserrima morte pereit, stercus autem per ostendentes. Consideratur autem affectio ex cruditatibus, & obcurantionibus, ubi corrupta permanserint, & ex uenenois medicamentis, & ex intestinorum ad scorum delapsu, & ex inflammatione intestinorum, plerumq colica affectio melli aspicata. Pueros igitur irrigationibus, cataplasmatis, infusis, glandulis, & fomentis, uelut de colicis dictum est, cura huius. Adolescentibus aut & in uigore constitutis, uenam fecabimus citra dilationem, repetita sanguinis detractio. San minus, cucurbitas affigimus per totam superiorem uentrem multas & leues. Ad dolentes uero paries, etiam cum febrilefactione. Desiccantur autem & consiliantur ipsorum artus, & tunc efficaciora infusa adhibeantur, & in oleum calidum demissio nes, instillotiq ac purgationes, & in summa, omnia ad colicos relata, exceptis his quæ adhibentur ob acres ac mordaces humores eorum dolentibus. Mirifice uero facit, etiam si uomant, anethum coctum ac potum. Post potum uero, panis in calidam aquam infectio, statim calida frusta edenda dabo. Cibum uero non condensibus rheum & cummum simul nra, in aceti multo cythia vi bibenda dabo. Ac eos qui ex ueneno accepto uoluitum inciderunt, ab aquæ calide pota ad uomitum cogere oportet. Habes autem omnium uenenorum acceptorum notas libro quinto. Deinde bibendum detur oleum calidum, aut iuscula pinguis, ut rarius uomant post aliquot dies etiam theriace detur. Perseuerante uero obturatione, lacte scisso cum modica scammonia, aut aloë, aut aliquo purgatorio alium exequat. Si uero ob delapsum intestini in se ipsum affectio facta est, statim ipse sursum uergente figura reclinatis, delapsum intestinum ad inguere retrademus, & ligamento hoc retinebimus.

De colica et uicis affectionibus.

Cap. XLV.

De colica.

Ordinem hunc docendi persequi nos cogit morborum cognatio: Commune enim est colicis, & lapidem in rheibus habentibus, ut & ab initio alius sit adstricta, & uehementer dolent, & cibum fastidiant, & nō concoquant, & tormina habent. Proprium uero colicis quidem, ut hanc omnia magis incerta sicut: Nephriticis uero minus: Et quod colicis circa dexterū lateris mollitudinem magis sint dolores, & ascendant ad stomachum, uisq, & hepar, ac splenem: & quod steruus penitus sit suppressus, ut neq flatus penetrant, & si ad necessitatem ipsum excreant, quod fluuio sit, similiter uelut bubuli: & quod aliquando pituita citrea excreantur, & urina copiosior ac pituitosa reddatur. Nephriticis aut & dolor circa ipsos renes firmitas est grauis, instar pali impacti: & testem ē directio dolent, & torpor siccioris ē directio sit, raroq sua sponte alius excreant, omnino autem infusis per clysterem immixtis, flatus & steruus biliofuit: Urinæ uero pauca & aruiose magis redduntur, & meatus urinarius est adstrictus. Hæc sunt calca-

k 4 larum

Medicus quidam
dum remeratio
uia sitit

Voluitus

Stercus per os
ostendensColica
rheum

Nephriticis

lorum in thetibus signa, quæ in urinis perfectis magis fiunt. At calculorum ^A
Calculus in uelica coactio, pueris magis fieri solet. Noctæ horum sunt, cruda & sub-
actio albida urina cum arenosa subsidentia. Fricant assidue ac contrectant pu-
 dendum, & arriuant, & assidue ad urinam reddendam urgentur, & urine
 sticticum habet. Materialis igitur calculorū generationis causa est cra-
 ssa ac torrens humor. Efficiens uero, feruida rheum aut uelice caliditas.
 Ceterū ad rheum, arteriosis calculos, & se canibus medicamentis uran-
 dum est, absq; hoc ut manifeste calfactam. Talia autem sunt, asparagus
 regiorum radix, & rubi radix, & utrum uisum, & graminis radix, & adian-
 tum, & bellium, radices lauri cori ex, althæe semen, cicor nigrum arietinū,
Carpus lapides spongiarum, acetum scilliticum, phuræon, aliorum, carpsia, faxi-
Prionitis fraga, lion & comestum & potam, cardui radix, crysimon, & prionitis. Bal-
 neis etiam assidue utantur, & post balneum statim aliqua ex rebus bibant.
 Irrigationibus quoq; cataplasmatibus, & fomentis ac infusibus laxatorijs
 ac mitigatorijs utendum est, ex colicis ipsa transferendo. Compositijs pos-
 ones sunt. Rorq; syluestria, malur syluestria, & apij radices coquito in uino,
 & expressum liquorem aqua temperato, & cyath. ii. bibendos dato. Insu-
 per sit uero hoc est. Fructus balsami, lapidis spongiarum, pullegij sicci, seminis
 malur agrestis, singulorum æquas portiones contundito, & cochleariū i.
 cum uini diluti cyath. ii. dato. Sed & siccatu sanguis hircinus, & cicade
 siccatine alis ac pedibus, & lapsi ludai cuiusue recolis hos ex uino mulso, in
Cilodum calido balnei solio deuent, & quæ ex ipsa parantur composita medicamen-
ipse ta. Et posse nephretica, & condita ad hoc composita. Quin & troglodytes
Rasse laudatissimum auxilium existit. Est autem auicula siue passerulus omnē
Troglytes uolugrum minimus, solo regulo excepto. Nam ut parvus sit, illo tamen so-
 lo maior est, & ipsi similes, colore inter cinereum & cum uiore pallidū, te-
 nui rostro præditus, in parietibus maxime ac sepius degens. Hic tonus sa-
 le seruans, & crudus assidue comestus, & calculos natos per urinam expel-
 lit, & de cetero generari uetat. Sed & uili totius uiuentis unā cum pennis
 cinis, totus per se, & cum pipere & solio modico, ex uino mulso potus, idē
 efficere solet. Ceterū ad dolorum acumen, & uigilias, antidotus Soti-
 ra, & Philonis, bona sunt pharmaca. Venæ quoq; sectio adhibita, sæpe do-
 lorem leuat, uelocem lapidis excretionem faciens. Præseruanda uero à cal-
 culi generatione sunt, primum boni succi & moderatus cibus, & exercitia.
 Deinde à leguminum omnis generis, & à frumentaceorum assiduo usu pro-
 hibeamur, & à caseo ac lacte, & obsonijs quæ ex ipso parantur. A uino (sē
 nigro, & carni multitudine). Et in summa, ab omnibus craffi succi cibis
 abstinere, & à male calidis & acerbis, hydrogaris inquam, ac conditis, &
 similibus. Hæc enim non solum nondum generatos lapides cō crescere præ-
 lubent, sed etiam iam generatos attenuere & excernere solent. Bibant autem
 acetum mulsum, cum aliquo ex simplicioribus urinam cientibus, adiantū
 apij, graminis decocto. Et post balneum scium, ante uinum, aquam tempe-
 ratam bibant. Et in medio prandio frigidam insuper sorbeant, si nihil pro-
 habeat. Si uisiorum humorum copiam simul sentiat, per uenæ sectionem
 aut purgationem euacuentur. Omnium uero optimum est ad præseruandos
 calculos, post balneum, prius quam uinum aut alium cibū capiant, aquam
 temperatam bibere. Porro uelice calculos in pueris, fortioribus auxilijs
 conuicies, quæ ex rebus deliges. Nimium uero aucto lapide, aut etiam ita-
 xa uelice collum oburato, catheteris instrumento, aut etiam lapidis exre-
 ctione utendum est, uelut in chrysia dicitur.

De inflammatione.

Rheum autem Si rheum aut uelice inflammatio fuerit, quæ & ex sentiore loci cum gra-
sic inflam- uitate, & dolore cognoscitur, & quod se habent, & mente mouentur, & uo-
ratio munt biliosa mæra, & mœre non possunt, & præsertim uelica inflamma-
 tio caeca ita se habet. Ut mitigatoria irigationes, ac cataplasmata ex ruta,
 & anser

A & anetho, & fenograceo, & althææ radice adhibeantur. Et per clysteres infusa ex oleo. papauere, & adipe asinerino. In uterica autem & opij obolus dimidius, cum myrris, & croco, & oleo, in sedem immittatur. Aqua etiam multa ipsis præstibenda detur, ita ut abstergeantur foribus urinae cistibus, & multo pota, præterquam si acris & biliosus humor in ipsis redundet. Tunc enim & multo pota utendum est, & ageruatim, ex aliquo urinae cientium circa mordacitatē. Eibant item de seminis lini paribus duabus, amyli parte una, cochlearium unum ex aqua. Cucumeris quoque ac peponis semen accipiant. Si vero sensoris sensum circa rheues percipiunt, linetola ipsis inspicitur ex uino & rosaceo, aut aqua & rosaceo, aut melino. Aut ceram ex cera, & rosaceo, & chamamelino, aut melino, & utellis oueum compositum, cum modico aceto aut polygoni succo. Postea uero etiam emplastro ex faccis, cum chamamelino utendum est. Abstinendum autem à ualde calidulis, propter mutationem in pus, & ualde frigidis. Nam ab his ienes facile in scitulum induratur. A balneis quoque inflammatione instante abstineant, & usum febricitantium & inflammationem accensē utantur.

De difflesi et ulceratione uariarum partium.

Dolores circa lateram mollitudines, & horrores inæquales, & febres inordinate, abscessus in rheuibus significant. Verum circa uesicam abscessum, supra relata indicant etiam dolor circa locum. Afflictum autem rheuem comperies ex eo quod in sanum latum decumbens homo, ex opposito dolens, uelut rheue dependente. In quibus insensibus ex aqua & oleo utendum est, & cataplasmatibus ex possilino, oleo, ac resina. Aut ex erui farina cum meli. Aut ex nascituro, aut limo columbino, cum caricis. At uero pus per urinas excernitur, abscessusruptionem, & ulcus in parte esse indicat. Quandoquidem uero etiam absque abscessu partes urinarie ulcerantur, ob uasali rupturem, aut corrosionem ex materia acris, aut ex lapideis deratione, distinguenda est ulceratio in rheuibus, ab ea quæ in uesica est, aut in iuxta urinario meatu. hoc modo. Rheuibus exulceratis circa lumbos dolent cum grauitate, & citra impedimentum urinae emittunt, & pus urinis amixtum reperitur, carnis particula in ipsis instantibus. Vesica uero ulcerata, postquam & inuam uentrem uehementer dolent, & agere urinam eiciunt, & pus postmictionem deorsum succidit, & squame in ipso graueolentes aut laminae feruntur. fursum cernere insubidentia scabiosam esse uesicam significat. At meatibus urinaris ulceratis, & puris ammixtio medio quodammodo se habet, & pilis similia magis in urinis feruntur, & dolor in medio loco inter rheuem ac uesicam sit. Si uero pus aut sanguis excernatur, etiam citra urinarum emissionem, nullius reatorum, sed pendendi ulceratio indicatur. Qui igitur partes urinaras exulceratas habent, aquam multam aut fenigræci decoctum præstibant cum melle aut cucumeris semen cum passo. Qui uero pus mingunt, eis detur armenica bolus, aut feralarum uistard cina, quantum tribus digitis præhendi potest, cum passo. Lactis quoque potus magis perire his prodest. Composita uero hæc. Seminis lini, seminis cucumeris, tragacanthæ singulorum drach. ii. in pastillos efforma. Aliud. Nucis pineæ nucleos xxx. seminis cucumeris fistulæ grana xl. amyli drach. i. Excipe duabus heminis decocti nardi ac seminis apij. Archigenes autem in epi sola ad Anticum, ad urinae difficultatem urgentem se accepisse ait, papaueris albi tostii drach. i. inspersum in decoctum funi rotundi odorati, aut calami, aut glycyrrhizæ. Vicosos autem dolores eximit hoc. Seminis cucumeris purgati grana xxx. nucleos pineos xii. amygdalas amaras dealbatar xxxv. croci quantum ad colorem satis est. Ieiunius accipiar quotidie cum lacte, aut uino protropo. Miras autem fiet, si pro nucis pineis, malum semen pari mensura accipiet. Sanare uero potest inquit, ulcerationem in uesica cyphi, & cyphiiformes antidoti. Ego uero in uentisuribus hoc usum, non opus habui uariare. Chamædryos, chamæpityos, singulorum drach.

*Urinarum
partium ala
morte*

*Prostata
aqua*

XXIII. alant, piperis albi, singulorū drach. VII. cinamomi drach. I. Ienissimae quantum eas fieri potest trid cochlearia duo pariter, ex cretico passo. Si uero febrilis, aquae cyath. III. Quid si mortuus ulcerosus addit, etiam amygd cochlear. II. & seminis cugumeris grana XX. adijciens, quod ex peto assē quor. Atque hoc ex Archigene. Sed & ex physalide medicamenta, & anidocum ex semine maluar, & ex bellarijs constans anidocum comoda est. Ad intercedendum autem scori, & ad peccandū imponantur cerata ex callypoto, butyro, adipe asferino ac hyrcano. In uescicam uero infundatur per parū clysteron aqua multa aquosissima, aut lac cum purissimo melle, aut cū cummeis semine. Aut omī candidam cum pompholyge, aut aliquā ex relijs medicamentis. Ulcere uero pascendo proserpente, passillus ex charta immitatur, aut bithynas. Et cataplasma ex palmulis, aut passis, cum galls, acacia, hypocistide, alumine imponatur.

De sanguine et rhinib eruptione.

Sanguis i rhinib eruptio Rhenes debiles sepe urinam retinere nō possunt, sed ampliores existentes, aliquid sanguinis ex uena emittunt, simulq̃ alias quādam crassitudines. Erumpit etiam sanguis sepe ex rhinibus per circuitum, quemadmodum in haemorrhoidibus. Eucuari uero assuescunt. In his nihil cito interrumpere oportet, si sanguis rarus sistatur. Si uero per se ueres, uena in cubito secetur, & medicamenta ad sanguinem spuētes, & alias sanguinis eruptiones destituta, etiam ad rhenes se uelle, unde sanguis erumpit, in uelum assuescunt. Maxime uero symphyti radix, & tragacantha uino macerata ipsi detur, & polygoli ac plantaginis succus cum posca. Aut amygdali amari cō passis. Aut bithynas scilli drach. I. tragacanthae drach. II. gummi obo. V. Excipe passo. Imponatur autē cruda ordacea farina cum posca & rosa. Aut cataplasma ex palmulis, & pane siliquino, cum acacia, aut hypocistide coctis in uino adstringente, aut posca. At sanguine ex uescica erumpente, etiam cucurbitis ad laterum mollitudines ac coxas affici uentur. Distinguitur autem affecta pars, dolore circa locum, aut quod amittens est urinae sanguis, aut nō, uelut de pure dictum est. Si uero grum osus factus est sanguis in uescica, cognosces quidem hoc, ex eo quod acentationis supplecti est urina post sanguinis missionem, & quod nubes quidam sanguinis, uelut par est, exiit, aut erunt humiditates. Dato autem artemisi decocto bibendum. Et elichyli, aut conyzae, aut raphani semē aut siphij succi, aut cythraeum, aut apij succi, singula aceto diluta: aut leporis coagulum, aut binnuli aut breidi in aceto mulso: aut lōdauum cum oleo. Et foris sponsia maris aut lōuio calido imbata imponatur. Si uero non soluantur, intencat pedo aut se serot fecerit, ueluti in calculosis, & grumis sanguinis ablati, congrua curatio adhibeatur.

De duricia rhenum.

Duricia rhenum Quae uero duricies circa rhenes sunt, dolores quidem non amplius exhibent, uerum uidentur ipsa uelut ex laterum mollitudinibus pendere. Et coxae quidem ipsa sapore torpent, pedum uero impotentes sunt. Mī inquit panca, toto uero corpora habere similes sunt his qui aqua inter eamq̃ laborant. Hos igitur mollire oportet ceratis, & malagmatis, interitionisq̃ ac foetoris, & urinam euentia exhibere, & uenarum infuso per clysterē subducere.

De diabete.

Diabetes *Diabetes* *Diabetes* Diabetes uelox est eorum quae bibuntur transiens, ut quae talia minguntur, quālia pota sunt. Quapropter etiam immodici sitis, unde & dyspnoea appellata est affectio, quae constat ubi debilis est facultas retentrix rhenū, foris autem magis attrahit, quae totum corpus humore priuat ubi immodicam caliditatem. Aduersus hanc igitur instantes, tribus plures & ex parte comutabiles, & non ad id humorem habemus, uelut est aliqua cum rosario, aut rhodomelo, aut hydiomelo, aut uino non uetere, aut aliā calido aliquo. Ex oleis turyba, seridem, lactis, & piscium petrosos. Et pedes ac uulua

scillas

A fustulas, pira item ac poma, & mala punica. Bibant autem frigidam. Præbent etiam polygoni fuscum, & belentum in uino nigro, & palmularum ac myrti baccarum cremorē. Cataplasma adhibeatur præcordio ac renibus, ex polenta in aceto & rosaceo. Item ex folijs uitis, coryledone, helxine, ac portulacæ. Sudores ipsi excutuntur, & uomitus ex aquæ frigide potu. Et ab omnibus urinae cientibus abstineant. Neque absurdū est ab initio ueni fecare.

De urinae stillicidio etiam reddende difficultate.

Si neque inflammatio, neque calculus, neque aliud quicquam ex rebus adest, & acris fuerit urina, & totas habens, aut etiam reliqua signa, bilem ostendunt, ob hanc causam aut urinae difficultas, aut eius stillicidium consistit. Et oportet alterantibus ac temperantibus hanc uti, pituitamque succo, piscibus, balneis, & uisui congruo, ita ut ab acris abstinemus, & à uino ac exercitijs, & ab iracundijs, & tarda cibi ac ceptione. Si uero urinarum tenuitas, & albedo, ac reliqua signa, frigidam indicant intemperiem, uinum calidū cōueniet, & condita, & urinae cientia medicamentis ac cibi. Et infusiles calidiores. Si uero super albedinem etiam crassiores apparent urinae, pituitosum humorem esse opinandum est, qui uel in cellum obstruitur, & oportet aceto mulso uti, & hyssopo, ac pulegio, aut origano, aut thymo, aut sulphio, & cōcis in aqua mulsa & irrigationibus calidioribus. Sive autē humor crassus, sine lapide, sine grana, aut huiusmodi quiddam obstrucentē inducit, & urinarum transitum impedit, catheterem adhibere oportet, si non inflammationis pars adit. At uero urinae in febribus difficultatem sanat irrigatio ex rutaceo, aut anethino, aut ueteri oleo. Si adstricta sit albus, siccigræci aut maluit decoctum infundatur. Infundantur etiam hi in aquam & oleum, aut in decoctum quoddam ex rebus speciosis, cum oleo. Certum uero ipsi conuenit hoc. Maluæ sylvæstris radices in oleo siccioso cōmodica aqua coquantur, donec torrefiant, & ipsæ quidem abiciuntur, ad oleum ut so amittitur rute succus quarta parte, & cere, & castorei quod satis est.

B De resoluta uelica, ad quam aliquando urinae difficultas, aliquando in uoluntaria urinis excretio sequitur, in tractatione de resolutione antea dictū est.

De perfrigeratis frætas.

Laxatio musculi circa uelicæ collum, hanc affectionem inducit. Quæ propter patris maxime contingere solet. In communi igitur corroborantibus quam maxime utendum est, uelut uinum ac oleum calidum est, ac confirmata, ita ut uitemus uehementer refrigeracientia, magis uero conalefaciamus ipsos, quantum eius fieri potest. Nam perfrigeratio uelut resolutionis imaginem representat. Naturaliter autem hæc efficae est sunt. Galli gatur assu sciuo bibendi dato ex aqua calida. Aut leucanthemi flores similiter. Aut leporis testem dextram in uinum odoratum bibendum dato. Aut calamintham & myrrham ante cenam bibenda dato. Aut rute sylvæstris semen totum bibendum dato ad triduum. Illinatur etiam pudendum ipsius cimoilia terra cum succo perdicidis.

De hepatis affectionibus. Cap. XLVI.

QUum uarias sustinet hepatis affectiones: nam & debilitate, & inflammatione, & igne fieri, & induratis scirrhis, & abscessibus, & ulceribus, & oburationibus corripitur: primum de debilitate ipsius dicendum est, à qua proprie hepaticos uocares affectos solent. Si igitur in succum quidem commutata, uerum liquidiora conueniunt alui excrementa, distributione ad hepatis defectibus, aut omnino non contingente, si ab affectione immunitis est uenter, attracticem hepatis facultatem debilem esse opinandum est. Si uero similia loturie carnis recens maceratum, alteratricem & sanguificatricem appellatam. At si ob calidam debile fuerit incomperiem, temporis progressu recrementum feculentius apparet, & ualde graueolens, & bilis abunde colorata crassa. Iam uero etiam essentia hepatis cum ipsi colli quiescente, & totum corpus colliquefacta, & sebrum, & cibum sustinent, &

Urinae stillicidium

Urinae difficultas

Perfrigerata

Perfrigerata frætas

Naturella assu

Hepatis uelica

Hepatis

bilis

bilis uocant. Si uero frigida intemperies est, necq; multae ex-
cretiones sunt. Diuturna enim est affectio, & per aliquos dies uenter magis
acuatim crumpet, uenter minus grauescentia erunt excrementa, uelut li-
mus sanguinis crassi propinquus acri bili. Quis & plures & uarietiores
colores, frigidam intemperiem indicant, & febribus ipsa languida apparet,
& facies collapsa, & magis cibos appetant. Vtra uero harum intemperie-
rum inest, si sic ea fuerit pluri adiuncta, de cetera apparent excrementa, & sunt

*Hepatis in-
flammati-
o*

magis. Si uero humida, liquidiora ac plura, & minus sunt. Porro si inflam-
matum est hepar, dolor in communis omnibus adeli in dextro praecordio,
transiens iursum de sinistrali usq; deorsum ad spurias usq; collas, & febris
acuta, & tussis secca, & sinus, & cibi inappetentia, & spirandi difficultas, &
lingua prius quidem rubicunda apparet. postea uero nigra. uocantq; bi-
lem & alius oppressi est. Quam autem consimilia quodam modo sunt si-
gna etiam in pleuritidis, differentiam ipsorum in capite de pleuritide dixi-
mus. At si erysipelas siue ignis si er constituit in hepate, & inflammatio,

*Hepatis ery-
sipelas*

nis ardor extenditur, & excurantur, & marcor succedit. Priuationem uero sinus
hepatis partibus inflammatis, naribus, uocimus, ciborum uicinationes, flam-
mae odores, & animi deliqua intenduntur. Et saepe perfrigeratur, ut aq;ue
praeterfusiones hinc initium sumant. Gibbis uero ipsius inflammatis, ad re-
liqua relatis, etiam tumor manifestus certa descriptione ad usum ac tactum
expellens adest. Atq; haec quidem si uehementi & magna est inflammatio. Si
uero obscura fuerit, tuberculum uelut ualde respicere: & si circa dextrum
praecordium dolere se dixeris, moderatam hepatis inflammationem esse con-
sentandam est. Si uero iuxta incombentium musculorum sinum, oblongus in-
flammationis tumor appareat, nullo ex relatis praesente, illos ipsos inflam-
matis esse cognoscimus. Grauitatis autem cum distentione ac dolore leu-
issus in dextro praecordio, citra tumorem ac febrem, oburationem uenarum
significat, qua parte uenter in porta. & sinus hepatis parib; , cum his quae
in gibbis sunt committuntur. Proinde si in abscessum inflammatio uertatur,
& dolor, & distentio ipsis augeatur, & rigores praeter rationem accedant, &
in sinistram laeas decumbere non possunt hepate magis dolentes. Rupto au-
tem abscessu, aut per uenas, aut per uentrem, acruata partis excretio con-
tingit. Si uero uelut duram affectionem tumor transmutetur, dolores qui
deus minuantur, tumor autem cum densitate manifestus est. Corpora uero
circumdata attenuata, progressu uero temporis difficilis sit cognitio. Nam
aequaliter eum accedit, & totam praecordium ab humiditate conegitur.
Ad calidam igitur hepatis intemperiem utendum est perfrigerantibus ac
corroborantibus uiscis moderatis, qualis est fetis, & cichorium, quandoq;
crudum comestum, quandoq; coctum cum coriandro. Decoctum item ipsius
potum, & succus, & ipsum adeo succum aq;ue melle inpersum, & ad calid-

*Hepatis cry-
sipelas*

das & ad frigidas hepatis intemperies facit. Intrybum autem trochiscum ap-
pellatum, & fenchus, ex cornu silibus sunt. facit & citri succi & uachus ex
aqua mella, & silicis succus similiter. Si uero etiam cum moderata obura-
tione intemperies fiat, cum uino aliquo ueni & urinae eiente, illa dato. Ca-
rapotum uero sumitur hoc. Cichorii drach. 111. radicis chamepityos drach.
111. Excipere melle cocto, & nucis pontice magnitudine praeco, & aquam
calidam in super sorbeat. Et ex opio ac hyoscyami semine lacta ipsis praebi-
benda dantur, & ipsa Philoni antidotis. In quibus autem calor inseditur,
etiam rosaceum optimum aut melinum ipsis bibendum dato. Cibum uero
pellant succum, aut alium, cum hydropotato accipiant. & panem similiter
ex aqua, cum aliqua eiusmodi secunda portione. Et in summa, cibos moder-
ate perfrigerantes citra oburationem sumant, & uino in totum abstinere-
tes, praeterquam si ob aliam causam, uelut est stomachi debilitas, uocantur, &
tunc tenue quoddam, & parum aq;ue serena, aquilum ipsis datur. Sed & bi-
gnem siue in hepate similiter curare oportet. At uero si frigida est intempe-

peries

Aperies, per contraria procedendum est. Panis igitur ipsis cum uino datur, & his autem cocta breuifera. Castaneas item guffent, & uuas passas, & de gaffinis quod sacis est, & uinum bibant. Præbibendum uero ipsis desur eupatorium, aut asarum, & medicamentum ex pipere, & ex descriptis antea ad coeliacos ac dysentericos commoda deliganur. At collectiones cyphiformes appellatur, ad calidas quidem in temperaturas omnino non consueiunt, nisi modicus quidam calor cum largiore humiditate fiat: Verum ad frigidas optima sunt auxilia, & magis si cum humiditate aut oburatione hepatis fiant. Si uero d' crassis ac viscosis humoribus obcuratio fiat, myracanthia, & maxime ipsius fructus decur, & radicle lauri cortex, & eupatorium ex aceto mulso, aut lupinorum amarorum decocto, cum ruta & pipere, facit & farina lupinorum pota, & radicle capparis partes 11. colli pars 1. cum uino, & medicamentum ex cacano, ad crassorum ac viscosorum humorum oburationes: ita item, & pistacionem fructus ac cortex, & marubium, & amygdale amare, & pistillas ex ipsis, draconij quoque ac ari radice, & agaricum, & acetum scilliticum, & acetum mulsum. Hepar autem lupi siccum tritum coctilearij mensura datum, omnibus hepatis affectionibus conducit, cum uino dulci. Quia & Theodorus antidotus optimi est medicamentum, & in oburationibus hepatis, & in scirrhis induratis, & in diuturnis inflammationibus, in colicis ite, ac morbo regio. Similiter & pica ex aceto mulso. Cibi potus huiusmodi sunt calidiores & ab oburatione liberantes, uelut est porrum ex aceto mulso, & palustris asparagus, & capparis similiter. Sed & reliqua obfonia cuilibet ex calfacientibus ac aperienti uim habentibus condimentis cocta. Et uinum sit tenue ac uetus, ita ut crassi siccet omnia uitemus, & balnea assida, & maxime post cibum. Diuturna uero euadente affectione, etiam uena sectionem ac purgationem assuimus, si nihil profuerit. Inflammatio uero hepate circa dilationem uena scirrhac cubito dextero, & molem sanguis detrahatur, uiribus sufficientibus. forissecus autem cataplasma imponatur uisceri, ex farina ordacea, fornograce, semine lini, cum palmulis, aut malis cotoneis, & flore meliloti, & ablinthio, ac chamemelino. In unguentum ita ut mollioris adstringentia ammiscantur. Epi themata uero sint, Nili, & odoratum, & Philagrium, & Apollonianis, & ex melilotis, & uisce, copon appellatum. Ad maximas autem inflammationes ualde malte experientia hoc est. conuex ablinthij, nardi celtice, asari, croci, singulorum unc. i. iridis, myrthæ, styracis, bdellij, ammoniaci thymiamaria, singulorum sextantem, medullæ utulise tridentem, cerati leni scini lib. 111. Dandum etiam ipsis acetum mulsum, & simplicia auxilia, uelut est asarum, nardus celtica aut indica, iuncus rotundus odoratus, petroselinum. Et uentrem irritare oportet per urticam & mercurialem, cocta in cibo accepta. In declinationibus etiam epithymi ac polypodium dentur in aqua mulsa, per chyfferem quoque alius euacuetur. In principio ex aqua mulsa insusa cum sale aurnitro. Verò declinatione contingente, misce byssopum, aut origanum, aut citum, aut centauium, & colocynthidem. Et in summa, si uis hepatis partes per uentrem, gibbar per urinas expurgantur. Cibus uero his datur pessina succus, in quo aptum coctum est. Quod si inflammatio fieri ignis speciem perferas, curationem antea diximus. Si uero abscissus sit, rationem eius adhibebimus cataplasmate ex tripermo, cū resina, manna thuria, piec, althææ radicebus, simo columbino, stercore caprino. præbibendum uero datur decoctum polij, samariz circa sepes nascens, ita ad tertias redactum. Item thlaspi decoctum, aut cichorij, & radicle chamedryos. Ruptione autem facta a qua mulsa, & que ad ulceratos rhones restata sunt. forissecus emplastrum Mnaseæ, & reliqua mollitoria, & locum imponantur, aut quod ex salicibus constat. At si in scirrhum induratum est hepatem, modica curationis spes est, ad aquam in se curat affectione transibentem, atque ad mollitoria ammiscenda sunt, ammoniacum, bdellium, medul-

Et uenarum
dilationem

Lupi hepar

Hepatis infla
tio

Cyprian mar
tium

Hepatis
necrosis

la, & adipex, & quæ his parem vim habent. Bibenda uero dantur quæ ab oburatione liberant & exurgunt ipsum uiscus, uelut est pipen, urinæ cispia, & calculos auerentia, cum his quæ paulbante ad hepatis oburationem relata sunt, ciborum quoq; esu conuenienter exhibito.

De male habitis. Cap. XLVII.

Malum habitus

PRincipium affectionis hydropicorum malum habitum uocare consueuimus. Curare uero ipsum oportet uenæ sectione, si nihil prohibeat, partitæ sanguinis detractio, ad tertium usq; ac quartum diem faciendo detractio. Eius cuandi autem maxime sunt qui ob hæmorrhoidum, aut mensium purgationis suppressionem, in affectionem collapsi sunt; quemadmodum qui ob plenitudinem humorum, à uenæ sectione abstinere debent, omnino autem purgandi sunt per hieram ex colocynthide. Vicius tenuis sit & rebus cæcioribus. Et naturalium aquarum usus assumant, aluminosarum ac nitrosarum magis deinde sulphurentarum. Reliquum uero balneum ex longioribus intervallis assumant, & uariis modis se exercerent, maxime per saltalipras, unctionis doctos medicos postea uero etiam ueratro utantur. Mirifice ipsa prodest & absinthij prepotantia, & sinapismi, & dropaces. Si uero ad hydropem affectio delabatur, ad hydropicorum curationem deducatur, iuxta modum qui referetur.

De aqua inter uentem. Cap. XLVIII.

Aqua inter uentem

Hypoxe uehementer perfrigerato, quandoq; primaria affectione, aut inflammato, aut in scirrhum indurato, aut alio quoptam modo affecto quandoq; per contensum cum alijs partibus, sanguificationis successus non contingit, & uocatur affectio Aqua interens. In qua aliquando flatus copia cum paucissima humiditate coæternatur, inter uentris partem appellatam, ac intestina, ad eum si uerbetur superior uenter, insit tympantisonum edat. Vnde etiam tympanites hydrops uocatur, confusus ab inflatione circa stomachum, & uentrem, & colon, & à febribus diuturnis; quandoq; uero et à duricia peritonæi membranz, aut ueteri in uulnibus, aut scirrhi indurati. Aliquando uero uisceris humoris copia cum paucissimo flatu, in si idem locis coæternatur, uelut in utro quodam comprehensa. Vnde affectio Asches hydrops nominatur, confusus & ipse ex relictis causis plerumq; uero à duricia & scirrbo, circa splenem & hepar, & à diuturnia circa intestina fluxionibus, in quibus uentrem in tumorem denari contingit, reliquam autem corpus alimendum non sentiens consistit. Quandoq; uero etiam per totam corporis molem frigidior ac pituitosior sanguis continetur, qui interdum ab hepate talis affertur, interdum etiam omni corporis carne uelut exaquescente generatur, ad eum ubi ac pituitosum appareat corpus, mortuo simile, & uocatur Lencophlegmatias, hydrops sub carne, aut intercus, confusus à longis febribus, & malo stomachi habito, & diuturnis hæmorrhoidibus suppressis, & à luxu muliebri, & spirandi difficultate, & uigilæ præter rationem obortis, & ab alijs his similibus causis. Curantes igitur ipsos in communi quidem ab euacuatione indium facimus. Vt tum in asche ac tympanite, per medicamentorum aquam ducentium exhibito nem. In intercute uero, per uenæ sectionē, maxime si ob hæmorrhoidū aut mensium purgationis suppressionē constata fuerit affectio, ac si dum in malo habitu consistant fuerint uenæ sectionem præmiserint. Et tunc igitur uelut in malo corporis habitu euacuationem parari oportet. Deinde bubulū bouis augmentari stercus siccum exacte tritam. In posca aut ac eto nullo coquito, & sulphuris quartæ parte inspersa, toti uentris capacitati imposita. Aut exprimam stercus, in urina pueri aut capræ, ad stringenti ipsius radice redactum impone. Hæc per uentrem humis ipsos purgant. Quin & ex fermento et iaplanina, & ex caricis, & calce, & nitro, & iude, & nasturtio, & sulphure uiuo, & ammoniaco, laurij bacis ac staphide syluestri, & syluestrium columbarum stercore, aut omnibus aut quib; uisum ex his assum

Tympanites

Asches

Lencophlegmatias

ptis, cum

A pis, cum aceto mulso utendum est. post hæc epithema spongiola appella-
tum, ex caprino stercore, misceat humiditatem euacuat, tum per oblituros
meatus, tum per uretrem, posita uero resiccantia emplastra imponantur, ad
quod ex salicibus conficit, iussu, confectis, ex hæc is lauriz aut epithema po-
lyarchium, aut ex semibus. Sed & hoc mstrum in modum efficax est. Ex
profundo enim abripit humiditatem. Lapidis pyritæ drach. xii. sulphu-
ris uini drach. xii. ammoniaci dyosmatis drach. xii. cumini drac. xvi
niri drach. xii. Excipe modice cera ac terebinthina, & pelli indocla per to-
tum uentrem impone. Prohibenda uero ipsa denur sambuci radix in uino
cocta. Aut cum merem syluestrem in uino austero maceratum ad triduum
dato, ita ut de uino cyathum unum bebat, additione quotidie facta usq. ad
opathos iii. Multæ uero mixturæ hoc est. Balsami, nardi, casie, cumini, gly-
cyrridis, hyperici, iunci rotundi odorati, asari, dauci, amomi, sinapi, per-
trolesini, calami aromatici, piperis, fescis, spondyli, singulorum æquales
partes, facit & unumquodq. ex his per se. Similiter etiam omnia urinam cl-
entia. Circa grauitatem uero urinam ceteris illa affata cum melle trita, & uer-
lut eclegma delingenda exhibita. Potest etiam aqua quæ bibitur in coquit.
Bonum est & hoc. Interne scilicet panis lib. ii. in uini austeri sextarius iii.
ad tertias coquito, & de uino bibendum dato quotidie, initio h. m. x. ro. sa-
cto usq. ad anctum usum. Opunum est & hoc ad ciendam urinam. Aliud
nus liquidum magnitudinis fabe aqua dilato, & per linteum excolato, & ad
triduum, aut alternis diebus bibendum dato. Conuenit etiam hæc pica ex
aceto mulso, & antidotus Theodorici, & ex amaris amygdalis passillus.
Ceterum aquæ ducentis plura sunt, experimento uero cognata hæc. Gra-
ma cinidia xl. aut l. aut lathyridis xx. uel xxx. Aut euphorbiæ silique
v. aut vii. Aut squamæ uris drach. ii. aut iii. Excipiuntur micis panis, &
incatapota efformantur. Aut corticis radicis sambuci succus ponis cum
condito. Aut salicis chamædæ, & squamæ uris, & anis, singulorum par-
tes partes dato ex aqua, ab initio quidem drach. i. interpolito aut em inter-
uallo etiam ii. & plures. Sed & hæc catapota admiranda sunt. Aloë, eu-
phorbiæ, grani enidi, singulorum unc. i. Rhei unc. s. excipe brassicæ succo,
& catapota efforma. Dato de his siliquas vii. aut ix. Quin & antidotus
ex charophyllo misceat aquam ducit. Sed & ut uinum aquam ducentis
demonstrandum est. Est autem optimum hoc. Sessle quadrantem, seminis
api, caparis radicis corticis, piperis, singulorum drach. iiii. grani enidi
decorant drach. i. selsi malabathri pilulas ii. Vini opimæ heminas xii.
mellis crudi lib. vi. comusa ac eribata uino macerantur, scissa uero simul
contestuntur. Danur huiusmodi. At post humore euacuationem etiam
theriaca utendum est. Babadi quosq. stercoreis uisi cochlearij mensura, quo-
tidie ex uino pota magnopere prodest. Infusis etiam per chlyserem utendū
est, nisi alius sua sponte liquida egerit. Tunc enim magis resiccare ipsam
contenit. Porro in mulieribus hydropicis etiam pello hoc substitutio ad
uuluum utendū est. Anisi, cardamomi, cumini, niri, aristolochia, fornigre,
cispulegii, flicum internæ partis, singulorum partes portiones, salino ex ce-
pta apponantur. post hæc etiam naturalibus balneis utendum est persequen-
ter, & arena ingestatione, ab aliquo balneis abstinere. Si uis uacare,
in balneo utitur in personabus ex nitro, sale, sinapi, calce, ac similibus. At
que hæc quidem etiam circa balneum commoda sunt, si licca cum oleo uen-
tri affricentur. At in hydropicis subter cutē etiam alijs partibus se exerceant,
quantum eius fieri potest, & sicca frictione in sole utantur. Sed & reliquis
uicibus siccior affumatur. Sallimenta igitur edant, & sinapi, & allium, & ex
uolueribus syluestres ac siccas. Et ex oleis abspatigum, gingidum, por-
rum, sinapi, eucalidæ, & reliquis syluestribus. Et salem theriacum aut sambu-
chi obsoletis adspargant. Vinosq. utantur, ueteri, tenui, urinam ciencer & si
adfix, mari mixto, ita ut ab omni largiore potu abstineant, & ab aqua in totum

spongiola
epithema

Aquam du-
centis

Tollit mulieribus
dini pilule

Resiccantia
substantia

Arena in
gylis

tum. Si uero cū febre consistat hydrops, ab omnibus calidioribus & acrioribus edulsi ac auxilij abstinentum est. Verum mixtum his utendum, aduersus id quod largier insilando. Ceterum in tympanite hydrops, & purgatoria, & quae totum corpus colligunt tollantur, & quae efficacius urinae ciunt. Quae uero flatus attenuare ac discotere possunt, intrinsecus ac extrinsecus utenda duntur. Et cucurbitae leues affidae toti uentri affigantur. Qui uero hydropem asciens habens, si non relaxis cesserit auxilij, ad perperutionem deducatur, quae nulli alij hydropi conuenit.

De splene. Cap. XLIX.

Splenis morbi

Splenis morbi

Splenis morbi
in exsiccationeSplenis morbi
in exsiccatione

QUum splenē ab hepate trahere solet strabiliarium humorem, qui uelut sanguinis lex existit, si quidem attractora huius nris debilis fuerit, aut obturatus meatus, per quē prius illum traxit, splenis niger confusus, dum sanguis impurus per totum corpus fertur. Verū si quidem grauitas, aut distensio facit circa splenem, aut etiam dolor, obturatio indicatur. Si uero nihil horum, attractorē facultatis debilitas. Vominus autem atrahit bilis, absq; febre & alia malignitate contingens, retentioem splenis facultatem debile esse indicat. Expulsorij uero ipsius facultatis debilitas, inapparentiū inducens, dum non amplius strabiliarium recrementum ad os uentris afferunt, appetentiaq; excitat. Quod si strabiliaris humor in ipso splene obturatus, primum quidem inflammatio huius sit, quam & ferror, & dolor, & sensio indicat, postea uero etiam in scirrhū induratus, ubi feruor quidem ac dolor cessauit, manet autem tumor ac duricia. His igitur & os graueolens sit, & gingivae corroduntur, & ulcera in eruntibus absq; cicatrice manent. In quibus hepate co affectio, uelut diximus, hydrops obocit. Intemperies itaq; ipsius similiter uelut hepatis curabimus. Inflammatione uero praesente, uel na de sinistro cubito secetur, aut circa summam manum, eo quod ex longiore distantia reuulsio fiat, aut etiam ob naturalem quandam cognationem. Deinde imponantur cataplasmata attenuantia citra manifestam caliditatem, ita ut etiam nōc aliqua adstringentia ammiscramus. Talis autem est ex sua natura salisbos appellatus. Est & hoc cataplasma admirandum. Foenigræ cū mientem, farinæ ordeacea, nasturtij, singulorum unciam i. sicum pinguum lib. i. herbae uerbenaē siccat unc. i. sicus a ceto acerrimo mactrare oportet, & cum alijs prius contulis coquere, & postea rursus coquere. Aut stercore caprinum cum cruda ordeacea farina in posca coctū imponito. Habet autem si uoles, etiam salis florem. Vbi uero prius cypreino cum aceto medico foueris, utere malagmais primū simplicioribus, quale est hoc. Ceræ sesquialbram, adipis taurini lib. i. nitri quadrantem, terchindinæ, sentenis uiscis, corticis radicis capparis, singulorum quincentem, coctis quae si quari possunt sicca in spergito. Sed & Nili malagma optimum est. Si uero inflammatio in scirrhū delabatur, fortioribus utendum est, ut etiam cutē lacerent, quale est quod ex stercore caprino paratur, & Cinnamon, & Marcharionis, & Tonforis, & quod ex lauri bacca confiat, & quod ex salicibus. Hoc uero etiam ipse cum successu expertus sūm. Auripigmenti sextantem, sandarachæ sextantem, cere, terchindinæ, singulorum lib. i. picis licet ex lib. i. galbani unc. i. opoponacis unc. i. corticis radicis capparis, myrobali, singulorum trientem, ammoniaci thymiamatis sexuncem, nardini aut cypriini quadrantem. Sed & ammoniacum cum aceto illius spleni serpe productū. Item q; ponam scmpulorum iij. aut iiii. pondere, cum cassiorij scmpulo i. in balnei solio, ubi caricas premaducant ac exsperunt. Aut ammoniaci partem i. cassiorij partem i. dato drach. i. Hæc etiam in scirrhū induratis proficiat, quemadmodū etiam capparis cortex aceto tritus ac impositus: quae etiam bibitur cum aceto aut aceto mulso, & crassos ac uiscosos humores euacuat: quātorq; uero etiam sanguinem. Salicis quoq; cortex similiter illinitur. Facit & cinis ex ossibus salubri, cum cruda ordeacea farina impositus ex aceto mulso. Ecentaurij succus facinleus impositus, &

potus.

A pōnei. Et supānerum amarorum decoctum, cum ruta & pīpere posant, & fa-
rina spōrum pro cataplasmate imposita. Et aqua in qua sepe ferrum extin-
ctum est, febricitantibus per se data cyathorum III. mensura, nō febricitantibus
cum uini & acetis cyath. I. Aut runcicis syluestris radicis cum scilla obol.
III. Aut chamædrys anulepissi a cerabulum, omnia cum aceto, aut aceto
bibendos dato. Aut acetum scilliticum, aut acetum mullum. Composita ue-
ro hæc. Radicis panicis, ammoniaci thymiamatis, corticis radicis cappa-
ris, herbe laniata, scille assæq; inferat partis, singulorum æquas portiones
permisce, & præbe drach. I. facit & ad anhelositas ac hydropicos. Aliud.
Myricæ fructus drach. I. III. piperis drach. III. spicæ nardi drach. II. ammo-
niaci thymiamatis drachmas II. tere cum aceto scillitico, & præbe drach.
I. eam unam ex aceto mullō.

Ad ulcerationē splenis.

Cyclamini drach. XX. bryoniæ drach. III. dictamni drach. II. scille assæ
drach. VII. herbe laniatæ drach. VI. radicis capparis drach. VI. Dato
dē his pastillum tritum obolatum cum aceto mullō. Quin & ex erica passil-
lus commodus est. Cibi horum sint attenuantes, acres, sicci, & præcillimus
potus. Exercitia item ac frictions, & sinapismi assumentur. Quandoque
etiam cucurbitæ cum scarificatione.

De morbo regis. Caput I.

MORBUS regis Icterus appellatur, diffusio est bilis in toto corpore con-
tingens, quandoq; acris, de qua in splenicis diximus, quandoq; figur.
Differre uero horum plures sunt, quosum causæ & designationes hæ sunt.
Si enim ex febtili morbo acerratum obortus regis morbus sedauerit fe-
bris, indicatorius est, materia ex profundo extrinsecus translata consilens,
neq; medicamentis opus habens, sed ex bilis, ac mox de causa fritione cito
decedens. Si uero cum febre fiat, & biliosis egestionibus, & grauitas sit cir-
ca dextrum præcordium, inflammatio feruens indicatur ipsius hepatis, ob
quam bilis feces sanguis per totum corpus ferat. Si autem citra grauitatem
feruat in ipso, ob solam calidam intemperiem hepatis, affectio collatur.
Si uero citra febre sit, inteq; albe alui egestionibus, uelice bilem suscipien-
tis affectio indicatur, aut mentibus ipsam obturatis, siquidem grauitas est
circa dextrum præcordium: aut absq; hac, uiribus suis debilitatis, siue ania-
doria eius qui ex hepate trahit, siue expulsores eius qui ad intestina expel-
lit. Dum enim non purgatur sanguis biliosus, in totum corpus distribuitur,
quem alio modo in nigro ictero diximus. Scdm autem hūc etiam uirum bi-
liosisime abunde colorate prodeant. Fit etiam icterus ob intemperie car-
lidam solidorum corporum, dum in bilem mutantur ea quæ alimentis ratio-
ne ad ipsa deferuntur, quemadmodum in hydropse subter cutem consilente,
ad pētiosam humiditatem transmutatio fit. Talis autē morbus regis
cognoscitur ex eo quod non acerratum, sed particulas fixas, nullo relaxorū
præsentæ. Quin & ex uenendi medicamenti pota, & propter uenenam ex-
trinsecus ex aliquo uenenum circulanter allata, morbus regis consistat.
Calide igitur hepatis intemperie, & inflammationis ipsius, & facultatum
debilitatis curationem, antes introductio de ipso recensita, quæ collā
citra permutationem huc transferenda est, ut ne eadem sepe dicamus. Ob-
turans autem uelice bilem suscipientis meatibus utriq; a ut a ltero solo, ue-
ni fecerit in cubito dextero. Quibus uero & in his, & in illis qui ob inflā-
mationem hepatis morbum regis contraxerunt, uenam prope parui di-
gitum dextere manus fecerit. Cataplasmati autem inflammationem acen-
ribus utendum est, & ipsi per hieram purgandi sunt. Commodi sunt etiam
clysteres perhibendum uero detur morbo regio affecta, apij, auradiani,
aut runcici, aut serpilli ad tertias decoctorū decoctum. Aut ablinchium po-
ui inspergatur. Summæ uero faciunt succi raphani cyath. I. cō uini cyath.

1. pot. Itemq; sacci cichorii cyathi 11. aut 111. per se, & cum uino. Verū ob hepatis inflammationem iſtericiū unum muſum bibendam poſce, aut decoctum ariſtoloſochie tenuis, aut hyperici, aut adiantū, aut herbe ſamaritę, aut rubiſtinctionum. Autrameni cornu ceruini dra chinam unam cum uino. Aut paſſinacem in uino ad tertias coctū decoctū. Aut ſulphuris uiui drach. 1. in ouis ſorbeatur. Hæc etiam ob obſurationē iſtericiſ magnifice profunt. Seminis autem triſpliciſ ſerupuli v 111. cum chryſotheo aut alio paſſo, in balnei ſolito poti, ſufficientem euacuationem faciunt. Recte etiam plera da tur, & atrida, & ex aceto muſſo conſians, & Theodoretus antidotus, & ex amaris amygdaliſ paſſillus. Dato etiam cinamomi quantum tribus digitis præterendi potiſ, in uini muſſi cyath. 1. aut aqua temperata. Aut myrrhæ magnitudinem fabæ, cum pipēris granis 7. pariſq; cinamomo. Qui uero ob calidam ſolidorum corporum intemperiem iſterici ſunt, ſimplicibus friſtioniſ bus, & exercitijs moderatis, & unctiōe, & balneis utantur, & humectante ac moderate frigefaciēte uictu, piſſam & ſucco, ſicybiſ, ſtridē, cichorijs, piſſo ſibiſq; æ uino tenui aquoſo. Cæterum de hiſ qui ex ueneni potu, aut ob uenenum etiā colantiam in orſum, ad hanc affectionem deuenierunt, ſiſeo v. dicetur. Potēd hile circa oculos & faciem recepta, elaterij cui magnitudinem cum laſſe muliebri inſilla in naſum in balneo, & ſtrapim in ſolium de-
mitte, ac præcipe ne caput mergat, & poſt balneum reſectorio uictu dato, ruſus in nares inſunde in ſole. Facit & cyclamini ſuccus, & marubij, & melanthij. Sed & acetum acerrimum naribus atrahe dum ſed et in ſolio, & præſumpt naris comprimat, & miſſicet euacua bēat.

Draculidiprolapſa. Cap. L1

Cauſam & chirurgicam curationem umbilici promittetis, in chirurgiæ tractatu dicemus. Quandoquidem uere & per medicamentorum uſum quidam ad naturalem ſtatum reuerſi ſunt, de hoc hile dicendum eſt. Alumi-
nis ſciſſi drach. 7. ſecis uiui rhodij drach. X. gallarum omphacinarū drach. 11. uino diluta, & ad mellis ſpiſſitudinē redacta impone, ſonſerſeq; ſpon-
giolam poſſeſ imbutam ſuperadde, & ſacſia deliga. Aliud. Cori cum ſar-
bae ſicſe, gallarum, baſaulij, ſingulorum æquales partes in aqua coquito. Vbi uero diſſoluta fuerint, diligenter tria imponito, cum ſpongia quem-
admodum diſſum eſt. Aliud. Ramenij plumbi drach. Xv 1. elcutie, man-
ar churia, ceruſiæ, ſac ci hypoeſſi hile, ſingulorum drachnam unam, uino diſſolutis ureſ quemadmodum dictum eſt.

*Quando quē ſepale æ interſia diſa perueniat, æ de pedandona æ teſſian co-
ſidia, æ ſuad pſſidra. Caput L11*

Cimolix terre & ceruſſi æquales partes hyoſcyami ſacco excipe, ut ſin-
gumentidam ſpiſſitudinem habeant, deinde oleo lentificino quantum ſa-
tis eſt addito con cute, ac ure. Aliud. Cicute ſacum, & ſolani, hyoſ-
ſeyami, lupini ſoligum generimorum, & pſyllij, ſingulorum partes portio-
nes terito æ minor, ubi prius deterſeris æ laueris. Oportet autem prius ali-
quot diebus a quam ſibere.

Pſſidra pſſidra

Aſellorum domoſticorum qui in globulum ſe conſoluunt drach. 11. ſan-
dara chæ drach. 1111. calcis uiuæ drach. VIII. aceti ueteris cyath. 1. lixuij ſu-
culnei cyath. 1. coquito in olla, & utere in balneo. Aliud. Calcis uiuæ
partes 11. auripigmenti partes 11. cimolix partiē unam, coctis in aqua ureſ
uelut dictum eſt. Aliud ſimplex & ſine odore. Calcs uiuæ ſecur. 1. ſanda-
rachæ unc. 1. coquito uelut dictum eſt, ac ure. Cæterum depilatoria in-
ter oculorum morbos relata habentur.

De Hermaſpouda. Caput L111

QUæ ex pectore et membranis ruptione ſunt inſeſionum deſapſiones,
ualde graues ſunt. Quæ uero ob rarefactionem, facilius curantur, pue-
rit magis uelut humidioribus contingentes: & multi ſanē ex hiſ cetera chi-
rurgiam

*A*urgiam, & per medicamenta quae imponantur. & per convenientem dietam rationem curari sunt. Videndum autem est subſcripſiſſis compoſitionibus, ubi hoc ſolum addiderimus, affeſſiones has ſolo loco diſſerre. Quam enim adhuc ſuperne circa inguen, in teſtium manet, habet noceſſe, hoc eſt inguinis ram ex ſua hermia appellatur. Vbi uero ad ſcrotum tam deſcendit eſt, enterocelis, hoc eſt in teſtibus orbi ramex nominatur. Proinde malicorij drach. x. gallicae omphacis drach. 7. in uini aſſueti cyath. iiii. coquito, triſtaq; preſcriſſo ac retruſo in teſtibus impoſito, ubi frigida aqua prius perluſeris. Erper dies decem ſoluſto, ita ut in lecto maneat. Ager ad dies triginta, & cupreſſi decoctam cum uino bibat. Aut pilularum cupreſſi oboli. i. in uino diluto. Hoc medicamen tam in puero efficitur eſt.

*Balanocele
Ectroccele*

*A*liud agglutinatorium. Radicis ſymphyti, ſucci mærubij, amygdalarum amararum, gummi ſingulorum pares portiones. Aliud. Percebin thia. unc. i. ceræ, thuris, myrris, glutinis piſcium, cochlearij unâ cum terſa ſingulorum unc. i. gluten ad triduum a ceto præmacerate. Aliud. Cupreſſi pilularum unc. i. gallarum unc. i. malicorij unc. s. glutinis quod remanet, manne thuris unc. i. ſymphyti unc. s. cochlearum unâ cum teſtis unc. i. pilulas & malicorium uino adſtringente diu coquito ac terito, & reliqua ammiſceto, & exceptis uitior. Aliud. Albis, malicorij, thuris, ſucci hypoſiffidulis, glutinis ſabellis, picis, bituminis ſingulorum unc. i. s. uini dulcis, quod ſatis eſt. Aliud uariogentia, facit & ad perfectiſſe ætatis homines, malo non diuturno. Cryſocollæ, glutinis, aurini, ſarcocollæ, glutinis piſcium, lapidis gagatis, lapidis hæmantis, rhodis ſyriaci corlaſi, acaci æſingulorum unc. i. s. lapidis pyritæ, ſulphuris ignem nō experti, magnetis ſpirantus, aluminis caſſi, manne, thuris, ſingulorum unc. i. picis brutæ quincunx, cochlearum unâ cum teſtis unc. i. recrementis argenti orientem, gallarum unc. i. liquore ſpongæ matris ferri unc. i. aris unc. i. bituminis ſexuncæ, olei myrris quod ſatis eſt. Vino adſtringente ſicca exceptis, & minus non inquinante uitior. Quod ſi decumbere non ſuſtineant, triangulari craſſiore legamento, quod in teſtibus a diſtingere poteſt, ſecure deligato. Abſtineat à ſuſtineſſis cibis, & uſu largiore, & aſſiduis balneis, & in cæpo motus, uelut eſt curſus, ſolatio, ac exercitio, & ſimilia.

*Aggenſia
Tors*

*A*d hydrocelem, hoc eſt a quoſum ram ſcem, ut ham of eua cœuat. Piperis grana c. ſaccas lauri lxx. x. mini drach. xx. ceræ drach. xli. olei hominū diſſoluſto, exceptis utere. Aliud optimū. Floris lapidis aſij drach. vi. unæ paſſæ uinæ celis exceptis ſextanteem, cumini æthiopici drach. vii. niri rubri drach. vii. l. trita impoſito, ſomno mane ac tieſpeti adhibito. Quodam eodem ſulphuris drach. vii. addent. Aliud. Calcem uſuam ſingulo uento exceptam, cum cerato impoſe, & panum natri ad calcem ammiſce. Aliud. Braſſicæ radices urito, & cinerem adipe porcino ueteri aliquanto excipito. Soluſto autem per tertium diem. Quo uero non curſus talde multa ſarhumoris collectio, hoc malagmate utere. Cerę lib. i. s. picis orientem, ammoniaci thymiam uſu nentē, aluminis liquidi unc. i. s. facit etiam emplaſtrum ex populo nigra, & reliqua atra ſtoria.

*Balanæ aquila
ſu*

De quibus inflammationibus, ſuntq; ſortis, & de diſſeſſione affeſſionibus.

ha. Caput I. III.

*S*cruti inflammatio cognoscitur ex eo quodd circa primum manus contactum dolens, & quodd feruor ac duricia intentis appareant. Teſte uero inflammato, neq; ad leuem contactum dolent, ſed digitis ſanſtentiſſis & rubor, & duricia, circa ſuperficiem minus apparet. Si uero quis digitus inſiſtatur, duricia in profundo occurrat. & febris aliquando oboritur. Propate igitur teſtibus inflammatis conuulſit uenæ ſectio circa malleolum. In comu ni uero omnibus cataplaſmata & cerata. Cataplaſma itaq; imponēdum eſt ex ſabacea ſarima cocta in uino diluto, cum uſis paſſis pinguiſſis uinæ celis exceptis. Aut cum inſum, aut a ſphodeli radicem coctam ac tritam, ac parē

*Scroti inflama
tione
Trifurcata
Inflammatio*

l + polentæ

polente pollinem ammisceto ac imposito. Aut lini semen in uino diluta. ^A
 Aut fenum graecum in aqua multa. Aut lilij radicem in aqua multa. Aut se-
 cem uini recentem cum polline polenter. Aut senecionem & coriandrum
 uiride, cum uinis passis unacels exempta. Si uero multos sit seruos, folia
 hyoscyami cum triticea aut cicerum farina imposito, aut harundinis folia.
 Aut cucurbitam eradam. Si uero diuturna est affectio cum duricia, cucu-
 meris syluestris radicem coctam in aqua multa, & cum farina liliacea trita
 imposito. Sed & hoc bonum est auxilium. Vuarum passiarum exemptis ui-
 nae res quin cunctem, cicerum serusaccharum unc. 12. cumini unc. 1. sulphu-
 ris dodransem, nitri unc. 1. resina quadrantem & semina clam, terito omnia
 cum melle, & pro cataplasmate utitor. Cerata uero hae faciunt. Olei cyathi
 1. colophonis sexuncem, plumbaginis, cumuli, utrarum passiarum, farinae
 fabaceae singulorum tridentem, cere sextantem, plumbaginem cum oleo co-
 qui ad aliquam compagem, deinde ceram & resinam adiecto, & ablata
 ab igne semisrighesacta, ad uinas passas trinas, & ad farinas affundito. Aliud.
 Olei anethini & rosacei, cere, resinae pinas, singulorum quincuncem, cami-
 ni sextantem & semoniam, stercoris albidini unc. 12. Cuminum cum ste-
 core alينو terito, & ceram frigesactam ammisceto ac conterito simul,
 deinde lino exemptis utitor, sanam superimponas. Aut oleo omphaclo-
 no, aut butyro & resina, aequalibus portionibus utitor. Si uero ex sudori-
 bus ulcera in scortis fiant, gallam tritam aut alumen, planguedini & felli ha-
 cino insperge, ac obline. Auero ad testis feruido ulcere infestatos, ubi ci-
 moliam terram cum aqua prius illensili, siccati permittito, & abluitione est
 calida aqua facta, myrtum socam, & myrtui parum, terito ac imposito. Eg-
 serum carinum in testibus excrecentias, cinis formicarius cum nitro & a-
 qua subactis, impositus sanat. Si uero pruritus circa scrotum est, nitrum,
 frigidum sphaesitrem, alumen liquidum, aceto & rosaceo mita in balneo il-
 line. post balneum uero, ovi candidum cum melle illine.

De seminis profluuiis, & rursus in semine effluuiis. Cap. LV.

Seminis profluuium in uoluntaria est excretio assidue contingens, clara
 profluendi sentigens, propter retentis facultatis debilitate. In qua com-
 uenit in quate affirmare, ita ut humbos, ita pubem sana conuoluta integram,
 uino & melino oleo, aut censurino insuta. Consequenter aut cataplasma
 imponatur ex palmulis, malis, cenanthe, acacia, hypocistide & rhois, ac si-
 milibus. Infundant autem lentisci & rubi, ac similia decoctis in uino, aut
 etiam aqua. Cibis uero utantur resecantioribus. Post prima uero tempora ad
 exercitium deducantur, per quod & totum corpus, & affectae partes ad ro-
 bur deducantur. Ceterum ad seminis redandam uitam facienda, sufficien-
 ter reserua sunt libro primo in uenda sanis tractatione. Vbi etiam de his
 qui conire non possunt scriptum est. Verum ad seminis in semine effluuios
 profuerit ipsis est maleclus frigidior, & decubitus in dextram aut sinistram
 laus, & quaecumque medicamenta frigida lumbis subliniunt, qualia sunt, co-
 rriandrum, cicutia, cerusa, portulaca, omnia cum aceto.

De semine. Caput LVI.

Semine est palpitatio pudendi, ad inflammationem quandam uisorum
 seminationum affectionem consequens, cum sentigens & si non desinat
 palpitatio, ad uisorum seminalium resolutionem, aut corruptionem delabi
 solet, & pereant cerebrae conuulsi, morientes autem a uentre inflantur, & si
 gidum sudorem excludant. Coniungit autem hic morbus, sed raro etiam mu-
 lieribus. Vena igitur statim secanda est, & uisus tenuis ac sine uino con-
 nuendus, & quotidie quidem alius mollienda est, uehementer nunquam,
 sed placide ac leniter. Optima igitur est beta, & mala, & mercurialis pa-
 rum, & concharum sulculum. Non malum est etiam inspiciebat elytherem
 adhibere. Verum urinas eientes, medicinas uitentia. Lumbis autem frigida
 eientia adhibeantur, melus est solani succus, aut portulaca, aut hyoscyami,

aut

A aut elenta. Necessè est etiam colem, & ani ac scortū intercapedinem, ex ali quo mitigante frigefactorio illinere, velut argenti spuma, terra cimolia, cer rusa, aceto diluta, aut aqua, utruino dulci, aut sapa. Decubitus sopinus no xius est. Bibat autem nymphæ radicem, & iridem, & adiannum. Ruta asit & seminis profusio, & Syrtiæ labarum prodest. Cibis deur framena: ceus medicas, & sit premantur. Si vero per se eret affectio, cucurbitæ affi gantur cum scarificatione. Et si plenitudo adsit, etiam per hirudines euacuatio fiat. Venter autem cruda osedeacea farina inægatur.

De prolapso. Cap. LVII.

PRoapismus est actio pudendi perseverans, in longum ac circum in te mescentis, citra rei generis appetentiam. Est autē stansosus species qui membrum tumefactū, ex humoribus viscoso ac crassis per moderate calidi tate generatur. Manifestum igitur est quod partes calefacere non oportet, sed leniter frigefacere, ceruo rosaceo cum aqua conquisitatos & per chamæ melinum ceruam pudendo ac limbis impositum. Vicius & medicamenta adhibeantur attenuantis facultatis, citra manifestam calefactionem. Adhi beantur etiam quæ manus hinc efficacia sunt, per experimentum comper ta. Nymphæ igitur etiam his hibenda denur, & citius semen, & rince aridis, obsoni misceant. Ab initio vero hoc ne deur, multū enim calefacit, sed postea post aliorum attenuantium usum. Si euacuatione utendum sit, per momias ea fiat. Nam per infernum ventrem contingentes, & per fluxionem concitant ad vicinas partes. Sed & exerceantur, & fractio assamant, ad fla tus discutiendos. Nulli ex rebus cōuenit coinas, præterquam in quibus ob hatus ablationem, semen redundare coniectamus.

De morborum genitalibus ieiuniis. Cap. LVIII.

QVid hanc affectionem habent, ad Venerem non stimulantur, & propter rea tristes sunt. Causa autem horum est, partium resolutio, aut senil itis inopia. Quam igitur semen generantia libro primo in sanitatis tuende tractatione relata sint, sumq; quæ ad eorum stimulent secundum simplici facultatem, nunc fortiora apponenda sunt. Communiter igitur acopis ad resolutionem commodi, etiam hic utendum est. Priuatim vero stillationem usum tenito. deinde addito oleo dextri pedis magnum digitum illinito ac coito. Si vero cessare uoles, digitum abluito. Sed & ex stillationibus multæ mixturæ ut dicentium efficax est. Præbendum uero denur tenebrine elenta, velut est primum hoc. Piperis, nucleorum nucis pinæ, petroselin i, ramenti pudendi ceruini, cerebintianæ, singulorum æquales partes excipe melle. Aliud. Cicerum crudorum, nucleorum nucis pinæ, singulorū sextantem, erucae, piperis, singulorum unc. j. excipe melle. dato drach. ii. cum uino. Sed & Syrtiaca appellata multiplex compositio conueniet, & quæ his similia sunt. Considerare uero oportet etiam alias affectionis cau sas, & correctionem ipsa conuenientem adhibere.

De ulcerum a seculo afflictione. Cap. LIX.

VLcera in pudendis & circa sedem, si sunt citra inflammationem, ualde siccanibus opus habent medicamentis, qualia sunt id quod ex charta uita constat, & anethum usum siccum, & cucurbita uita. Non humidis au tem & recitibus ulceribus, etiam aloë bonum pharmaci est, sicca in pul uillam redacta inspersa. præ omnibus uero dolorem eximit, & nullo minus efficax est pompholyx. Si uero humidiora fuerint ulcera, pinus cortex per se, & lapis hyematis. Si autem & profunditas aliqua ipsis affuerit, ad rela ta manna thuris ammiscenda est. At si no me depalcendo proserpas, lentica la imponatur cum malicorio. Viendam etiam emplastro coraco ex aceto mullo appellato, & pastillo lithyæ, & qui ex charta consurgit. Rimas autem in pudendis ac sede sunt resina fricta cum rosaceo trita, ut si rigementia crassitudo fiat, ammixto etiam ouis utello, & opio. Aut foliorū hedere sic conamulorum cinis tritus cum rosaceo in plumbeo mortario adhibeatur.

Pastilug.

Passillus quoque ex uino & oleo, & qui ex lapide phrygio paratur, ualde cō-
moda sunt medicamenta, & ad istas, & ad sordida circa coronam ulcera,
& maxime quum detrahere praeputium nō possunt. Aliud simplex, quod
etiam acrimonas obauddit. Cadmiae uisae ac lotae sextantem, foliorum ro-
saeum exungitum sexuncem, lices insperge, ablucens prius uino. Ad con-
dylomata uero facit hoc. Chelidonia, orisypi cerari, medullae geruinae, folio-
rum rubi, singulorum parae portiones cum cerato. Et passillus ex uino ac or-
leo similiter. Si uero in eole, intra pudendi foramen, in conspicuū ulcus fiat,
cognoscitur ex eo quod aut pus, aut sanguis exoritur, extra medietate. cur-
ratur autem primum quidem aqua mulla aquosa collum, deinde lacte po-
stea amixto etiam ad lac Asbere collyrio. Aut passillum album, aut eum
qui ex loco sit, in plumbae pila tritum immixto, aut etiam penna in eo tri-
ta illito. Deinde linamentum totum illius indito. Optimū est & quod
gallam recipit & pompholygem, amydam & aloē, aequis portionibus
trita cum rosaceo, & plantaginis succo.

Ad dolorem in pudendo.

Berynum & resinam pari modo liquata imposito. aut lini seminis succo
parae partes myrrhae & resinae tritae terito ac imposito.

Ad tumorem pudendum.

Vitis foliorum tenerorum drach. i. ceruae drach. 7. trita impone. Vite
etiam aquae marinae frigidae perulsione, & quiete, & colis deligatione.

*Tumor in pu-
dendo
Verruca
carnea*

Verrucas in pudendis, Thymos appellatus curat, & augeri rursus nō si-
nit cūta firmamentorum uino cum aceto impositum. Item cornicis salicis uili-
cinis. In summa uero, uerrae carum genera omnia, & thymus, & formicaria,
& quae quasi ex chorda pendet, per medicamenta quidem uolenter exule-
rantes auelluntur, per putrefaciētia uero ac erodentia mortificuntur. Pro-
prie uero facit claterium cum tale impositum, grossi cum aceto, nitro, & fa-
rina sic succis illitis. sinaridia caput salū uinum. prugo cum sulphure qd
uo ulla. Tithymalli succus illius. ocymī folia cum acramento fusoria. Her-
liotropij magni semen cum uino impositum.

Ad inflammationem ani.

*Asia, hem-
orrhoides*

Cerussae tridentem, pompholygis aut cadmiae tenerae unc. i. thuris unc. i.
seridis suc ei heminam unam. Omne postea in suc cam instillans donec con-
sumpsit fuerit. Deinde cerato facto ex cerue feruente, & rosacei lib. i. ubi
erantis ammisce, & fortiter emollito. Immixto autem per instillum entum
pars tractetur, & superius deligato facit etiam ad citius inflammationes, &
ad ulcerationes sedas, cum fenore aut mortu.

Ad ignem factum circa sedem.

*Ignis factus circa
sedem*

Emplastri ex succis lib. i. rosacei quod satis est, panis pari lib. i. croci un-
ciam i. opij unc. i. Crocus & opium macerantur passo, panis aqua. Deinde
de ad ipsa trita adijcitur emplastri ex succis, & rosaceum, & emollitur fa-
cit etiam ad calidissimas podagras. Aliud faciens etiam ad inflammationes
nemini. Censammino, & rosaceo, in plumbae pila, plumbae pistillo tri-
tum illine. Aut cerussam & oui candidum, & rosaceum in eadem pila, doe-
nec stringentium crassitudinem habeant trita illinito.

Ad fistulam.

Hyoscyami foliorum tenerorum, portulacae foliorum tenerorum, melica-
rum panis uino maceratum, uittellorum ouorum assatorum, singulorum pa-
res portiones, rosacei quod satis est, postquam fomentum adhibueris ad lo-
cum ex rosae ac melilotide cocto, cataplasma imposito. Aliud optimū.
Ad ani inflammationes, & extuberantias. Cerussae, spumae argenti, ammo-
niae thymiamantis, bellij, singulorum sexuncem, cerebithidinis unc. i. ceruae
unciae dimidium. Aut succo iolani hyoscyami, aut portulacae terito, quae
liquari possunt liquefacta ammisce & excipito, & rosaceo mollitis insti-
tor. Sed & emplastri Phucoryche appellatum, & quod ex plumbagine
paratur,

A paratur, & pallidus ex lotio, & ex balicacabo, & ex rosia, ad sedis inflammationes, inter clara sedis ac pudendorum medicamenta habentur.

Ad extuberantiam.

Si inflammatae sunt extuberantes, & relatis in communi utendum est, & priusquam hoc pallillo. Ceruse quadratam, pompholygis unc. i. spumae argenti sextantem, mastiche sesuncem. excipe hyoscyami succo. Si vero non sunt inflammatae, ulcio praeterea pilularum cupressi uisitarum cinerem asperge. Aut corticis cucurbitae siccae usti, aut ossium palmularum cinerem similiter. Aut cistariam uisitarum & fentuculi cinerem. Aut malipunicis foliis sicco, pari uino albo ammixto proleue ad dies septem. Verum ad callosas extuberantias, calcem & auripigmentum cum aceto acritrinita, in sole distillare bonum est.

De haemorrhoidibus.

Si haemorrhoides plus quam oportet euacuantur, corpori si habet aquosum fieri contingit, & ut praue cibos auferantur, periculum est etiam si larga sanguinis eruptio sit: quemadmodum etiam si penitus supprimatur, inde operosa est curatio. Quare cum plures sint haemorrhoides, unam relinquere oportet, purgationis gratia. Quaedam uero sunt quae in superiore parte non apparent, & propterea recte curantur. Circumetro nihil quidem excruciant, uerum magis dolorosae sunt. Ad has igitur cyclaminum succum illine, & aperiuntur. Ad eas uero quae immodice euacuantur, spuma Aegyptiae, semibuci foliorum, artemisia, singulorum quincuncem, sideritidis tridentem, in aquae hemleis VIIII. ad dimidiam coquo. Deinde herbas quidem reiectas, ad aquam autem siccam hoc ammixto. Melanchericum alumenis rotundi, singulorum drach. VIIII. spumae argenti drach. IIII. galle quadratam, misyos drach. II. sorcos drach. I. Soluto hoc sicco in decocto, septies in die irrigationem facito. Sequenti uero die similiter alia facta eiusdem ponderis praeparatione, similiter irrigationem facito. Et tertia die eodem modo. Si uero reliquiae aliquae manserint, quarta die per acum facta compunctione, si senserint, aut sanguinem fuderint, decoctum quidem similiter facito, de sicco uero dimidium ammixto. Vbi autem irrigasti, cum sicco contingito, quo exacte exarantur. Verum propter inflammationem panem imponito. Aliud. Panem parum in gero primario macerato, & in noua olla usum ac ritum imponito, abluens antea uino. Facit & ad extuberantiam. Aliud. Sorcos drach. II. chalcididis drach. I. misyos drach. I. atramenti fuscior drach. III. aluminis scissi drach. IX. aris usti drach. I. melanchericum drach. I. uasre sicco. Cibi uero sint in his quae nimium euacuantur, qui paucum sanguinem faciant ac minimum superfluitatis, siccantisq; ac adstringentes, qualis est lota alica ex posca, & oryza & chondria. Ex oleis myrba, cichorium, & portulaca. Ex uino adstringenti. At in excruciantis haemorrhoidibus conueniunt cibi his contrarii. Maxime autem colligina, & sepiarum, & polypodum, sopeduntisq; ac charitagineorum etis probe commodat. Haec enim sanguinem turbant. Sed & quae menses ducunt, has commoda existunt.

Ad prociatas aut.

Enicae fructus, gallatum, cerussa, acaciae, succi hypocistididis, corticis pinus, thuris, myrbae minnae, singulorum aequales partes, sicca asperge prius uino austro. Aliud. Recrementi plumbae, thois lyriaci, singulorum drach. VIIII. floris solarium drach. IIIII. myrbae minnae drach. II. utere uelut priore. Aliud. Corticis pinus, minnae thuris, spumae argenti, singulorum drach. VIIII. pilularum cupressi siccae, plum baggais, singulorum drach. II. utere uelut dictum est. Ex urina ipsius regi adhuc calida affusa prodest.

De utriusque fistulae, et prius et postea purgatione. Cap. LX.

PLerisque parcat mensium consingit circa decimum quartum annum. Pau-
cis citius circa decimum tertium, aut duodecimum. Non paucis autem tar-
dius quatuordecim annis. Tempus uero unicuique purgationi statutum non
est. Multae enim ad duos aut tres, plurimae ad quinque dies purgantur. Aliae
ad sex

*Extuberantia
dicitur*

*Haemorrhoides
dicitur*

*Cum proci-
as autem*

*Aut prius
autem
Myrba
austro*

*Utriusque
fistulae
dicitur
Statutum
tempus
gale*

ad septimam usque diem. Paucæ etiam ad duodecimum usque purgare solent. A
Desinunt autem purgari aliquæ circa quinquagesimum annum. Paucæ etiam
que ad sexagesimum. Quibusdam à trigésimo quinto anno, & maxime pinguibus, menses desinere coeperunt. Si igitur remoratur purgatio, circa præfixum tempus laxatio, & leuissimum, aut potum capitati præbibendum dato, cum pipere, & ruta simul coctis. Edas autem lolliginis, sepias, polypos, & quaecumque eius generis sunt peiuationem enim sanguinem turbant.

De mensium suppressione. Cap. LXXI

mensis
suppressione

SUpprimuntur mensium purgatio, aliquando toto corpore male affecto, aliquando ubi uetus spiritus propriam affectionem suscepit, propter loci frigiditatem, aut plagam, aut intemperiem ex natiuitate, aut ob acquisitam vexationem. Plerumque uero ex abortibus, & ob paucam aliquam principalem primariæ affectionem, uelut est hepar, aut uentriculus, aut thorax, aut eiusmodi quedam in diuturna affectione constituta. Suppressa uero multarum & diuturnarum affectionum causa fieri solet. Quum igitur ob aliquam uiscerum interanctorum affectionem primariam purgatio intercepta fuerit, aut moram traxerit, maxime operæ precium est primariæ affectionem partem curare, & post ipsam utri meminit. Notas autem illarum partium affectiones in superioribus tradidimus. ubi uero nihil illorum affuerit, manifestum est ipsum uterum primariæ affectionem esse. Si igitur non prohibet ætas, aut habitus corporis, aut aliud quiddam, uena secetur, non ante præfixit mensium tempus, sed prædicto iam dies decem adiciatur. detrahatur autem non plus duabus libris & dimidia, ne minus una, si sine uenam secuerimus: sin minus, hiera ex colocynthide purgetur. duabus drachmis datis in sex cyathis aquæ mulis. Febre uero præsentē hiera uti non expedit. Commodum autem est uenam secare in primis febrium diebus, post purgationem resicere ad paucos dies. In sequentibus autem exerceantur deambulationibus, strictioribus infernarum partium, & lauentur. Cibi conueniunt qui facile concoqui ac distribui possunt, & olera humida ac dulcia omnia. Ex piscibus peritrosi. Ex uolueribus teretiores. Lactis potus, dulciora ac meliora liba. Vinum uenue album, non ualde uetus. Ineptæ sunt carnes, & legumina, ex cepa pasana. Vbi uero propinquum est præfixit tempus, ex marinis denique charulagineis ac mollis, uelut dictum est, & testa interdia. Et potum capitati cum ruta & pipere coctum, & decoctum ipsorum bibant. Tunc quoque ligamentis infernas partes adstringant ad tres aut quatuor dies. Insuper autem præfixito tempore, ligamenta quidem tollantur. Præbiant autem myrrhæ obolus, aut fabæ magnitudinem. Aut castoreum ex passio, aut aqua mulis: aut artemisiæ decoctum, aut saluæ, post balneum ex passio & uino absinthite. Absinthites autem nimum per totam curationem præbiantur. Præterito autem tempore præfixito, & nulla, aut non memorabili purgatione facta, ad millecolum uena secetur, & repetita detractio fiat. post septimum uero aut octauum diem, purgatione ex hiera utatur. Et post quantum diem dropacæ adhibeat ad pedinem, lumbos, ac femora. Et ubi per triduum aquam bibis, cataplasma ex sinapi ac pane madefacto, partibus portionibus imponat, usque ad æquinoctii tempus. deinde lauet. Sequenti mense caricæ pro pane assumantur in decoctum. fenigræci, maluz, pulegi, rutæ & artemisiz. In sinum uero infundatur susinum, aut amaracinum, & pessus subdantem, neopharmacia, hunc uero quæ et cipit rebus appellatur, aut libanum uocamus. Cui autem pessus lana carpinata, & in rotunditatem ad digiti figuram redacta, in qua continentur medicamenta. Atque hæc curatio plurimis sufficit ad purgationem. Si uero fortioribus opus habuerit medicamenti, sunt hæc in dyspnea potum cum uino, cyperus, artemisiæ radix, casta, iunci rotundi odorati flos, nardus, radice helenij decoctum, myrrhæ fabæ græcæ magnitudo. Hæc cum passio bibuntur, in aquæ mulis cyathis dimidio. Et dictamni decocti cyathis. & ammoniacum, & sagapenum. Quæ uero si omachi minus

noxæ

Anoxe expolium habent, his & opopanax parum in pilulam coactum, & melle cocto tinctū dari potest. Quin & familiaria nobis semina mentis morire solent, sed minus, ut si est, benicolum, cuminum, apium, daucus creticus, scifeli, ammi, sinon, cicco, cedri bacca, & omnia urinam eienna. Apposita autem & subdita faciunt hec. Myrrha, absinthij, aut lupinorum decoctio trita, aut etiam rursus succo trita. Bellium eodem modo. Styrax item & oleo sylvestris gummi, cum rursus succo similiter. Aur aristolochia longa ad collyrij formam exculpata. Similiter etiam magni centaurei radix, aut uersari, aut scammoniae succus, & colo cynchidis medulla perle, & attenuata imposita cum ruta. Et galbanum fuffinum. Eisdem etiam lenius eiacere solent.

De mela purgatione utriusque sanguinis ex re-ruptione. Cap. LXXII.

Nimiae purgationes mulieribus sunt, quandoque dum menses augentur, & acutius sentiuntur: quandoque in partu perfecto, quae plerumque etiam sua sponte cessant. Frequenter autem & ex acrioribus vehementer sanguis erumpit, ut si sepe periculum incurrant. Primum igitur contrahendi sunt artus, ab alia & ab inquinibus. In pota uero danda est posca non si frigida, & posca quoque assumenda. Imponendaque locis leniter multae ex uino & oleo aut rosaceo, aut melino, aut myrteo expressa. Cibum denique chondrus lotus ex posca, aut oryza, aut alia, hydromelum quoque asplenium, aut omphacomeris, aut talium quiddam ipsi detur. Prebiantur autem balsulum in posca, aut hypocistidis aut acacie succum, aut lycium, aut sanam asiterem, aut unam acetham siccam, aut rheon, aut subitis ex Italico uase usti cinis. Aut scissum edant in posca maceratum donec mollescat. Apposita uero & in pudenda subdita sanguinis eruptiones siliunt, hypocistidis succus aut acacie, triti cum manna in aceto. Misticce uero amilianus spongia uino aut piceliquida imbuta ac apposita. Aut uisus ipsius cinis cum aceto aut posca apposita. Similiter etiam liberis ex Italico uase usti cinis. Porro fecus autem

Totius corporis
entis
Ventriculi
purgatio

Subiecta ex tra-
hite uisus

Imposita profunt epibemata adstringentia, & cataplasmata ex palmulis ac malis cydonijs, in quae addita sunt malicorum, ilicis glandes, rubi uirgultorum, senesci fossa, balsustum, acacia, hypocistidis, gallae parum, alumen. Maxime autem hoc. Glutinum maceratur in posca donec fuerit dissolutum, deinde in robustum lintel inducitur, & lambis agglutinatur. Efficaciter quoque ad hoc faciunt emplastra glutinosa, nelar est, Harmonia, locellum, Arbera, Melinum, Indicum, & similia. Pellis autem utendum est ad sanguinis eruptionem his. Gallae internam partem triam, & thus, aqua dilue, ac appone. Aut flores mali punici dulcis similiter. Aut polygonum tritum. Composito uero hoc. Aluminis scissi, gallarum intermixta parva, succi acacie, mentae, singulorum drach. iiii. quorum assistorum uirgulos quinq. Sicca tenuitur succo plantaginae, & miscetur. Vitis autem tempore in pessum laeum excipiantur, & in rosaceum tinguntur, ac apponuntur. Sed & eucubite leues, magis, saepe sub mammae apposita, abunde reuolunt. In febres autem his quibus sanguis erumpit conueniunt hi. lunet acuti capitulo, rum, myrsi, rosarum, rhamani foliorum, rubi uirgultorum, singulorum ex quibus partes in aqua coquito, & insidere subeto. Aliud. Corticis radicis mali punici dulcis, myrsi, corticis caperis, singulorum partes iii. gallae partem i coquito in aqua sufficiente. Ceterum per chlysterem uteriforium plantaginae succum infundito, aut scissis, aut polygoni, aut sola ni. aut perdicis, aut psyllij, aut hypocistidis, aut acacie. Inducitur etiam hinc per lamen, aut digitum, aut specillum, aut pennam in longitudinem formatam, usque ad uteri osculum. Sed & Andronis pallibus per uteriforium chlysterem, cum aliquo ex praedictis succis, aut cum uino adstringente simulus, efficax est medicamentum.

De fluxu muliebri. Caput LXXIII.

Fluxus muliebri est fluxio uteri, per quam totum corpus expurgatur. Tamen si autem specie praeditus est id quod euacuatur, quale est id quod redunt, habet dat.

dat. Aliud enim est rubicundum, uelut serofus sanguinis humor: aliud album, huiusmodi pallidum, ab amara bilialiud aquosum. Si uero aliquando sanguis purus, uelut in uentre scissione sentitur, diligenter animaduertere oportet, an ne aliqua erosio facta est in utero. Notae fluxus sumuntur, ex eo quod alii dant loci humectantur, humoribus colore diuersis: & ex eo quod argenti decolor est, alimentum non sentiri, cibum uertitur, & in decubitu de difficultate spiras, & tumidos oculos habet: & ex eo quod aliquando cum dolore, aliquando sine dolore sit, & ut cum ulceratione, aut circa ulcerationem, aut inflammationem, aut fœtidam, aut puram. Proinde toti corpori optulari oportet, quum humida sit affectio, per siccantia circa manifestam caliditatem, & per frictiones totius corporis, & per unctiones ex melle abuni de cocto. Danda sunt etiam unam scientia medicamenta, uelut est aqua, in qua asinum & apum sunt incocata. Eucurandam quoque totam corpore per alium. Ad hanc portula comesta, & saccus eius potus prodest. Item balustia, rubi fructus & flos, quercus membrana illa quae sub cortice trunci est, & quae sub cortice ipsius glandis hippuris rubicundum maxime fluxum sit, ita pota ex aqua uel uino. Item hypocistilus, lentisci fructus torrefactus est uelut portula, sanius asser, lemnium sigillum, coagulati leporis, aut lœdi, uel agui, aut utuli, aut cerui. Vinaceae trita, myrti baccae, uua acerba siccata, piceae cortices, & quae in sanguinis ab utero eruptione dicta sunt, quae non male esse efficaciam exhibent. Quum uero cum dolore sentitur, per uterifusorium aut alium clysterem, succum alicuius, aut pistam, aut irragi, uel oryxæ infundito, cum aliquo dolore sedante medicamento. Et in exacerbationibus quidem mitigatoria adhibeantur. In intervallis autem per circiter enis aliquando affligit ex alto eucare ac menses transmutare oportet, per diuersas gestationes, decubitationes, uociferationes, unctiones, cucurbitas, dropaces partium superincumbentium, insolationes, frictiones, pilothra, sine gemata, sinapismos, uomitus à raphania, uelut rectorium, balnea, uelut uinum, uelut cibum.

De inflammatione uteri ac declinatione.

Caput LXIII.

Veritas
inflammatio

Inflammatio uteri fit ex pluribus causis. Nam & ex plaga, & mensuri superpressione, & frigidityte, & infectione. Non minus etiam ex abortu, & partu eo, propter malum partus editionem. Sequitur ad uteri inflammationem fœbris acuta, dolorque capitis ac tendinis, & basis oculorum, iuncturaeque maxillae, ac digitorum: & colli detractio, & declinatio ad contraria, stomachi per consentiam affectionem, oculi uteri conditio, pulsus parui, densi. Et si obusa fuerit inflammatio, non uehementer uterum dolent. Si uero fortis, etiam ipse totus pulsatorio modo dolet per totum, si totus est inflammatus. Si pars inflammata fuerit, et circa hanc magis dolor de se significat ignem periret. Si enim posteriores ipsius partes solum inflammatae sunt, dolor circa lumbos sit, & si crebra supprimantur ex recta intestini compressione. Si anteriores, dolor circa pectus sit, & uix sit ibidem ac emittende difficultas, ex uefica compressione. At lateribus inflammata, & inguina tenduntur, & circa grauantur. Si uero fundum ipsius inflammatum fuerit, circa umbilicum dolor maxime conditit cum dolore. At si circa osculum est inflammatio, circa superuum uterum dolet. & digito immisso durum ac retentum osculum occurrat. In emittione igitur primam irrigatione ex uino & oleo, aut uino & rosaceo intendum est, circa pectus et lumbos, per huiusmodi purgat tra deligationem. Cuius adhibenda indiciorum usque ad tertium diem. Post quod uera locanda est in cubito, simul prohibeant. Non tantum autem alica ex aqua multa, aut pane, aut uino subtili alteris diebus. Post quantum diem coagulata imponatur ex polline, fœmole lini, fœmole piceae, ex aqua multa, in qua papaueris capite coacta sita sunt, & oleo. Si uero indigne aduersus caliditates inflammationis, impositio ignis licet naturae habens, ad modum lotum in passio coctum acutum, adhibere illud totum adstatorum, cum rosaceo,

inflammatio
in qua papaueris
capite coacta sunt,
et oleo.

A rosaceo, aut melino, aut crocino, & impone. Aut palmulas uino diluto feruifaciat cum potentia polline terito, addito aliquo ex relatis argentis, & imposito. Declinatione uero contingente, ceratam nardinum aut cyprini adhibeo. Per totam uero curationem etiam infestibus utendum est, ex decocto foenigræci, aut seminis lini, mala, artemisij, & ex oleo. In his autem quæ ferre nequeunt calore, ex aqua calida, affuso rosaceo. Pelli uero & infusa assumentur ex asyppo, butyro, medulla ceruina, adipe aserino, ungento sulino, & cera Tyrhenica. Verum quæ calorem sustinere possunt, in his etiam aëreis appellatus pellus conueniet, & encepharmacus. Quæ uero non sustinent, cum oleo, & rosaceo, & adipe aserino aut gallinaceo. Ad feruidiores autem inflammationes, emplastrum ex succis in duplici uase cum rosaceo liquefactis, & succi plantaginis, aut sepidis, aut cichori, aut inrybi misceto. Authoc uxor. Adipis anteriori aut sulis recens drach. iiii. cerati rosacei aut sulini sextantem, utriusque unci. I. croci drach. i. myrrhe obol. iiii. opij obol. ii. aut pro opio, papaueris capitum decoctum. Si uero multus uexat dolor, succi papaueris magnitudinem fabæ, cum lacte muliebri ac succo foenigræci apponendam perbe. Ceteri ad inflammationes cum duritia, emplastrum tetrapharmacum rosæ eo diluam apponito, aut infundis. Quin & declinationes uteri circa exacerbationes quidem, similiter uelut inflammationes curantur. Verum in remissionibus & mali declinatione, his quæ magis molliunt utendum est. In iuuene ratis autem, his quæ ex alto euocant, & mucus transmutant. Si uero extrinsecus duritia est, malignatis utendum, eo quod ex meliloto paratur, & Meniser inscriptis & lelij, & Melino Serapionis, aut pyrino emplastris. Vicius ab initio quidem sit tenuis. Declinatio ne uero modica contingente, ad balneum ducantur, & pleniore cibuantur.

De abscessu uteri. Caput LXXV.

Si inflammatio in abscessum mutatur, relata signa intenduntur, insuperque inordinate exacerbationes cum horrore ipsi fiunt. primis quidem temporibus intus, cum doloribus; perfecte uero suppuratione facta aliquantulum remittit. Verum circa ruptionis tempus, & dolores acriter saepe punctorio modo irrare putantur, & febricula uel emensiores uexant, & aliquando urina supprimitur, aliquando steruus, circa affectum uteri partim pedimento contingente: aliquando uero tumor circapubem, & uelut fluctuationis sensus, ubi abscessus maior fuerit. Qui uero in expeditis locis est, etiam per dioperam instrumentum immissum, aut per digitorum contactum deprehenditur, supra hoc quod etiam dolores uel emensiores habent, propter osculi neruositatem: quemadmodum sanè in fundo abscessus, & in sinu, minorem dolorem inducit, & digitis quidem tumor non occurrit, osculum autem grauius comperit. proinde quo citius suppuratur, auxilium ferendum est, per cataplasmata ex foenigræco, semine lini, ordea, cea aut triticea farina, ammizis ficibus coctis, quandoque etiam columbino fimo: Sed & infestibus inflammationi congruis assidue utendum est, & pectus ex terebinthina, myrrha, asyppo, & butyro. Rupto autè abscessu, si quidem ad uellicam pus delatum fuerit, lactis pota utendum est, & cucumeris semen habendum. Si uero ad intestinum rectum eruperit, lentis ac malicorij decocto coactis, per clysterem infuso. At si ad sinum ruptus fuerit abscessus, si quid emporum pus fuerit, rosæ cum infundatur, aut oleum in alba, aut tetrapharmacum regium emplastrum, aut butyrum recens: si uero sanies tenuis grauiolens foratur, uelut ab ulcere depulso pro serpente, adstringentius sit infusum, ex myri baccis, palmulis, lenticula. Et post humoris excretionem si inflammatio permaneat, in cataplasmaticis ac infestibus perseverandū est. Ceterum si circa uteri osculum abscessus fiat, & non rumpatur, postquam renues factæ fuerint partes puri incubentes, ad puris excretionem per chirurgiam non conuestegus, uelut in chæruigæ tractatione dicetur.

m .

Deul,

Vuln. med.
vratib

VLcanas saepe utitur, ob partium difficultatem, aut factis extractionem aut corruptionem, aut ab acerbis medicamentis, aut à fluxione, aut ex abfcessibus ruptis. Si igitur exposita fuerit ulceratio, per dioponem usum despicitur. Si vero in profundo, ex his quæ excernuntur. Humor enim diuersus excernitur, inflammatio quidem ulcere, paucus cruentus aut feculentus cum dolore si vero sordidum est ulcus, copiosior, & sanies cum minore dolore: si vero depulscum proserpit, graneolens niger, cum uel ementi thoribus doloribus, & alijs inflammationis signis, & irritato ad laxatoria medicamenta, ad conaria uero, alluatio. primum uero si est ulcus, humor paucus, equalis, sine odore, crassius, albus, cum solius facilitate. Si igitur inflammatum est ulcus, his quæ ad inflammationem relata sunt utendum est. Si uero sordidum, plantanæ succus cum melle infundatur, aut tetrapharmacum emplastrum cum sulino, aut aqua multa cocto in ipsa fenogrecæ, aut molis, aut fursibus, aut lense de cortice, aut quo magis repugnet, marubio, aut eruo. Aut amittatum melli erui serinum, aut indidem, aut alumen rotundum, aut simile quiddam immixtum. Hæc ipsa etiam forisfecus eaplastum modo imponitur aqua multa sabacho peculiariter autem prodest hoc medicamentum. Crocus optimus teritur cum lacte muliebri, deinde rosaceo cerato exceptus cum adipe asferino illatur lanæ tomento. Preteritum hoc est quod etiam ad dolores conducit. Capita papaueris in passio diluto macerantur ad triduum, deinde coquantur donec flacciscant, postea serentur cum foliorum rosarum drachmis V. croci drach. III. in mixto capirum papaueris decocto. deinde coræ drach. II. cum rosaceo liquore affunduntur, & in pello apponuntur illis ex rosaceo. Facietur etiam id quod ex omnia, croco, rosaceo, adipe asferino, & medulla ceruina paratur. Ex emplastrum Aegyptium absq. ærugine misceat ad ulcerationes facit. Si uero ulceris depulscum proserpit cum inflammatione, imponatur panis panis maceratus cum aqua multa, oleo albero, fenogrecæ, & palmulis pinguis. Infundatur autem succus plantaginis, solani, polygoni, & ridis, primum per se, postea cum uino asfero aut aceto. Si autem sine inflammatione nomen depulscum, fortiora infundantur. sicut est decoctum malicæ, uisum, orlese uirgulosum, cupressi, malorum cydoniorum, rubi, baci, aril myrti, lentisci, rhamni, rhois conarij, ex uino adstringente. postea uero si tam decoctum ulumini, acacie, lycij, hypocistidis. Ex istis uero decoctis sit etiam infusio. Si non succedit medicamentum aridum ex charta immixtum, primum cum polca, deinde cum aceto. Aut palmillum Antherium hoc est steridum appellatum. Aut chalcididem, aut aramænum sutorium, cum istis liquoribus sicut ea quæ dysentericis conueniunt. Dato autem citius boni succi modicum, puro autem lacte ulcere, & lauto, & nupto uis septatis, & nitum exhibito, quo cito cito producat. Pelli usi, & apponatur confectio ex melle, dissoluta cum cadmia, aut ladano, aut plumbagiae. I. omne eus autem emplastrum eicantem indoctæ, superno ueneri ac eosis imponatur. Quomodo modum enim cataplastatum, ita etiam emplastrum faculetas, per occultos meatus penetrans transferatur.

Cancer libri

Cancer in uero partium cum ulceratione, partim sine ulcere consistunt. In his igitur qui sine ulcere sunt, tumor reperitur circa uentri ostium dum res, ut quilibet, preminens, colore feculentus, rubicundus, quandoq. etiam subfundus, & dolens uel uolens circa inguina, & superum uentrem, & pedinem ac lumbos lægredi sunt confectum, & migrationem medicatio nem. Si uero ulceratus est cancer, ad dolores, duricias, & tumorem, erosa etiam & iniqua ulcera conspiciuntur, plerumq. quidem sordida, orta tumida, albicansia, torpes cunctas inuicias habentia: quæ uero pura uidentur, feculenta, fluida, rubicunda & cruentæ apparent. Lix. emittitur autem assidue ab ipsa

A ab ipſo ſanctis tenuis, aquoſa, nigra, aut ſulua graucoloſa. Aliquando etiam ſanguis fertur, & alia ſigna ad inflammatum uterum relata. Affectio igitur ipſa incurabilis eſt, ſed ut alicubi etiam Hippocrates dixit, mitigare tamen oportet per inſeſſus ex ſumo greco & milia, & per cataplaſmata ſimilia. Valde autem mitigant in exacerbationibus malua aut alba, in aqua mulſa ſtaccida facta, & cum modico roſaceo contrita ac impoſita. Itemq; cataplaſma ex caricis, melleſo, ſata, thure, burniade herba cum oleo diligenter conſuta. Et cataplaſma ex palmulis coctis in paſſo, additis ouorum uisceribus, & podenta. Aut cataplaſma ex papanere cum coriandro, aut polygono, aut ſerido. Hæc quidem in doloris exacerbationibus, poſtea uero ceramim adhibetur ex roſaceo, aut myrteo, aut ceranthino, aut melino, cum palmulis in paſſo coctis. Præſtatim autem commodat id quod ex fece in aneis uſuſu, quibus aqua coquitur, ſubſidere paratur. Hæc enim ſex in ſuper aſſata minuiſſime tenitur, & cerato roſaceo excipitur, ad emplaſti compagem redacta. Et hæc quidem fruiſecus. In inſecus autem mitigat locos etiam oleſi. Si uero ulcerati fuerint, etiam hæc mullebet inſuſum, & ſuccum plantaginis tepidus. Si uero eruentati fuerint, ſuccus polygoni cum modico thure inſitigat, & peſſi ex croco, & mulicri lacte, & ſucco papaueris, & ceſſo. Omnibus autem efficacius eſt, etiam ad ſedis affectiones hoc. Spumæ argenti Italice ſore ſexuncem, thuris maſculi, ceſſi, adipis porci ſe centis, butyri recocitæ, ceræ Tyrrhenicæ, ſingulorum ſextantem, roſacei trientem. Spumam ægeri ſerido ſuſco tritam liquari adijce. Cibi denique boni ſucci, qui ſane conſequi debet diſcretus poſſint. Vnum ſic medicum æquolum. Vident acrimoniam etiam, & ciborum copiam, prompte enim in ipſis cibi coeſpiciuntur.

De ſcirrhus cyſtæ utero dero.

Cap. LXXVII

Vnde ſcirrhus

ſcirrhus uteri

In ſcirrhum induratur uterus, aliquando de repente nulla prægreſſa cauſa: plerumq; uero inflammatione prægreſſa, & neq; ſolara, neq; in abſceſſum tranſmutata. Species ſcirrhi eſt etiam tumor durus, ſcleroſis appellatus, in collo uteri maxime conſiſtens, qui quidem tumor ſimilis eſt, minus autem rotundus, cum moderato dolore. Conſequitur etiam in his declinatio ad oppoſita, eſtq; tumor pro ratione affectionis uehementer tenetiſſus, cum grauitate & ægro motu, non ſolum totius corporis, ſed etiam totius corporis, adeſſiq; ad actionem obſeundus pigriſſus. Sequitur non probe curata malus habitus æquoſus. In principio inæguena ſecetur, aut purgatio aſſumatur, per hiteram Archigeni. Deinde cataplaſmata ex caricis, hyſſopo, nitro, & abſinthio. Et cucurbitæ cum ſcantificatione. Malagmata utropolyarchiam, & ex ſemi nibus conſana, & ex laui haccis parantur. Inſeſſus ex decocto caricarum, aut melle, polegi, althææ. Peſſi ex cerebintina, galbano, myrrha, ſerido, ceſſo. Dropaces ſcem, & aquarum naturalium nitolarum uſus, itemq; bituminioſarum. Virtutibus autem tolerantibus, etiam uictrici uſus.

Peſſi mollioræ.

Ceræ ponticæ, ſanguenti melleſi, ſingulorum quadrantem, irini, glucini, cyprini, ſingulorum ſextantem, adipis urſini, anſerini, butyri, ceſſi, medullæ ceruinæ, cerebintinæ, ſingulorum unc. i. Alia. Poli drach. ii. myrrhetæ drach. iiii. cum uino Mendelio trita, & irino ſubacta apponenda præbetæ. Alia. Ceræ Tyrrhenicæ, adipis uirulini, cerebintinæ, medullæ eeuſinæ, mellis Antici, olei uictrici, ſingulorum æquæ portiones.

Medicamentum ex alto euoſana, ſacti & ad inflammationem. Vux paſſæ albe exemplis uinacis quadrantem, rutæ uictriciſ foliorum ſextantem, aquæ marinæ ſeſquifunctum, cumini drach. iiii. mellis quod ſatis eſt. Fornatum autem inde peſſum cyprino oleo intinge, ac appone. Sed & aureus peſſus, & libaniſus, & enaſpharmacus affectioni commodant. Magis uero proprie

Demola.

Cap. LXXIX

(Titianus.

Mola quoq; in ſcirrhum induratus eſt tumor, aliquando circa oſculum uteri, aliquando circa totum ipſum comparens, taſſu lapidis duriciam

m. j.

referentia.

referent, cum detractioe partium superincumbentium, & gracilitate, de-
coloratione, ciborum inappetentia, mensium suppressione, mammarū ca-
more, adeunt conceptus suspensio in aliquibus ab initio fiat postea vero tē-
pore discernuntur. Quaedam etiam aquae inter cutē suspensionem de se exhi-
bent, & hoc discernendum est, cum tumoris duricia, tum quod non fiat so-
nimis digitis illis, quemadmodum in hydropticis. In quibusdam autem re-
vera in hydroperam transiitio fit. Quandoq; etiam incurabilis ut plurimum fit
affectio. Quibusdam etiam sanguis fecit. In communi igitur decubitus in
domo parua & tenebrosa ac tenebrosa conducit, quae etiam moderate re-
frigeret, in lecto immobilis ut pedes ad pedes habeant subliniores, & in
quieto. Nam motus omnem fluxionem prouocare potest. Et tumores qui-
dem ac duricias, his quae ad scierhos & scleromata relata sunt curabimus.
Veram aquae inter cutem infusiones, per ea quae dicta sunt in tractatione
de hydrope. Sanguinis autē eruptiones, uelut sanguinis eruptiones, & flux-
uum multibrem. Quidam uadunt molam esse canem infirmum, ad ipsas
uicini tunicas consistentem, & quae paratur ueluti scetus. Sed & haec species
laxatorio curationis ducta tractanda est, ut facilius exornetur.

De fistula ueni. cap. LXX.

Illa autem uenas ex frigiditate, aut lectus corruptione, aut partus difficultate,
inoculento ocluso, aut sanguinis gramo in ipso oburato, quandoq; in ca-
uitate ipsius fluitans cohaesit, quandoq; in tunicis corporis ipsius
uicini. In his sequitur tumor peccans, & imi uenas, cum duricia & dolore
punctorio, usq; ad septum transversum, & stomachum, ac inguina perpan-
gens, & ad digitos illationem lenius in tactu tympani oboritur. Curare
igitur oportet prius uenae sectione, si nihil impedit. Deinde circa exar-
cerbationes, inodis, & irrigationibus ex oleo rutaceo. In scissis usq; ex deco-
ctione, pulegii, antemillae, castae, & similibus. Et cataplasmatibus ex semine
apii, cumini, feniculi, anisi, ammi, & farina liliacea. Cucurbitis item hui-
bus, & cum leuificatione. Moram uero trahente affectione, purgatione ut-
tendum est ex picra, & hiera, & dropacimis ac simipimis, & balneis natu-
ralibus. Obstitit autem digito prius pinguedine immisso, incumbentem
sanguinis graminis ita conuenga, ut ad illud educat leniter ipsum euoluens.
Rursusq; cataplasma imponatur ex ficu, nitro, & ablinthio. Epithimata ue-
ro sint mollitoria, polychium, & quod ex seminibus paratur, & quod ex
lauribacis. Pelli conueniunt ex ruta, melle, nitro, maxime uero hic, licui
pinguium compositi drachm. cumini drachm. i. aphronitri drachm. i. Verum
propter acrimoniam prius in lac pingatur, sed & mollifici pelli uisum diuina.

De ure frangulatione. Cap. LXXI.

STriangulatio ueni est recurus ueni, ad affectionem per consensum du-
ctus, principalissimas partes, uelut sunt arteriae caecides, eos, cecus huius-
modi. Sequitur in affectus accedente exacerbatione, mentis languor, pigri-
tia, curum delirans, lactei passio, aspeches tristitia. Instante autem suffoca-
tione, sopor grauius, mentis emotio, nullum diuinum sensum apprehensio,
cum uocis interceptione, curum contractio. Deinde incipiunt rubere ma-
lia, & facies aliquantulum plena fit. Vbi uero remissa est, prodit humidi-
tas quaedam ex locis multioribus ad contactum, & murmur quoddam in
tympanum procedit, & ipse pulsatio laxatur ueni, atq; sic & mentem, &
sensum recipiunt. Mouetur uenem moribus secundum circuitum, uelut cor-
ruptis, & pleto uidelicet uero aut seminaria, aut alia materia, aut putrefac-
tione ipso materia. Et multa quidem resingunt sunt; quaedam uero in exar-
cerbationibus decedunt perierunt, pulibus quidem duncta euadentibus,
& inordinatē salsis remittentibus. Deinde etiam ipsorum interceptione fit,
quente, modica autem humiditate uisum roris in cute consistenti. Verū res-
ipnam me prius obitura cum ingente, deinde penitus inuadente. Ad-
iungat haec affectio hyeme & autumnis, in oculis salacibus, fluribus, &
perferunt

Aperferunt ſi per medicamēta ſtrepiles facti fuerint, & alijs perfrigeratis. Ita, quæ in exacerbationibus extreimas partes deligat & oportet, & tota cura, totumq; corpus conficere, & velut eos qui in animi deliquium inciderūt reuocare, & odoramenta graueolentia naribus adinuere, uelut ſunt, ſinicuſus lucernarius extinſus, caſtoreum, pix liquida, et dria, lanæ & panniculi uili. Quidam etiam maſcula in urinae ueteris, aut egeſtionis aſui naribus adhibentur. Cucurbitas quoq; affigere oportet ad anguſta & inum uentris, cum multa ſtamina, & leuia, & cum ſcariſicatione. Si uero prolongetur exacerbatio, etiam ea quæ ſtatu ducunt commoda ſunt, uelut collyria in animum ſubdita, quæle eſt cum minum & nitrum cum melle. Sed & inſulo per chyſterem ſtercora ſubducere oportet, ut ne ſua appoſitione premant. In ipſum uero uterum odoratiſſima ungenta inſuſa, denotare ipſum ſolent, uelut eſt amaracinum, mala bathribum. Sed & ſinapi partim naribus adhibetur, partim pedibus cataplaſmatis modo imponitur. Voce quoq; aſperiore quis in clamor, exciēt, ac uocet ipſam. Secundo uocia etiam adhibeantur ex caſtorio, herba ſanaria, pipere. Vbi uero remiſſe exacerbatio, ad uomitū cogantur, & in cibi abſtinentia, aut omnino modico cibo conſeruentur. Poſt ſeptimum diem lacta ex colocynthide purgentur. Poſt tertium uero diem, cucurbitas affigere oportet limbis, & laterum mollitudinē. Deinde caſtoreo uelut aliquando cum uermis decoctio, aliquando cum aqua muſſa. In quibuſdam enim hoc etiam ſolam ad perfectam curationem ſatis ſecit. Inſeſas autem, & peſti molliori ſi affluantur. Atq; hæc quidem ad exacerbationes. Verum ad totius corporis reparationē, & uenæ ſeſſione in initio ſaſcra, ad purgationem per hietam tranſire oportet. Deinde picem ex aloē dare drachmæ pondere, cum cyathis III. aquæ muſſæ, ſi aſtutus uſu, aut ex interualſis drach. II. cum aquæ muſſæ cyath. VI. Viendū etiam dropaciliſis, & cucurbitis, & ſinapiſmis, & acopi ex euphorbio. Deinde exercitijs, ſciſſione, & uſeſerationibus. Poſtea etiam aquarum naturalium balneis.

*Collyria ſub
dritia*

*Mixta picem
et aloē uſu*

De ueni proleſſa.

Cap. LXXXII.

Vterus prociſcit raro quidem, uerum ob plures cauſas. Aut enim muliere ex alio delapſa, & ad coxas delata, ruptis peſſiculis quæ ipſam uterū ſcui continerent, aut ob extraſionem ſecundæ uterum ſeuol attrahentis, & ipſi adhaere, uelut in partus difficultate: aut ob inartificioſum ſectus extraſionem: aut ob plagam aut ob animæ aſſeſſiones, uelut liberorum amiliſſione nanciatæ, aut hoſtium incurſu: aut ob periculoſam nauigationem, aut aliquā huiuſmodi cauſam, tota corporis meſſella exoluta, utero ſimul prolapsa, aut ob reſolutionem & debilitatem partium, uelut inclinata maxime ætate conſingit prociſcit autem os ipſum. Quidam uero totum ipſam prociſcere narrunt, id quod probabile non eſt. Quomodo enim reductus ſit manipollet. Oportet igitur euacuato primum per chyſterem ſtercora, & exciētia urina, quo undequaq; à compreſſione liber ſit uerus, ægrotam ſupinam collocare, aliores coxas habentem, & poplines incuruatos cum cruribus diductis, deinde accipere hapiſum lanæ figura & craſſitudine ſinali mulier reſpondentem, cumq; tenui linteolo circumdare, & in ſuccum acaciæ inſingere, aut in hypocſtichidis ſuccum uino diſuam, & ad uerum apponere, & extra uiolentiam retrudere totum id quod prociſcit, donec tota morles ad ſinum redigantur, & ſeſſeſcus conſegere peſſinem ſpongia expreſſa in poſtea, & decumbere ſucere hominem æuentis ac coaptatis inter ſe cruribus, ita ut uterum alteri incumbat. Poſtea uero cucurbitæ affigantur cum plurima ſtamina, & ad umbilicum, & ad uraq; laterum mollitudinē. Odo ratum quoq; naribus adhibeantur olfacienda. Tertia uero die, incumbente in ſinu lanæ hapiſo, inſideat mulier in uinum nigrum aut ſeu aliquamuliſſi tepſatum, aut in myrti, ſenſiſi, ac malicorij decoctum. poſtea incumbens lanæ hapiſus collatur, & alius eodem medicamento imbutus indatur. Cataplafmata extrinſeca imponantur ad inum uentrem, ex poluſis, polentis,

*Veni proleſſa
lapſa*

aut lenticulta, & malicorio, cum aceto mulso, & per tertium diem rursus ca-
dem fiat usque ad perfectam curationem. Si vero ubi per tempus mansit, pu-
erfactum fuerit id quod procidit, auferatur id circa omnis periculi formidini.
Nam totum ablatis esse uicem putrefactionis narrant, & tamē mulierē uicisse.

De obsterentia utero.

Cap. LXXIII.

In obsterentium circa uteri osculum, aut ob ulcerationem progressam,
aut ob inflammationem in scirrhum induratum. Curare uero oportet in-
fistibus emolliciendo, ex aqua & oleo, & fœnigræci decoctio ita ut testis simi-
lia cataplasmata imponamus, & pellos malicorios adhibeamus. Si uero di-
uturna fiat affectio, subspirationibus & suffimentis ex aromatatis utendi
est. Soluti obsterentium etiam passillus ex calypo, nitro, & resina terebin-
thinatur quod nihil aliud sit quam osculi uteri contractio.

Non concipiuntur conata.

Cap. LXXIIIII.

In communi quidem utriusque, & uero & mulieri consenti, ut totum corpus
in bono temperamento conservetur, per laborem, ciborum, balnearum, &
reliquorum omnium moderationem: & quod maximum est ut ne
gligamus habitum pinguedinem. Neque enim idonei sunt pingues ad libe-
rorum generationem, tum quod pudendis non congruum, tum quod modici
cum etiam semina emittunt: neque tamen etiam attenuati. Proferunt autem
ipsis omnia celsa facientia, & leniter inflantia, uinum igitur calidum mo-
derate accipere oportet, & ex oleribus erucam, & hominum, & erysimum,
& similia. Rutam autem & calanthen pro omnibus uitare. Si uero ob
uiscosam aliquem humorem conceptioni fiat, humorem expurgare, aut bono
uiscu contempnere. Prius tamen uero mulieribus consentit paruum circa ute-
rum quidem maxime prouidentiam habere, & menstruiam curationem et
tra impedimentum fieri. Vbi itaque prope adest purgatio, ciborum ac potuum
moderationem quam maxime procurare oportet, ita ut etiam aliquid ex ir-
ritantibus ad purgationem accipias, qualia sunt odorata ac aena odora, uel
ut est scandix, crithmum, feniculum, apium, smyrnæum: utri uero in spe-
ries corrigere frigidiores itaque uti os indicat in mensum suppressio, & uiscus
frigidos, ac crassi humoris, & torpor oboritur circa pedinem, lumbos ac enu-
ra. Si uero perfecte perfrigerare fuerint, neque Venerem appetunt. Oportet
itaque ipsam tum alip: laboribus se exercere, tum omnibus fœmentis, & his
quæ per sustinui sunt uti, & calorem renouare. Neque absterentium est calidiorum
habere, & fœmina odorata, cumina, anisum, palegi comam, & iuniperi fru-
ctum, pipere singulis auxiliari. Ipsarum uero uterorum fœmēta partum ut
pores sint, infidentibus sellis perforatis, partim calida aqua affusa, in qua co-
cta sit saluta, artemisia, ruta, cyperus, palegium, acorum, & odorata semina.
Cataplasmata enim ex his singulis pedini adhibeantur. Bonum est & por-
tyrachum epithema. frictiones item pedinis & coxarum nullo minus em-
ferunt. Vtendum etiam pellos subditiu, ex myrrha, ruta, galbano, & casto-
rio, ubi prius fœmenti aque mulse aut marinæ adhibuit. Bonus est ad hæc
pellus qui gone, id est genitara appellatur. At uero calidiores uteros con-
iutare oportet ex toto corpore calidior, & mensibus paucis, & cum dolore,
& quod exulcerant pudenda mulieris. Corrige autem per moderate hu-
meantia ac frigidificientia, qualia sunt ex oleribus lactuca, & malua, &
bitum ac cucurbita, & eucamis, & pepo, & stryplex, & porulaca, & alij
consimiles erbi. Valde uero & superino uenit, & lumbis adhibeantur fri-
gescientia tum cataplasmata, tum succosae distillationes. Si uero ob humiditatem
uteri non concipiant, signum est quod & humectantur circa coitus,
& tenniores ac multi deferantur menses. Vicius autem huius cōuenit siccor,
labores, friciones partium superarum, omnis siccitas & moderatio er-
bi. Commodum sicut etiam acerbis medicamentis uterum corroborare,
qualia sunt lentisci decoctum, & myrtilacearum, rosarum, rhois, floris ma-
li punicearum teneronum uirgultorum, & gallæ. Quod si siccor sit uterus,

A per contraria curetur, balnea dico, & unctiones, & cibos humectantes ac olivaceos, quousque moderatum, & non valde utuus. At si per humoribus crassioribus conceptus impediatur, si quidem is mordax fuerit humor, purgare oportet mulierem, quemadmodum quique humor peculiariter id exigat, maxime vero per pitam exalot. Deinde serum lactis per clyster immittere, & unctum commodissime excogitare. Plurimosi vero humores laboribus, & sudorificis, & vomitibus, aut etiam inferni evacuandi sunt. Oportet & medicamentum hoc bibendum dare. Epithyma, euphorbii, pipertis, seminis dauci & petroselinis, omnia tria drachmarum duarum pondere exhibere. Hoc & per ventrem probe ducit, & uterum calefacit, quemadmodum sipe etiam in cunctis his que non purgantur prodire fecit, postquam vero correctio se declaraverit, mensibus probe prodeuntibus, tunc coire oportet desinente purgatione. Quando quidem vero etiam flatus in utero prohibent conceptionem, signa quidem ipsorum ex his que de uteri inflatione dicta sunt accipere oportet. Curare autem primum visum parciore, deinde cumino, & anetho, & apij semine, & ruta, & aniso exhibitis. Aromata item plerumque exhibentur, partim ut apponantur. Ceteris conchios uteros aperire oportet, odoratis decoctis assulis, & somentis adhibitis ex malua, semine lini, fenogreci, & oleo, quandoque etiam in melle. Postquam istis item, artemisia, conyza, calamulatha, pulegio, & anthemide in pressis vero utantur terebinthina, nitro, cucumete sylvestri, clausilio, calissa, & picis sero. Quibus autem osculum uteri hiat, his viscus, & fomenta, & medicamenta succura ac adstringentia continentem, mali punici flores, lentiscas, rubi radices, myrti bacca, & que in humidioribus commovent. Distortiones autem uteri fomentis dirigere oportet, & mollicibus pressis subdita. Porro coitus cum muliere averis, etiam ad conceptionem conferre videtur.

Coitus tempus
et conceptionem
aut

De fissura, conchyliata, ac hemorrhoidibus uteri. Cap. LXXV.

Circa uteri osculum fissurae fiunt ex violentis partibus, & primum quidem latent, dum recentes adhuc sunt ex partu dolores, polius vero paulatim percipiuntur, aliquando ad manuum contactus, aliquando etiam in coitu, quando etiam eructant sunt propter constrictionem. deprehenduntur autem linea diducta. Nam ruptiones in ambitu osculi conspiciuntur. In quibus chirurgia & mordentibus medicamentis resectis, simplicioribus infestibus & pressis uti oportet. Coeunt etiam emplastrum tetrapharmacum dicitur. Si vero callosa fuerit fissura, medicamentum ex charta ulsa utendum est, cum rosaceo. Quod si uim ipsas non ferant, eisdem styracem terebinthina exceptum inditio. Vlcibus autem ad cicatricem perductis, conuenienter id quod ex caduua constat, aut aliquod sedi destinatum, ut uter est id quod ex spuma argenti paratur. Quandoquidem vero contingit fissuras diuturnas in condylomata mutari, per consimilia callus adimuntur, & condylomata in incutit ad cicatricem perducuntur. Hemorrhoides autem sunt circa osculum aut collum uteri, & per dioptram instrumentum deprehenduntur, ex eo quid eminentia apparet circa exacerbationes dolorosa, cruenta, & rubicunda. In intervalis autem rugosa, doloris exorta, submissa, ac stillosa. In his igitur si fieri potest, in intervalis excisione utendum est in uolsella prehenbis. Si minus, per medicamenta saltem ipsas comprimere oportet, ita ut aliquando malicorio sicco cum galla, aut tali quopiam astringamusi aliquando his que in eruptione sanguinis ex utero relata sunt utamur, quod etiam his quibus ob debilitatem singulis erumpit, consentiunt, que cognoscuntur ex eo maxime quod uterum assidue cruorem remittit ex intervalis, & non solum mensis purgationis tempore.

Constric-
tione
fissurae uteri

Conchyliata
ut uteri
Hemorrhoides
ut uteri

De fissilipera. Cap. LXXVI.

Difficilis parienti sit aut circa parientem, aut circa factam, aut circa secundam, aut propter externa. Circa parientem quidem, aut crassam, aut obesam, aut que totum uterum paruum habet, aut dolorem partus exper-

Parienti affi-
ctum

est, aut tumida, aut inflammationem circa uterum habet, vel in alia parte, aut quomodo cūq; aliā egrotat, aut naturaliter debilis est, & extrahere nō potest, aut ante tempus parit. Circa foetum uero, qui aut nimis magnus est, aut parvus, & parū grauis, aut magni capitis, aut monstrosus, uel ut biceps, aut mortuus, aut unus qui dem, utrum debilis, & qui extra prodire nō possit. Aut quod plures sint foetus. Quinq; enim uisus prodidit Hierophilus, aut quōd si figuratus habeat præter naturam. Nam figura secundam naturam fortibus est, prima quidem in caput, manibus ad foemora extensis, ita ut è dno oculo ueni, caput nō minus inclinationem habeat. Secunda ab hac in pedes circa inclinationē. Quæ uero præter has sunt figure, omnes præter naturam sunt. Circa secundam autem, quæ aut non auellitur, propter crassitudinem, aut etiam antea quā oportet auellitur, propter tenuitatem. Euaerato enim humore, & tunc præ se ferunt egredi uolunt, propter externa uersu aut rigiditas densa sunt, aut immoderata caliditas uires excoluit, aut etiam formata aliqua se allapā. Si igitur ob coactionem aut uelut oburationē fortes, difficultas pariendo fiat, primam coadiuuare oportet per laxationē, intendendo afflicte oculi calidam, cum decocto scariagræci, aut malue, aut seminis lini, aut etiam cum auris, mitigationis gratia. deinde cataplasma imponere pubi, superno uentri ac lumbis, ex semine lini cum aqua mulla, aut aqua & oleo & infusibus similibus uti. Sed & ex balneis assumere laxantiores, si non febris, aut alia aliqua causa impediat, & patientem perlecticam mouere in aëre moderatē calido. Quidam etiam concessiones fortes adhucurunt, & sterutatoria admonerunt. Et quæ quidē sinistra est, impellatur. Quæ uero in experta est dolorum partus, perius deat, ut maxime fortiter spiritum concutiat, & ad laterum mollicudines compellat. Quæ uero animi deliquit in cibus, odoramentis non offendentibus rescillitur. Allocata autem modio crines, modico cibo nutritur. At uero quæ obesa est, in lecto prona figuretur, genibus ad foemora inclinatis, quo uerus ad abdomen delatus è directo osculi sit, per digitos autem ceratis aut pinguedine osculum illinatur, & leniter diducatur. Cui qua affectio fuerit circa partes, etiam huic prospiciatur & sterco cōtenuum per molle infusum per clysterem efficiatur, & secunda aperta diuinatur, aut digitis, aut scalpello inter ipsos occubato, præcedente sinistra manu, & aliquis pinguis humor per clysterem in uteri capacitatem immittatur. Si uero præter naturam figuratus effluens, naturæ figuræ restituantur, partim impellendo, partim deducendo, partim succedendo, partim dēigendo. Et si quidem manū aut pedem præuisoris, non hac parte apprehensus extrahatur. Magis enim obtusum, aut exarticulatur, aut etiam abruptur uerum digitis humero iniectis, aut coram ipsius foetus, pars præmissa ad cōuenientem locum retrudatur. Ac si unā cum obturatione, totius foetus figura quæret, prius ipse ab utero osculo in faldine retrudatur, deinde apprehensus natus ad osculum dirigatur. Si uero plures uno uentus defecauerint, rursus sursum ac deorsum dirigantur, omnia ipsam sursum ac leniter circa compressionē oleo luto affuso. Tempus autem defessus in faldam est quum osculum uteri apertum digito occurrerit, & præcepto promissa. Quod si uero nō prodierit, eo quōd mortuus est foetus, aut ob aliam causam, ad foetus extractionem progrediendū est.

De coxendico morbo. Cap. LXXXVII.

Articulare
uerber
Coxendicam
morbo

Quum articulare morbi generis sit coxendici morbus, in eo solo differat ab eo, quōd causa ipsius circa coxam firmatur. Causa uero huius est crassius ac pinguis humor coartificationem circa coxam impactus. Dolor autem plerumque in locis circa nates & iniquit, usq; ad genus. In plerisque uero usq; ad humerum pedem pertingit. Ab initio igitur ægro oblato, post sterutonium per clysterem cum uariatione, ueris sectionem à cubito assumimus cum repetita detractione. Si uero post tempus æger nobis obtigerit, à muliere circa eius allicium detractionem faciemus. Et circa exarticulationes

A lusiones hac irrigatione utendū est. Cyprini cyath. viiij. aceti cyath. iiii. nitri cyath. ii. seminis rosmarini cyath. i. per lanas facetas calida hec adhibeantur. Post hanc cataplasma imponatur ex lupinorum amarorum farina, cum aceto mulso: aut ex lotiacea farina cum resina, & cucumeris sylvestris radice, & nitro, & calamintha, & rosmarini semine, & lauri baccis. Sed & sola calamintha utiliter imponitur cū aceto mulso, aut aqua mollia. Empla- stro uero mitigatorio utendum est hoc. Ceræ drach. c. cerebintina drach. xxv. araginis drach. vi. myrrhe, galbani, iridis, singulorum drach. vi. cedre drach. v. præbendus detur succus cyrenæicus eius magnitudine, aut callosi drach. i. cum opopaneis oboli. iiii. Radicis autem capparis cortex ponas, & cataplasma is ammixtus prodest. Si uero multus est dolor, etiam dolorem eximentia medicamenta locum habent. Velut cū antidotus Philonisi, & que ex duobus pipere generibus constat. Infusum uero hoc immittitur. Mellis sesquicyathus, olei sesquicyathus, aque cyath. ii. nitri drach. viiij. cerebintina drach. iiii. His calidis infusis, insuper fontem uno adhibeatur, quo longiore tempore retineatur. Quæcumq; macosa, quandoque etiam sanguinea, quando etiam plus prodest. Si uero perseuerauerit affectus, quod tamen raro contingit, rursus ipso utendum est frequentius, pro aqua centaurei decoctio ammixta. Sanguinem euacuat etiam Thlaspeos semen infusum, & elaterij succus, & quod ex ipso, aut ex radicibus ipsius componitur oleum sicyonium, & felleum piscium muria. & oliuaram colymbadum muria recte infundi potest. Cauebitis etiam ad coxam, cum multa flamma & scarificatione utendum est. Aliquando etiam hircodinctus perleuerante autem afflictione, ad purgationē procedendum est, aut per hieram, aut per colocynthidem, ita ut medullæ ipsius probe trite drachmæ pondus detur, in aqua mellis cyathis plus minus duobus, pro viribus aegri, & pro ut alio bene affectus est. Si autem nota in aqua mulsa cocta. Probe etiam hoc expungat puls ex colocynthide. In quibusdam etiam uomitus à raphanisa bibulo profuerunt. In interualis autem itropax adhibeatur, & acopa ex euphorbio, præsertim id quod varium appellatur. Balnes uero naturalis his commo di sunt. Si uero nō adlins, in alijs saltem locis, relaxis acopis utantur, & compositis his, tum Asclepio appellato, tum hoc, quod ex euphorbio, & darceæ, & centri nigri, callosi, pyretici, pipere, staphidis syluestris, singulorum æqualibus partibus paratur. Post balneum picis tride quadrans, sulphuris uini sextans, calido adhuc corpori inspergatur, ipsamq; chara intergatur. Si uero neq; hæc proficiant, aut reliqua in oculi relictis, bonum est etiam linapi cum cæteis imponam, aut etiam per se. perfectè uero ipso reseruit libridis herbe usus, quam sine etiam lepidium, aliqui uero syluestre nasturtium appellant. Quæ uero apud nos nascitur fruticosa, folijs lauri similibus, & multo maioribus, multam de se experientiam dedit, non solum in coxendicium, sed etiam alijs diuturnis morbis. Aestate autem multo efficacior est. Si uero etiam sola tunc quum expetitur, non produxerit, radice ipsius cornicem conuolare oportet cum pipere silulo, ad emplastri formam, deinde in linum densum infusa, dolentibus maxime locis imponere, aut circa totas nates & femora, & linere donec nigrescat, aut omnino liuida sit summa cuticula: postea ipsum auferre, & lotio hoc ceratum imponere. Opopaneis trientē, in aceti cyathis duobus dissoluit. & cerato cyprino exalpto. Quod si recensum calium urentium usum, emplastris melleum extirpantibus utendum est, quorum de numero & hoc est. Ceræ, resina, pinus, singulorum drach. x. cerebintina, simi columbarum syluestrium, fecis uini uisre rectis, singulorum drach. vi. galbani sesquidrachmam. Est etiam de extirpantibus emplastrum lex na appellatum. comoda sunt quoque ea que ex linio & nitro parantur. Quin & potionibus quæ ad annum habuerint quidam usitant, ex quibus est & ea que ex quatuor rebus constat, chamædrys libra una, gentiana dodrante, aristolochia rotunda dodrante,

Stomach
etiam

Scorbutica
herba

Artemisia
medicinalis
Medicinalis
quatuor rebus
constat

lemi

seminis rutæ sicci sextario uno. Hæc confusa & cribrata quotidie dare oportet eo chilicis mensura, ieiunio & concoctione probe facta, cum aqua singi-
 die cyathis duobus, ad annum donec morbus sedetur. Medicamentis quo-
 que ex septem rebus compositum, & quod proclo adscriptum est, idem pro-
 mittunt. Exercitiis facies per deambulationes, & per assiduos flexus, salus
 ac cursum. Cribis sit attentius moderant & concocta facilis. Si vero nulli ex
 relictis cedat coxendicium morbus, quandoq; ad suppurationem uertitur,
 quandoque laxatis neruis colligantibus, coxa ex articulo luxatur. Oportet
 itaque diuturna facta affectione, articulum uere tribus aut quatuor locis,
 uelut in charurgie tractatione referentis, & ulcera ad plures dies consensu-
 re, ut ac cicatrix inducatur.

De podagra, gonorho articulari, arthritide dicta. Cap. LXXVIII

Non sola partium debilitas podagricas & arthriticam affectionem effi-
 cit, alioqui exacerbationes indolentes esse oporteret, in quantum e-
 tiam debilitas semper inest articulis debilibus, neq; humor solus: non enim
 in articulos solos irrueret afflicto uenens ambo, & humor præter naturam,
 & partium debilitas, morbum efficiunt. Quam enim nutritiousa partium fa-
 cultas debilis fuerit ob ciborum repletionem, consequenter cruditates ob-
 oriuntur, & redundans humor in quamcumq; tandem coartulationem iam
 antea debilem irruens, & neruos colligantes distendens, dolorem efficit.
 Neq; enim neruorum qui uoluntario motu mouetur, primario afflicto nam
 est inflammatio: alioqui in locis inter coartulationes medijs itidē ipsam
 fieri oporteret, uelut in ipsis medijs, aut femoribus, aut cubitis, aut bra-
 chijs, per consensum igitur afficiuntur etiam uoluntarij motus nerui. Quan-
 diu igitur pedum coartulationes solum humor infestat, podagra affectio
 appellatur. Vbi uero causa omnes corporis articulos pertrahit, arthritidē
 appellare solent in qua & uerticula, & scapulae, & maxilla, & omnes arti-
 culi morbo feriuntur. Quis uisum etiam aures, & dentes, & fauces, & quan-
 doq; etiam hepar & splen, articularibus dolentibus participant. In quibus si
 non breui ad articulos translatio fiat, periculum in medico tempore argu-
 tos corripit. Cæterum redundans humor, quandoq; biliosus, quandoque
 sanguineus, aliquando strabiliaris, plerumq; uero pituitosus & crudus est,
 ex ciborum redundancia, cruditatibusq; ac ocio collectus. Moram afflic-
 tus circa articulos crassescit ac uiscosior emittit, ut etiam totos articulos
 efficiat. Aliquando uero etiam humor ex pluribus mixtus est. Quare fit ut
 & cognitio & curatio difficilis, & ferè incurabilis sit morbus. Auspicatur ut-
 tem & laeditur affectione in plerumq; lassitudo inmodica, & deambulatorij
 nec concitata, & equitatio frequens, & rei Venereæ incompertius usus,
 frigidi potus non consuetus, frigidorum aut multorum aut in aliorum edu-
 ctum eius, utrum multum sit & ex offensionibus, aut in passionibus, aut
 luxationibus, aut alijs huiusmodi, quidam primum affectionis experimen-
 tum fecerunt, præcedere quidem in corpore, & hæcenus quiescente mate-
 ria, externa uisum laeserunt causa ipsam commouente. Tristitia autem &
 curæ, & uigiliæ, ac reliquæ affectiones, non solum commouent, sed etiam ipsæ
 generantur, aut primario, siue per accidens, uiscosos humores. Variæ igitur
 sunt uelut dixi affectionis causæ. Facillime uamen quantum eius fieri potest,
 assurgens humorum differentia deprehenduntur, apote quarum note
 ex coloribus ac symptomatis accidentibus sumuntur. Biliosi enim fluxio
 ad coloris pallorem ac ruborem, etiam coloris sensum, & dolorem acutiorē
 efficit, & cito per cutem distribuitur, citra magnam tumorem, & calidit-
 entibus impolitis exacerbat, quemadmodum uisceris à frigefactentibus
 remittit. Atq; hoc quidem etiam in alijs omnibus plerumq; maxime tamen
 ex bilioso afflicto humore contingit. Et febris ipsa accedit sæpe in exacer-
 batione uisceris, quando etiam sic colosi sunt. Sic autem & nigritorem
 in strabiliaris reperies colorem. Album autem & aqueum in pituitosa.

In quibus

A In quibus autem sanguineus est redundans humor, in his & dolorem intus delutescentem, & tardius in tumorem se attollentem, uelut etiam sanguineus colorem deprehendens. Ad firmiorem uero dignotionē conferet tibi etiam praegressa uelut ratio, & reliqua.

Curatio eorum quae ex bilioso humore fluxione laborant.

Principium curationis in his qui ex fluxu bile, aut potius ex qualitate assecti sunt, assilientis humoris sit curatio, per purgantia medicamenta, quale est maxime quod ex rhodomelue paratur, & quod ex malis cydonijs & quod ex petra antidoto, & catapota ex aloë. In exacerbationibus autē forinfecus rosaceo utemur, cum oui utello, ac uino modico, confictis insuper leniter parce. Sed & singulacientes herbas adhibemus, uelut est solanū, portulaca, hyoscyamus, semperuolū, lenticula palustris, ferula, papauer, polygoum, rosarium folia, & similia, ita ut aliquando ipsa illinamus, aliquando cum melle panis posca maceratis, aut cum ordeacea farina, ac rosaceo cataplasmatibus modo imponamus. At in inflammatione articulorum ignem sacrum referente, melle nigro eucubitate recentis cortex impolimus, & peponis ac cucumeris caro, per se, & cum panis & perdicij folia, itemq; herbae, cum pane am poline polentae. Sed & psyllium cum ordeacea farina coctum seruidas inflammationes mirifice mitigat. Similiter & rosacei ceratam cum aliquo refrigerante iucco singulaciam: & quod ex fabacea farina paratur. Habet autem hoc modo. Certe quincuncem, chamamelini sextantem & unc. 3. rosacei sextantem & unc. 3. farinae fabaceae unc. 3. & uinum 7. utellos.

Aliud cataplasma. Malua uirides coclas terito, & psyllium prius iam uelut osam sacrum ammisero. Deinde utellis ouorū additis, cum oleo chamamelino imponito. Si uero malus & agere tolerabilis est dolor, etiam ex croco, & glaucio, ac opio paratis utendū est, ita ut cum posca ipsa seramus, & aut illinamus, aut cum melle panis imponamus. Colenus autem huius meminit. Sacri papaueris drach. 111. croci drach. 1. cum lacte bubulo aut caprino terito, aut panis internam partem adijcto, & ex contacto rosacei emollito, ac pro cataplasmate utitor. Aut opium & crocum cum lacte melle, cerato rosaceo excipio. Sed & ex torpedine ceratum eiusdem facultatis est in exacerbationibus, & oleum ex ipsa. Quin & hoc consimile est. Melle panis aqua aut posca maceratum, semperuolū, aut solanū, aut portulacae, carniū palmarum, seminis papaueris, singulorum partes partes, utello, rum ouorum affuso, & rosacei quod satis est, pro cataplasmate imposito. Verum si uelut febribus inuolantibus non oportet, sed eo usq; solum ut doloris uehementia moderator fiat. Nam uehens ipsorum usus, & humorū compactiones, & tofus, & diuinas motus difficultates efficit. Post usum igitur eorum qui dolorem extingunt, aut emplastro ex siccis cum chamamelino dissoluto utendum est, aut eo quod ex althaea paratur, aut aliquo huiusmodi medicamento. Postquam autē recalcitra fuerint refrigerata, partem corroborabimus emplastro phoeniceo, aceto & rosaceo, aut uino ac rosaceo dissoluto. Si uero grauentur emplastris, ac acie fuscus cum posca illinatur, aut lyeli cum croco, & glaucio, & perdicidis fac co in posca. At uero utrumq; ipsorum perfrigerantem & humectantem esse conuenit, quales sunt ex psilana & alia sorbitiones: & ex oleribus malua, lactuca, larybae, & galliarum domelliarum pulli, & pilces perotii, & erinacei, & perdicis, & similia. Vident omnia calefacientia, & qui pulli ac fluxum bilium generant, & cina uetera, fulua ac nigra, & repletionem. Videntur etiam balneis potabilium aquarum, & circa ipsas fluxiones, quantum ad causam attinet, & absq; dissimulo aliud quid prohibeat. Vident frigiditatem, et horū abstinentia, ac uelut edulcoratū esum, ebrietatē, huiusmodi immodiciā, Venerē.

Curatio eorum quae ex fluxu bilioso fluxione laborant.

In quibus sanguineus humor redundat utraque sektionē utendum est citra dilationē

dilationem. Iam etiam in pituitosis febribus aut acutissimis, quando quidem & his humor in ventris quatuor maxime continetur, quantitate magis quam qualitate laedens. Venae igitur sectione assumimus statim circa primam morbi tentationem. Nam quos sepe iam fluxio praecorruptis, illi laeduntur magis ex sanguinis evacuatione, quibus ut opem sentiant, & magis hi quibus ex natura frigidius ac pituita debilius est corpus. Post sanguinis evacuationem, si non solum sanguis est qui redundat, modico tempore interposito, etiam purgatione ex sacra utemur. Sed & acuti multum liliantem ex his est qui hos convenienter purgant. Qui vero talia purgatoria medicamenta recusant, his catapotia utantur. Aloës, colocynthidis, ueratri nigri, scammoniae singulorum unc. i. euphorbii unc. s. niri unc. s. ex elpe succo brassicae, & pniebe pro utriusque. Melius autem in malorum cydoniorum succo.

Catapota
pniebe

Aliud catapotium datur & in exacerbationibus, & in interuallis, & in omni humore in podagrica. Aloës sextanem, agnelli unc. s. croci unc. s. colitune, i. spicis nardi unc. i. floris iinei odorati unc. i. carpopaliami unc. i. cassiae sextantem, scammoniae sextantem, epithymi quadrantem & unc. s. Dosis moderata est scrupulorum ii. perfecta iiii. Quin & ex armeniaco lapide catapotia misceant purgant, pituitam in arthriticis convenientia tam in principibus, tum in declarationibus fluxionis, atque etiam in intervallis data.

Scammonia
fuga

Quando quidem vero quidam scammoniam velut stomacho incommo- dam iugant, danda sunt ipsae, & praesertim si pituitosa materia redundat, haec catapotia. Colocynthidis medullae, ueratri nigri, hellebori, gummi, aloës, singulorum unc. i. niri Alexandrini, euphorbiae, singulorum unc. s. dantur scrupuli iiii. Igitur vero pro gummi, epithymi adieci. Quidam vero in ipsis exacerbationibus, in omnibus artibus idcirco, purgatione ex hermodactylo utuntur. Verum attendendum est, quia si stomacho incommodus est hermo-

Hermodactylus
in stomacho
incommodus

dactylus, & anxios ac ciborum inappetentes facit. In illis igitur his qui ne goctis quae disteri non possunt urgentur, ipso utendum est. Compendio- nis & post duas ut plurimum dies sedat fluxionem, ut quis ad conueltas san- ctiones obcundas transire possit. Noui autem quendam qui non ipsam Hermodactyli substantiam exhibebat, neque aliquid medicamentum ex ipso com- positum, sed herbam ipsam coquit, cum aliquo ex consuetis pharmacis, uer- turanulo, aut apio, & decoctum bibendum praebet. Ex minus ita quomodo perenni in euacuationis fluxione liberatur. Oportet autem propius circa quod stomacho incommodus est, uelut dixi, postea stomacho gratis & corrobor- tantibus, cum moderata caliditate, potum mentis corrigere. Ceterum Ale-

Alexander
melior

xander purgationem ex coronopodio meliorem esse dicit, ea quae sunt ex hermodactylo, ut quae eandem euacuationem & doloris sedationem efficiat, cum hoc quiddam stomacho incommoda est. At vero locusta pituitosis adhi- beantur, si quidem moderatus est dolor, brassicae uiridis imposita, & apium, & conyza, & uerbena caeciliati uero uelementer dolent, farinae semigræ- ci partes iiii. linnae hellebori partes i. farinae cicurum partes i. cataplasmatas modo impondo cum aqua multa, aut uino tenui, cum modico cyproleo, aut nardio, & maxime hyeme. Cuius remedia & casium brassicarum uillos- rum, cum xanunga impositum multum prodest. Venam ad mitigandum dolor-

Xanunga
atro

tem, recurrens a xanunga esse oportet: ad silenticium uero uterem sal- sam. Iam & helleborum illic cum farina ordeacea in aqua multa coctum, aut per se ipsum recens humidum impositum, cum brassicae folijs. Scilicet etiam caputem si cuius per se, aut cum farina ordeacea, ex posca coctum. Quandoquidem uero & ex his quae contraria esse uidentur quidam opem sentierunt: nam ideo enim humorum mixtura digestionem excindit, matorum mixturam referemus. Prodest itaque syluestris & hortensis atriplex cum pane imposita. Aut uerbak i. iusta cum bulbis & pane rure, aut cum polio- na. Aut ex emula ordeacea farina cataplasma in summa. Porro, in quibus est

Causa obscura
quid faciat

obscura causa, praedictione lacere oportet, quandoque etiam quae sunt eiusdem generis

A generis, aliquando etiam ad contraria, ita ut neq. iisdem, immoremur, si nō mitigationem exhibeant. Hanc enim quotidie in ipsis artis operibus uidemus fieri, & idem auxilium huic quidem articulo prodest, alteri uero in eodem egrotō similiter inflammato, non solum non prodest, eodem etiam hora, sed quandoq. etiam insuper laedit. Et quod sane mirum est, unus & idem articulus sepe ab eodem auxilio, nunc quidem utilitatem percipit, paulō post aucta etiam insuper inflammatus est. Non igitur aliquando fortassis, ubi quidem viscosa & crassa materia obtinet, ex calidioribus opem sentit: ubi uero acris ac feruida humoris qualitas obtinet, frigefaciētibz mitigatur. Et nihil miri est etiam frigidiorē naturā materiā, inflammationis tempore exardescere ac feruere, ut hūis si ita contingat, amputationē omittam. Au uero coctionem prohibet farina lupini cum aceto mullis aut posca. Aut silybi, aut bryoniae radix cum pane. Sed & hoc ex his est quae et in lationem mitigant, simulq. moderate discurrunt. Lyeij unc. i. ammoniac. ēi thymamatis unc. i. cum uino uetustissimo erita & oleo acerbo coquito, & farinae subaece quod satis adijcto, & moderate cocta imposito. Post uigores autem tumore relicto, imponantur bulbi per se, aut cum polentre posline, usq. ad laniationem. Ita enim operari solent. Si uero cataplasmatibus non indigeant, irrigationibus & perfusionibus utantur ad locos, maxime si extremae partes fuerint, ex chamemeli & melilori, aut etiam centaurei decoctis. Quidam etiam capparis decoctum multum iuuat. Hoc autem omnium efficacissimum est. In aceto acerrimo Thymum, origanum, Thymbam & esalamintham coquito, indeq. locos affectos perfundito, nō solum semel, sed sepe in die confidenter, multis profuit non solum ex piritu, sed etiam bile affectis. Quidam & hoc obseruant. Ilicis glandes mundas, & dū coquunt, & decocto hoc extremas articulorū partes in fluxionis principio, ad multum tempus frigrant, interiores autem partes spongias perfundunt, & itacum materia impetum repellunt. Hoc etiam ex bile affectis conuenitquemadmodū etiam in aquam calidam absq. aliquo decocto dometur. Ceterum ad dolores, & impactos articulis humores, ob intentam frigiditatem oboritur, forte est hoc auxilium. Olei ueteris libram 15. miri Alexandrini lib. i. terebinthinae lib. i. euphorbiae unc. i. iris sextantem, farinae fœnigraci sextar. 15. His uero etiam conueniunt quae ad coxendicum morbum relata sunt. Multis enim ex ita perfrigeratis, in declinationibus & sinapi cū caricis usi sunt, & alijs rubefaciētibz. Quidam etiam medicamento ex cantharide. Verum haec laedunt in posterum, si non aliquo ex mollioribus usi fuerint, uelut est quod ex herba lanaria paratur, & quod pyxis, & quod Basilij appellatur. Et quod ex abiete fit, & quod ex populo nigra, & Bromiū, & hyponium appellatum, & ex acopis fortiora: In quibus etiam maxime neriorum per consensum affectiones & humorum impactiones sunt. Emplastrum uero ex melle urina, etiam in uigoribus impolium, frigidioribus praesentem fluxionibus commodum est. Similiter & ex duobus uetari generibus passillius. Porro ad laxos tumores conuenit fomentum quidem ex sale fricto, aut etiam alio modo aquae marinae calidae per spongias perfusio aut irrigatio: & emplastra ex sale parata, item ex lixiua, & ex nitro emplastra, & confusis haec cataplasmata post uigores. Victus autem siccior, & ut his superfluitatibus habens his conuenit, & ciborum abstinentia, aut passimonia, & balneorum assidueum abstinentia. Loti uero, nitris & alijs deficiētibz utantur. In declinationibus autem exercitijs & frictionibus articulorū maxime utantur, & naturalibus balneis, aut etiam arenae ingestione, uo misibusq. a raphanis ac cibus. Qui uero ad hoc idonei sunt, etiam per ueratrū albi euacuantur per uomitus, aut etiam per infernam alui purgationem.

Contra uerum quae mixti humoris fluxiones laborant.

Qui ex mixto humore affecti sunt, post sanguinis in principio morbie, uacuationem, relatis localibus auxilijs utantur, si quidem biliosior & acrior

*Tafis d'orge
reprobius*

Tumori loci

est redolens sanguis, his quae in talis fluxione relata sunt. Si uero frigidi-
or & pinosior, aut etiam magis atrabilarius, his quae post illa dicta sunt,
exceptis ualde scribis. Si uero diuturnum sit malum, etiam his. Sed & hoc
complicata ab initio conuenit. Malicorium & rhus, & potentia, in uino tri-
ta imponuntur. Aliud. Ad solia brassicae cocta ac probe trita socem acce-
ti adiecta, & quorum crudorum uittello & dros, & rosacei parum, & trita in
posito assidue permutando. Cibos autem attenuantes & parum nutriendos
sumant, proinde & carnibus ac leguminibus abstinent, & à uino copiosius
re ne nigro. Quid si fieri possit, etiam in totum uini potum uident. Multos

*Uini abstinen-
tia multa*

enim noui qui à solo hoc penitus abstinent, et omnes opem senserunt.
Quidam etiam in principio morbi perfecte liberati sunt quidam potius, &
raro, & neque ualde dolorose exacerbati sunt. Si igitur nihil adeo ex hoc
concolat, aut in futurum timetur, per totam uitam à uino abstineat. Qui
uero propter debilitatem, aut per refrigerationem, aliquantulum succumbere
apparuerit, ubi ad biennium à uino abstinerant, hinc iam modicum &
aequum perpetuo bibant. Oportet autem eos qui à uino abstinent, pro ui-
no anisi decoctum bibere, aut aliquis eiusmodi seminis, abstinendo quan-
tum eius fieri potest à fructibus pomorum, & reliquis perfrigerantibus, itaq;
à Veneris usu. Qui uero medicamentis quae per annum bibantur periculi
à morbo liberare uolunt, hi plerq; pinosiores ac superfluatius abun-
dantes fuerunt: calidioribus autem & siccioribus repentina mortis causa
fuerunt, materia ad intestinum, aut rheum, aut lassa, aut pulmonem, aut ali-
quam primariam partem translata. Melior igitur est in huiusmodi, aut
multo sanguinem redolentibus, nisi usum uitare, quam ex hoc uisus in re-
lata pericula incidat. Verum in si frigidioribus & superfluatibus relictis,
theriaca ex uiperis utendum est, ita in bonafacta concoctione frequenter
ipsum sumat hyeme, rarius autem aestate. Aut enim à meritis lib. v. aut non
denariorem ipsam red dit, nullam relaxationem parum laedens. Quandoquidē

*Amiditi an-
ticipati*

uero cogunt aliqui nos etiam ad relaxatorem antidotorum usum, eundem in ye-
neris esse scito, & quod ex Demasione paratur, & quod Apapet appellat-
ur, & inordinatum dictum, & Ochridon octo rebus constans, & quod pro-
pelo adscribitur, & quod ex scordio fit, & quod ex corallis, & alijs complu-
ra. Verum securissimum omnium, insuper et uisum experiri et esse, quod ex
corallo paratur, ut quod etiam totos in articulis tam reos, & dissolutos. Ho-
rum autem omnium & facillimes, & usus modum, & in his cautiorem, in
libro de medicamentis comperies. Similiter etiam philosophorum ad artu-
ticos, & compositiones eas, & usus modum, in ipsam habuimus, pinosioribus
dico, in usum ueniendum. Alij ad totius morbi exclusionem, ut specu-
latus sum in oleo coquentes arthriticis modentur, parum uisus in maxime
leues uiscentes, parum mortui. Similiter etiam hyetnas coquunt, discuf-
toribus oleum facientes. Deinde solia ex ipso complentes, & arthriticos in
ipsa demittentes, & multo tempore immorari habentes. Iuxta hoc autem cū
pugnet non solum timores circa articulos, sed etiam totum corpus vacuare.

De ipsis.

*Tofia an-
ticipati*

Quandoquidē etiam tofi sepe in articulis coguntur, aliquando ob cras-
sum ac terrensium humorem in ipsos inuentum, aliquando etiam ob medicam-
entorum dissensionem ac inmodice resu cationem, citra concoctionem,
utrum, sed nosse expedit, commodiora pharmaca esse quae uisum cum hoc quid
molliunt, etiam diu utere solent. Molliant itaq; adipem uiculi, & medullas,
& ammoniacum, & balastrum, oleumq; ualde uetus, & styrac. Ili ueniunt
etiam & succum, nigrum, sal. lixuriam, adarce, euphorbium, & lunilia. Ve-
nim ad tofos in articulis praesentem facit casus uenissimus & acerrimus,
cum cunctis laetitia putiginis ac ueteris decocto tuius ac impeditus. Urumpen-
te enim tofo sua sponte, quondam enacundo contrahit. Compendium autem
si quod ex penia sit, experiri uisum cognatum esse, & dupliciter parari, &

*Asperum
spuma*

quod

A quod à lixiuio appellatur. Sed & hoc priuatim facit. Aphronitri, terebinthi-
næ, lixiuij ex cinere calce addito parati, propolis, singulorum trientem, ce-
ræ dodrantem, colophonie lib. 1. olei unc. xvi. mixtis utere ad tofos. *Condere
terre*
& ab-
fcessus. Quod uero ex cinabari paratur, admirandum quidem & ad tofos,
& ad plura alia, sed difficulter haberi potest. At quod ex nucibus auellanis
fit, ad hoc quod scilicet em succellum habet, etiam facile parari potest, & non
solum in fortioribus, sed etiam fistulis seu su pñditis corporibus conuenit,
si emplastrum ex melle, aut quod ex anemona fit, dux parces ad unam ipsius
assumantur. Si uero non adsint, etiam ex eo quod ex cerussa fit, & qualis por-
tio ad ipsum amouiscetur. Aliud ad tofos. Sanderscham tritam uel co-
quercino excipe ac utere. Aliud. Facit etiam ad fistulas & Aegilopias.
Olei sextar. i. ipsum æ argenti bellum, & unci æ dimidius, auripigmenti unc.
i. Spumam argenti & oleam coquito, donec non amplius inquinent. Dein
de auripigmentum ualde tritum inspergito, & prius quàm adharuerit, ab i-
gue ablatis untor. Quæ uero ex lapidis Aq̃ flore in intervalis exacerbatio-
num imponatur, ad omnes circa articulos consistentes collectiones con-
uenientia, æterum testimonia quorundam, huiusmodi habere et edun-
tur. Sed & id quod ex suis flore paratur, in declinationibus similiter impo-
suum, reliquos tumores discutere creditur.

De præsentibus podagra.

Podagram iam consistentem, aut etiam arthritidem, corrigere op̃erosissi-
mum est, citra relictas methodos. Verum eam quæ nondum facta est, præca-
uere facile est, ita ut cibus detractio fiat, & eis utatur quis, qui & facile con-
coquantur ac distribuuntur, & nihil superfluum habent, itemq̃ uino mo-
derato: & ut exercitijs addito fiat, quantum satis esse uisum fuerit. Auxilij
uero loco, sal in oleo tritus, & articulis affricatus. omnibus qui præcauere ne
in podagricam affectionem incidant, magnifice prodest, si nō ualde siccam
habuerint intemperiem. Oportet autem eo uti mane & uesp̃e per omnem
uitam. Sed & post inflammationum declinationes eodem utendum est.

Ad priuatum in plantis ac pedibus. Cap. LXXIX.

P^{er}iniones ulcerose sunt affectiones, circa manū ac pedum digitos consi-
stentes hyemis tempore. Oportet itaq̃ ipsos aqua marina tepida perfun-
dere, aut betæ, aut lentis, aut erui, aut radicis asphodeli decoctio post perfu-
sione lentis coctas in uino tritas imponito. Aut ficus tritas cum oleo im-
ponito. Aut alumen, & farina, æquis partibus in uino trita adhibeto. aut
fecem uini subaridam. Aut balbum recentem uino tritum imponito. Aut
allium in oleo torreto, ac rejecto, & moderata cera in oleo liquata imponi-
to. Aut malicorium uino coctum ac tritum, cerato rosaceo excipito ac uti-
tor, irrigatione ex lupinorum decoctio præmissa. Aut mannā, & sulphur
uiuū cum melle cocto imponito. Arthrocycami succus afflicto illitus, ab
inflammatione ac dolore conferuat.

Medicamentum ad perinones.

Rapi radicem excusato, & in foliulam excusatam ceræ sextantem, & or-
leis lendicini sextantem indito, & in duplici uase. in aqua marina, aut ma-
rina, aut lupinorum decoctio coquito, & hoc quidem per uindictam, ceratum ue-
ro in uapo liquatum, frigidum imponito. Verum in ulceratis perinio-
nibus, thuris, aluminis causti, rubricæ, resinæ, æquales partes, adipe suis-
lo dilutas excipe ac utere. Ceterum ad ulceratos cum inflammatione, he-
zopharmaco hilex rebus quas recipit appellato utere. Olei dodrantem, ad-
ipii aurini, fellis item, singulorum libram i. spumæ argenti sextancem, co-
lophonie trientem, mellis sextancem.

Ad digitum ex intore pedum.

Picem liquidam sinisio. Aut cinereum fluxatilem aut marinum in pau-
nis exurto, & detracta ressa, cum oleo terito, & ad mellis spissitudinem re-
digito, & præterea rimis instillato. Facit & scillæ pars interna oleo serue-
re.

da, & cum creberrima contrita, & cum ceruicem uisum & adipe capri a
no excepti. uerū dignos praeiudicare oportet, & sic medicamenta adhibere.

Ad fissuram perianthii septuaginta floribus emplastrum.

Calceolae drach. X. ceruicis drach. XX. cere drach. XX. aut XXX. adli-
pis porcinis recentis & pumicem, colophoniam dodrantem, facit seminis lini
cyath. I. olei dulcis uncias XL. teneram plantam facit uelut nullum aliud.
Aliud. Adipis capri, ceruicis, olei, aequis portionibus utere. Aliud. Ma-
liconem in aceto coctū per quinque dies imposito, deinde circum circa mun-
datis calceoli oleo aut strigmento imposito. Aliud. Scillā in oleo coquita,
& ipsam quidē torrefactā rejecta, in oleo uero creberrimā liquata, ac uti-
li.

Ad atrius perianthii septuaginta drachma.

(tor.

Cere, olei, spumae argenti, mellis, singulorum aequales partes, facit etiam
ad omnem ulcerationem plantarum ac calcaneorum, & uolarum, & inter-
nae digitorum pariti, & hoc magis si uelcus propinquum unguis fuerit.

Ad foridum in planta oleum medicamentum quod in unguis induitur.

Facit etiam ad pudendum. Amurcae cyath. I. aceti cyath. I. coquito in uase
aeneo ad mellis spissitudinem, & priuatim squamam teris drach. II. mannis
drach. II. Lanarum faccidarum mollium tede obsoletarum ac utitur eue-
ris, quantū manu prehendi potest terito, excipitque omnia, ac utitur, ad ul-
nera quidē aino diluta, ad pudenda uero se plantae passa. Aliud. Amur-
cae, mellis deipurae, singulorum pares portiones. Hoc etiam gingivas purgat.

Ad unguis ex calcem entis, facit pulmo agnēus, & porcelinas, & capri-
nas, coria ueteribus soleis ulla, inflammata quidem non proficiunt, uerum
sedata inflammatione opitulantur. Aut cepam cum multo gallinaceo adipe
imponere. Aut gallinam istam inspergere. Aut acaciam aceto dilutam stillare.

Ad unguis ac callos.

Cape LXXX.

AD clauos praeiudicatos unam aliquam ex comenditibus compositis.
Albus imponere oportet, aut eruginem rasam, aut sandaracham, aut si-
stilis dicam puluillum siccat, aut silulare collutium, pumit uice, aut
montaco coarctum. Illi autem clauus rotundus, albus, clauus capiti admi-
lis, circa omnes corporis partes cohaerens, maxime tamen in plantis ac di-
gitis pedum. Ausuratur autem longiore tempore, etiam si quis permanserit
clauus partes uisibiles deorsum callosos, aut pumice deteras, mundatur etiam
callus. Facit & lupinarum crudarum uisum cum melle. Mōy pice li-
quida exceptum. Multo uisum cum pueri impuberis urina. Lixi lumentū
cum aceto coctum. Hoc autem sepe experimento cognitum est. Canduri-
dum, stramentū succis, callosos singulorum aequales partes, excipiantur re-
tinctura ad emplastrum formam, & clauus praeiudicatus imponatur. A-
liud. Fecis uini uisum, callos uisum, uisum singulorum pares portiones cum li-
xiuo aut urina pueri impuberis.

De offitio de curia uagatorum prius de paronychia.

Cape LXXXI.

Paronychia id est reduita abscessus est circa radicem unguis cohaerens.
Quam alius parua est paronychia & incipiens, galla cum melle copri-
mit, ac coacta est in pedem. Aut Melle pastillum, aut Nere, cum aqua. Verū
ubi iam caro praeter naturam excreuit, leopum habentis ut ipsam per noctem
in odenta contemimus, ac rumpimus. Facit ad paronychias, arrium for-
des, & hyetum. Suppuratum autem punges, & emisso humore spongiam
aqua imbutam impones. Auelentem cum aqua tritam adhibeto. Aut pho-
nitionem emplastrum cum uino. Aut uisum in fides lixe lixos, & pumice cera-
tas ar trito. Aut puluerem cum aqua facit etiam ad paronychias furina in
pinnam melle, aut uino emisso subacta. Ad ulcerationem unguis, eruginis, spu-
mae argenti, singulorum drachmas quatuor. Sarcocollis drachmas quatuor,
quantum satis est insperge, & superne linamentū ex uino, atemque
spongiam impone. Opus est autem & cariem unguis
quaque ab ungue dispare.

De pterygla.

Pterygium est nimium carnis incrementum, quod partem unguis operit, ex paronychia, aut alia huiusmodi causa ortum habens. Ad hoc igitur auripigmentum, & massam, æquis portionibus insperge, & superne linamentum ex uino, & spongiam impone. Aliud. Chalcididis, squamarum æris, malicorum, singulorum æquales partes. Excipe fici affata & melle, & hoc prius ex spissamentorum decoctio rigato impone. Quod uero de pterygio exarsit depurga.

*Pterygium
spissamentum
decoctum*

Ad digitum pterygi parafentia, et ad puldorem alera.

Thuris drach. i. squamarum æris drach. i. æruginis rase drach. iiii. mellis cyath. i. cerito ad solem donec subtilia fiant, & utere cum splendio, loco ex uino pririgato. Aliud, breui resiccans ac curans pterygla. Sorcos uisit drach. i. thuris drach. ii. æruginis rase drach. i. cum melle contrita pterygio ipsi impone. facit etiam ad reliqua horum locorum ulcera maligna, & nigredines, & putrefacta. Aliud. Squamam æris palmularum aut ficiuæ carne excipe, ac utere. Aliud. Columbinum fiant cum polente poliline in passo coctum ac tritum, calidum impone. Sed & æris squama per se insperfa pterygia resiccant. Oportet autem angulum unguis affidæ per se calpellum eleuatum auferre, ut ne augescens, pterygium pangat.

Ad ecquisos ungues. Myrti & mali panice solita tenet et imponito.

Ad subnatos ungues. Farinam pice ammixta imponito.

Ut discedat affectus ungues. Sulphur tritum adipe suo excipit imponito.

Ut discendant scabi ungues. Visci quercini, sandarachæ, foenigræci, singulorum sextantem, cantharidum, chaplinæ, singulorum unc. i. aceti quod sita est. Aliud. Propolis Anticæ, ceræ, bituminis, singulorum drach. i. sulphuris uini drach. i. Excipe sine oleo, ut ne inquinent. Vltimo expere te castæum medicamentum unguibus obducitur. Aliud. Pictis liquidis, ceræ, colophonis, cerebinthinæ, ammoniaci rhymitantis, sulphuris uini, sphronis, singulorum æquales partes, ut ne inquinant. Aliud quod scabros ungues discedere facit absque pulueratione. Bituminis, auripigmenti, sandarachæ, sulphuris uini, singulorum drach. i. iiii. Excipe resina, & utere ex oleo uero per se poma in diem. Aliud. Farina crui felle ouillo, aut urina ouilla subacta utere. Aut calce cum oleo. Aut malicbe chia cum opobalsamo. Aut uiscerum, ceræ, ammoniaci, & sulphur uinum, quod sita est excipe, & pelliculæ inductum impone. Aut staphilem sylvæstrum cum aceto tritum adhibe. Aut resinæ terebinthinæ drach. i. sandarachæ duplum, ad radicem unguis simul impone, ac diligenter deliga. Quum uero exciderit ungula, ceram myrti imponere, cui parsi additum sit de medica mento ex resina parato.

CAPITA QVARTI LIBRI.

In hoc libro, qui quartus est totius Operis, de affectionibus quæ in articulis, et sparsim, extra corpus maxime fiunt, tractatio habetur.

De elephante	Cap. I	De papulis sive bullis	Cap. XX
De lepra & scabie	Cap. II	Ad ambusta	Cap. XXI
De impoigine	Cap. III	Ad eos qui flagris caesi sunt.	Cap. XXII
De pruritu	Cap. IIII	Urpili ex ambustis nascentes.	Cap. XXIII
De lence	Cap. V		
De vitiligine alba ac nigra.	Cap. VI	Ad desquamata	Cap. XXIIII
Ad hæmata	Cap. VII	De uerrucatum speciebus.	Cap. XXV
De pustulis	Cap. VIII	De ganglio	Cap. XXVI
De pustulis nocturnis	Cap. IX	De inflammatione	Cap. XXVII

De abscessibus corporis externis.	De canis ulceribus	Cap. XL ^A
Cap. XVIII	Repurgatoria sordidorum ulcerum	
De gangraena & carie	Cap. XLII	
Cap. XIX	Ad uicines ulcerum	Cap. XLIII
De herpes	Cap. XX	De carne ulcerum excrecente. Cap.
De igne sacro	Cap. XXI	put. XLIII
De tuberculo, bubone, & pano.		
Cap. XXII	De nomis proserpendo depascensibus, & putredinibus ac phagedenae	Cap. XLIII
De furunculo	Cap. XXIII	
De terebantho	Cap. XXIII	
De carbunculo	Cap. XXV	De ulceribus cicatrice indigentibus.
De cancro	Cap. XXVI	Cap. XLV
De cancro facis	Cap. XXVII	De malignis ulceribus, quae & chironiae, & telephidae appellantur.
De inflammatione	Cap. XXVIII	Cap. XLVI
De luxatis & conuulsis.	Cap. XXIX	Ad cicatrices nigras
De carne contusa & fugillaris.	Cap. XXX	Cap. XLVII
De raptione ac unctione.	Cap. XXXI	De linibus
De scabie	Cap. XXXII	Cap. XLVIII
De strumis	Cap. XXXIII	De fistula
De Stenomatibus, & atheromatibus, ac meliceridibus.	Cap. XXXIII	De ulceribus quae restringuntur.
De faui	Cap. XXXV	Cap. L
De simplici ulcere	Cap. XXXVI	De ulceribus in articulis
Quae glutinare possunt ulcera.	Cap. XXXVII	Cap. LI
Ad dolores ne inflammata ulcera.	Cap. XXXVIII	Quae spicula, aculeos, & spinas extrahant, & confimilia
Cap. XXXVIII		Cap. LII
Aderata & non suppurantia ulcera	Cap. XXXIX	De sanguinis tumore ex uena, tum ex arteria eruptione
		Cap. LIII
		De nervi laesione
		Cap. LIV
		De agneculorum distortionibus.
		Cap. LV
		De luxatis articulis
		Cap. LVI
		De lumbrieis
		Cap. LVII
		De dracunculis
		Cap. LVIII

PAVLI AEGINETAE REI MEDICAE LIBER IIII.

CAE LIBER IIII. ~~PAVLI AEGINETAE REI MEDICAE LIBER IIII.~~

Medico Physico interprete.

De Elephant. Cap. I.

Aortam Cap.
pulmon
Cancer est de
phus autem
partis
Elephas est de
cor tatione car
partis



REI MEDICAE PAVLI AEGINETAE ita dicere arbitror, Auxilliorum facilitatem morbis superioribus esse oportere, & propterea Elephantem curari non posse. Non enim reperitur medicum eo superiorem. Si enim cancer qui uelut elephas quidam est in una parte, ex incurabilibus etiam ab ipso Hippocrate nominatus est: quomodo non magis elephas qui nichil cancer quidam in toto corpore est, omnino incurabilis erit? Quam enim atrocius ex qua hae affectio consistat, dupliorem generationem habet: Aut enim ex arabilioris ne feculentioris humore, & uelut sanguinis filis moeant ex flava bile, utriusque superaffatis generam: subrubros quidem Elephantas minus quodammodo, aut uerius dicam, minus malignos, peius autem ex huius differentia efficit. Alios uero, qui etiam maligniores sunt, & totum corpus exaleant, & extremarum partium elapsus faciunt, posterior differentia ex flava, bilenimium affara generata producit. Quapropter de his qui iam morbo detenti sunt desperandum est. Vbi uero in principio est affectio, ut neque aliqua extremarum partium decidat, neque ulcerata sit cutis superficialis, neque etiam tumidae eminentiae plurimum insurgant: Verò superis solum

Apis solum sit facies, ita tamen ut non ualde indecorum aspectum præferat, curare tentabimus. Non pauci enim per solam capitis unctionem, plerisque qui ita inciperent morbo, uenæ sectione utuntur, cum repetita sanguinis detractione, atq; hoc magis in uere, quando maxime & gignitur affectio, & exacerbatur. Paucis autem interpolatis diebus, nouem aut decem, purgamus ipsos pulre ex colocynthidē, non una uice, sed sæpe, iuxta rationem medicamenti quantitatem adaugentes, purgatio quoq; ex hiera his commoda est. Rursum autem diebus circiter decem interiectis, serum lactis scissū ipsi dandum est, non infra trium horarum mensuram, neq; supra quinq;. Sequentibus uero diebus lactem non scisso, aut rectis malisio alantur. Ex his si quidem remittit affectio, eodem alimēto utantur. Si uero perseverat, a lacte abstinētes, & ab acrim edū uocant, itemq; à raphanis & cibus. Commoda est etiam postea ex uetrato albo purgatio, his sibi fieri potest in uetro, semel in autumno. Cæterum his qui à malo uicē sunt, neq; uena secetur, neq; uentrū detur. Neq; enim transito à cute ad profundum contingit, neq; immūtur, nisi mātēte ex his amplius sit. Verum materiam ad uentrū ac intestina deducere oportet, & ex alto cuos antibus ac transferentibus humores uti, sic euresq; ac adstringere cutem. Lenēs igitur excubite ad os uentriculi, & ad præcordia affigantur. Et si idem quoq; paribus dropaces adhibeantur. Puro autem tempore interpolito rursus reflectendum est, in idō à purgatione per hieram sumpto, omnia uenæ sectione, ex qua malus detrimendus, quā uictus ulla futura esset. Et hoc circiter ter aut quater in anno urendum est, maxime uere & autumno. Portiones autē his consentiant hæ. Aceti cyathi. i. cum cedria cyathi. i. & succi brassicæ crude cyathi. ii. Mixta hæc dantur mane & uespere. Antiscorbuticis herbarū folia arida drachmæ pondere, in uini cyathis uno. Aut coma ceruini drach. i. & aceti scissini cyathi mensurā bibendam præbe quoddie post maturinā deambulationem. Sed & alia circa hoc tempus dentur. Aut scillæ assuæ drach. v. in aqua mulsa, aut in melle ad eclegmatis modum. Aut succi cyrenaci erui magnitudinem, melle & butyro dilutus. Aut ramēti eboris drach. j. cum uini cyathi. ii. Aut cumini Aethiopici drach. ii. cum melle uelut eclegma. His autem magis opitulatur pastillum theriacorum drach. i. in uini boni cyathis uno trita ac pota. Similiter etiam pastillum scissilicorum drach. i. bibatur. Sed & calaminthæ succum, uelut efficacissimum auxilium laudans, porum incipiam autem esse asumi à tribus cyathis usq; ad sex. præ omnibus autem efficacior est theriaca ex uiperis, & pota, & forissecus illita. Si uero habent post se ipsa animalcula, nihil adeo efficax est, uelut uiperarum carnes coctæ comellæ ex albo iure, salsa coctura per aquam copiosiorē, & salem, & porrum, & anethum, usq; ad spinarum separationem, abscissis prius capibus ac caudis ipsarum, ad digitorum quatuor mensuram, exemptis etiam interuenientibus, pellesq; degracla. Quin & theriaci sales idem cōpromittant, cum obsonijs sumpti. Sic enim si ipsi utantur, contingit aliquando squama, aut uelut quendam corticem de cute ipsarum discedere. Cæterum uictus ratio huiuscemodi sit post somnos præfrictus, & alius exonerata, gestetur, & uosseretur deinde licetur, & uale exerceatur, partim saltu, partim & quidē amplius flatteribus, & follis ulla. Detergio autem sudore, illinatur oleo ursino, aut ursipino, aut hircino, aut uolucrino quopis, aut beryro recenti. Modico uero tempore intercedente lauetur, illinens succo fenugreci, aut pilisæ, aut modicum ammoniaci cum aceto dilutum. Post balneum detergius illinatur lentiscino, aut cenanthino, aut myrteo, & uino modico cum alumine, aut ammoniaco, ut frigiditas sit spissitudo. Detergius autem rursus mollibus linetis, ad dimēdiam horam qui est at, post quam pota aqua, immo illis digitis aut pinis uomat. A uominu uero uinum abanthites aut origanites bibat. Cibis sint panis ordaceus, aut maza ex polenta. Olera

Pulre colicis
cyathideVentrū ab
acrim qñViperarū
carne qñDetergius cum
ursinum

uero heri, lactuca, raphanus, pontum, brassica duabus aquis edulcata, & cappa-
ris. Ex mari uero, ostrea, pelorides, entiaci, pectines, tellina cum be-
tis cocta, salimentum uetus medicamentum loco. A uino autem per totum
morbum abstinere, itemq; a Venere, ita ut paucissimum solum, & tenue,
& aquosum uinum, iuxta tempus refectionis ex purgationibus sumant. In
quo etiam acris auferantur, condonatis exceptis. Danda autem sunt ipsi,
pulsana, oua, alia cocta, lac, & mel cum pane, malua, rumex, sisarum, pisces
tenete carnis, & ex uolucribus bono succo praedita. Ex fructibus, si cas, ur-
ua, & uuae passim. Ex dulcorijs ea quae ex nucleis pineis, aut amygdalis co-
ctis, & enico parantur. His autem in die alantur, grane enim his est semel in
die cibum capere. Ceterum post curationem in trinis cam, sine igne aia in bal-
neo utantur, ex decocto betae aut konigraci, cum aphronitro, aut sapone,
aut myrobalano, & quandoq; etiam pilosulis. Detrahet etiam portulaca
cum aceto trita, & tenue semper uinum, & rumicis radices aceto coctae, &
alumen cum sale & sandarachia aequalis portionibus, in uino & oleo lentissi-
mo. Et id quod ad uisiliginis desuperfite est, ex alcyono, nitro, sulphure, myr-
ti folijs, & cici sythacris folijs aridis, cum aceto tritum ac illinum. Et quod ex
sepiæ testa uita, & pumice, nitro, cimolia tosta, gummi, & galla omphac-
na, partibus paribus paratur, sic cum sulphure, aut cum aceto affricit. Sed
& hoc mirifice facit. Rumicis radices fasciculum plene manus, nati drach.
XII. diuris drach. XXV. sulphuris drach. XXV. cum aceto Aegyptio illin-
tur. Efficax est & hoc, Auripigmenti drach. X. sulphuris uiui drach. VIIII.
cocti drach. XII. caleti uiui drach. IIII. ceræ drach. IIII. baccarum lauri an-
danum drach. XII. Haec populi foliorum succo, aut crasso decocto subigan-
tur, & in illis spissitudinem habentia illinuntur. Aliud. Rumicis radices
fasciculi duo in aceto coquantur, & in psal tunduntur ac conteruntur. De-
inde Alcyonij lib. i. sumis, aphroniti bellum, sulphuris uiui lib. i. restaram
cochlearum uisitam stentem, chameleoni nigri radices trientem. Conte-
runtur omnia ad frigiditatem crassitudinē, deinde illinuntur, uita e qui-
dem in sole sepe. hyeme uero in balneo, usq; ad exsudationem. Quin & Ae-
sculapij aridum sinegma bene his congruit, & omnia quae in communi re-
feruntur deflorata, siq; ad ea quae ad uisiliginis describuntur, quemadmo-
dum etiam nunc uita illis quoq; competant. At uero tumida eminentia
inflammata aut exulcerata dinstant lycio Indico, aut glaucio, aut aloē, aut
Andronio pallido, aut polydæ sphragide. Cataplasma imponatur ipsa ex
alica, cum succo polygoni, aut plantaginis, aut helicina trita. Sed & Mile-
sae herba uiridis folia cum axungia uisae impolita, mirifice optulauit.
Rubeant enim inde partes, uentum facile sedantur pane impolito, aut cer-
to ex oleo amygdalino facto, & ad naturalem colorem restituantur. Iul-
cerata autem partibus coeuntur emplastra, id quod ex diphryge paratur,
& Melinum ex uino, & coracium, & quod sit ex aceto multo. Et pistillus
Andronius, & posipholyx, & cadmea. Signum porro quod moderatet
fiat, uero mortuus, est quod prima ulcera ad cicatricem perueniunt. Cete-
rum ad sperandi difficultate in elephanticiis, asellos sub uisita aqua uis quin-
que aut sex, ex aquae melle cyathis tribus bibendos praebe. In communi ue-
ro etiam aliqua ex his quae ad difficulter spicantes scripta sunt, ipsa conue-
niunt. Aquarum uero naturalium usum, uelut maxime necessarium eligere
opus est, aluminosarum praefertim & ferrosarum, & si fieri potest frigidari.
Conferunt autem ipsi eodem quoq; in pota. Eandem uim habet etiam are-
ne marinae uis, & omnia exudantia ac sudorifica. Quandoquidem uero
afflictio ex his est quae facile per contagionem distribuuntur, non minus
quam pestis, habita uero ipsorum quam longissime remouenda sunt ab ur-
bibus, & in urbi erantibus ac frigida locis statuenda, & in quibus pauci
homines, si ita fieri possit, uolentur, ita ut hinc in circumsitas locos digre-
di possint, tum sua ipsorum causa, tum etiam non minus ob eos qui ipsis
occurrunt

*Autum Aeg-
ypsiis*

Alkisa herba

*Contagio ex
elephantici*

A occurrere possint. Nam & ipsi aliter commodiore utatur, & alij malum impetigini non poterint.

De lepra & scabie.

Caput II.

VTraque harum affectionum asperitas cutis est, cum prurita, & eliquati-
one, ex iracundia humore generationem habens. Verum lepra per *Lepra*
profunditatem corporum cutem depalcitur orbiculatior modo, una cum *scabie*
hoc quod squamas pilicium squamis similes dimittit. Scabies autem magis
in superficiali haret, & varie figurata est, & furfuracea corporiscula remittit.
In his igitur uenas scitionem assumere oportet, si corpus humorum copia
redundare ubi uideatur. Sin minus, omnino tamen purgatione per ea que
atram bilem euacuant. Forniceus autem ueris in communi quidem ueris
tro utroque, & calce lepra in usum sicca seposita. Visuero expetente, aqua di-
luta srigimenti spissitudine illine. Aliud. Salutaria olea Aethiopica la-
chrima, singulorum drach. VII. corticis radicis capparie, gummi, singulo-
rum drach. XIII. illine cum aceto in sole. Lepras autem priusquam remouent
sagittione apposita, radix urtis alba. Composita uero hanc. farinae soliacae
choeniceae, cardamomi albi drach. II. spumae nuri drach. I. arramenti su-
torij drach. VII. asphodeli radicis mediet drach. III. terito in aceto, & ce-
raei crassitudinis illinito, loco ex nitro preparato: & ubi exolueris, quod per
tertium diem faciendum est, & aqua frigida ablueris, curas illine. Aliud.
Secci radicem asphodeli sexuncem, sulphuris uiri, mannae, singulorum drach.
X. niri drach. VIII. aceto diluta illine. Ad scabiem uero priusquam factum,
simplicia quidem, staphis sylvestris, lupini amari, cardamomum cum ace-
to, silij radix cum melle, resina terebinthina, sulphur, cicer, sterus capelinus.
Composita uero haec. Misy & chalcitidem, partibus partibus cum uino illi-
ne scabiei humidari. Aliud. Rododaphne folia tenera in olei sextan-
tio coquito, donec torrescant, ipsi seque abiectioni ad oleum cereae albae qua dran-
tem adijce, & hac soluta frigidifica cito, ac sulphuris uiri unciam unam insper-
gito, & in sole, aut in balneo illinito. Quidam cum rododaphne etiam scil-
lem coquunt. Aliud. Emplastrum ex faccis sextantem, cere sextantem, ro-
sacei unc. I. spumae argenti quadrantem, ceruse quadrantem, picis liquidae
sextantem, crementi argenti sextantem, syriaci sextantem, aceti quod satis
est ad strida torrenda. Aliud. Ceruse unc. I. amyli unc. I. plumbi unc. I.
loranorum rubrorum aut anthesis sextantem, cere sextantem, rosacei dor-
drantem Anchusam cum rosaceo probe coquito. Deinde reliqua adijcto.
Aliud. Oua decem, aut quot ad usum sufficiunt, in aceto acerrimo mace-
rato, donec putamen ipsorum molle fiat, deinde in ipso aceto uirellos ipso-
rum coquito, & cum rosaceo ac reliquo aceto etiam spumae argenti parum
coactrito, & srigimenti spissitudine illinito. Aliud. Oporum aceto ma-
ceratorum uirellos III. rosacei sextantem, sulphuris uiri quadrantem. Prae-
teritis cum aceto uirellos & sulphuri, cera tum adijcto. Quin & argenti spu-
ma cum aceto & rosaceo mitta, ut emplastrum formam accipiat, acnorem sca-
biei depingat. Sed & ex lapathio sinegnata, & pleraque ad elephanticos de-
scripsit sinegnata, in communi etiam ad lepras & scabiem faciant.

De impetigine.

Caput III.

Vbi grauius tenues & acris humores alijs crassis succis amixti sunt, im-
petigines lichenes dicti generantur, quae breuit in scabiem ac lepram
transiunt. Quapropter me dicam enus ut hementer siccanibus opus habet. *Impetigini*
Proinde postea corpus, si opus habuerit, euacuatione, simplicia ipsa *Lichens*
compertant, cicer, uetrum, erinaceus in petra degens, pix ceratig ac resing
summita, crocodili terrestris sterus, &URNORUM ubi solam oryzam ede-
rint. Multi uero hoc solo impetigines in mento, aut etiam alibi curauerunt.
Triticum multum incudi feracem imponunt, & defluentem ex ipso liquor-
em adhuc calidum impetigini illiunt. At puerosi impetigines salua ho-
minis assidue confectio. Ad hos facit & pruni gammi illum. Inaceratae
uero

uero impetiginis viticis foliis trita cum aceto imposito. Aut capparis folia a eodem modo. Compofita uero haec, Sulphur cum cinre, aut cum ammoniaco, aceto dilutum illinito.

Passila ad impetigines.

Glutinis fabris drach. iiii. rhuris drach. iiii. aceti cyathi dimidiū, aceto dilutos illinito. Alius. Chalcitidis, gummi, singulorū drach. vii. sulphuris uisui, miffos, singulorum drach. vi. aquae aris, acacis, singulorum drach. ii. cum aceto illine. Aliud. Sulphuris uisui, sponae natri, singulorum drach. iiii. canchrysa grana lxx. uentro cum aceto, & solam affricam partem illinere, ita ut integram ne contingat. Resiccant uero abluere frigida aqua. Aliud. Veratri albi drach. v. iiii. sario & lapinorū, buccinorū ulforum, natri, singulorum choeniceum. Stacea affricare. Ceterū, feras impetigines uocant eas quae ex moderate resiccantibus nihil opus sentiunt, ab acrioribus uero exacerbantur. In his igitur medicamenta adhibere oportet malum quidem efficacia, ita tamen ut ne uehementer mordeat, quale hoc est, Glauci, thuris, aleyonē, bituminis, sulphuris, gummi, singulorum unciam unam, illine cum aceto. Aliud. Picem aethiopicam cum aceto coctam liquefactam illinito.

Impetigines
ferae

Uic Aphro-
disia

Aliud ad impetigines & pruritus. Amramenti sutorij, sulphuris uisui, natri, rhuris, singulorum & quales partes, ad impetigines cum aceto, ad pruritus cum uino illinito. Aliud ad impetigines. Ammoniaci rhymitatis, balsamē erui, ac lapini, singulorum partes portiones, cum aceto.

De pruritu. Caput IIII.

Pruritus

Pruritus in senectute contingens, perfecte sanare non datur, utrum subscipis mitigare poteris. Qui uero ex uiciatis humoribus in alijs oboritur, cum sanare conuenit, humores uiciatos euacuando, qui sane fuerint biliosi, aut pituitosi, putrefacti aut salii. Cognoscuntur autem ab aetate, temperamento, uicū, tempore, regione, & reliquis eiusdem ordinis. Si igitur in uenis una cum sanguine redundare uideantur, à uena sectione incipendum est. Si uero qualitate magis assilunt, facta per conuenientis medicamenta ipsorum euacuatione, ad externam curationem nos conuertemus. Balneo itaque utrum est omnino saluū, quandoq; etiam ubi parum cibi accipit, rufus repetenda loca est. difficiliter enim humefari affectus potest. Defrictio uero fiat ex foenicula, aut betae, aut furfurum, aut malui syluestris & salsae, aut pessulae decocto. Insuperq; cum farina fabarum, aut lupini aut myrobalani, aut cum singulare peponaceo appellato. Si uero moram trahat, similiter quidem lauandum est, fomentum autem adhibendum ex decocto saluae, myrtae, mercurialis, origani, gulegi, baccarum laetulae, cucumeris syluestris, capparis: itemq; ex lixiuio, & muria acida. Deinde inspergatur nitrum sicū, aut cum fecce aceti. Aut medicamentū quod recipit spuma natri sextar. i. rhuris, sulphuris uisui, singulorum lib. i. cinerū lib. i. dimidiū. Aut hoc, Aphronitri, sulphuris uisui, aleyonē uisui, & quales singulorum partes adhibe aridas, aut cum aliquo ex relatis decoctis. Si uero uoles, etiam uetratum siccum insperge, extra pinguitudinem. Illinendum autem est oleum & acetum, conerita in ipsis asaphide lyta esset, aut sulphure, aut sandaracha, aut omnia simul. Aut linapi cum myrobalani expressio, & oleo ac aceto. Aut coctioe uisui ac trita cum melle. Aut ramis radices, aut singula ex ipsa parata, uel capite de Elephan tedictum est. Aut aliqua ex his quae ad icabiem relata sunt. Quod si exulcerentur partes, utendum est parygo emplastro, aut ex pompholygo parato. Aut ceruicem i. in olei cyprini cyathi, liquato, & sulphuris uisui unc. i. adiecto. Aliud ad pruritus. Nucum magnarum rascidarum unc. i. sulphuris uisui. i. cum aqua sarco tritis utere in balneo cum multa defrictione. Hoc solum multis labellis, & alijs pruriginosis sufficit. Sed & ipsum ipsum per se uidebitur in alio in balneo magnifice prodest.

Similiter

A. Similiter etiam perdidicum, & resina aceris cum rosaceo soluta ac illita.

Resina aceris

Aliud. Oryzæ puræ & ualde albæ quadrantem, tridito, cribrato, & aceto acerimo ad strigendum ipsissimudineq. terito, & sulphuris uini purissimi tritunc. I. adjecto, & probe mixtis in balneo utitor cum multa defricciónē. At in his qui superfluis humoribus magis abundant, si æquali pondere sulphur & oryzam miscueris, melius medicamentum effeceris.

De Leuce. Caput V.

L. Leuce transmutatio est cutis ad colorem albidiorē à uiscosa ac glutinosa oriens pituita. Quandoquidem uero non omnis leuce curabilis est, di-
Leuce
gnosciones ipsius tales habeto. Leucen in superficie non ultra cutē perpen-
dit, & si quidem sanguis fluxerit, curam recipit. Si uero humor sacculus,
Leuce candida in epidermide
incurabilis est. Auspinnicula laneo aspero ipsam conficans, & si quidem
subicundior color euaserit, curationē recipit. Si uero in eodem colore per-
manet, non curabitur. Quin & quæ plures corporis locos occupant, &
quæ uentiliores sunt, minus curationem recipiunt, quàm hæc quæ paucos
locos tenent, & recentiores exiliunt. Quidam igitur usionem per forum
in leuce probarunt, quæ per diffusionis modum solum adhiberetur. Alij ue-
ro & ex usione dolorem, & ex hac cicatricem uerit, quæ nō minus quàm
ipsa leuce decorem uiliaret, crassiam inducentibus medicamentis usi sunt,
quæ etiam concolorem cicatricem efficere tradunt. Alij etiam hori doli
cultam reprobantes, sincluras adhibuerunt, imposuerunt magis quàm uti-
litate studiosi, quos pro omnibus reprobare oportet, propter uelocem asse-
ditionis regenerationem. Utendum igitur est subiectis compositionibus.
Adarces, canchryos, sulphuris nitri, singulorū æquales partes. Singula trita
ac cribrata seorsum, deinde cum aceto simul ad multos dies lenigata in so-
le illinito, non acerrimè, ut ne cutis exulceretur. progreſſu uero temporis
adjectum parum quid de neratro, & de galla similiter. **Aliud.** Fici nigre
ungula aceto in aceto, & leuigatis aphonitri, sulphuris uini, amyrici fru-
ctus, singulorum æquales portiones ammisceto, & nitro præfrictis illinito,
ac insolato. cauendo ut ne exulcerentur. Archigenes autem calce uia sus-
ficiendi, ad fici folia ammixta usus est, aut ubi debueris inquit, leucas ue-
rastro albo donec euadere, quo reliquo corpori concolores fiant, sinopide
autem illiusde terra illine. Aut acubus simul insistentibus perpunctione facta
donec cruorem fundant, sinopide cum aceto illine. Aut præfrictus uelut di-
ctum est, fici succo recenti illinito, & folia ipsius aliquantulum confricato.

De virgine alba signa. Cap. VI.

V. Virginitas generatio eadem cum leuca species est. Verum illæ ad pro-
fundum usq. corpus mutant, ut etiam pilis similes enascantur. Virgini-
nes uero in cutis superficie consistunt, præterquam quod etiam ipsæ moram
trahentes ad profundum usq. procedant, ut etiam pilos albos producant,
propter subiectum humorem. Num ex pituitoso humore calbæ sunt, nigre
uero ab atrabiliario. In communi igitur utrisq. conuenit calx lota aqua so-
luta. Aut dracontij radix cum aceto imposita. Similiter ueratram utrunq.
lupulorum amarorum decoctum affusum, & farina ipsorum imposita cum
aceto aut aceto inulso. Capparidis radicis cortex cum aceto. Ilij radix cum
melle tepaque cum aceto illita in sole. crocodili terrestis hercus, similiter etiam
burnaginis ubi solam oryzam ederint, sepiæ testæ usq. Compositum uero
hoc, Alcyonij, nitri, singulorum sextantem, neratri albi, sulphuris uini, sin-
gulorū unciam unam. Quidam etiam fecis uini usq. unciam unam addit.
Aliud. Sulphuris uini, spumæ nitri, singulorū drach. iiii. canchryos gra-
ma lxx. terito cum aceto, & solam uirginitatem illinito, ita ut integram par-
tem ne contingas. Reficcatum uero a blutro frigida aqua. **Aliud.** Parie-
tis lupineorum, baccinorum usiorum, nitri, singulorum choeniceum, neratri
albi drach. vii. sicca affricato. **Aliud.** Parie. etnisi lib. ii. seminis eracæ,
amygdalarum amararum, radicis cucumeris syluestris, singulorū lib. i. sol-
o no nullis

no malis leuigata illinito, & post horæ spatium spongia detergitur, facit & ad maculas solares, & uaricæ, & alias cutis maculas.

Ad albuginem alba experimento conuenit.

Sulphuris uisifexchar. ii. calcis uiuæ albæ trientem, candidum ouorum quinq; olei nardini & aceti parum. Sulphur primum teritur, deinde nardinum adijciunt, & rursus teritur, atq; ita acenum infillatur, ac rursus teritur. Calx aut prius in loca semel, & iterum atque iterum sulphuri additur, unâ cum candido ouorum, & rursus teritur, & coactus humor diffunditur, ita ut modicum eius relinquamus, quo unguentum illini possit, atq; sic utimur.

Aliud Archigenus. Sulphur uiuum, sicut folia arida, aphronitrum, aleyonium, cinerolium terram, in yreum, cum aceto adhibe.

Aliud Archigenus. Fici foliorum in umbra siccatorum, sulphurea, aluminis, æquales singulorum portiones, cum aceto illine. Aut sicut foliorum drach. iiii. nitri drach. ii. aleyoniæ albi drach. ii. cum aceto illine in balneo. Prius tamen uisifligines nigras ex acie tollit sandaracha cum dimidia sulphuris parte. Verum nitro præparata hæc in sole illinito. At uero albidis, atramentis fuscis, æruginis, æquales singulorum partes, nitri duplum, abis pinguitudine affricare. Aut caechryos, sulphuris uisifadare res, æquales singulorum portiones, cum aceto affricare, ac illinito. Quam autem resiccata fuerint, fricando a blando, idem etiam ad leucas facit.

Ad stigmata, ex libris Archigeni, Cap. VII.

*Stigmata.
Melle quod
uiscum*

STigmata eximes si ad quod macula inhiaret cum acrimonia aceto illinas. Aut calcis uiuæ partem i. nitri siccissimi partem dimidiam, cum aqua in sole illinito. Vbi uero exulcerata fuerint, uelut ulcus ad cicatricem perducit. At Crito ad stigmata inquit, locum nitro præfrictum cerebimichina integro, deinde deligatum ad sex dies finito, septima uero die soluto, & stigma acu perungit, & deterfo paulatim per spongiam sanguine, uelut sale confrecto. Deinde in possum medicamentum ad dies quinq; finito, est autem hoc: Thuris, nitri, calcis uiuæ, ceræ, singulorum drach. iiii. mellis drach. viii. postquam enim exoleuerit, atramentum in medicamento repperies. Aliud unguentum. Piperis drach. i. rutæ drach. iiii. sandarachæ drach. iiii. auripigmenti drach. i. Mellis quod lanas est, loco nitro præparato illinito, & reliqua similiter ut in priore facto. Soluto autem per eriduum, & atramento deterfo, rursus illinito. Tollit enim inquit, in diebus uisigulæ, etiam ulcerationem ac cicatricem.

*Castrofrin
gula*

Aliud casteam appellatum. Thuris drach. iiii. nitri drach. ii. atramenti siccissimi drach. iiii. ceræ drach. vi. piperis drach. iii. cæcis drach. iiii. aluipis drach. iiii. auripigmenti drach. i. sandarachæ drach. iiii. mellis quod lanas est, utere uelut superiore. Onibis uero autem, Ranunculus herba imposita, aut capparitis folia, stigmata exanant. Si uero in alto sint, & citius non possint, & non multa curæ occupant, frigido caustere crassa inducta tollit.

Deposita, Caput VIII.

Capula

PUstulae sunt crassis humoribus in cute impæctis, & magis adhuc si summa cuti cula densa est. In quibus igitur etiam in profundo humorum copia subsistit, eos prius purgare oportet. Si quis enim non prius hoc facit, de scutere aggredietur, ubi ubi ipsos magis quàm euacuat per cutem. Si uero profundius sine superficialibus fuerit, per cutem ipsos euacquare oportet, & non procul distrahere, quod contingat si per uentrem, aut per uentrem euacquare uelis. Ceterum curam nonem humorum cuti inlartorum, per somnia & castastorea facere oportet, & præsertim ubi late pustulae fuerint. Tales enim ex abunde frigido ac crasso humore generantur. Lani itaq; folia genera itaq; rutæ, utaq; post portione teritis, & mannam charis cum oleo dilutam addito ac illinito. Aut betum generam eodam tritam imponit. Aut ceræ drach. viii. sulphuris tantundem, silis drach. vi. Arida teritis, & olei cyathi dimidio affuso, omnia simul coquito, factisq; inde emplastra utitur.

^Aunitor. Coctura uero affidere oportet. ualde bonum est medicamentum.

De papula nocturna. Cap. IX.

^Papulae nocturnae ulcuscula sunt sua sponte euentia, bullarum instar, *Papulae nocturnae*
subrubicunda, ex quibus rapta subcreuerit sanies deserta. Atque haec quidem interdum non ualde infestans. Noctu enim dolorosa sunt, agis quibus pro ulceris ratione Silphij itaq; succum aqua diluti imponito. Succat enim abiq; moris. Aut cicuram leuigatam impone. Aut brassicam crudam cum aqua. Aut apiam cum polenta tritam imponito. Aut hyoscyami folia cum melle trita. Aut sola num per se, & cum confandro uiridi. Aut olea folijs coctis cum aqua utere. Aut uinas passas reiectis uinaceis tritas splenio infusitas impone. Aut adiantum tritum cum melle. Vitis uero debentur acris, acida ac salia ingerant. sumentia item utere, & bulicra, & splem.

De papulae sine bulla. Cap. X.

^Quae non sua sponte rumpuntur papulae sine bulla, & tamen dolore infestant, eas acuta acupersore conuenit ad commodum saniei desluxum. Deinde humorem leniter exprimere, ut ut cum propolice sanetur. Et si bulla repleta fuerit multum scito octulsi, ut si uisum sit persore oportet, & exprimere, & cutem adstrictam seruare, donec ad cicatricem perductum fuerit id quod sub ipsa est exulceratum. prius quam igitur pustula erumpant, lentem coctam tritam cum aqua imponito. Aut mali ponice uirgula calido cinere sepe facta adhibeto, & locos torreto. Si uero eruperint, & ulcus fiat, ad ipem suillum liquetum, & argenti spumam tritam misceto, & linteo infusitas imponito. aut silphij radicem in aqua coctam de trita, et ceruo imponito.

Ad papulae nocturnae bulla.

Spumam argenti, & sulphur uisum aequali portione, cum aceto & oleo myrteo, ad stringentiam spissitudinem trita, illines cum oleo & uino. Facit item & ad haec, & ad calidas eruptiones, & ad papulas effluentes, & ad achoras manantis capitis ulcuscula, & ad furunculos incipientes, & ad ambusta, medicamentum ex plumbagine, & quod ex ouis paratur.

Ad ambusta. Cap. XI.

^Ambusta moderate detergentibus medicamentis opus habent, citra hoc aut manifeste calefaciant aut frigesfaciant. Proinde terra chris, & cimolia, & creta, & omnis leuis terra, cum aceto non ualde aceti, aut aqua commixta, illis probe facit, & bullas excitari prohibet. Item ouum totum crudum euelligio impositum, lana molli exceptum. Nam & moderate perfrigerat, & citra mordacitatem reficit. Sed & stramento scriptorio oblinito, aut cinere aqua diluto, aut lenticula cocta trita, aut ceruo inungito. Ceterum ad ambustiones ex aqua calida prius quam bulla ex eueniat, olivarii muris conditarum aquam affundito, & ipsas olivas cum polenta tritas imponito. aut alumen scilum tritum cum aceto illinito. Aut sel marinum cum aqua larga liquatum illinito. Aut lixiuum affundito. Aut garo, aut muria perfundito, aut bulbos illorum, aut hyacinthi, aut narcissi, cum rosaceo tritos, & ad stringentem crassitudinem redactos illinito. At uero Marcellus compocuit hoc tradit. Panniculum melle imbuium, & in ordeo obvolutum exurito, et confectio cineris eius drach. vii. cerussae drach. xii. buryi drach. vii. cerucae drach. xvi. adipis capri drach. xvi. rosacei drach. xvi. Quod si iam bulla exierit fuerint, thymum & polentam tritam cum aceto impone. Aut calcem uisam cerato ammittam, & linteo infusitam impone. Quia & perfrigorium appellatum medicamentum ad haec commodum est. Quae uero ille erat, sunt. poero trito inunge. Aut portulacum tritum cum polenta impone. aut columbina miscens linteo inuolutum exure, & cinere eius oleo diluto utere, admirandum est medicamentum. Pinguis quoque ut pieere coites, aut adiannum sicum tritum, aut myrti folia uita trita inasperguntur. Facticij, gula haec etiam cum cerato composita. Sed & quod anchuse rubicundae radicis sicca, ualis, iuta tritentem recipis, & ceru albij dodrantem, rosacei un-

A Achate lapide utitur. Onibafius vero hoc, Ceruſe, reſing pinus, olei ueteris, ſingulorum unc. 3. ammoniaci thymiamatis, galbani, ſingulorum unc. 1. cera tritremca uel diſcum inquit, plumbeum craſſiorem ueluti ſunt uerticilluſ, ganglio maiorem inposito ac deligato. Grauitate enim diſſoluit ipſam per longius tempus. Sed & nos hoc utimur. facit etiam oxerum & maſſiſcherum emplaſtrum.

De inflammatione.

Capit.

XVII.

In communi quidem omnes calidos & doloroſos cum ardore tumores, inflammationes appellare ſolent. Verum prout diuerſa eſt materia quæ iſta pſos efficit, etiam horum differentiam euariare ſolent. Nam ubi ſanguis huius, & craſſitie moderatus, ad aliquam partem acutius inſluxit, & ob copiam impactus eſt, fieri eam quæ priuatiſſimè inflammatio appellatur. Si uero huius ſanguis in aliqua parte conſiſtat, herpetem. Vbi uero ſanguis & ſanguis bilis ſimul inſluxerunt, eryſipelas ſive ignem facrum efficit. Quum autem inſfluxens ſanguis calidus multum fuerit ac craſſus, carbunculos producere ſolet. proinde ab ea quæ priuatiſſimè inflammatio appellatur initium ſumemus, quæ in multis ſæpe contingit. Quæ tumor eſt rubicundus, doloroſus, reſtrens, & calidus, ex ſanguine uelut dixi, bono ortum habens, qui quandoq; ex toto corpore aſſertus, quandoq; in ipſa parte reſedens, ut huius contineri non poſſit, ſed inſtiterit excludat in intermedios uacuos locos. Sed & ad uulnerationes ſerpe, & ad fracturas, ulceraq; ac plures alias extrinſecas cauſas, hæc affectio concomitur. Poſtquam igitur de repente pars aliqua, extra manifeſtam cauſam prægreſſam, inflammata fuerit, totum uero corpus ad partem demanſit, totum curare oportet per uenæ ſectiōnem ipſam uulnere inflammatam partem frigare, ac cataplaſmata integere, non calefactis enſibus ac humectantibus, ſed his quæ id quod inſluit repellere poſſunt: & id quod in affecta parte continetur euacuat e.

Inflammatio
incommuniInflammatio
propria
Herpes
Eryſipelas
Carbunculus

B oportet ex ſemper uiuo, & mali punici corticibus in uino coctis, rhoſq; ac polenta compoſitum. Si igitur dolor uehementis non eſt, hoc ad dolorem utendum eſt. Si uero cum maiore dolore per ſuſceptionem inſeſcit, neq; ſic calida aqua, aut oleum adhibeatur, aut ex farinis cataplaſmata. Inſinica enim ſunt hæc fluida affectionibus. Verum mitigare oportet doloris uehementiam, eo quod ex paſſo, ſoſoſo, ac cera modica paratus, cum lanis ſuccidis multum ceſſipi habentibus. Excipiuntur autem & adhibentur hæc craſſitate quidem frigida, hymeuro tepida, ita ut etiam ſuperiores partibus affectis locos ſpongia uino auſtero imbuta aut frigida poſita, circumdantur. Admiſcenda uero ſunt etiam herba in cataplaſmata, quæ ad hoc eodem modo ſunt. Helixina igitur ad omnem inflammationem conuenit, non in principio, tum in augmento. Similiter glaſium, ſcriplex, malua, laſuca & cucurbita, ad calidas impoſitæ. Faciunt quoq; tribuli ambo ad inflammationes ex fluxione. Beſſica uero ad induratas permutacione autem ex his contingente, & pure non ſubiſcente, emplaſtro ex chalcitide curare oportet, aut ſimili ali quo ex his quæ ad fluxiones faciunt. Iam uero puram uino imbutam auſtero extrinſecus medicando ſuperimponere. Atq; hoc quidem modo inflammationes ex fluxione curabis. Eas uero quæ ob aliquam externam cauſam conſiſtunt, ſi humedtis ac calefactas, non lides. Et ſi quoq; opus fuerit ſcantificare ipſas, eodem modo hoc ipſum facies. At ſi ex fluxione abortus ſcantificatus, & præſentis in principio, magni cuiuſdā mali ægroto autem fuerit.

De affectionibus corporis externis.

Capit.

XVIII.

Si fieri non poſſit ut ſupparationem prohibeas, panem aqua & oleo coctum inposito. Aut ordeaceam farinam ſimiliter preparatam. Pars autem perfundatur aqua in qua althææ radix ſit cocta. Vbi uero tumor ægri ſupparari, aut diſſiciliter diſcuti poterit, cataplaſmate ex caricis uteris. Oportet autem dulcem ac pinguem caricam coquendo diſquare in aqua, & ſimilem facere aquam tenui melli, heri adſpergere ordeaceam farinam. Et ſi quid tumor

Abſceſſus
externus

discutiuntur, uerum de sechofius, cum caricis coquito hyssopum, aut origanum. Et si amplius intendere uoles, silem ad decoctum adijcito, diligenti ratione animaduersione habita, ne propter uehementiorem ressecationē, pars infirmitum induretur. Et si quando iste quid uidetur, in aqua concoques cum cumeris syluestribus radicem, aut altheam, aut bryonē. Verum his fortior est, & maiore discutioria facultate praedita dracontuli radix. Sed & ipsum ex dracontulo medicamentum, multa fortiter discutit. Quandoque igitur sola haec decoques, quandoque etiam caricas adijces, farina quoque cum adipe ammixta. Quin & anethinū oleum discutienti uisum habet, & erudos ac incoctos tumores concoquit. Pice quoque duras ac erudos tumores omnes concoquit, si cataplasma ins adijciatur, & hoc amplius liquida facit.

Medicamentum compositum, quod concoctos iam abscessus exprimit, ut sepe plus in splenio reperitur, non concoctos uero penitus discutit. Lae pēdis pyritae drach. x. i. ammoniaci trini rati tandem, farinae fabae coq. drach. vi. excipe et resina liquida, & pelli infusa impone. Splenium autem ne auferas donec sua sponte decidat. Ceterum non longe antes preparare medicamentum oportet, cito enim siccat. Ex his uero tamen si non sic discutias, sed plus in ipso lubis, eo scilicet, & pure eracato, de cetero oleum auram adhibere nitaris. Imo et uisum est, ubi opus sit uulnus, aqua multa, & potius, & uino utris, item quibus uulso. Et si inflammatio ad sit, lentius ea plasma teli non ad sit, alio quoque emplastro in talibus sectionibus utendum est, & non minus eo quod ex chalcitide paratur. Super ipsa uero spongiam, aut lanam uino aceto imbutam imposito. Vulnere uero nullum pingue medicamentum adhibere, quale est id quod tetrapharmacū appellatur. Vehementer enim reficari opus habet.

Quantitas abscessus.

*Abscessus qui
respuat*

Quandoquidem uero aliqui non sustinent ferro abscessus locari, conueniens est ut medicamentis attractionis utamur. Narcissi itaque radicem tritam in aqua multa cum irino coctam impone. Aurandinis teneram radicem tritam cum melle. si uero dura fuerit, aqua multa prius coctam. Aut aristolochiam cum melle impone. Rumpit autem picis licet, propolis creticae uel qualis portio, & cicurtem inducit.

*Dionysii em-
plastrum*

Dionysia emplastrum ad abscessus admirandum, & ad mammas aeglam dulcis tumentes attractorium, per obscuros meatus discutiens. Olei ueteris, aquae singulorum lib. i. coquito parum, & aphonitri sexuncem adijcitur, milios unciam unam, aut sextantē, & coquito donec non inquinat. Deinde addito mannae thuris, cere, terbinthinae singulorum sexuncem.

Ad ueneris abscessum.

*Veneris
abscessus*

Cerae, colophonae, butyri singulorum lib. i. picis siccae, mellis, singulorum lib. ii. aruginis quadrantem, uisici quod satis est. Facit item oxerum & Mastichinum emplastrum.

Aliud trochanterum. Ammoniaci thymiam acis sexuncē, cere, terbinthinae, singulorum trientem, sulphuris uisum quadrantem, natri quadrantem. Quin & similia appellatam medicamentum, & quod ex assis paratur, uehementer respuat abscessus iam non sanatos. Quod uero ex seminis lini succo coctum, discutit, transmutat, rumpit, iuxta aptitudinem. Verum ad maiores abscessus, etiam conueniunt ea quae ad parotidas rebus sunt. Aequae haec quidem de abscessu ex inflammatione transmutato. Galenus autem dixit, aliquando neque inflammatione progressa abscessum oriri, ea uidelicet quae ex hano sanguine generantur. Statim enim ab initio inquit, ob aliam aliquam humorem quae uicini tandem, excoctantur, & temporis progressu subiectis abscedunt ea quae illum continent. Itaque etiam secia omnigenas humorem ac solidorum corporum species intra se habere uidentur. Nam & corio, & unguis, & sanguinis guttur, & lacte melleo, ac mucoso, & collibus, & ungibus, & capillis similia corpulcula aut abscessibus reperiuntur: imo etiam

*Abscessus de
qui progressu
inflammatione*

etiam

etiam animalia saepe reperta sunt, ferre è omnibus ex putredine orti habentibus similia. Sed & lapideus, & arenis, & testis, & lignis, & carbonibus, & lino, & strigmento, & assure, & feci similia, in diuturnis malis abscissibus, ex humorum de loco ad locum impetuoso decubitu obortis, consistere dicite. Quapropter abscessuum corporis externorum maxime, note perfectiores tradendæ sunt, & eorū qui per medicamenta dissentiant nequeunt. Abscessus itaq; est corruptio ac transmutatio carilum, aut carnosarum partium, velut musculorum, venarum, arteriarum. Horum aliqui in tunica continentur, velut sunt Atheromata, Scantomata, Melicerides aliqui sine tunica consistunt, generis appellationē habentes, de quibus nunc agamus. Abscessuum generationem plerumq; inflammatio præcedit, de qua diximus. Quandoq; vero etiam ab initio sanum oritur, velut paulo ante dictum est. Sequitur ad abscessum, ardor loci vehemens, & maior tumor, magisq; et antra rubicundus & durus, cum punctorio dolore, & pulsus ac gravitate, ut quid ex parte pendere poterit. Quod si citilocus nobilis fuerit, febris quoque accedit, & rigor inordinatus, & noctu maxime dolent ac febricit. quandoq; etiam inflammatio ipsi excitatur in glandulis vicinis. Vbi vero per seclusus factus est abscessus, plerumq; minuitur. punctura quæm pruriginosum, & paulatim suppurat: & tunc moris fatigatur magis in apicem acutum, & admodum mollis est ac facile cedit, & superficies de apice detrahatur. dico aut de his qui foras rumpuntur. Si igitur ex medicamentis, aut sua sponte rumpantur, linamento est ductu curatus, parte particulatim evacuanda in manus, aperite oportet eo modo qui in chirurgica tractatione refertur.

Dragaceæ etiam.

Cap. XXX.

Quum inflammatio non discutitur, neq; in pus transmutatur, saepe in gangrenam ac cariem transit, quare & de his dicemus. Gangrenas equidem appellant mortificationes ob inflammationis magnitudinem, non tam factas, sed adhuc fieri pergentes. Et si quis non cito talem affectionem sanet, afflicta pars facile mortificatur, cuius pars velinas corrupta, & hominem occidit. Quum vero corpuscula ita afflicta penitus sensum amiserint, non iam plus gangrenam, sed cariem ac corruptionē, græce sphacelum appellant. Hic affectus etiam oculis accidit, quā circumstantia ipsa cario sitis humores saniores generans, his perigaverit illa, ac putrefecerit. Perfecit itaque mortificatam partem celerrime refecare oportet, quo loco sang. parū appropinquat. Gangrenam vero curare, sanguinem quā plurimum ex afflicta parte evacuando. Aut enim vena secta corruptam sanguinē eua. cure oportet, quem circa ipsam partē vena magna fuerit aut tota cute multus ac profundus ulnifcusilis impactus diuisa, ita ut ubi sanguinem desinere permiserimus, aliquid medicamentum ex his quæ putrefcentibus commoda sunt imponamus. Sunt autem hęc, farina crui, aut loli, aut fabarum, cum aceto mulso. Si vero vehementius adhibere uelis, salea adiciro, aut pulvill. Andronis, aut aliquem similem. facit ad gangrenas etiam ueteres neces. Repurgat autem ipsas urtica, & trichymali succus tempessive & moderate adhibetur, prodeest ipsa etiam lupulorum amarorum decoctum assusum. Quidam vero post sectionem, securitatis sectionis gratia, etiam eutemet adhibent, in quibus sale cum porri succo utendum est. postea autem ad crustam remouendam, cataplasma ex pane, aut hordeacea aut triticea farina, in aqua & oleo coctum imponatur. Item capitalis succus poluillus cum melle. tetrapharmaco etiam ac Macedonico appellato utendum est: probe uero separatas crustas, panis cum apio tritus, aut cum ocymo. Aut ins, surpanax, aut aristolochia, aut acorum cum melle, aut thus. Auferetiam probe crustas Macharionis medicamentum, & illa, melle excepta in linamentis. Verum in mollibus corporibus farina crui sufficit cum melle.

De Crustis, scilicet, ad gangrenas.

Aeruginis castis, minij, aluminis scissi, singulorum æquales partes aqua

rasus illius. Gangrenas circumscarsificabit imposita farina solida etiam cum rapum & sale, quandoque etiam aceto-nia pasta exemplis uis acris, cum cornu, addito sale & aceto musco. Nucum regiarum nucleis myrti solida in ni no cocta trita cum melle. Raphanus cum aceto etiam crustas ad os usque respit.

De herpes. Cap. XXX.

Herpes

Humile citra alterius humoris amixtionem secreta, in parte aliqua consistente, affectus Herpes nominatur. Si si quidem crassior fuerit eoque pagis, magisque acris, totum cutem usque ad subiectam carnem emolcerat, & uocentur Herpes adedens. Si uero tenuis, & minus acris, ac calida, bullas paruas in summa cute exaltat nullis similes, & Miliaris herpes ex similitudine dicitur. Verum ex Orbisq; sententia, prout eam fluxa bile mixto miltarem herpetem facit. Quacitabinus igitur totum corpus per medicamentum bilem ducens. Affectus autem locis si gelidior sit ac licet anna medicamentis adhibebimus, ab indito quodam pomponis uis, & rubi, ac plantaginis, in cataplasma deponentes, postea uero lenticulam, huiusmodi aliquando etiam melac potentiam miscelamus. Item si cataplasma descriptum ad inflammationes ex fluxione, citra semper uis addicionem. Vicerata uero illinantur passillis passio soluta, aurum tenei & aulero non ueteri, aut postea aqua la. Adhibeantur etiam glauciam, & hinc similia ex aqua, aut hoc nihil efficiant, ac totum ammisceant. Sed & plantaginis sicco, aut solani diluti maxime prodest. Aut lini semen solutum, ac uino oleoq; coctum & tritum in pouito. Aut et moliam soluti succo dilutam illuito. Et si purus argenti tritonem, succo porri cyathi. V. l. succi herpetis mundus, trita illuito. Vbi uero diuturna iam sunt talia ulcera, idoneus est Mula pallidus & Andromeda.

Aliud ad herpetem bullosum. Recrementum plumbi in uino aulero trito ac diluto, herpetis solida in uino cocta superne imposita. Aut certe tritonem, myrti sexcentis, recrementum plumbi tritonem, uino tritonem recrementum, reliquis liquatis aceto excipe, ac illine. Sed et autem nomen de palestre, aceto ex recremento utere, aut lenis cocta cum melle in ege. Ad herpetem uero qui sub cute est, recrementum plumbi trita trita succo excipe, aut cerato myrtis pro rata. Aliud. Lani mollis non lota, circum totum obvoluitur ac uis drach. XIII. cerat drach. XXV. recrementum plumbi ac etabuli dimidum, ad ipsa capris curat & loci in aqua drach. XXV. olei myrti quin eundem. Aliud ad herpetem in hementem de palestre. Malicorj malipuanet dulcis drach. VI. spumae argenti drach. VI. lani uen lute circum totum obvoluitur ac uis drach. III. cerat drach. XII. ceruse drach. VII. duris, & luvialis scilicet singulorum drach. I. uino & myrtis excipe.

De herpes. Cap. XXXI.

Erysipelas
ignis fere

Tymorem ex sanguine feruntur ac tenui consistenter Galenus primatum Erysipelas, hoc est ignem feruum appellans, eum qui ex uis, sanguine ac bile conuulsus est ex superius humoris nomine, ducta affectionis appellatone nominant. Quam enim sanguis super, & inflammationem ex ystematolum quoniam fluxa bile, erysipelas inflammationem appellat. In eorum uero, amorem ex sanguine ac bile est dicitur factis productum, erysipelas nominat. Vno autem modo apparet non multum referre, ad amissionem sane usum. Verum illud uis expedit, operendum esse erysipelas maxime est & caput. Quare si non sit ex aqua, aut si sit, quandoque etiam si sit gulari. Nam si sit ab interio ubi est par uis, neam in catho secro, maxime quidem humerali: in minus, cum quae inuenitur. Si uero ob aliquod impedimentum remansit in se, purgatione intendum est per bilem ducens medicamentum. An hoc quidem etiam in erysipelas aliam puritatem intendum est, aut uis per chylum illuc accoribus, illandaeq; erysipelas parum ut id quod in illis repellamus per huiusmodi, parum ut id quod in coacervatione est dicitur, per moderatam caliditatem ac huiusmodi, prius quam similia ac nigra pars sit, ita ut ex quod illinantur semper huius

A per humida conferuimus, per hoc ut frequentius alterentur, atq; illud fieri potest, si per molles spongas prius illa abluantur. Mollus enim parts fer uor cito exhalare faciens, hac refectas. Opus autem habent erysipelas ab tanto uclut dixi refrigerantibus cum humiditate, absq; adstrictione, uclut est semper nitum, & portulaca, & ptyllium, lenticula palustris, lentis, cucurbita, solanum, hyoscyamus, lactuca, glaucium. Insipiensq; apium, & rhamni folia per se, aut cum pane imposita, & cerata ex aqua ualde frigida. Misceatur & opij quid illis, & succi papaueris, & cicute, & mandragoræ, & sunt compolita medicamenta. Fieri quoq; potest ceratum ex cera alba, rosaceo quadruplo amittato, quod ex oleo crudo citra salem si paratum, ita ut hanc in pasta emolliantur, & atq; frigide affundatur quantum suscipere possunt. Si uero etiam aceti tenuis ac pellucidi parti quod ammiscueris, melior medicamentum efficies. Sed & poletem cum aliqua ex relatis refrigerantibus herbis, multum frigescent, & palmæ pingues cum aliquis ex illis. Illud etiam potest pars cerula, aut cimolia, aut sigillari terra, cum solano. Aut spuma argenti cum rosaceo. Aut chalcitide cum oleo & passo. Aut cerula cum aceto & lycio. Aut acacia cum aceto. Remittente autem febre, utendum simplicibus quidem, sulphure uiuo & menta, cum aceto & rosaceo. Aut uita cum abstinis, & aceto ac oleo. Aut spuma argenti, uim porri & betæ succo. Compolitis autem, priusquam quidem ad caput hoc passillo. Spuma argenti, cerula, croci, sulphuris usui, opij, cum passo. In eorum uero ad omnes partes, nisi sinopich, chalcitidis, anisoy, tozerelach, aruginis, stramen, ci suar, aluminis kalli, singulorum æquales partes, mere ex aceto.

Aliud. Sulphuris usui, cerula, opij, acaciæ, singulorum æquas portio, nec, cum aceto.

Cataplasma ad erysipelas, herpes, aliosq; pustulas, et ankyra.

Foliorum recentis altheæ tenerorum lib. i. in aceto coctam probe terito, & addito rosacei trimenti, spuma argenti, cruillæ, singulorum sextantes, & uncia dimidia, rursus terito cum coriandri, aut temperati, aut solani succo. deinde ad oleis melleis panis ut emplastri formâ accipiat imposito. Eius plastro uero utere hoc. Olei cicini libram unam, myrtellibram unam, ceræ quatuor, emulsionem argenti mentem, aruginis rase sextantem. m. Acetugo & argenti spuma aceto seruantur.

Ceratum ad erysipelas et ankyra.

Ceræ albe tridentem, rosacei quatuor, autem, ouæ sex, perfrictas tridentem. Ankyra postquam uero cessauit inflammatio, aut diuturna sit, antea quàm liuida pars fiat, cataplasma ex cruda ordiæ farina imposito. Si uero iam liuida facta fuerit, scarificetur, & cataplasma dentius imponatur, & perfundatur aqua calida dulci, aliquando etiam marina, aut muria. Quandoq; etiam cataplasma ei eadem ammiscetur. Postea uero relatis compolis utendum est cum animaduerfione: Nam si diutius permancant, in pus aut ponedinem transmutatis conuigat.

De tuberculo, bubone, et panu.

Capit. XXXII.

EX Galeni sententia bubo, & tuberculum, & panus, glandularum affectiones sunt. Bubo quidem inflammatio. Phrygethion aut id est panus, est glandule erysipelas inflammatum, aut inflammatio erysipelatosa. Tuberculum uero ad suppurationem cito tendens glandule inflammatio. Verum iuxta alios quoddam, in communi omnes qui præter naturam in quacunque parte enascuntur abscessorij tumores, tubercula appellantur. Dicit enim Hippocrates, Quibuscumq; tubercula in urinaria fistula enascuntur, his suppuratione ac eruptione facta, solatio contingit. Qui igitur ex offensionibus, aut alijs uicibus, aut doloribus proueniunt bubones, extra pericoriam sunt. Qui uero ex febribus, qui sanè maxime in peste contingere solent, pessimi et diutini, siue iuxta foras, siue sub alijs, aut ad collum enati fuerint. Verum priores in principio, uclut omnem inflammationem, per refrigerantia ac

Bubo
Tubercula
Panus
Phrygethion
Bubones in
pelle

na ac odstringentia auxilia repellere oportet, aut spongijs ex posca impo-
 nis, aut lactis ex uino ac oleo epado, aut rosaceo, aut melino, aut lentiscoino,
 aut myrrino. Deinde discutioris iterandum est. Si uero etiam totū corpus hu-
 moribus redundet, antea euacuatur. At si nihil superflui habeat, ulcens qui-
 dem ex quo bubo factus est, curam habebimus, uelut in tractatione de ulce-
 ribus dicitur: glandula autem inflammata mingeretur lactis in oleo quopis
 laxatorio imbuta. Sed & totum membrum ex ipsa obducendum est. Sup-
 puratus autem rursus non promptè discutitur, sed ecrasiformibus medica-
 mentis discutere ipsum conentamur, quod maxime est id quod ex apyrano pa-
 ratum, & quod ex herbis constans, botanicum appellatur. Quod si discussio
 non coningat, ad ruptionem procedendum est, tamē si ut in alijs abscessi-
 bus, & curandum uelut illi. Ceterum in his qui ex febribus, aut simpliciter
 ex humorum copia fiunt, repellentia uitanda sunt, ut ne dum repellitur
 materia ad profundum recurat, ita ut uero à discutientibus incipiendum
 est. Quod si nihil prohibeas, uelut acas, aut uires, aut ex secūo prius in cubi-
 to assumantur. In loco uero utendum est iossatis ex decocto chamemeli aut
 anethi, aut alientis consimilis. Reliqua uero medicamenta totū materia ma-
 xime quidem ex his quae libro tertio ad parotidas relata sunt transferemus,
 nec minus ex his quae paulò ante ad inflammationes dicta sunt. Quod ad mor-
 dum etiam paronum curatio, una est his, nam ex rosatis ad erysipelatā, insi-
 tuenda est. At uero Asiter Anticus herba, quam etiam bubonium ob hoc ty-
 psūm uocant, non solum impolita, sed etiam alligata, bubonibus auxiliari
 creditur. Tubercula uero priusquam discutiant in cataplasmate impolita, a-
 dianthū, amplex, helixine, althaeae radix in uino cusa, ammoniacū cum meli-
 le mollium, ac impolitum, aut cum camelinā ac cera. Rumpit autē propo-
 lis, lupini amari cum aceto impoliti, eueneris syndellitis radix, cerebri mē-
 na excepta, capparis radix similiter, nitram cum formenno aut sicubus.

De ferunculis.

Cap. XXXIII.

Ferunculus

ET ferunculus tumor est abscessorius, ex crassissimis humoribus in carnosa
 maxime locis constans, mitis quidem quum in ipsa sola cute consistit
 malignus autem quum ex amplicore profunditate emergerit. Discutiant fer-
 unciculos & conuocantur haec. Trineuni conuocantur ac impoluitur, masti-
 che Aegyptia, uineae passae resectis unacumque sale trite ac impolite, aut
 dissolutis, aut imponit. Aut caricas coctas in aqua mulla imponito. Aut
 ammixtam ad caricas resinam imponito. Aut tydas caricas, si pingues fuer-
 rint, dissas. Aut formennum cum nitro. Aut lini semen cum melle. Aut hyos-
 cynam solita crata cum butyro. Compolita uero, id quod ex formenno para-
 tur, & quod ex polline, & quod priusquam dothientium à ferunculis appella-
 tur, conuentum. fomentum autem adhibe ex mollibus spongijs, adducens
 eadem aquam antea, atque sic medicamenta imponito.

De trechintho.

Cap. XXXIII.

Trechinthos

Dioscorides

Alexandrinus

ORibalius trechinthum tuberculi speciem esse dicit, & incumbere ipsi
 lupine bullam sine pustulam nigram, quae rupta id quod subiacet de-
 squamato humile uideri, hinc uero dissecto, puri appetiti. Verum Dioscorides
 Alexandrinus ait, trechinthi sunt eminentia in cute consistentes, rotunda,
 cum pallido uisore nigricantes, so ebintu frustis similes. Haec igitur eo-
 dem modo uelut alios tuberculosos tumores curare oportet, auxilijs ex ro-
 latis hinc translatis.

De carbunculo.

Capit. XXXV.

Carbunculus

Sanguine magis ac abulatio euadente, ubi cindit, & ad partē aliquam
 dirigit, carbunculos appellatos uiri contrahi: qui sunt ulcera crustosa,
 phlegma à pustula hinc bulla ambustas hinc insitum sumentia, aliquid e-
 stam hinc huc. Laxa alpunt sine affectu omnino in principio ipsam partē.
 Deinde quādo pūna, quādo plures pustulae emergunt, nullū speciem
 praecedentes inattendant, quibus impunctibus insulter crustosum scul-
 cus, simi-

A cum, similiter ueluti ferro candente, crassa ipsa modo cineris coloris, modo nigri apparente, cum hoc quiddam fando adheret, & quodammodo affixa est, cum depautione proferente. Reliqua uero caro, circumfusa ualde flammam ac nigra colore sit, & splendens ueluti pix & bitumen. Talis autem est ex acie para belis. Verum carbunculi circa eamem oborti, breui citius confisibuntur. Qui uero in membranis aut nervis sunt, diutius permantet, & affectionem per consensum subiectis locis distribuunt, ut etiam inflammationes erysipelatose ipsi fiant. Non paucis autem ad suppurationem conuersi sunt, plerique etiam febres adfunt. Ortiuntur etiam ex quibusdam popularibus causis carbunculi. Curare igitur ipsos oportet, nisi ualde parutuerint, per uenae sectionem, sanguinis euacuatione ad animi deliquium ulip facta. Scarificare etiam post uenae sectionem non incommodum est, profundi digibus uulniferulis impactis, ob humoris crassitudinem. Ad locum aquae affusum moderatè repellentibus ac discutientibus utemur. Tale autem est cataplasma ex plantagine ac lenticula cocta, cui panis albaniter nequale de puri, neque sordidum, citius teneret sine adiecto. Super ipsam uero ulcus ex ueterem entibus medicamentis a liquo d'imponemus, uetus est Andronis, & Polydæ, & Passonis pastillus. diluantur autem passio ad strigementum com-pagena. Sed & Maillione puluillus sicus, aut etiam ipse similiter dilutus facit. Radix quoque dracunculi, aut aristolochiae, utriusque filiphij aut cyrenalis, singula cum aceto recte sibi possunt. Quae uero ignis sacri speciem praefert, ad erysipelata rebus diluantur. Atque partes de affectione per consensum suspectae sunt, latis succiditis ex uino & oleo irrigentur. Poli-que uero quicquid ictor, cetera capitalia diluta, linamentis excepta, carbunculis immittantur. Maxime autem bonum est id quod ex herbis, & quod ex nitro paratur, & puluilli sicci nemis dicant, tum per se, tum cum rosaceo. Per-manente uero duricia utendum est Melino Serapionia. Soudendum tamen est ut quam citissime carbunculi suppurentur, ita ut his in die, semel noctu, cataplasmata ac medicamenta alterentur. Caterum ut eradicentur carbunculi, & a condensatione cum uicinis adiacentibus exoluantur, mala punctione acida conuulsa in aceto coquiro, & fuscida terito, ac linteis infartis imponi-to. Vbi uero reflectantur, aceto madefacito. Carbunosos suppures ac rumpit nocte regle ueteris nucleus, aut etiam non ueteris compressi folia ac germina, & rectes ac tenerae pilulae cum polenta una passa uinacis reiectis carlicae in uino coctae papaueris comuti flores, succus filiphij cum ruta & modo dico melle spix liquida cum uis passis & suillo adipe.

Ad carbunculos ualde haerent.

Spumæ argenti lib. i. olei ueteris lib. i. auripigmenti unc. i. Spumam argenti & oleum coquito donec non inquinent, & sublati auripigmentum adijcito, ac rursum coquito donec nigrum medicamentum euadat, & in pasta trito utere linamentis illito.

Ad gangraenas, ulcera aeterna, diarrhoeas, diarrhoeas, fluxum, podagram, fistulas

ut ad carbunculos, et proferantur puluerem.

Opilacacia, misyos torrefacti, squamæ uris, singulorum drach. ii. atramentum latorij drach. i. seminis hyoscyami drach. i. tritis in aqua utere. facit etiam probe inquit, tetrapharmaca cum emplastrum, quintam duris partem habens. Ad carbunculos autem in pudendis, chalcididis, aeternis lino-ni, singulorum drach. viii. aphronis drach. ii. cum aqua trita utere. Facit quoque stercus ouillum torrefactum cum melle. In Alexandria, Serapias de qua & orchis, & triorchis nominatur, uiridi cum micis panis utuntur, uelut cataplasmate, ad carbunculos & omnia crustosa. Crusta uero elapsa, uelut commune ulcus curato.

De cancro.

Capit. XXXVI.

IN omni corporis parte cancer nasci solet. Nam & in oculis, & in utero, ac in tractatione de ipsa dictum est, & in alijs pluribus partibus. Verum in

*Carbunculi
causae popu-
lari*

*Chironi
aliter
Struma*

*Tempus
Orchis
Triorchis*

Cancer

maxime mulierum maxime abundat, eo quod laxae sunt, & materiam quae
 crassissima est propensius suscipiunt. Ex atra enim hae effluente canceri pro-
 ducuntur. Et si senior fueris, cum exsiccatione. Quapropter colore nigro
 res sunt inflammationibus, & ita tamen caliditatem. Venit uero replentur,
 & circumdare a ten duntur, ad similitudinem pedum canceri animantis. Un-
 de etiam hae appellationem morbus habet. Quidam uero propterea quod
 ita pariter adhuc, ut argit oculi pollicis, quas apprehenderit, nomina,
 item autem, quousmodum etiam animal ipse cancer. Verum ob humoris
 huius crassitudinem, etiam in uentibus est, ancer, ut qui neque repellit, neque
 discuti possit, neque totius corporis purgationi cedat, quum sane etiam mige-
 ra medicam contra impolita & decurrit, & a fortioribus exasperetur. Fieri te-
 men potest ut inaequales caneros auereri prohibeamus, aut ab illis humo-
 rem euacuantes, prius quam in affectu parte & confirmetur. E uacuabimus
 autem primum, si nihil prohibeat, per ueneri sectionem, deinde per purgan-
 tem, ab initio ex simplicibus, quales est opethymum, quod quatuor dra-
 chmarum & dimidii pondere, ex sero lactis aut aqua mellea damus. postea
 uero ex huius, quae nigra ueratrum recipit. Ad locum uero affectum ules-
 ram, absque offensione adhibemus facit soland lux cas, linteum molli duplica-
 to in ipso tracto ac impolito. Oportet autem hoc insectis supra illud sanam tene-
 ram circumdare, quae ipsa succo sit inspersa, & diligenter providere, ne illa er-
 licentur, ita ut frequenter succum affundamus. Poterit autem in ulceratis
 caneris, diutius quis uti medicamento ex pompholyge. Neque inepta sunt
 ea auxilia, quae libro tertio de uteri canceris sunt relata.

*Ad canceros multos, et ad regios siles ulcerum, et ad inflammationes in pa-
 rida, aut reseda, aut in caneris.*

In plumbea pila, plumbeo pulillo, terram leoniam sphragidem appella-
 tam, cum posca & aqua mellea, scribo donec nigrescat. Aut rosae
 comae, aut crudum oleum, aut semperui succum, aut coryledonis, aut la-
 tharis, aut psylli, aut ueratrum acerbis, similiter scribo ac illinito. Visu uero uti
 tur arger, praesente succo abunde, & lactis sero: & ex oleis malua, am-
 plexi, bilito, & cucurbita. piscibus item petrolis, & uolucris omnibus,
 exceptis palustribus.

Arthriticis ad canceros et ad alia ulcera.

Cancrorum sturialium ulcera, & caducae, autrisque aequales portio-
 nes tritas inspergitio. Aut cancrorum cinerem cum cerato impondo. Aut
 erysimi semen tritum cum melle adhibeto.

De tumore laxo.

Capitulum XXVII.

Tumor laxus

Orbita

QUum de tumoribus ex calidioribus humoribus conflatis tractaveri-
 mus, nunc de contrariis agemus, initio h tumoris laxo a cepto. Quod
 admodum enim ex biliosa fluxione erysipelas, sic ex pituitosa cedema ori-
 tur, qui tumor laxus est circa dolorem. Nouimus autem etiam aliter tumor-
 res laxos fieri circa pedes, in affectionibus aquae inter cutem, & tabe, a cura
 lo corporis habita. In illis igitur tumoris laxus symptoma accessorium est
 ad affectionem eam quae hominem detinet, nullam praeterea curatione re-
 quirens. Sufficit enim si modo quid facere uelis, contricare crura, aliquan-
 do cum aceto & rosaceo, aliquando cum oleo ac sale, aut etiam ad ipsam ac-
 centum & rosae cum tale insecto. Si uero ob pituitosum humoris influxum, la-
 xus tumor in parte aliqua adhibita sit, satis est aliquando spongiam aceto im-
 butam imponere, cum deligatione leniter adstringente, ex inferis partibus
 tantum habente, & ad superius delinente. Verum nouam spongiam esse o-
 portet. Si uero talis non sit, eam quae ad se expurgare oportet cum nitro, aut
 potius cum lixuria. Quidam ex his tumor non subsidit, potum quid de ala-
 mine amittit. Commodum est etiam generum ellychniam, et alium
 di humore imbutum ac tepidum. Nonum est etiam glaciolum. Inueterati
 autem laxum tumor cum curabit, si oleo parti per uentrem, deinde spongiam li-
 xuria

Ellychnia

^Axiatio imbutam imp-offa eris, ac uolentius adstrinxeris. Discunt autē & ad-
stringitumores laxos, omnis terra illia, & magis Aegyptia, & illa sic facta.

Draughton.

Caput

XXXVIII.

Spiritu flatuoso quandoq; sub cute, quandoq; sub membranis effusa circun-
dantibus, aut musculos ambiens, congregato, in flatio oritur. Colli-
gitur etiam aliquando circa uentrem, & intestina, & inter hæc, atq; periro-
nem membranarum, in hydrope tympanite appellato. Et differt sane a humo-
ricus laxis, & quod non in causam ueluti foueam cedat, dum premitur, ue-
lut illi, & quod sonitu edat, quemadmodum tympani. Ad hoc uero quod
spiritus non diffletur, corporum densitudo cooperatur. unā cum hoc quod
etiam ipse spiritus sit crassus. Vnde etiam curatio nis scopus est, corpori re-
refectio, & crassi spiritus attenuatio, quæ per calida ac tenuium partium me-
dicamenta perficitur. In inflationibus igitur circa uentrem ac uiscera, oleum
terruum paruum hoc efficit, in quo ruta sit incocta, aut euminum, aurapij
semen. Quandoq; etiam cucurbita magna citra scarificationem, iterum ar-
que iterum circum umbilicum appolita discunt. Si uero musculi ob contra-
ctionem, quemadmodum ex pullationibus, inflati fuerint, partes ualde cali-
da & acuta egre ferunt. Quare ab insano in manibus perseverare oportet,
dedinatione uero contingente, in discursionibus. Utendum itaq; est sa-
pa cum modico oleo, lanis succidis excepta, aut etiam cerato ex carypso am-
mimo. Et cura adhibenda quo caliditas permaneat, nam frigiditas non con-
ducit. Postquam uero mitigatio facta est, æctum ammiserit, & tunc aut
sphenitram, & postea etiam lixiuim, postremo autem emplastra discus-
soria adhibenda sunt, usq; ad perfectam mali depulsionem, quale est & sub-
iectum Strigimenis semel facta primum ut pura fiant excolito, ac rursus in
ollam sinicis, & ritam calorem utram infusa farina in perlam infusa, do-
nec luti spissitudo fiat, ac utior. Hoc uero efficacius est compolium ex sy-
comoris medicamentum.

Ad luxatos et contusos.

Caput

XXXIX.

Ad luxatos ac contusos articulos faciunt lane succidæ, aut spongia ace-
ro & oleo imbuta ac imposita. Bulbonum coctiorum teneræ partes cum
melle, uiridis folia, & sal, & nitrum totum tritum cum cerato. Ut re scem
perfusionē aq̃ue dulcis, aut marinis calidæ, post sedatam autem inflamma-
tionem ac dolorē, etiam deſtructionē luxatorum partium utere.

De ceræ castæ et ſigillatæ.

Cap.

XXX.

Came ab aliqua grauiore illa pla contusa, & parais in ipsa uenulis disere-
nis, sanguis profunditur intra perſultationis modū. Vnde sub cute col-
lectus, ſugillationem ſive effuſi ſanguinis ſuſſuſionem appellatam efficit, &
& cute non diſſiſa, uelut tumor ad contractum mollis ac cedens ſequitur, li-
uidus ille & plerumq; ſine dolore. Scopus igitur nobis eſt, ut cedentem ſan-
guinem diſcutiamus, atq; hoc breui prius quā nigreſcat. Ab initio uero et-
iam de adſtringentibus aliquid ad diſcuſſoria amittere oportet, eo quod
tunc uenularū conſuſe denſari expetant. Poſtea uero etiam citra adſtrin-
gentia, ſola diſcuſſoria utemur. Sed & ſugillata ab initio ſcarificantes hoc
modo deinceps curationem adhibebimus. Verum ad uetera ſugillata rapha-
nus impositus facit. Tollere autem ipſum oportet, quam mordere incipit.
Anthraxi ſuccus eſt micis panis adhibitus. Species poſt ſugillationem
ſunt ſuſſuſiones effuſi ſanguinis, ſub oculis contingentes, hypopia ac hypo-
ſphagmata appellata. Itemq; ſanguinis ſub ungui decurſus, ex plaga con-
tingens, de quibus in proprijs locis dictum eſt ſecundo libro. Verū de his quæ
in ungubus ſunt, etiam in clauſurgie tractatione dicetur.

De ruptione ac ſuſſuſione.

Caput

XXXI.

Ruptiones omnino quidam cum ſanguinis ſuſſuſione ſunt. Sanant autē
ipſas medicamēta moderate calefacientia. Tale uero eſt a copon ex po-
pulo alba paratum, & quæ huic ſimilia exiſtunt. Verum in ruptionibus in

p

proliu

teſtate

Tympanite

Luxata

Contuſa

Cere contuſa

ſugillatio

ſugillata

Hypopia

Hypoſpha-

gmata

profunditate corporis, acriora & maiore secandi vi praedita medicamenta adhibere oportet. Commodus est talibus etiam cucurbitae usus. Si igitur ita tum descensus fuerit sanguis suffusus, facile concrevit caro disparata. Si vero diu duraverit, & sordes succreuerit, fieri non potest ut de cetero ruptio concreverit, sed labra solum inter se apponuntur, ita ut ex levi occasione facile rursus disparetur, & intermedius ipsorum locus humiditate quadam impleatur, & quodam modo assidue sanguinis suffusio fiat, similis ei quae ab initio facta est, praeterquam quod citius quam illa descenditur, ut quae remanens leuolam humorem continet, quum illa ab initio ex sanguine fuerit coacta. Aruallo fir, fibris quibusdam durallis, & sola mitigatione opus habet, usque ad doloris sedationem. Non enim glutinari possunt. Aristolochia itaque rotunda, si quid aliud, ruptis ac uulsiis comoda est. Similiter centaurei marginalis, & ipsius succus. Rheonitum, & colius, & beldii, cum aceto mulso de fureis.

Cap.

XXXII.

(pota

Scirrus exiguus, tumor est praeter naturam, sensus exors ac densus. Qui uero exiguus non est, egrum sensum habet. Et qui quidem sensus exors est incurabilis est. Qui uero egrum sensum habet, non quidem incurabilis est, non tamen facile curatur. Fui enim in viscoso ac crasso humore, qui ita partibus scirrho affectis impactus est, ut ingre uelli possit. Aliquando igitur ita tum ab initio consistit ac augetur, plerumque uero à medicis efficitur, qui in inflammationes & ignes sacros perli gnerunt ac adstrinxerunt. Si igitur quis uehementer diffusoria medicamenta corporibus in scirrhum induratis adhibeat, etiam si manifestam scirrhii immutationem fecerint, tamen breui tempore affectionis reliquias incurabiles efficit, reuoluit quidem humiditatem diffusam, reliqua uero resecata, & nesci si lapidea facta. Oportet itaque diffusorium medicamentum habere, aliquid etiam mollitorium, absque hoc ut uehementer calefaciat ac resiceat. Tales autem sunt medullae omnes, & praesertim ceruina ac uitalina. Ex adipibus uero leuiniis, expardali item ac uulturni. Deinde taurinis. De uolucris autem anserinus, & gallinae uetus ac phasianus. Slector autem est caprinus ac hircinus. Etad haec, ammoniacum thymiana, & beldium maxime Scythicum, & styrae liquidior ac pinguis, & massiche Aegyptia. Si quidem igitur aliae partes in scirrhum indurate fuerint, semper his per se utendum est, & medicamentis quoque ex ipsis compositis. Verum intenditibus ac ligamentis, lapidem igne candefactum ac ceruino aceto extinguere oportet. Si autem lapis pyrites, si haberi potest, si molas, molaris. In hoc affeclam panem comminere oportet, quo exhalantem uaporem suscipias. Et postea rursus mollitorium imponere medicamentum. Oleo tamen tenui ab initio, non aqua, pau tem perfundere oportet perpendit singulis diebus, ita ut si quando etiam althaea, aut cucumeris syluestris radices, in oleo decoquamus. A balneo uero in totum ipsis abstinendum est, aut saltem infrequenti. Vbi uero scirrhus moderate fuerit emollitus, ammoniacum pinguisissimum ac ceruino aceto distent parti illimini ad multos dies, post quos uisus mollitorio utendum est, quod galbanum & opopanax pinguisissima recepit. Talia autem maxime sunt, id quod ex perna fit, & Amythaon in scriptum atemque medicamenta ad strumas describenda.

De struma.

Cap.

XXXIII.

Struma sunt glandulae in scirrhum induratae, circa collum, & alas, ac thoracem maxime consistentes, in equum uis igitur ad relaxam scirrhosum curantem referuntur. Primum uero lupinorum amarorum farina ex aceto mulso cocta imponatur, quae etiam ad tubercula facit. Aut bubuli steruus aceto coctum imposito. Hoc etiam in scirrhum induratos tumores omnes diffendit. Prode uero si uinas distendit, et alx melle aut frimento, aut oleo, aut adipe porcino exerceat. Aut calidis & aut aquiles partes, masticis & homi grecis quadruplis, cum melle uelut malagma imposito. Hoc duras dilectur,ampus transuolutis recipit. Item solia, ea farina cum columbino succore,

A stercore, & lini semine, in uino cocta. Grossi syluestres ac domestici. aut na-
sturtium album istum cum pice liquida malagmatis forma imponito. Aut
cucumeris syluestris radicis sicce, & huius foliorum siccorum uisum cine-
ron cum terebinthina imponito. Aut staphidis syluestris, niri, utriusq; æ-
quales partes, truce duplici, cum resina imponito. Aut stercore caprinum
seu bubulum in aceto coctum. Aut erui farinam in urina pueri impuberis
maceratam, & pice ac cera & oleo liquidis exceptam. Aut serpentem mor-
tuum in ollam coniectum gypso oblitum, in fornacem mittitur ut exaruit.
& cinerem ipsius ad æqualem sœni græci partem ammisceto, & in ille exce-
pis utitur. Sed & ex aspidibus medicamentum admirandum est, & quod ex
herba lanaria paratur, & quod ex cucumere syluestri, & quod ex cedria.
Seruas supparat aut diffundit hoc. Myrris drach. x. ammoniaci thymia-
matis drach. ii. asci quercini drach. v. galbani drachmas iiii. propolis
drach. i. in mortario contundantur.

Serpentis qñ
dñi

Ad strumas ac doli in membris.

Visci elaborati, resinae hęc æ, cera, singulorum lib. i. galbani quadrans.

Ad strumæ aliorum quæ non ulcerant.

Cera, resinae pinus, adipis porcini infolli, marubij, ænagidis rasi, singu-
lorum sexuncem. Aliud ad strumæ. Olei ueteris lib. ii. cera lib. i. colo-
phonie trientem, niri trientem, alij lupina x. ii. Alij nucleos de corticatos
in oleo ad pridum macerato. deinde donec torrescant coquito, atque ipsos
quidem abiecit, ubi uero ea quæ liquari possunt liquefecerit, postquam ab
igne ablata sunt, nitrum tenuissimum inspergito. Hoc etiam abcessus rum-
pe. Aliud. Cineris sculpi sextuncem, aluminis scissi unciam unam, æ-
phronitri unciam unam, picis liquide septuncem.

Trasum strumæ.

Aluminis scissi, sandarachæ, uerulij drach. iiii. squame æris drach. i. aut
ripigmenti drach. i. Siccum hoc strumæ inspergito. Si uero cancrorū fue-
rint, rosaceo subactis his in die utitur.

De strumatis et atheromatibus ac meliceridibus. Cap. XXXIII.

Quoniam abesse quædam generis & hæc sunt, uelut in illis diximus, appellatio-
nem singula propriam adepta sunt, & similitudine contentari in tumo-
ribus essentiarum. Est enim quædam ipsarum uelut adeps, quædam uelut
mel, & quædam pulvisculis. Scopis uero curatiōis communes sunt, ut id
quod continetur discutiamus, aut erodamus, aut in totū excindamus. Qui-
dam igitur tumores nobis scopis subiacent, qui quidem tenuiorem homo-
rem habent, uelut Meliceris. Aliqui duobus tantum, uelut Atheroma. Nam
ut & excindamus, & erodamus hoc, fieri potest. Verum si catomata per so-
lam chirurgiam curantur, quum neq; erodi, neq; discuti possint. Singulorū
autem horum dignotionem in chirurgiæ tractatione reperies. Eorum uero
quæ discutunt, in strumæ tractatione materiam habes. Priuationem autem
Meliceridas discuti hoc. Vasa passis uinaculis reiectis xx, squame æris
drach. iiii. fomento prius adhibito impone. Aliud. Ladani, bdellij, gal-
bani, ammoniaci thymiamatis, propolis, terebinthinæ, singulorum æqua-
les partes in mortario tundantur. Facit & ad strumas, parotidas, tumores
lani, tubercula. Archigenes autem ad meliceridas inquit, aphronitri & uer-
ulri duplici, cum cerato duro imponito. At uero erodiorum usus circum-
sita cute contingere non potest. Oportet igitur & meliceridas, & atheroma-
ta, aut etiam strumas, prius cute nudate, atq; hoc per usoria medicamenta.
Ex quorum numero simplicitas est id quod recipit calcem uiuam, saponem,
ac lixiuium. Varietatis autem & quod repositum si nusi potest, hoc est.
Calcis drach. iiii. fecis uini ulsæ, niri rubri tosta, singulorum drach. ii. mi-
ni drach. i. terito cum lixiuo. & ad melis liquidiori crassitudine redacta,
terferuacito, ut quodam modo compagem acquirant, & in plumbea psy-
xide reposito lixiuium infillat, ut ne breuiter liceatur. Facit & ad uerru,

Strumata
Atheromata
Meliceridas

Verris me-
dicamenta

cas summe chorda similes, & ad fornicarias appellatas, pieropyia, clauae, callos, cicatrices prominentes. for autem uini non sit duobus in artibus antiquior. Ex hoc autem illinito, & ubi siccari inceperit, spongijs abluito, ac rursus illinito, & ubi cutis nigrescisse incipit, rursus abluito, ac crassam indurantibus illinito. Crassa uero diapla, erodentia adhibeantur.

Trasam mordacitate facere.

Trasam mordacitate facere.

Squamæ zris desich. iiii. sandarachæ drach. ii. neratî nigri drach. ii. utere cum rosaceo. Aliud. Squamæ zris, sandarachæ, seminis urticæ tostæ, equalibus partibus singulorum cum rosaceo utere. Aliud. Erinaceorum ulionum, testæ sepiæ, scripimentî, equalibus partibus cum rosaceo utere. Verum circumlitus partes omnes ceratâ cum oleo illine. Bonum est & hoc. Calcis non preparatur partes duas, chalcitidis partem unam, auripigmenti partem unam.

De facie.

Capit. XXXV.

Facie.

Facies tumor est in cute habens perforationes, per quas melli similis humor excernitur. Impugnanda igitur sunt ipsi uiae passæ cum ruta, aut sic tenerima solia cum melle. Aut nasturtium cum lini semine ac melle. Aut cucumeris satui radix cum melle. Aut sulphur uinum cum cerato uel terrebithina. Varii quidem curationem facies, si quælibet, tertio de achoribus relata sunt hinc transferences.

De simplex ulcere.

Capit. XXXVI.

Vici simplex.

Quandoquidem simplex ulcus diuisio sola est, si quis diuisa est trahat ligamento circumdato, coalescenti disparatæ partes, citra ullam aliam opem. Oportet autem ubi circa alterum solum labium ulcus fuerit in obliquum euersum, illinc deligationis initium facere, & ad contraria conuertere. Si uero circa ambobus labiis euersum ulcus fuerit, deligantur enim ex duobus uicibus adhibere oportet, atque ita labia adducere. Si enim nihil inter labia coinciderit, uelut est pilus, aut arena, aut oleum, aut sordes, aut euulso disquidam, ulcus omnino coalescet. At si magnum fuerit ulcus, ut est parata omnino contrahi per deligationem non possit, futuris primis ipsa contrahere oportet, deinde ita deligare, & glutinatos ipsi appellans uicibus uti, quæ et collectâ humiditatem reliccare ac collumere possunt, & ne alia insint prohibere.

Quæ glutinare possint ulcera.

Capit. XXXVII.

(Cont.)

Chalcitidis ulcera.

Verus solas impositæ, filicis & brasseæ & chamæleæ fructus, solia, & cortex plantaginis aëtheris luccus, papyrus posca aut uino mæctrata, & circumducta obuoluta. Recentia uero glutinant, pinus aut picis solia, & cortex recens uelut ligamentum obuolutum cum aspra, aut posca, aut uino. Caseus recens trias. Forisileus autem imponitur solia ramis, aut uinis, aut heta, aut lactuce. Caseus autem ex acido lacte etiam maiora uulnera glutinat. pinus syluestris etiam fluxu repræsentat. Hippuris imposita contra ferriam si uerui dissidii fuerint liana sintus in duris corporibus, etiam si in musculorum capitis fuerint. Cupressi solia, & germina, & recentes pilæ læ ac molles, in duris corporibus. Verum amabile erit oportet tenuissimum linæ puluillum de uulæ uicino pariter acceptum, myrrha cum aqua illita, aut olea, ter et interius etiam uerui dissidios glutinant. Quinque uero solia cum melle altum uulnus imponent. Ad uetera uero ulcera anagallis facti cum cerato, licet in hordium uulnus. Sed & ceratâ cum cerati myrtæ triplici pondere. Ceterum ad uulera in capite myrrham siccam inspergito, & non malefacies. Cito enim ipsa contrahit. Aut aloë siccam, aut aëtholochiam uisum, & cum melle in uino ad moderatam crassitudinem coctâ linæ uento illita indole. At ex cypripis glutinantibus sunt, emplastra barbara, & nucem, & Nicotian inscriptis, & quod ex salis thus paratur, & quod ex diatano, & resiqua huiusmodi, quæ uulnera maxime glutinare possunt.

Ad dolores faciei et oculorum.

Capit. XXXVIII.

Vicis simplex.

Ad dolores faciei et oculorum uulnera opus est la, canibus ac inflammatione.

tionem accubitus medicamentis. Ex liquidis igitur optimum est uinum. facit etiam posca. Si uero etiam cum sorde inflammata fuerint, etiam aqua multa aquosa. Ex siccis uero in communi quidem conueniunt ad inflammationes relata, exceptis acerbis ac oleosis. priuatum autem hoc. Mala pumice dulcia cocta in uino, ac trita imponito. Admirandum hoc est & multi usus. Nam & ad capius ulcera facit, & ad ea que sunt in pudendis, & que in toto corpore dolorosa, & ad oculorum inflammationes. Si uero cum ignis facer, aut tale quid, ad ulcus accesserit, maxime ad illa descripta uiuendum est.

Ad cruda ex uis suppurationis ulcera.

Cap. XXXXIX.

Recentia, & eo quod adhuc inflammata sunt, non suppurationis ulcera, concoquant & suppurant, ex simplicibus quidem aqua temperata, affusa, farina triticea, aut alica, aut panis, aut glutinum libroris, cum terbinthina impolita, cera, crocus, thias, pix, rosa eorum, adeps porcinos & uiculis. Compositum uero tetrapharmacum linamentis exceptum ac rosaceo dilutum. Vetera autem & callosa concoquant, ex simplicibus quidem una passa, styrax, galbanum, myrrha, iadanu, pix, resina, butirom, mastiche egyptia, cetylus. Composita uero emplastrum sine cera Galeni ex oleo cicuto, linamentis exceptum oleo ueteri aut cicuto solutum, & quod geminum colorem praefert, similiter id quod regium appellatur, & similia.

De cruda ulceribus.

Cap. XL.

Canum ulcus deficientis carnis explosionem postulat. Huius autem materia est sanguis moderatus ac bonus. Moderatione itaque ipsius per sufficientem alimentum acquirimus. Bonam uero temperamentum per bonam ipsorum alimentorum succulentiam, & per bonum temperamentum partis in qua est ulcus. Quandoquidem uero superfluitas quae eui uanur, quae quidem tenuis est, humiditas ulcus facit quae uero crassior, dum ipsi accrescit, sordes efficitur a de causa medicamentis opus habet quae moderate siccat ac extergunt. Tale autem est thus, & farina triticea, sabacea, & erui, iris, anisolochia, castinea, panax, & pompholyx. Quum uero nihil profuerit adhibendum incantans medicamentum, sic quodam modo ad aliud transfundendum est. Si enim eo piusior sordes apparuerit, & humidius ulcus, hinc cognoscendum datur, quod defectuosius siccat medicamentum, & intendere ipsum oportet mellis ammissione. Si uero parum, & magis siccum repertum fuerit, plus quibus oportuit resiccat, & oportet oleo copiosiore dilutum etiam adhibere. Contingit autem aliquando dum pharvacum fortius est, colligari quid de carne, ut sordidum ac humidum appareat ulcus, confimiliter ut illa quae defectuosius sunt resiccata. Verum hoc quod sic colligatur cauens sit, & labris humidum, insuperque rubicundum, & inflammationis particeps. Saepius uero etiam manifeste ager mordetur. Illud autem alterum ex minus resiccantibus nihil horum consequens habet. Putredo itaque ligno

Ulceris cruda

Causa ulcera

Lignorum putredine

Supergargaris sordidiorum ulcerum.

Cap. XLII.

Sordida ulcera siue crua sint, siue plana, probe repurgat Aristolochia est sordidiorum melle, terbinthina cum pari rosaceo ac melle. Aut buryro pro rosaceo purgatis

accepto. Iris Ilyrica cum melle, olivæ muria servatæ impolita. Ad nervosa vero, terebinthina cum butyro eliquata. Verum ad valde fœdida ac depa-
 scendo proserpentia facit marmurum cum melle. Hoc etiam crustas elicit.
 Composita vero hæc. Amurca coctæ, stellis despumatis, aluminis phorini,
 singulorum æquis portiones. Aliud. Serapiadis triorecheos, hoc est tri-
 tellicularis sicca, indis Ilyricæ, marmurij sicca, anisotheliaz, singulorū dra-
 chmas ꝛiii. farinæ erui drach. x. utriusque, & cum melle. Insuper autem
 ad fœdida ulcera facit Aegyptium, & cerata ex sale eliquata, & Indicū, &
 Athenæ, & emplastræ viridia diluta, & fœci pulvis ex pumice, utiq; qui ex
 erio parantur. Et passillos Melanchionis appellatas. Similiter quæ is qui
 Criogenes dicitur.

Ad æternæ ulceræ.

Capit.

XLII.

Vermæ ali-
cens

Ad vermes in ulceribus nascentes primum remedium est, ut humiditas
 & pueredo, quæ illos generat, tollatur. Necant autem vermes, omnia
 in communem quæ ad vermes in auribus descripta sunt. Verum ad eos qui
 in ulceribus sunt, inquit Archigenes, cerasam & polium æquis partibus
 cum pice liquida dilue.

De cancerum excisione.

Cap.

XLIII.

Canceris
in ulceribus

Cancer in ulceribus excrevens per resiccantia vehementer medicamenta
 tollitur, quale est diphyrges inspersum, & aris liquama, & testæ crum-
 ma usta, & erinaeei usti ambo cum toto corpore. Verum hæc quidem mor-
 derate tollunt ac compescunt excrecentiam carnis, puer vero Alia flos ve-
 hementius. Et hoc adhuc magis Iori, & chrysocolla, & chalcitis, & Misy.
 Viliæ vero minus mordent. Et aris flos similiter. Aerugo autem omnium ver-
 hementissimæ. Sal utius flaccidas carnes consumit. Similiter & linamenta
 uisla ex lino facta, muria aciore macerata ac resiccata, indita moderatè
 carnem excrecentem consumunt. Aerugo autem cum squama aris, ex his
 sunt quæ vehementer compescunt. Compositum vero rhodium liccum, &
 platon, & sanum appellatum, circa mordacitatem compescunt. At maxi-
 mas carnis excrecentias ad profundum usq; crustis obducunt, passilli Fau-
 stianus triti inspersi, & liccum sole usum dicitur. Quod vero recipit calca-
 mure, liquamæ aris, & manæ æquales portiones, & ad excrecentia facit,
 & singula similia repargas cum melle, & replet cum cerato.

Siccum inspersit compescit.

Spumæ argenti, chalcitis diti, aris, mis, plum baginis, æquales singulorum
 partes. Aliud fortiter compescens circa mordacitatem. facit etiam ad no-
 mas, & maxime excrecentem in gingivis ab inflammatione carnem. des-
 bat etiam dentes. Calca utitur lib. i. antipigmenti sexuocem, Antipigmen-
 tum ædem terito cum aqua, & calcem totam velus cadentiam adhecto, &
 tris siccat, ac utitur. Ut ex passillis pantolimus appellatus, & qui ad poly-
 pos descripti sunt, probe ulcera compescunt. Ixi emplastris autem viridia,
 & maxime id quod ex cappadocico sale paratur, similiterq; his carnes ex-
 crescentes summe produunt ulcera.

De nouis proserpente depascendis, et putrescentibus, et phagulis.

Capit.

XLIV.

Nouæ ulceris
depascen-
phagulis

Depulsionibus utendū est in ulceribus depascentibus ac putrescentibus,
 ex aceto, & posca, aut uino adstringente, aut aqua frigida, aut marina,
 aut lentaculæ decocto, utriusq; malicorij, balastij, lentiscij, baccharum ægypti,
 spinæ Aegyptiæ, aut aliovis de adstringentibus ac resiccantibus. Catapla-
 smata uero adhibeantur ex iisdem, & ex eui farina, & alumine liquido, &
 panis inslaginet mactis. Aut gobij uerticis, aut alius salientis ueteris car-
 nis illoræ, ut elinthus ne liquidus, æquales pondere partes tritis imponito.
 Aut anisotheliam, & uicini salueris lincum æquis partibus, æruginis di-
 modum, cum aqua mellis spissitudine illinere. Si uero crusta non decedat,
 clatenj pitem pousticem ad gurginem ammisceto. Verum ad putredinosa
 facit

Gobij salis-
mactis

facit loti tritum inasperum, & linamentum nullum siccum superimpoluit.
 A Aut aristolochiam rotundam, & gallas pari portione, cum oleo obline. aut
 cucumeris syluestris radicem, aut brassicam, aut betam, aut ruminis folia, lin-
 teo illigata castido cinere obrue. Vbi uero mollis facta fuerint, cum sale trita
 impone, usque repurgant. Aut olea germina in uino cocta cum melle impo-
 nito. Aut chalchidum inponito. Aut apij semen tritum, aut lini semen tri-
 tum cum auramento fusorio adhibeto. Aut thymum, & uiam passam, & fi-
 cus coctas inponito. Aut sic folia trita cum melle. Aut nstrum, & camu-
 num, & firmam cum melle. Aut cucumeris syluestris radicem, aut scillam
 coctam cum melle. Aut sorcos drach. XII. chalcitidis drach. X. mifyos drach.
 IIII. cum acerrimis aceti hemina dimidia tertio donec reficentur, & exce-
 pitis uisitor specillum inungens, & in uiscere obvolvens, superne uero duplit
 lincolum ex uino & oleo inponito. Si uero nullum mata fuerint, hyoscy-
 mum cum polenta, aut brassicam cum melle adhi beto.

Ad puritatem in omni loco, & nomas. Calceis etiam, chalcitidis, utrinque
 que drach. II. auripigmenti drach. I. hoc etiam ad puerygia in dignis, & ad
 phagedenas, & ad carbunculos utendi est, in pudendis cum melle, in reli-
 quis siccis & superne splenio resino impolito.

Ad nomas omnes, & eas que in ore sunt, & ad sanguinis eruptiones, &
 ad carnem supererectam, siccum panchrestum ab omni moda uulnere
 appellatum, compescendo efficit. Chalcitidis, mifyos, ambrosia eundem
 drach. XX. squamarum ferri drach. VI. gallie omphacitidis drach. VII.

Ad canas & peredens.

Salis drach. XII. aluminis cuiuscunque tandem ulti drach. I. squamarum
 pumicis ulti utriusque equali partem, facit & arago rasa cum mifyo ulti, qui
 ce liquida excepta. & iquama ferri cum oleo.

Ad nomas pudendi faciunt tum hircum Melicerum appellatum sic est,
 B & quod ex myrto acuta sit, & quod ex charta, itemque ad omnes nomas. &
 coracem ex aceto multo, & Andronis pallidus, & conuiles. Eadem et-
 iam ad phagedenas conueniant. Nam & phagedena ulcus est proserpen-
 do depalens ac erosum.

Ad humecta ac grauolenta ulcera, Lemnia terra signata ex aceto, aut
 aceto multo, aut posca, aut uino diluta ad locum compage, altius facit. Aut cui-
 pi est folia, & germina, & palata tenera, aut cucurbitae sicce usque cinis, aut
 cornu platani ulti, aut anethi ulti, aut lanarum fordidarum usitaram cinis.
 Aut plantago, aut isatis per se, aut cum polenta. Aut precedam radice sicca.

De ulceribus non indigentibus.

Cap. XLV.

R Efficaces & adstringentes carnem ulcerum cicatrice indigentium in-
 tantum, ut non solum id quod prater naturam superfluum est discutia-
 mus, sed etiam id quod secundum naturam habet aringamus, superfluum ul-
 ceris cum similem efficiamus, & ulcus ad cicatricem perducamus. Commo-
 da uero ad hoc est gallia omphacitis, & mali punici cortices moderaterefic-
 cantes. Sed & quęcumque circa adstrictionem sine mordacitate siccant, ea in-
 dem ad cicatricem ducunt, uelut est myrrha, spuma argenti, & oibres li uita
 fuerint. Nam & hæc si sicca inpergantur, sepe cicatricem inducunt. pinus
 item cortex cum ceruo myrto, hederæ flos cum ceruo, hylæ radix cum ro-
 saco. Item resina pinus sicca, pumex tostus, squama aris, æquali portio-
 bus sicca utere. Hoc etiam compumit. Aut pumici trito, manase ac diphy-
 gis, utriusque porum quid ammisceito æquatur. Aut spumæ argenti partem
 I. diphyrgis dimidia m, eam ceruo uelut splentum inponito. Vetera uero
 cicatrice incluserit usque cum thure, arago cum pari diphyrgis ac ceruo myr-
 to. Aut consuetum paruum rocto cataplasmati modo impoluit. Humi-
 dioribus autem epyen radices inponito. Ceterum ad ea que circa sedem
 ac pudenda sunt, maxime si iustam mata fuerint, aloë utere trita sicca, aut cum
 aqua. Aut iquam aris, aut chrysoliam, in sole cōcra molliti inponito.

Vitæ dicitur
 et indigentis

Siccat doctorem indocentem.

Oleorum drach. XII. manne drach. VI. cadmiz drach. IIII. facit etiam ad nomas. Aliud. Aristolochiz drach. VI. corticis pini drach. VI. manne drach. VI. pumicis drach. IIII. colophoniz drach. IIII. aridis drach. IIII.

Aliud. Cerae cernui usi drach. IIII. corticis pinus drach. VI. ceruse drach. IIII. zruginis rase drach. II. cadmiz drach. XVIII. Aliud. Florum mali punici, atramenti furoris, singulorum drach. XVI. squame aris, aluminis scissi, singulorum drach. VIII. galiz drachmam unam. Aliud. Ceruse, spume argenti, singulorum drach. VIII. recrementi plumbi, galiz, myri sicce, singulorum drach. IIII.

Aliud cicatricem indocentem.

Aluminis scissi unc. I. terito & in aquae fixatorio uno macerato. dissoluto. nero illo, linamenta in aqua madefacto, & siccatie ipsa utitor.

Telephum simpliciter doctorem indocentem.

Cere drach. XI. spume argenti drach. XXXV. diphyrgis drach. VIII. olei myrti dimidium hemitram. Facit adhuc etiam emplastrum phoenicium, & ex cadmia confians. & myrsinatum ac similia. Verum ad regre nec pienti cicatricem, cere, olei myrti, singulorum drach. VI. cadmiz drach. VI. plumbi, thuris, singulorum drach. II. aluminis scissi, aris usi, singulorum drach. I. zruginis rase drach. II. excoluto alternis diebus.

Idem ut regit doctorem recipiunt.

Cadmiz drach. VIII. chrysolig drach. VIII. aluminis scissi drach. VIII. zruginis, squame aris, singulorum drach. I. resinæ pinus drach. XI. cere drach. I. olei myrti quod satis est. Aliud. Cera, resinæ pinus, singulorum sexuncem, cadmiz sexuncem, chalcididis crude quadrantem, myrti quod satis est. Cadmia & chalcidis uno teritur in resinæ caniculari. Vtere cum ipse non lareat, & super eum linamenta, ac spongia ex vino. Aliud. Aris usi sextantem, aluminis scissi sextantem, salis ammoniaci drach. II. cere sexuncem, colophoniz sexuncem, olei myrti sextantem, arida in sole reseruit ad dies XX. Quam autem mellis spissitudinem habuerint, aliquantem ac effusam ceram cum reliquis amulicero ac emollito. Facit adhuc etiam medicamentum ex pumice, & illa appellatur, & consimilia.

De indigis aliter, que ex chirona, & telepho appellantur.

Caput

XLVI.

*Chironia
ultra.
Telephum
ultra*

Vetera & regre cicatricem recipiunt a se ora, aliqui chironia appellare vult, veluti quæ chiron e ipso opus habet ut ad sanationem: quidam telephum, eo quod Telephus ex eiusmodi ulcere deus habuerit. Considera ista quæ nunquid & totum corpus perulis humoribus vitiatum, tales infundentes ad ulcus demittas, & redundans humor per convenientia medicamenta euacuandas. Si vero etiam vitis sit, quales humores ad crura demittas, si in his alius exsistat, etiam hic interceptendus est, velut in chirurgie tractatione dicitur. Aut etiam per vena sectionem ipsos euacare oportet, singulis frequenter detractis, & deinde locis libris auxilij usi, quæ citra mordacitatem, extirpanda mali vim habent. Simplicia igitur sunt ex pumice, & diphyrgis, & squama aris, zrugineq; ac calce moderatè lora. Aut alumen scissum tribus suspense. Aut celypi drach. IIII. uiræ passæ drachmas IIII. nini drach. II. prætelis melle impone. Aut squame aris drach. X. aluminis drach. II. cum cere drach. X. in sole molito ac imposito. Composita vero hæc.

Telephum ad chironia.

Ceruse pestem, aluminis scissi sextantem, squame aris sextantem, salis ammoniaci, thuris, zruginis rase, malicoriz, singulorum sextantem, calcis vitæ unctam una uiræ crassam unam, olei myrti sesquialteram, arida cum vino terito. In principio hoc callus excindis, & repellunt seuerar. In fine vero usas olei myrti, & emollitum cicatricem inducit. Aliud. Spume argenti lib. I. olei lib. I. radices chamæleonis nigri, aristolochiz gallicæ præciti-

Aphacitidis, singulorum unc. i. galbani, ammoniaci thymiamatis, thuris, singulorum sextante, preparato ita ut viridium arundinis radicibus cōmoueras.

Archigenis ad chironia, tum in tibijs, tum in cōmis, malefica strumata, parotidas. Adipis bubuli libras iiii. terebinthinae quincuncem, manne se- Terra Sardæ
puncem, terre Sardæ appellatæ, qua pisciores utuntur quincuncem. Li-
quaris ad sicca adiectis ac commillis utere.

Aliud Archigenis. Cere trisecras, olei omphacini sexuncem, manne, aut thuris, diphyrgis, squamarum tris, singulorum drach. iiii. Arida cum aceto trita, & ad mellis ipsissitudinem adacta, ad ceratam ammisceto, & diffusa, linamento excepto utor. Aliud. Ad mulierum maligna ulcera, & a-
liorum qui tenerum corpus habent. Cere tyrrhenicæ, drach. viii. adipis
taurini, terebinthinae, plumbi usti ac lolidi singulorum drach. i. utere per lina-
menta cum rosaceo aut myrteo diluto.

Ad cicatrices nigra. Cap. XLVII

Cicatrices nigrae tollit oleum impolitum, in quo bryoniae albae ac nigrae Cicatrix
nigra
radix sit incocta, donec fuerit exsiccata calaminta in uino cocta. Spuma
argenti lota, cum rosaceo albo. Verū ex impetiginibus cicatrices, itemq;
alias, concolores facit adeps alpinus dilutus, crucæ semen tritū, & cum sel-
le caprino, babulo ac ossillo illiti addita argenti spuma, cuius ossillus uetus
tribus cum uino austero, ammoniacum thymiana cum felle fissio illitam.
Composita uero, spuma argenti, mentæ, thuris, æquales partes cum melle.

Aliud. Nimi ammoniaci thymiamatis, sulphuris usti, myrrhæ, æquas
portiones cū aceto albo, aut uino, aut aqua tritas. Illinito modico, ut ne sit
exulceratio. Aliud. Cimolix, hercoris columbini, saponis, thuris, æ-
quales partes cum aceto.

Sursum ad cicatrices nigra.

Cimolix drach. viii. aphroniti drach. 7. acratæ albi drach. 7. rectamen-
ti à myrobalano extracti reliqui drach. iiii. in balneo affricato.

De sinu. Cap. XLVIII

Quum a diuersis ulceribus cutis diuina inglutinata fuerit ad subiecta sinu
corporecula, affectionem hanc Sinum appellant. Siquidem igitur ad
superiorem regionem extensus fuerit sinus, facile per oculum sanies effluit,
& glutinato facili exiit. Si uero ex infera sursum spectans, sanies intus
manens aliquid ex coherentibus erodit, & si non prius ad effusionem fer-
ceris aliquam sectionem, nihil efficit, neq; incarnando, neq; glutinando.
At si circa artus fuerit sinus, cubitum uidelicet aut femur, poterit etiam si-
ne sectione ex aduersa parte glutinari, si decliuem figuram artus facias. Er-
gō si in cubito circa cubiti flexuram oculum fuerit, sinum manum un-
alem extendens, siqum ad subfluxionem coherens. Si uero in femore ad
geminus sinum si quis habeat, decliuem figuram facies, puluino molli por-
ptin subiedo, ita ut inguen humiliorem positionem quā genu habeat. Si
quidem igitur Sinus incarnatione non opus habeat, statim per fistulam ali-
quam in directum perforatam, & uelitam alligatam habentem, aquam mul-
sam aquosam ita ut bibi possis, in ipsum infundes, atq; hoc ad abstergendū
sinum in sinu herentem. Verū ad sanam glutinationem, uisum aut uir-
nem multum. Et deinde ad glutinatorium medicamentū procedendum est.
Si uero cuius sinus, & incarnari expectas, prius sic cum ex charta medi-
camentum cum malo rosaceo immixto, deinde linamento uulso oculum
obturas, posita uero silem, aut Machæronia, aut consimile aliquid em-
plastrum, cum rosaceo cerato liquidiore dilutū similiter immittes. Vbi ue-
ro moderatē subincarnatus fuerit sinus, ex agglutinantibus medicamentis
aliquid impones, ueluti si recens eruentum uulnus cures. Talia autem sunt
barbara, & gemini coloris, & filia appellata, maxime uero omni id quod
ex oleo cicino, & metallicis, sine cera paratū Galeni appellatū con-
uenit. Verū post medicamentū impolitū, spongia noua ex uino multo

ant uino quàm maxime mollior circumdatur. Et diligatio à fundo sinus ini-
tium finis, & ad osculum desinat. Linteoloris uero circumdationes adstrin-
gantur quidem circa fundum sinus circa dolorem, paulatim autem laxentur
usq; ad osculum, ita ut emplastrum quod foris secus sinus ambiat, iuxta oscu-
lum sit recisum, quo sanies excerni possit, & aliud quoddam paruum em-
plastrum ipsi osculo impositum sit laxum, ex eodem medicamento, propter
eandem effusionem. Hoc autem finis usq; ad solutionem, quam ubi tertio
quoq; die feceris, hoc ipsum auferes & aliarabis, eo quod tunc sinus circun-
daturum est relicto. Signum uero digestionis, si sinus profunditas glutinata
sit, hoc tibi erit, si bene effluxit sanies, modicaq; ac concocta, aut si etiam o-
mnino non effluxit. Insuperq; si iuxta ipsum sinus necq; dolor sensibilis, necq;
umor sit, sed locus totus contractus est, & licus, & doloris exors. Si uero
etiam pus probe coctum modicum in osculo uideris, adhuc magis bonam
spem habebis. Si uero etiam prima aut secunda die aliqua sanies excerna-
tur tenuis ex sinu, necq; sic de glutinatione desperato. Saepe enim medicamē-
ti uis humiditatem ex subiectis partibus uoluentem exprimit, quae expressa,
loci moderatè siccit redditi glutinatur. Tertia uero aut quarta die absin-
tito, si crocus saniei humor per os appareat, sinum non glutinatum esse co-
gnosce, & in eodem medicamento persistas. Si uero uelut uersimile est,
propter humiditatem aliquam desiccet, non absurdum uidetur etiam ali-
quid ex ipso medicamento aligare.

De finis attritu.

Sanis attritu

Quantum de seculo abscessu, aut propter medici imperitiam, aut propter
afflictū timiditatem, cutis sinus incumbens tenuis & atrita fuerit, & fieri nō
potest ut ipsa adimatur, post reclusas infusas elutiones, glutinatorio utendū
est medicamento, compage quidem liquida, facultate uero sicca. Tale autē
est ex chalcitide constans phoenicium appellatum, oleo antiquo dilutum,
ut nec durum ualde sit, necq; manus inquinare desierit, & postea cum uino
rectori subactum, & circumcirca impositum, cum coequenti digestionē.
Conuenit etiam ita atrita, uelut dictum est curi, uel præcipue mel ad em-
plastrum compagem eo ritum ac impositum. Melius autem est post impositū
nem ipsius linteos exceptis, inspergere super ipsam, per cribrum eleuatū, myr-
rhā in puluerem coactam, aut abōn, aut thus, aut omnia simul. Expertus
etiam sum constantem scire admirandum ad eundem usum medicamen-
tum. Ab hoc proximum est symphytum, & postea iridis illyricæ radix, post
quam etiam emulsa sit. Aliquando uero etiam circa cocturam haec melli
inspergimus, ubi olla ab igne est tollenda. Praestat tamen postquam ablata
est inspergere, & deinde coemonere donec mel tepidum fiat, atq; sic ipsam
sinui imponere, & uelut dictum est deligare.

De fistula.

Caput

XLIX.

Fistula

Fistula siue est callosus sacus, ex abscessibus plerūq; constans, ex trans-
itione ab amandū filitib; appellatur. Si quidem igitur ad os delicta,
fieri non potest ut curetur absq; chirurgia, nisi temporis progressu squama
aut os, sua sponte descedat. Si uero ad os non desinat, per medicamenta que
callos excidunt ac glutinant sanabitur. Callos excidunt hęc. Sphondyl-
ij radix, dracha & induta, fistularum callos auferit. Veratrum nigrum inditū
in duobus aut tribus diebus callum tollit. Amurca cocta & infusa. Sori cru-
dus aut rictum cum modico uino diluto infusum. Sori & crocomagma cū
aqua multa. Aut elaternum terebintina exceptum, in collyria efformato ac
indito. Aut sisphij radice sic cum infundito. Consumit etiam hoc. Acurgi-
nis drach. x. ammoniaci drach. ii. aceto excipe & collyria oblonga effor-
ma. Collyrium quo ad callos excindendos uis. Ammoniaci thymamari-
tis, atramenti futorij, zuzurij, mifyos, chalcitidis, gummi, æquales singulo-
rum partes excipe aceto. Aliud ex Heliodori chirurgia. Cadmia, mifyos,
ammoni futorij, aris usui, gummi, singulorum drach. iiii. chalcitidis cru-
di drach.

*chirurgia
heliodori*

Adre drach. iiii. excipe pueri impuberis urina, & collyria efforma. Vbi vero collyrium fistula indidit, fornix eius panis micæ aqua imbuta imposito, alterando illas donec inflammatio sedetur, & crassa excidat.

Aliud quod in Alexandria accepi. Anchuse radicē, māsyes tosti, chalcitidis, æruginis, aluminis scilli, atramenti futorij, aloës, singulorum unc. i. cantharidas quinq. aceto trita in collyria efforma. Aliud. Atramenti futorij drach. ii. chalcitidis, æruginis, singulorum drach. i. excipe gummi ac utere in collyria efformanda. Postquam uero callus excisus fuerit, ærugine cocta cum melle purissimo oculo reparga sed & incarnantibus post calum excisum uti oportet.

Collyrium incarnans. Aloës, myrrhe, ammoniaci, cineris putaminum quorum uisum, singulorum æquales partes aqua tritas in collyria efformato ac indito. Aliud. Myrrha, aloës, thuris, mali corij, singulorum æquales partes excipe aqua. Quidam felle aurino excipimus. Incarnat etiam uix acerbe succus Noxi etiam quendam qui cedriam fistula infudit, atq. hoc admirando successu. Post incarnationē glutinosiorio utendum est mediamento, iuxta eum modum qui de alijs sinibus relatus est. Si uero angusta sit simulq. longa fistula, inquit Galenus, & nondum uideatur mihi totus in se collū habere, sed sordem solum, prius liciuū immitti, atq. hoc tandiu in fistula manere sinis, donec sordes perfecte elapsæ esse sperari, postea medicamentū imposui. erasit id quod ex nigro oleo cōstans superius reuoluit.

De sinibus que resurgunt. Cap. L.

Quidam ulcera ubi cicatricem receperunt, sepe post non ita multum ^{Vixit que resurgunt} tempus rursus inflammantur & refringuntur. Affecio enim osse aliquo, aliquando caro incumbens facile cicatricem recipit, & perfecte sana esse uidetur. Verum sinioso humore, paulatim ex osse in profundo cornu pilonem perforante, ad illam rursus influente, inflammatio & pus accedit.

Aur cicatricem refringant. Quæ igitur est talium ulcerum curatio, medicatio tanta ut os affectum discedat. Facile igitur incidenda ossa emergent, si papaueris syluestris & scilicet folia, cum polente polline ac uino trita, pro cataplasmate impone. Aut hysscyami semen, & atramentū futorij partibus portionibus trita adhibebis. præcedant quoq. radia squamas ossis breui disparat.

De sinibus in articulis. Cap. Lii.

Articuli siccores sunt quæ cunctis partes. quapropter ulcerant siccores. ^{Vixit in} iis opus habent medicamenta. Probe igitur Polydæ pastillus facit, ^{articulo} cum uino tritus ad strigimentisiam spissitudinem. Item quæ alia similiter ut hic relicta medicamenta. Sed & aqua marina, & multa super ipsos perculos, melius afflicti uidamus. utendam itaq. est ad articulos his quæ magis siccant.

Quæ spicula, aculei, et spinae extrahuntur, et consistit. Cap. Liii.

Aculeos & arundinea, insuperq. spicula ac spinas exiit Anagallides ^{Spicula et aculei} am hæ, arillo olochta rotunda, ammoniacum cum melle, hysscyami semē ^{hæ carae} tritum inspersum. Arundinis radicem contusam, & ammixto melle linco ^{hæ carae} insartam, larga copia imposito breui edocuit.

De spiculis tunc ex ossibus, tunc ex arteria extrahuntur. Cap. Liiii.

In partibus ex quibus sanguis erumpit, contraria sinibus figura cōducit, ^{Sanguis erumpit} hac autem est ea quæ sursum spectat. Sed neq. hac immodica existat. ^{pito ex arteria} Periculum est enim ne dolor oboratur, & uas rursus sanguinē fundat. Nihil enim magis sanguinis eruptiones mouet, & inflammationes auget, quàm dolor. Verum in partibus sanguinem fundentibus, si ann diglum ad osculum ulceris circa uasculum obdedita utiliter insartaris, citatq. dolorē premas. Nam & sanguinem simul cohibebis, & granum in uulnere congelabis. Quia & an multum in profundo situm sit uas, unde sanguis erumpit, diligenter considerare oportet, & positionem ipsius ac magnitudinem, & an uena sit aut arteria. postea uero si quid em paratum est uas, aliquo sanguinem sistente utendū est. Optima ex his sunt obstruendi ut prædica, quæ compo-

nunt

nuntur exulina fricta, & farina triticea polline, & gypso, & alijs eius mo-
di, cum oui candido subacta, & cum pilis leporinis impositis. Si uero ma-
gnus uas est, hamo ipsum distendere conare, & moderate obrare. Sup-
presso autem sanguine, si quid uena fuerit, citra laqueum, quidam medicamen-
tis sanguine libere conare. Si uero arteria, ex duobus altero adhibito, aut la-
queo circumdato, aut toto uase distenso, sanguinem continebis. Laqueus ue-
ro aliquando etiam magnis uenis circumdare cogitur: quemadmodum et-
iam ipsas disticare aliquando totas, per transfuerum uidebimus. Verum ad
hanc necessitatem denentimus circa uenas, quae erectae ex magna profundita-
te sursum feruntur, & maxime per angustiam aliquam, aut principales par-
tes. Sic enim utraq; pars utrinque renellitur, & uenas ab incumbenibus cor-
poribus occultantur ac tegitur. Tutius autem est utrumq; facere, & laqueum
radici uasis circumdare, & inde iam locare. His autem factis, quam citissime
incarnare iussimus, prius quam de cicat laqueus de uase. Si enim non cito in-
carnetur, sed locus alicubi uacuus compariatur, uasis dilatatio, quam aneur-
ysina uocant, contingit. Cognoscere autem an uena sit, aut arteria, quae san-
guinem fundit, ex eo quod arteriae sanguis flauior est ac tenuior, & pulsato
modo euacuetur. Venae uero sanguis nigrior est, & crassior, & sine pul-
su prodit. Optimum igitur ex omnibus incarnantibus medicamentis, quae
sane nos nouimus, hoc est, quo etiam ad cerebri membranas sanguinis
eruptiones tutissime uti possumus, & ad colli uulnera usq; ad singulares uer-
nas institui: nam & hanc sanguinem cohibet citra laqueum: recipit autem
haec, thuris pinguisissimi partem i, aloës in mollioribus corporibus partem
dimidiam, in durioribus tantundem, & prothure, mannae tantundem. Ex-
cipe oui candido ita subacta ut mellis ipsitudinem habeant, & deinde cum
pilis leporinis quam molliissimis, uasa e toti ulceri plurimè impone, & ex-
trinfecus linteo deliga, ita ut primas quantur aut quinque lineas obuolutio-
nes super infam uas, unde sanguis profuit, facias, & hinc ad radicem ipsius
procedas. Deinde solutione per tertium diem facta, si medicamentum tuto
adhuc adherent, aliud rursus circumdabis, & uelut insuper humectans nar-
sas deligabis. Si uero sua sponte reipuerit, ita uenientem, si dices uasis per di-
gitum leniter compressa, quo nihil uideatur, hoc quidem placide tolles, alter-
um uero appones, atq; sic curabis donec uas fuerit incarnatum, ita ut figu-
ra sursum spectans semper circa molem sit seruatur. At uero quae crustas in-
ducunt, nudicorem partem efficiunt, quos pro natura habebat, crusta dila-
ta, & pleriq; sanguinis eruptio quae isti non potuit, ad crustarum delapsio-
nem consecuta est. Videndum tamen etiam his, ubi necessitas magna co-
git. Maxima autem necessitas est uti crustificis medicamentis, aut caneris
ignatis, quum ex putredine fae erotione sanguinis eruptio contingit. Et sane
in talibus astidionibus, ubi quicquid pumelinosum est reseruerimus, tar-
tius est aut urere ipsam ueluti radicem, aut crustificis medicamentis uti. Hoc
autem maxime in padendis ac sede fieri solet. Scopus autem in crustam in-
ducendibus sit caliditas cum adstrictione, uelut in maly, chalcinide, atramē-
to summo. Quae uero ex calce uiuæ sunt, uchementiora quidem sunt, sed
quia calce non adhaerunt, et uis ex ipsis inducit citius decidunt: melius au-
tem est ipsas manere. Canerigit enim ut caro ad fundum ipsarū sic crescat,
& uelut operculum uasis fiat. Ceterum in his unde sic sanguis erumpit, as-
tis sanis inaspera probe supprimi, aut gallice utitur. Oportet autē ipsas igne
candelacti, uo ceto aut uino extinguere in summa, sanguinis eruptionem &
flumē, simplicia quidem, aloës, thuris, manna, tanta terra asper dicta, ferrugo,
lazarum uisitarum cinis tenuissime tritas, liereus alinum ac equinum, bi-
tumen medicum, m. alcorum, diphryges, galla, myrtus sicca, alumen om-
ne, cradum & altum, resina torrefacta, uina cortex, aut silis sicca, pistillari
pharaui sanguis, maxime ubi crustas abiecerint. Primum uero sanguinis
narium eruptionem silis, uelut acuti semen, urticae foliorum succus, chal-
cidis,

Acijs, andryllis uita, pili leporis, fescule medium uinum cum aceto, siccus affinitum sicut aut humidum, poeri succus cum thure ellychnio exceptus. Composita uero medicamenta omnis sanguinis eruptionis sunt & hæc. Spongiam nouam liquida pice imbutam, & humore oblitam, in noua oleo exurto, & ad cineres partes II. plumbi partem I. & sibi partem I. ammi scero. Aliud. Mannæ thuris, sulphuris stius, quales singulorum partes inspergit. Aliud. Chalcedis drach. VIII. thuris aut mannæ eius drach. XVI. resine frictæ drach. VIII. gypsi albi drach. VIII. Aliud erule inducens & sanguinē sistens. Chalcedis, xris uiti, ammi furoris, mēlos tophi singulorum æquales partes. Sed & Rhodium appellatū medicamentum, & flauum dictum, ex eorum numero sunt quæ probe sanguinē sistunt.

De nervi fauciati.

Cap. LIII.

Nervi fauciati aut puncti inflammationem ac dolorem excellentem habent, propter sensus subtilitatem. Quare etiam febres & convulsiones his accedunt. Quibusdam etiam delirium, propter neruorum cum cerebro coherentia. Quandoque uero etiam circa alios locos fauciati parti uicinos, inflammationes ac abcessus fieri solent, ex ipso nervo fauciato, propter ipsius cōiuncturam. Oportet igitur cutis uulnus inglutinatum forare, quo per ipsum limes effluat. At in punctionibus si circa uideantur, etiam diutius dissectionibus se manio secantibus insuper concidere oportet. Verum in adhibendis aut ipsi, si humoribus omnibus ex æquo redundant corpus, & inflammatio magna sit, primum à uenæ sectione incipiendum est. Si uero uisari fuerint in corpore humores, etiam purgatione utendum est. Ad ipsius autem uulnus medicamenta adhibeantur dolorem mitigantia, & effluxionem aperientia, præsertim si non insuper concessio facta sit. prout a qua calida, quæ alijs inflammationibus consensientissima est, his inimica

Nervi fauciati aut puncti.

Heat, & ad sensum calidum sit. Neque enim frigidum, neque tepidum ualde, si ne noxa adhibetur. Ex medicamentis autem cōmoda est resina terebinthina, per se in pueris, mulieribus, & tenera carne prædita, cum euphorbio aut tam emollita, in his qui duram carnem habent. Si si quandoque durior resina, cum aliquo oleo tenuiore. Cataplasma sitis uero in inflammatione ac patre leantibus nervis uti quis poterit, farina ordei cea, aut fabacea, aut erui, in lixirio cum aceto mulso cocta. Verum circa cocturam, ad punctiones etiam cerato huiusmodi quis utatur. Cere quadrantem, euphorbij unc. I. aut si ecoris columbini, in durioribus corporibus, olei sextantē. Quandoque etiam terebinthinae unc. I. Quod si emplastro simile medicamentum in cere uoles, ad euphorbij unc. I. cere, & resina frictæ, & olei, & picis pinguis, singulorum leuonem a dijsies. Si uero pro resina, propolim pinguis simam addas, melius efficies. Quin & hoc ad punctos nervos cōmodum est medicamentum, Idem casu ad rabiosi canis morsum facit. Aceti sextar. I. picis pinguis lb. I. opoponacis quadrantem. Opoponaca aceto dilutum amplius contrito, & amittitur pice coquit. Hoc medicamentum pan. Iis nervis cōmodum est, non permittens puncturæ osculum coniungere, quemadmodum neque in his qui à rabido cane morsu funiculæ ad cicatricem peruenire. Verum ad sola dura corpora facit. Si uero ad pueros punctos aut tenera carne præditos eo uti uoles, per aliquod discussoria ut prædictū liquore ipsum potes, amara uiti misceat, aut opobalsamum, aut oleum uetus. Conuenit etiam regium medicamentū, quod recipit nitrum, aut calcem uiuam, aut euphorbium, aut sulphur uinum, aut columbe syluestris & ercus, aut opoponaca, aut sagapenum, aut fixam cyrenalem, aut castonium. Ad libram autem medicamenti, uncia una abusus ex relictis medicamentis inscienda est. probe facit ad nervos fauciatis, & maxime punctos. Possit autem quæ ruri degens in reliquorum inopia, propolim recentem ac pinguem uulnori indere. Aut fermentum maxime uetus solum, & propoli amixta, aut cum ti-

Aqua calida nervi fauciati de uenæ

A & Athena, quoniam & compositiones, & utendi modum, in septimo libro reperies. Quandoquidem uero aliqui diuites preciosis medicamentis ad sa-
 cratos neruos uni expentunt, Galenus ad punctiones quidem neruorum hęc
 descripsit. Cinnamon unc. i. dāclamī unc. i. mari unc. i. amaraci drach. ii.
 cere bellēm, opobalsamī dextranem, terebinthinae unc. i. Aliud. Succ
 cyrenaei unc. ii. cere quadrantem, opobalsamī unc. xii. Vtū ad deno-
 atos neruos hoc. Cere ungentaria quadrantē, ungenti spicati, aut foliati,
 aut nardi unc. xiii. pompholygis loti unc. i. spicē nardi unc. i. amomi
 unc. i. folij unc. i. Atq; hęc supra ipem praestantia esse Galenus dicit.

De articuloꝝ distorcionē.

Capit. LV.

Articulorum distorcionēs, ancylos & ancyloēs appellare solent, hoc est
 articuloꝝ contractiōes, ob impactos humores, aut neruorū aliquam
 distorcionem obortas. In quibus molliendi ac laxandi facultate praedita re-
 quiriuntur. In cōmuni igitur ea quae ad induratas in scitum partes, & ad
 huc magis ea quae ad reclusas relata sunt, his cōpennit. Priuacis uero per-
 fusio ex aqua & oleo, in quibus cocta sint, lini semen, forum graeci, althaea,
 laurus, cucumeris syluestris radix. Eripiūm adeo oleum Scyoniū. Post
 perfusionem autem adhibeantur his primum acopa simpliciōra, uelut est id
 quod ex populo nigra paratur, & quod ex abiete. Bromiam item, & Basilio
 inscriptum, & pyxis appellatum. Postea etiam Aristophaneum, & Azani-
 ta inscriptum. fortissima uero sunt, & quod Lysipondum, & quod Varium
 appellatur. Ex emplastris autem Amythaonī inscriptum & Anicetum ap-
 pellatum. Optimum uero hoc est. Bdelliū, adspis uulcani, amesoniaci thy-
 miamas, iridis Illyricae, singulorum drach. xvi. opopanax, galbanū, can-
 tharus, styracis, thuris, singulorum drach. vii. pipentis grana clx. cere
 lib. s. resina terebinthinae lib. s. olei irini facis quod sacis est, utni quod suffi-
 cis. Contunditur hoc medicamentum. Est & Acopon bonum, irino aut cy-
 prino, aut lurrino dilutum. Medium uero inter acopa & emplastra locū ob-
 tinet, medicamentum ē perna multa mixtura. Acoporum autem usus per
 mollem ac per seueriorem sit affriccām, unā cum hoc ut etiam affecti arti-
 culi flexionem ac extensionem experiant.

De leniti articulo.

Cap. LVI.

I Axantur articuli saepe, & in diuturnis febribus morbis, & in colicis,
 & resolutis, caliditate maxime ac humiditate intemperie ipsos occupan-
 te. Atq; hinc motus impeditur. In quibus acacia saccus aqua dilutus ac af-
 frusus, aut rubi, aut myrti, aut lentisci, aut ulmi radicum corticis decoctum
 conuenit. Aut malicorium in cataplasmate adhibeatur, aut myrti folia cera-
 to myrteo excepta imposita. Corroboracione enim opus habens nerui colli-
 gantes, peradstringentem ac relaccantem facultatem. Talia igitur medica-
 menta articulis imponenda sunt, uelut est id quod ex foliis paratur, &
 oxerum appellatum, & phoenicēnam, quod uinum adstringens, aut aceti
 insuper assumptis. Plurimq; uero pꝛe frigidaꝝ talem impotentiam senpu-
 tantes, atq; ita calidioribus auxilijs uti, maiorem noxam induxerunt.

De leniti articulo.

Capit. LVII.

Tres sunt in uiscerum lumbricorum species: una eius qui totumq; est
 crassitudine altera fuit. Tertia eius quem Ascarida appellant. Omnibus
 autem origo est ex cruda ac crassa puritosa materia, & putrefactioni apta,
 qualis fert congregari solet in pueris, & alijs erapulosi: sed non ex calida
 & acris, aut urabiliaria materia. Hęc enim quoniam etiam nutrinenti maiorem
 transgressi sint, ad lumbricorum generationem ineptae exsunt. Imò uice
 uersa etiam corrupendi ipsos uis habent bilioſa maxime superflua res.
 Et uero aliquādo uni cum lumbricis excreta fuerit fluxa bilis deorſum, aut
 per uominus, illos quidem in intestinis esse scito, bilioſam autem humorē,
 aut circa os uentris, aut in aliā quādam parte constituisse. Vniūcuiusq; igitur
 differentia spiorum, & speciem, & ortum, & locum, & dignotionem

dicemus, stomachi curationem, à rotundo initio accepto.

De lumbricis rotundis.

Lumbrici igitur rotundi speciem omnibus notam habent, eo quod etiam
rotundi hi magis quibus alijs redundent. Constat autem maxime circa tempora inter-
 flina, appropinquantes quoque mori, ut ea de causa saepe per os effluantur.
 Quibusdam etiam per nates excreti sunt. Abundant autem magis quàm alij
 in infantibus, & usplurimum cum febre. Verum circa principia febrium
 orientes, ex subiecta corruptione substantiam habent. Circa vigores autem,
 ex morbi malignitate, circa declinationes vero, ex mutatione uniuersorum
 in melius, non sicut Hippocrates ait, Bonum est etiam lumbricos rotundos per-
 trahere, morbo ad iudicationem tendente. Hi uero rotundi citius perimuntur.
 Sequitur in his qui lumbricos rotundos habent, inuersionis ac uentris mor-
 sus, & nates parum irritantes, sic &c. In quibusdam etiam singulis, & som-
 ni cum palpitationibus, & surrectionibus praeter rationem. Quidam etiam
 cum clamore exurgunt, & rursus in somnum delabuntur. Pulsi inaequales
 sunt, & febres augescunt inordinate inuadentes, cum extremarum partium
 perfrictione, & ter, aliquando etiam quater in die aut nocte, citra rationem,
 significationem accessionis peribent. Pueris autem manducatio, cum excre-
 ta frustra lingua, & denticum strepor comings, & oculos claudunt, & tace-
 re capiunt, & excitantibus indignantur, & oculi subruent apparet, &
 male rubicunde fiunt, & rursus haerescunt. Verum haec ad modicum tem-
 pus, & ex intervallo fiunt. Quibusdam uero ad stomachi accurrentes nau-
 scarum ac morisum cause sunt, & egroti cibum non appetunt, ad fumen-
 dum uero cibum cocti, nauascentes uix deglutiunt, aut etiam ingestum re-
 uocant. Multis etiam uenter doletur cum comestorum corruptione, & in-
 testum tympani inflatur. Reliquum uero corpus praeter rationem eliquatur, quod
 neq. fames, neq. euacuatio immolice facta sit. Non tamen in omnibus om-
 nia relata signa querere oportet, sed quaedam iuxta id quod experientia, ali-
 quando etiam plurima. Haec autem contingunt, dum animalis circa intesti-
 na obvoluitur ac mordens, & dum febris caliditas uapores prauos ad cie-
 rebrum affert, ex collecta in uentre purulentosi humiditate. In quibus ali-
 cubi ambobus simuliter praespicere oportet, febris, & lumbricis, alibi mo-
 dique febres tantum et libris, lumbricos sicut in corpore excellere oportet.
 Multi enim neglegi ab ipsa corruunt, & conuulsi perierunt. Alij scindit
 se affirmant ipsos per inguina egredi. Expelles autem ipsos prius oc-
 cidis, occides autem per amarorum maxime auriliorum usum. Quum igitur
 communis est febris & lumbricorum curatio, auxilia simpliciora conue-
 niunt. Praebendam itaq. ipsis dandum est chamæmeli & myxariorū deco-
 ctum, aut etiam ipsa myxaria cocta edenda danda, dandus etiam seridus suc-
 cus, aut coriandri semen cum aqua calida tritum, aut cum posca. Aurati-
 culæ muris herbar decoctum. Aut cornu ceruini rancurum. Aut rubeica si-
 nepti. A lentissime nita. Aut olei crudi amari ochlearia duo paulatim abfor-
 beant. Nam amaritudine sua lumbricos occidit, lubricitate uero ipsos de-
 uoluit, unā cum liercore egerit. Quod si inflammatio ac dissensio uiscerū
 sit, cataplasmate utendum est ex semine lini, & farina lupini, & absinthio,
 ac hyonice radice, cum aceto melle. Aut etiam perfusione ex oleo chamæ-
 melino, uino, absinthij semine, & aloë, circa praecordia adhibita. Si uero fe-
 bres non uoluerint uexare, menta ad myxaria ammisceratur & exhibea-
 tur. Aut alij seridis de his, si non est, etiam effluatior, uelut est decoctum se-
 riphae, aut calamintha, aut filicis. Aut cardamomi semen. Aut radice mali
 punice acide decoctum ad tertias redactum. Aut cumini tolli, & natri sul-
 phuripulvis uti scrup. iij. Aut simonitum, aurabrotum, aut ambo simul
 cum melle in cataplasma redacta. Aut lupulorum amarorum scrup. iij. Aut
 basilicæ, aut cucurbitae semen tritum. Aut absinthium, quod etiam solum saepe
 fuit. Dandi etiam aloë loti scrupuli iij. Atq. hoc inser laudatissima
 habentur.

a haberetur. fortioribus etiam illota datur. Quandoquidem uero pueri aloē non a demittunt, supinis ipsis detentis, & ore per cochlearium disparato, per clysterem aliquem subtilam ualidam alligatam habentem, inuicis ipsis aloē quā penitillime transmissam inieciunt. Atq; hæc miranda methodus est in pueris ægrè admissis moribus: in quibus etiam alimenta forbula sepe hoc modo inuicissimum, ubi alioqui illa non apperientes auersantur. Sed & Cyphi, & Maluaphiam recte dari possunt, & cornu ceruinum usum cum pipere, ex melle aut aceto nullo. Sed & reliqua ut ex aceto nullo ipsis dētur conandum est: præstat autem si scilliticum fuerit acetum, & maxime in persectoribus. Aurisnapi cum oleo & aceto. Qui uero cū alui fluxione à lumbricis infecta sunt, eis plantaginis succus præhibendus dandus est, aut ipsa plantago sicca. Ex aquo enim ad utrumq; efficax est, rum fluxionē, tum lumbricos. cataplasma uero his imponatur ex cruda ordacea farina, silice, absinthio, farina lupuli, samonico, & abrosino. Quin & malicorium, & acaciam, & gallam, aut balsamum amantillæ conuenit. Quandoquidem uero quidam amaras potiones auersantur, ex iis relaxanda sunt: quæ non palam amara existunt. Danda præterea etiam chamæpitys, marubium, lentium, baccæ lauri, cassia, thymus, pulegium, carpesia, cyperus, polypodium, iris, enicurus, erythrodanum, spina Aegyptia cum pipere pari, lex scoropularum pondere, in decocto mentæ, aut mori radicis succo, aut decocto petroselinæ, ac reliquorum odoratorum seminum. Fortius uero utendum est aloē, cum melisso oleo & uino. Hoc etiam appetentiam excitat, cuius magna cura habenda est. Sæpe uero ammiscendum est ad aloē a blinthis, aut felle ta urino implendus umbilicus, cum aliquo ex relictis amaris. Aut oleo ex rododaphne frequenter illinendū. Aut cedria rum sola imponenda, rum addito cerato, super totum uentrem. Aut pex arida trita inspergenda. Aut menta, aut nigella cum rosaceo illinenda, aut etiam scriphi decoctū his ammiscendum. Aut mali perlicæ folia contrita imponimus. Vtendum etiam ceruina medulla angustini modo, in unguibus, pectine ac lambes. Sed & ceratum hoc adhibebimus si opus fuerit. Aloē, absinthij, farinæ lupuli, scriphi, melanthij, singulorum scrup. vi. cere uinc. i. s. olei chamæmelini quod si ris est. Arida cum bubulo felle terito. Sæpe uero ipsa per sedem infundenda est aqua mulla, quo ad dulcedinem mella, lumbrici deorsum prodeciuntur. Si autem putrefacti in profundis, non excernantur, sed magis euaporatione efficiant, subeducere ipsos oportet, aut aloē, aut amari ex ipsa medicamenti portione, quandoquidem etiam aliis non inuicis est ipsis modorata per infusum euacuatio.

De lumbricis latis.

Lumbricus latus transmutatio, ut ita dicam, est membranz intestinis Lintus
intestinis agnatz, in corpore quoddam animarum, atq; hic excernitur sæpe
ignus, ita ut incredibilem magnitudinem aspicientibus exhibeat, aut etiam
per partes secedit, ita tamen ut exoluitur, non amplius generetur. Abundat
autem quandoq; etiam in non febrilientibus. Sed & in febrilientibus nascitur
in morbis longis, mordacitatem stomachi assiduam inducens, & appetentiam ciborum incontinentem. Nam id quod animatum factum est in intestinis adiacens alimentum abripit, ut alio situm opus sit, & si id non contingat, mordetur intestina. Consequitur in ipsis, gracillitas corporis, & impotentia cum inequalitate. Verū signum minime omnium mendax est, quod unū cum excrementis quædam cucurbitæ semini similia excernuntur. Cæterum curatio superiori consona est. Conueniunt enim præpositiones ex scribis, & allij efus, & silicia aut centaurei decoctum posum, & per clyster infusum. Itemq; calaminthæ, aut dictamnij, aut pulegi decoctum. Infundatur etiam ipsis muria, præbiant etiam hoc, quod neq; his qui ab alijs lumbricis infestantur inuicis est, præsertim si febre carcant. Nimi rubri, pipiris, candamoni, singulorum ꝑ quales partes. Dantur ex hoc scrupuli iiii. cum

uino aut aqua calida. Aliud elegna. Piperis, baccarum lauri purarū, cuncti Aethiopici, massilici, singulorum partes portiones, mellis quod sitis est. Datur cochlearij mensura, mane & ad noctem dormituro. Si uero efficacius ipsam facere uolueris, niri rubri tantundem addito. Aliud. Heliosiameniaci thymianatis, piperis, in alio exemplari, silicis, singulorū drach. v. cum aceto melleo calido. Et interpositio tempore, euphorbij drach. i. aut duas perfecte uetatis hominibus bibendas praebe. Aliud. Filicis acetabulum, niri drach. ii. dato in aqua hemina praegruatum. Melius autem efficitur, si parum scammonis additum fuerit. Aliud. Corticis radicū mali punice summa parte decorticati drach. iiii. piperis drac. iiii. cardamomi drach. v. marubij drach. ii. Ex melle praebe eis à praegresso alij elu. Verum ad perfectam affectionis depulsionem, etiam thentacen exhibebis, uehementi febre non prohibetite.

De Ascaridibus.

Ascarida

Quin & ascarides, ueluti iam antea diximus, species lumbricorum sunt, uermibus similes, circa intestini recti extremas partes, & musculi adstrictiorum partes primas consistentes, & horum locorum praetium uehementē indocentis. Generant hanc speciem, uisio amenti, singidinas, & ciborum corruptio. Euenire itaque ipsas oportet, in infansibus per glandulas subditas, ex melle, modico sale, aut nitro. In peti cūoribus, muria acri, aut centaurij decoctio cū nitro, & melle. Aut decoctio colocyndidis, aut abundij, aut chamaeleonis, aut anchusae, aut enicel, aut hyssopi, aut pulegij, aut calaminthae, aut upisiorum. Post infusa per clysteres, rectum intestinum sublinatur ex simplicibus, acacia, aut hypocistide cum nitro, aut rhoz brynaco cum alumine liquido. In his qui adstricti sunt, tenuis terra ipsa agide appellata cum uino. Ex compositis, pastillo Andronis, & similibus. Sed & cedris ipsa infundatur per clysterem multipliciter perforatum, quales sunt ut si fusijs appellari. Aut carne salis quae ad hoc apta sit, indita, deligatione uisum, quae mētu id sustinere possint, ita ut ea frequenter alteretur. In compositis uero omnes à uentibus sustinere uicem poli ichneumonis sufficit. Amentia ipsa sine boni faciei, & quae facile distribui possunt, & neque efficiens tem lumbricorum causam augent, neque uires immāui permittunt, quantum gratia etiam uinum dābimus aequo sum. Etiam ea de causa frequenter ipsos nutriemus, tum ut ne alimento carentes lumbrici, morsus inducant. Tempus autem alimeni dandi cum mē ad me est, quam aliquantū adiu. lumbrici sunt habiles. Si uero etiam fluxio uentris affuerit, nosse oportet magis augeri lumbricos, eo quod alimentum non distribuantur. Et torbiles cibos & pisces exhibere oportet, a quibus etiam adstrictibus amittis, uelut sit pira, mala, mēsa panica praesertim acida. Foris si cutis autem aduentrē utendum est auxilijs adstrictigentibus, uelut super dictum est.

De dracunculo. Caput LVIII.

Dracunculus

IN India & regionibus super Aegypti dracunculi generantur, uelut lumbrici similia animalcula quaedam, in musculis partibus, brachijs uidelicet, formoribus, ossijs. In pueris uero etiam in lacribus sub cute consistunt, & manifeste mouentur. Deinde temporis progressu diuinaiores, iuxta dracunculi aliquam extremitatem, locos suppurant, & aperta cute, principij dracunculi foras procedit. Verum dum attrahitur, dolores inducit, & praesertim ubi abruptus fuerit. Quapropter aliqui plumbei molem ex dracunculo suspendendam esse dicunt, ut ut accuatius, sed particulatim ex plumbei mole delapsio ipsius fiat. Alij hos damnantes, eo quod nihil minus ex pondere plumbei dracunculus abrumpan, & uehementes dolores inducat, iubent partem demittere in aquam calidam, quo dracunculus ex caloris fomento foras procedat, utq; in dysipis ipsam particulatim extrahere. Caeterum Soranus neq; omnino animal, sed necui alimenus concretione, dracunculum esse putat, qui opinionem solum inducat, quod moueatur. Sicut autem

*Si uel roscos
uini qd drac
unculus*

Autem hoc fit, siue prius illud, & Sorano, & Leonide, & alijs usum est, affusione calide & cataplasmati cōeoctioris in his utendum esse, quæ ex aqua mulla, & farina triticea, aut cedreae parentur. Sed & emplastri eiusdem facultatis usum quondam probant. Conueniunt autem fuerit & id quod ex hœcets lauri, & quod ex melle conficit. Nam ex horum usu, dra cuniculus, siue corpusculum illud contentum morificatur, & excidit. Suppuratione uero cōtingente, si nō excidit, dillectatur cutis, & demudatū id quod cōtinet, auferatur, & linamenta indantur, & deinceps suppurationis curatio adhibeatur.

CAPITA QVINTI LIBRI.

In hoc quinto totius Operis libro habetur tractatio de ferarum uenentiarum moribus, & de plagis earumque uenenum elaculantiur, & de auxiliariis aduersus uenenū medicamentis.

Quæ præterea in cōmuni ab omnibus uenenum elaculantiur.

Cap. I

Curatio communis omnium ab aliquo ueneno elaculante istorum aut mortuorum

Cap. II

De moris hœcetra hido, & afflicto, ac foemadinaeque

Cap. III

Ad non rabioforum canum morfus.

Cap. IIII

De uespis & apibus

Cap. V

De phalangis

Cap. VI

De araneæ morfu

Cap. VII

De scorpij plaga

Cap. VIII

De scolopendra terrestri ac marina.

Cap. IX

Ad fistionis morsum

Cap. X

De mure araneo

Cap. XI

De uipera maris ac foemina.

Cap. XII

De amphibiaena ac scytala.

Cap. XIII

De dryino

Cap. XIV

De hæmorrhoides, preslere siue dipside

Cap. XV

De hydro

Cap. XVI

De cenchrino

Cap. XVII

De ceraste & aspide

Cap. XVIII

De basilisco

Cap. XIX

De marinis, & prius de pallinaca, & margena

Cap. XX

De dracone marino

Cap. XXI

De scorpio marino

Cap. XXII

Propagatio sanguinis testudinis marinae

Cap. XXIII

De moris hœcetra hido, Cap. XXIIII

Cap. XXV

De moris ab homine

Cap. XXVI

De uenenis

Cap. XXVII

De præseruatione hœcetra hido

Cap. XXVIII

Curatio communis eorū qui quodcunque uenenum sumpserunt.

Cap. XXVIII

Enumeratio simplicium uenentiorū.

Cap. XXIX

De cantharide

Cap. XXX

De buprestis

Cap. XXXI

De salamandra

Cap. XXXII

De cruce pinas

Cap. XXXIII

De lepore marino

Cap. XXXIIII

De rana rubra, aut palustri.

Cap. XXXV

De hiradinibus

Cap. XXXVI

De chameleon

Cap. XXXVII

De hyalcyma

Cap. XXXVIII

De cordandro

Cap. XXXIX

De psyllio

Cap. XL

De cicuta

Cap. XLI

De papaueris succo

Cap. XLII

De caspali succo

Cap. XLIII

De mandragora

Cap. XLIIII

De aconto

Cap. XLV

De ixi

Cap. XLVI

De ephmero

Cap. XLVII

De smilace

Cap. XLVIII

De solano furioso, hœc quibusdam do-

Cap. XLIX

rycno appellato

Cap. XLIX

De sardonis herba

Cap. L

De papauere corniculato

Cap. LI

De pharico

Cap. LII

De toxico

Cap. LIII

De fungis

Cap. LIV

De sanguine taurin

Cap. LV

De lacte coagulato

Cap. LVI

De melle in Hieraclea nascente.

Cap. LVII

De gypso

Cap. LVIII

De citula

Cap. LIX

De calce, sandaracha & auripigmen
to Cap. LX
De spuma argenti Cap. LXI
De plumbo Cap. LXII
De hydragyro Cap. LXIII
De ueratro albo, thapsia, elatris,

agrico nigro, ruta syluestris, mel-
lanchio, recentibus quædam spinæ
pappi Cap. LXIII
De his quæ nobis familiaria sunt, ac
lus est uinum, & frigida aqua
Cap. LXV.

PAVLI AEGINETAE REI MEDI-

CAE LIBER V. ~~PAVLI AEGINETAE~~*Medico Physico interprete.*

*Quæ præferuntur in conuulsi ab omnibus uenenis diutius
tibi. Caput I.*



D B uenenum elancilantibus animantibus dictum, ab his
quæ in communi omnibus talibus commodant initium
sumemus, ea quæ præferantur prius tractaturi. Si glorie
quis in locis eiusmodi feris resectis, ex aliqua necessitate
dormire cogatur, in quibus maxime salamandra, aut pha-
langia, aut reptilia quædam abundant, horum quidam sub
terraneis latebris, alio cum aqua trito, aut aliqua ex re-
ferendis herbis, obtutare conuenit. Sufficit uero cornu cernina, ungulas
caprinæ, aut pilos, gurgaten lapidem, bitumen, boddellium, gallanum, eupressi
aut cedriamenta, melanthium, pucedanum, ut tunc folia, calamithen, sa-
penum, cassiolum, canchryos radices, conyzam, aut aliquid ex reliquis
gramineis. Culicis uero priuatis fugare sufficit, stramentum uero,
melanthij syluestris seminis, eumini, singulorum æquales partes cum ster-
core bubula. Ad hæc etiam ignem frequentius accendere conuenit. Nam
terre splendorem pleneque fugant. Stratum subternendum est ex asphode-
li, culamintha, ut tunc, pulegio, psalo, conyza, atherosno. Si uero fieri non
possit, ut toto quis strato huiusmodi maneat, strato saltem hæc circumfusa
solentur. Anemadverberem etiam habere oportet in his quæ conueniunt,
& in aquis, & uasis uinarijs, & diligenter obtutando. Nec uero focos sub
quibusdam arboribus facere oportet, præsertim picea & pine. In his enim
salamandre & eneeæ letales abundant, quæ præterea calore calefactas,
obstantes incidunt, aut etiam alijs uasis, si non fuerint contextæ. Qui uero
secundarios esse expetitis, ut cerato liquidiore illinantur, ex ceta, rosæ, eo gal-
bano modico, & conuulsi ueneno modico, aut etiam eumino Aethi-
opico. Primum uero uene quis ab apibus & uespis feriat, prohibent
malua folia cum oleo trita illita.

*Cerato conuenit eumini & aliquo ueneno macerato illorunt
modico. Caput II.*

Si contingat ut aliquis à uis sit aut commodus ab aliquo uenenum elan-
cante, statim excussione attendam est. Oportet autem eum qui excussus
est non esse seipsum, sed nino ex colluisse, & oleum in ipso continere. De
inde si pars a diuitis, aut carbunculum commodis alligere, cum multa flamma
scutisæ infusa facta, strepitum in loca. Reuoluitur enim uis cum sangui-
nis & flammæ capitatione, etiam ipsam uenenum. Adire quoque oportet &
crassa obducere oleo. Sed & extremarum partium perfectiones adhi-
bere conueniunt fuerit, si animal quod mordet letale fuerit, uelut est as-
pis, & castes, uipersa, & leucisa: quæ uis diuodum sanè uenerat Galenus, uini-
uocem quendam à uipersa commodum, quem feruillam cognouisset, sta-
tim dignum commodum lacte sibi amparasse, & penitus à periculo libera-
tum esse. Si uero uenenum prius per corpus dilinbit conigerit, statim uer-

nae

A hac sectione utendum est, & maxime si ichus humoribus repletus tibi uideatur. Dandum autem est cum cibis edendum pipere, aut allium. Vtrum bene dandum est forte, ut ex eo recentibus uaporibus & familiari caliditate, corporis miscella replantur. Postea uero cataplasmata adhibeantur, quae morbum calescere ac lacerare possunt. uelut est brassicae aut fici cinis, aceto annexo, aut licius, aut garo. Item cepe cum potentia aut pane, & porrum cum sale. Aut pix liquida calida cum sale, aut cedria, aut caprinum lercum. Conuenit ipsis etiam perfusio ex aceto calido, in quo cocta est calamintae aut ex aceto & aqua marina, aut ex aceto & muna. Impoſuendi sunt locis gallinae, & magis galli, aut alia animalia reſecta calenta. nam & uenenum transuinit, & dolores mitigant. Sed & emplastris utendum est ex sale, & eo quod ex canchry & adarce constat, & in summa his quae actiorem facultatem habent. In comuni uero omnibus à quocunque tandem uenenti etiam exulante commotis aut scitis, praeterquam si omnia non sunt lesae partes in profundo, in potu dent scitis, aut erica, aut astragalitis cum aceto. Aut bellum, aut paliurus eodem modo. Aut paliuri decoctum. Aut mustela assiccata drach. ii. cum uino. Hoc celebre est. Aut testudinis maris singula. Aut castorei drac. i. cum uino diluto. Aut libanotidis drach. i. Aut ficomyridia. Aut porri succus. Aut chamæpitys, aut myrsinam, aut cinamomum, aut aristolochia, aut uincis semen, aut cupressi pibula, aut felici, aut pipere, aut trifolij semen, aut bacor lauri, aut cancri fluminales rossi aut coeli. Vter etiam composita huiusmodi theriaca.

Theriacel autem cincladia, & acuta, & asperis morbis,

& serpibz istis.

Bryoniae, opopanaxis, indis Illiriae, radicia libanotidis, myrrhor, singulorum drach. i. tri aristolochiae drach. v. thuris, rursus syluestris, singulorum drach. i. i. farinae erui drach. ii. cum uino pastillos formato, & obolos iii. cum uino dato. Quin & purgatio omnibus conuenit, & exudationes facientia medicamenta, & theriacea ex uiperis assumptio.

De morbo à canebulo, & affectione ferientis aequae.

Cap. III.

SErmon de morbo à rabido cane reliquis proposituus, eo quod animal si multum est, & familiare, & frequenter rabie corrumpitur, & egre caueri potest, & periculum ex ipso uitari non potest, nisi multis & modis auxilijs quibus utatur. Rabiunt canes plerumque in uehementioribus aestibus. Verum ut Lycus ait, quandoque etiam in intentis frigoribus. Rabiosi uero scilicet canes & cibum, & potum auersantur. Hi sunt quidem uehementius, post autem non admittunt, & plerumque anhelant, & aures dematrant, & saliuam largam ac spumosem emittunt, & nati in totum sunt, adeoque neherdesipientes, ut neque familiares cognoscant. Inuadant itaque omnes sine lacerato, similiter & feras, & homines, & mordent. Mordentes autem statim quidem nihil moleste inferunt, praeterquam ex uulnere dolorem. Postea uero affectionem inducunt, quae uocatur Aequa formido, & contingit cum comustionibus, & totius corporis robore, maxime autem faciei, & cum exudatione ac anxietate, & aquam singunt, siue uideant, siue admoucantur: quidam etiam omnem humorē. Quidam etiam latrant, uelut canes, & aggressi alios mordent, & morsu suo eiusdem affectionis causa sunt. Porro symptomatum aliorum causa manifesta est, quam apprehenderit uenenum omnes partes. Quod uero timent aquam, aliqui ob immodicam siccitatem fieri dixerunt, nimirum humida ipsorum essentia penitus immutata. Verum Rufus melancholicum talem ipsis speciem oborsu pronuntiavit, ueneno illum atrabillis humorem instillante, quemadmodum alios melancholicos nouimus alia atque ista timere. Quae sane causa concurret etiam his qui dicunt ipsos putare, quod ea causa qui ipsos non mordit imago in aquis obuersetur. Ceterum eorum qui hanc affectionem incedunt, nullum sanatum esse nouimus, praeterquam unum atque alterum ex historia nobis cognitos, & hos ipsos non à rabioso

Canes rabidi morbo

Lycus medicus

Aequa formido

Rufus medicus

rabioso

rabioso cane morfos, sed ex aliquo commorfo affectione transumpta. Ante uero huius affectionis tentationem, multi etiam ex his qui bene modifuerunt, seruati sunt. Hinc igitur curationis initium faciamus. Quando uero saepe id contingit, ut ex eo quod aquae formidinis affectio hactenus non accessit (plerumque enim circa quadragesimum diem inuere solet. In quibusdam post sex menses, narratur quibusdam etiam post septimum annum accessisse) quidam canem qui momordit non rabiosum esse opinati, uelut ad cicatricem perducere se stant, atque sic ipsi affectionis autores faciunt: hac probatione usus, utrum rabiosi canis sit morfus, aut non, comperies. Noces regias probe tritas ulcetri imponito, & post die acceptas gallo edendas obijcito, aut etiam gallinis: & primum quidem ipsas non continget, si uero se me urgente edent, ascendito. Si enim non rabiosus fuerit canis qui momordit, ueniet animal quod edit. Sin rabiosus, postmodum morietur: & tunc ad ulceris apertionem festinabis, & post paucos dies rursus eadem probatione uteris. Et ubi animal non morietur, uelut ad cicatricem perducet, nimirum uelut agro iam à periculo liberato. Hanc itaque probationem Orbasius tradidit. Aut ex relatis signis canem rabiosum esse ex se cognouerimus, apertis ibi statim utemur. Primum igitur ex sperientibus est id quod ex pice aceto acerrimo, & opopanace paratur, ad fucatos neruos relatum. Si uero tenera cute praeditus fuerit is qui commorfus est, trino aut balneo, aut aliquo huiusmodi diluatur. Aut lomento prius adhibito, ulcera alio ingito. Hoc etiam crustam inducit.

hanc crustam in rabioso cane morfo.

Salis fossilis drach. VIIII. chalcitidis drach. XVI. scillae drach. XVI. ruta uindis drach. IIII. araginis rase drach. IIII. seminis marrubij drach. I. Vt re primum sicco, ut crustam inducat deinde cum rosaceo ut crusta excidit. Seruentur ante in partes non inducta cicatrice ad dies quadraginta duos.

Cephalus in rabioso cane morfo usque usque confirmat.

Cepas cum sale & ruta imponito. Aut silphium cum sale. Aut saluamenum. Aut cinerem famentitium cum oleo. Aut allium, aut sambuci folia, aut mentam, aut melissophyllon, singula cum sale. Aut nucis regias cum cepa, & sale, ac melle. Aut cinerem ficulnam cerato exceptum. Abluto autem ulcus chamamelo in aqua cocto, & rumicis syluestri radice. Quodam etiam ferramento ignis ulcus urunt. Praebenda uero ipsi danda sunt simplicia. Lycium, abutinium, silphij succus, chamodryps, scordium, polium. composita haec. Cancrorum stantatillam ad famenta uitis albae, in cyprio aut uero uale uitorum cochlearia II. radice gentianae tres cochlearia. cum uini meraci ueteris cyath. II. ad dies quadraginta bibenda probe. Quodam etiam sanguinis perdis cochlearia II. addant. Cancros autem augescere luna cupere oportet, ante solis exortum. In his uero qui eodem die non biberit, duplum mensuram dato, aliquando etiam triplam. Quin & ex uiperis theriac recte dari potest. Purgare uero oportet medicamentis ex cucurbita syluestri quod die dato, cum decocto salis, aut sideridis heraclei, quam sane etiam abysson uocant, quidam etiam hepar canis qui momordit edendum dederit. Viscus talis assumatur qui simul obtundat ac extinguat uiceni facilitatem, simulque impediatur profundum delationem. Vtunque autem facere potest uini dulcis meraci ueteris, & lactis portus. Similiter aliorum, ceparum, & porci esus. Si uero non à principio assumpta fuerint aut alia relata, propter aliquod impedimentum, canis resolutionem, aut cucurbinam admonitionem, aut uiscris uisionem non assumere oportet, quam tam ulcus ad profundum procciderit. Verum relato ex alio euocandi ductu utendi est, nisi si uero uisceris aquae formidinis affectione, purgatio tunc ex Hiera, & ex scillo lacte assumatur. Sudorem elicientia exhibeantur, & dropacinae & sinapismi sicut particulae in peruenit corpus, efficacissimus autem omnium cognatus est ueratri uis saepe assumptas.

Admon

*Cane rabio
morfo co-
gno*

Cyprian aut

*Abyssin, silphij
rue Hiera
Hepar canis*

Ad non rubicundum canem morfus.

Cap. VIII.

Canis non r.
Hystrix

CANUM non rubicundum morfus, qui & ipsi uenenosus aliqua essentia ac natura participans, statim asperso aceto, expulsa mora percussio, infusa per se nitrum cum aceto tritum ex alto supra morsum destilla, & deinde spongiam nouam aceto imbutam, aut etiam aceto cum nitro mixto tinctam, ad triduum impone, & deliquitum sepe modela cito, perfecte enim per sanat. Aut erui farinam oleo subactam imponito. Aut spongiam nouam. Aut lani fac eidem aceto & oleo imbutam adhibeto. Aut ruli folia contusa cum aceto imponito. Aut ceptum nitram cum melle. Aut origani comæ, & gilia, & ceptum singulorum æquales portiones cum melle. Aut marrubium nigri, quod etiam hallowen uocant, cum sale. Ceterum ad morfus iam suppuratos farinam cum melle subactam imponito, priuatim enim ad hos facit. Inflamma-

Tallus

De apibus & apibus.

Cap. V.

Vesicæ & apibus

QUI ab apibus icti sunt, eos consequitur plaga dolor, rubor, tumor, pruritus circumscriptus eleuatus, & aculeus in plaga manet. Qui uero huiusmodi, similia quidem, uerum magis intensa, eo excepto quod aculeus non relinquitur. Ad utriusque morsum facit lutum, aut sterus bubulum illitum, aut fici succus, aut mon folia trita, aut malug folia, aut ordacea farina cum aceto imposita. fomentum item ex muria, aut aqua marita.

De phalangia.

Cap. VI.

Phalangia

COMMORIS à phalangia ipse quidem locus rubicundus apparet, & pruritus similis, neque tumidus, neque calidus, sed moderate subrubicundus, uerum perfrigeratus & pruriginosus. Sequitur periculosus perfrigeratio, tremor, corporis grauitas, sudor frigidus, dolor insentus, pallor, urinarum assistia ad excretionem irritatio. In quibusdam urinae difficultas, & colica interdictio, sensus humidus, distensio circa inguina. & poplitea conuulsoria, morfus stomachi uehemens, lingue obscuritas, momus aquarum, aut arachne telis similitudo, quibusdam etiam per urinas & uentrem eadem feruntur. Et si in calidam aquam demittantur, dolore liberantur, & rursus uehementer dolent. Auxilium uero sumunt, si ex trinfecus ipsis imponas cinerem fusilum, cum sale testis uino subactum. Aut mali pentice syluestris radicem tritam. Aut aristolochiam cum farina ordacea aceto subactam. Perfundenda sunt ulcera aqua marita calidior, & methylophylli decoctio, huius etiam solia imponenda sunt. Oportet etiam humores frequentiora adhibere, & præpositionibus uti his, abrosom semine, aniso, aristolochia, cicere syluestri, curmine Arthropico, cedri baculis tritis, platani cortice carfolij herbe semine, myricæ fructu, singulorum horum draclm. bibendas præbe, cum uini hermina una facit & uisidum capressi pulueram aut foliorum decoctum, utroque temperatum. Quidam etiam cancrum fluuiatilis in succum redactum, cum lacte & apij semine exhibitum, liberate tradunt.

De canem morfu.

Cap. VII.

Arctus morfus

ESI etiam quoddam araneum genus, quod ubi percussit intensus dolor, et circa medium paracordium gignit, ruborem item & urinae difficultatem, quandoque etiam suffocacionem. Allevantur autem icti ab his, si cum linum syluestre thebaicum, aut uincta semen, aut populi alba folia in ponsumano aut allium solam ingerant, & uinum meracum insuper sorbeant.

De scorpiæ plaga.

Cap. VIII.

Scorpiæ plaga

A'SCORPIO ictis locus statim inflammatur, incipit, ut qui durus & rubicundus, & cum dolore circumtentus fiat, & uicissim nunc feborem, nunc frigiditatem percipiat. Et quum dolor sequitur, quandoque leuiter assiggit, quandoque angere fit. Concomitantur sudor, horrores sensus, tremor, extremarum partium frigiditas, inguinum tumor, & membri arectio. Sepe uero ex nias flauum cum strepitu per sedem erupit, pilorum erectio, color cedus dolorosus circa summam cutem, quum sensus ita afficiatur, uelut ab aco puer dura

clara fiat. Sed & his confectum auxiliatur fici succus ualensculis instillatus, & ipse scorpius qui percussit nitus ac plagæ impediens. Postea uero sal tri-
m imponatur, cum lini & althæe herbæ semine. Auxiliatur etiam sulphur
uinum resina exceptum, aut terebinthina. Similiter & galbanum ad splen-
dorem dilatum ac impositum, & alamintha trita imposita, & cruda farina
ordeacea preparata cum uino & ruta decocto. Sic etiam auxiliatur semen
ursoli herbæ tritam ac impositum præbent etiam aristolochiæ drach. ii.
maxime corticis comitis. Ciconiam item confasam, & pulegium satis
decoctum, & bacca lauri decem misas, & alaminthen diuidus coctam cū
posca, & cyperum cum uino. Rursum eodem modo, & fici succo, & sulphi-
si aduersin minus, succo paribaco utendum est. Facit & trifolij semen post,
scorpius offi-
catus & cymij semen, præter opinionem quoque facit argentum statim plagæ ap-
positum. His uero omnibus confecti potest balnei uel affusio cum mal-
ta exulsiore, & uini potus meracior, utrumque uinum aqua dilutum. Com-
posita præbentur hæc: Sulphuris uini fabæ Aegyptiæ magnitudo, cum
pipereis grande ꝑ iii. in uisibilia dimidia. Aut sulphij succus cum car-
cro tinctus in uino. Aut melanthij, camuri Aethiopici, aut ietis seminis, singu-
lorum æquas portiones cum uino.

de gressu serpionis ac phalangium plagis.

Fecis uini drach. xvi. pyrethri drach. iiii. lemnis ratæ syluestris drach.
iii. caliorij crucæ seminis, singulorum drach. i. excipiantur testudinis ma-
rina sanguine. Dantur oboli iiii. cum uini meraci aut aceti cyathis iii.
Aliud. Pyrethri, aristolochiæ, singulorum drach. iiii. pipereis drach. ii. suc-
ci sulphij drach. i. datur fabæ Aegyptiæ magnitudo.

De scelopendra terrestri ac marina. Cap. ix.

scelopendra
terrestre
scorpius
fabæ
Morsus scelopendra, in communi locus circumscritus a morsum lineola,
& amollitur, & aliquando feculentus, raro uero etiam rubicundus ap-
paret. Vleeritur etiam ab ipso mortu uento lacte, ulceratione quadam do-
lorosa ac ægè curabili. Ad hæc etiam pruriginosus sensus per totum cor-
pus contingit. Priusquam uentis his quæ marina scelopendra morsum sunt, ut
quodam & pellucidus quandoq. tumor sit: qui uero à terrestri rubicundus.
Ipsi igitur plagæ salern tritum imponere oportet, aut roram tritam, aut cli-
nerem aceto subactam, aut scillam. Perfundere uero maris acida oportet, aut
uelut Archigenes iubet, oleo multo calido, atq. sic relata imponere. In post-
eriores canitur Aristolochia cum uino, aut sepallum, aut calamitha, aut ru-
ta syluestris, aut trifolium, aut succus radicis alphodeli hemina dimidia
mensura cum uino.

De scorpion.

Capit. ix.

scorpion
morsus
Quod si ellione morsu bant, intenuē dolent, & morsum liquidum habent.
Opem uicem statim sentiant, si plaga cepit & alijs integritur. Quin
& licetdam edam, in superij uinum meracum abstergeant, curantur. Scellam
etiam gratum ipsis imponitur.

De morsu aranei.

Capit. x.

morsu aranei
morsus
Ad morsu aranei morsum sequuntur dolores pulsantes, rubores circa sin-
gulas dentium puncturas, pusillæ eorum morsum sinistro humore ple-
næ, & in propinquo omnes hinc uentilati pusillæ eum subexcorietur, ab
bana apparet ulcus, dilataxis membranis circulis. Ad hæc excidunt partes
paretentes, uenae oriente similiter ut in eis quæ pascendo proferant. In
super etiam uicem sequitur circa intestina, & urinae difficultas, & singule
humiditatis cum coelatio. Auxiliatur ipsis ex galbano ipsocalum, per se
impositum, aut cum aceto tritum. Aut farina ordeacea cum aceto multo
posita. Et ipse mors araneus qui morocedit dilaniatus ac impositus, & pyre-
thrum impositum. Aut mali, ortum mali puncti dulcis coctum. Aut mala
syluestris. Aut allium tritum, aut uinagrum cum aceto. Et moris calide
pulsio, deinde ordei uili cum aceto capsulata. Præbent a broso nō co-
ctum

Adum cum uino, aut silybrium, aut serpyllum, aut erucam, aut galbanum, aut salsam, aut cupressi pifulas teneras cum aceto mulsis. Aut pyrethrum cum uino. Aut chamaeleonis radicē, aut hœdi coagulum siue agni. Aut gentiane radicem, aut uerbernam. Hæc etiam cataplasmati uicem præbet. Sed & ipsa murem araneum qui momordit, tritum cum uino bibendum exhibent. Facit & hoc. Myrhæ drach. VI. arifolochiæ corticis drach. IIII. Ceterum ad murem aranei & scolopendre morium, silem cum piceliquida impoſito. Aut cedriam cum melle, aut alium cum fici folijs & cumino, aut calaminthæ folia, aut ordeum cum aceto.

De uiperæ mure ac farina.

Cap. XCII.

Viperæ mure

faci

IN his qui à uiperæ mure, cum formina cômori sunt, aut etiam à simili bus uenenum elacuantibus, sequitur in principio quidem dolor cômori loci, postea uero etiam totius corporis, apparent autem in morfu duo foramina parum inter se distantia, & fluxio ex his sanguinis & humoris. Si uero si postea nêro etiam olescup ostentum etiam æruginosi ac uenenosi, quem sanè quidam ferarum illarum uenenum esse dicunt. Sequitur quoq; tumor circa morium subhiſcendi ac lûidi, coloris circa corpus nistatio, ueritigo, stomachi exolutio, animi deliquium. In quibusdam etiam uomitus biliosus, urinae difficultas, & circum morium pustulae emergunt uelut in ambubus & nome circumcirca depascens corripit ad circumfritas partes proreptans, & gingiæ ipsi eruantantur. Accedit ipsi etiam tremor, & sopor, & frigida exsudatio. Minore uero periculo liberari uidentur qui à uiperæ formina mori sunt, quàm qui à mare. Et ex his ipsis minus periclitantur qui cibum præsumpserunt. At in curationibus præsentissimum auxilium est ad huc etas, & meri potas, adde ut si quis hæc sustineat, alio auxilio opus nō habet. Edant etiam porrum, & cepas, & salsamentum acerinum. Quidam etiam ranas cum iusculo præparatas edendas dederunt, faciunt quoq; hæc singula cum uino pota, testudinis marinæ sanguisficem cum cumino syluæ stia, coagulum leporis, aut hirculi tritum obolorum pondere, ceruini pudendi siccæ drach. I. anchusa tenuifolia tota. Hanc etiam quidam appendit, suc ei porri hemina dimidia ex aqua mulla, me lissophylli foliorum succus, ruta syluestris, gallinarum domesticarum cerebrum, panacis radix cocta cum uino, garici drach. I. bæccæ iuniperi, siphodeli radix, pistacea trita, uitis femen, mustelæ assidgate drach. II. echij radix & succus, canoni fluminales, aut marini per se, & cum staphide syluestri, & sale, ac polio, arifolochiæ radix cū myrtha, & gentiana, & bæccæ lauri, singula æquis portionibus melle excepta. Sed & hoc admittam dum est, ab Orbasio traditū ad uiperæ moriū. Anſia cetabulum, piperis drach. IIII. arifolochiæ corticis, opij, callosrij, myrthæ singulorum drach. I. passo trita in passillos saba græcæ magni tudinis efforma, & pro uiribus præbe, cum uini diluti cyath. III.

Aliud ex libra Lyci, pharmacum ad uiperæ moriū accommodatum. Lyciſtri Myrthæ, callosrij, piperis, pontulæ, singulorum dra chemam I. seminus anethi acetabulum, passo trita dato.

Lyciſtri

Caneris mure

dicantur

Aliud ex libris Archigēis. Caneros XXX. cum sufficiens farina trita, cea in pila diligenter tundito, & calaminthæ ac salis modicum ammisiceto, & in passillos efformato ac siccato. Vtere uero in cataplasmate cum lacte, & cum aqua mulla unum bibendam præbeto. Si uero caneros fiatitiles non habes, maris inquit, utere. forinsecus autem plagæ impositū capri num siccus cum uino egregiè auxiliatur. Aut lauri folia cocta cum oleo. Aut lauri bæccæ, aut calamintha, erica ruta, apium, abrotonum, galbanum in splendo, origanum uiride tritum, pulli gallinæ cœi dissolui, & calidi impoſiti, ac frequenter permutas, cuius farina uino subacta, raphani cortex tritus, scilla cocta, cruda ordea cea farina cum aceto mulsis, eucnemis syluestris folia cum potente polline, hex uini similiter cum potente polline, rana cum sale & melle, fuscus in aceto coctum, cinis cum aceto, cedria cum sale, pax liquida

Achix drachmæ dæ in uino diluto, aut posce cyathis duobus. Deinde mar rubij succus, aut decoctum cum uino. Aut nasturtium syluestre. Aut halsula regie semen, aut illos aut fœniculi semen cum uino. Recens etiam sauas mellis facit, si elatur cum aceto.

De cœchina, sermulari.

Cap. XVII.

His qui h cœchina mori sunt, morsus sanabilis est uiperæ morsus. cœquatur puere, & defluunt carnes, quæ prius uelut in hydropic intumue, runt. Lethargo concipiuntur. & in somnum profundiorē delabuntur. Eas fistulas dicit ipse affectum esse hepar, & uelicam, & intestini crassum. Resectis enim ipsa, partes hæc corruptæ inueniuntur. His igitur lactuæ semen cum lini semine impositum auxiliatur. Et saturata mira, & rana syluestris, & serpillum cum basilula regia eritum. In potu uero ruscigig dangu, centaurææ radices drach. ii. cum vini cyath. iii. Aut arisolocix radix eodē modo. Similiter trem nasturtium & gentiana.

De aspidē ex aspidē.

Cap. XVIII.

Tres aspidis species Galenus esse dicit. Vnam quæ terrestria appellatur. Alteram quæ chelidonia. Tertiam quæ Pyra, quæ etiam perniciolus, ma omniam existit. Nam hæc ubi collum extendit, & spaciū longitudinem mensa est, collumque uenenum corporibus inspuat. Hanc reginam Cleopatra peremisse dicit, quæ ubi Augustus Ananion deuictus ipsam captiuam abducere uellet, ipsa bestia huic insillam mammā adinuas, & ab hac com morsu perit, nam ita celeritiam mortem inducit. Com morsu itaq; hæc erasile locus attollitur, cum duricia & pustulis. Fluix ex morsu sanas, quandoque nigra, quandoq; subpallida, & prælini coloris. Et uariam speciem præ se ferunt mors, per totum corpus. Et pudendum quidem intenditur. Mens autem emouetur. Oculorum uero obscuratio faccedit. Tandem uicem per reat ita anteriorem ac posteriorē partem conuulsi, uelut in tetano solent. At ab aspidē morsu, parvus omnino apparet morsus, similis puncturis acus, citra tumorem. Sanguis non multus, sed paucus niger defillat. Velox autem oculorum obscuratio apprehendit. Dolorq; corporis multiformis omnino leuis, & non hæc uoluptas consequitur. Quapropter bene exclamauit Nicander.

Perimicq; uinum absp. dolore.

Color permutatur & uisus ac herbaceus sit, ante uentriculi morsus modicus est. Ions assidue reuclitur. palpebre absp. sensu moventur, uelut in somni accessione. Et in his mors corripit, ne tertia quidē dici parte dilato ne facta. Virisq; igitur compendio auxilium offert extremarū partium refectio. Quapropter citra dilationem secanda est com morsu pars, si id fieri potest. Aut cito circumfere ruscigig conedatur, & per profundum ad quæ usq; excindatur, quo com morsu partes & his uicinas uenenum non excur rat. deinde reliqua cauterijs resiccantur. Horum enim uenena, uelut etiam Basilifet, insillat tamini sanguinis, celeritæ & sanguinem, & spiritum in arterijs congelat.

De basilifet.

Capit. XIX.

Et hæc bestia raro in hominum conspectum uenit. Erasilatus autē dicit. Quin basilifet ut momordentis plaga sub aurea sit. Et conferre ipsa dicit castorei drach. iii. in potu. Eodem modo etiam papauis succum. Nos autem nihil horum experti sumus.

De muræa pœstia, cynuræa.

Cap. XX.

In marinis, uelut est palinaca & muræa, digno conspecta est. Sænt enim noti pilices. Morsus ab ipsis optulitur succi sic guttae iii. aut paulo plures, cœ serpylli ramalis iii. aut iii. potæ. Ite quæ ad uiperas descripta

De dracōe marino.

Cap. XXI.

(iunt.)

Marini dracōis plagam plumbo conficito. Aut serpyllo trito integito. Aut lenic cocta. Aut sulphure cum aceto. Aut ipso dracōe disseccato. Urina uero humana fringato. Abstinendum uero aut salutari cum uino

dilato

diluto bibendum dato. Aut cremorem uini dulcis in quo fici ransuli cōmar-
daerunt aut pisces cerebrum.

De fignis marinis. Cap. XXII.

*Scorpioni
marino*

Scorpionis marini plagam sanat melle diffectus & impositus. Sulphur u-
inum cum aceto affricum, bacce lauri tres trite ac potae.

Preparatio fignis testudinis marinis. Cap. XXIII.

*Testudinis ma-
rinas fignis
preparatio*

Testudinis marinae sanguis ad repositionem preparandas est hoc modo.
Testudini super lignum aut scille nas reclinare supinae caput cito am-
putato. Ipsum uero congelatum sanguinem, in multa frusta per harundinē
diuidito, impositoq; uali operculi uice cribrato, ad solem exposito, & resic-
catum reposito, a cunctor ad usq; erig. morsum, uelut dictum est, drachmis II.
cum aceti cyathi I. secūda die drach. IIII. cum aceti cyathi I. Aerula drach.
VIII. cum aceti cyathi III.

De morfo à crocodilo. Cap. XXIII.

Crocodilo

In morfo à crocodilo, nitrum tritum cum melle, donec repurgetur ulcus
imposito, deinde melle, butyro, in edulla ceruina, adipe anserino morsum
imposito. Galenus se cognouisse dicit, eos qui à crocodilo morfi essent, exar-
ctē auxilium sensisse, adipe ipsorum crocodilorum ualueribus imposito.

De morfo à leone. Cap. XXV.

*Leoni
morfo*

Non extra propositū opus fuerit, inter uerus et cūlantia animalia, etiam
hominis morsum scribere, si quidem multo maligniora alijs ulceribus
apparet ea quae hominum morfus sunt, & maxime si scimus fuerit qui mor-
moris, & legumina, & maxime lenticulum antra comederit. In comuni
igitur ea quae de alijs uenentum et cūlantibus dicta sunt, etiam in his cōuer-
nient, ab initio morfi infectus adhibita, exceptis his quae ualde acris
sunt, & urentia, propter uero morfi ex oleo praedito, forniculi radicem cum
melle imposito. Aut subaceam farinam cum posca & oxyrhodino inponi-
to, & frequenter permutato. Emplastro uero uter: hoc. Squamae aris, galba-
ni, ruginis, singulorum uno. I. cere lib. I. plum baginis lib. II. olei sextario
I. plum bago cum oleo praecocta, ruginē & squamam aris a Turis, & ubi
spissata fuerint, liquefictilia liquefacta adstuntur. Sedata uero inflam-
matione, uelut commune ulcus, etiam haec curato.

De uenenis. Cap. XXVI.

*Venenis
placis*

Quoniam de animantibus uenenis et aculantibus compenditō cūerimus,
consequenter ad tractationem de uenenis progrediemur, simplici
quidem exposuimus, & horum notas, ac auxilia medicamenta, tum in cō-
muni, tum singulis peculiariter producturi. composita uero tractanda si quis
uoluerit. Nam uariorum medicamentorū occidendi uim habentium
compositiones quidam exposuerunt, quae uideri magis, quam prodelle le-
genibus possunt. Neq; enim exacta signa horum in his qui ea sumperunt
comperiuntur, quo etiam conueniens auxilium quis ipsis adaequare possit.
Quoniam uero uaria haec appareant ex predominante in ipsis facultate, for-
tassis etiam id quod aduersus illa accepta exhibetur, uariū quia efficere por-
terit, ita ut quandoq; ex aequo, quandoq; ex predominante facultate, iuxta
confectore usum id conueniet. Rursus igitur & hic à pēseruantibus in-
itum sciendum est.

De pēseruatione à uenenis. Cap. XXVII.

*A uenenis pro-
pēseruatis*

In doctrina de medicamentis uenenosis, ea species quae pēseruationē do-
cet maxime difficilis est, eo quod hi qui occulte illa exhibent, ita rem mo-
liantur, ut etiam peritissimos fallant. Nam letaliū amaritudines medicamen-
torum, amixtis dulcioribus tollunt, graueolentias uero, aromati ammi-
xionibus. Aliquando uero in morbis, dum in uisitatione exhibere possint
talia, uelut est ablinthium, abrotanum, opopanax, castoreum, ipsa uenena
amittunt. Quin & in cibus, uelut sunt diuina, aut uaria obsonia, illa am-
mixta uenena offerunt. Quare si quis suspicionem habet, is condita edulla
uictis,

Auter, & omnem intentam qualitate[m], dulcem uidelicet, salu[m], & acidam. Maxime uero aqua quod dicitur est praesumere oportet. Expleta enim appetentia, de cetero facile deprehenduntur qualitates. Sed alia quaedam adhuc est praesumenda ratio ualidior. Nam eos qui tale quid suspexit habere o praesumere oportet ea quae medicamenta habent ac destruire possunt, ut haec sunt carie[m], cum nucibus regijs, & ruta, ac salis grano: & mala medica, cedromela appellata. Bibant etiam napi semen drachma[m] pondere cum uino, aut calamintha folia, aut lemniam terram sigillatam, aut rutae folia &c. & si nullo medicamento laedantur. Sed & antidoti quotidie praesumptae est uino, si b[e]re Aegyptiacae magnitudine, ualde secunde praeseruant. Tales sunt, Antidotus ex semine, & quae ex sanguinibus constat, & Mithridatica. Haec quondam etiam ipse rex Mithridates usus est, praeseruendi à letali medicamento gratia, quotidie ipsam sumens. Quam igitur à Romanis capta esset, his poro letali medicamento ubi inde uitam finire non posset, gladio se ipsum peremit. Quando quidem uero etiam citra insidias, ex exploranda, quae in desertis locis, homines in noxias res incidunt, uelut si ita coniungat, ut sub arbore aliqua, puta aut picea, cibum capiant, attendant ad ea leuissima animalia, quae ex his arboribus, aut etiam ex laquearibus decidunt. Vasa item uini, & aquae, & in quibus obsona coquam, operculis tegant, quemadmodum etiam in animalium uenenum circulatorum praetentione dictum est.

Ceteris ceteris etiam qui quodcumque uenenum suscipiunt.

Capitulum XXXVIII.

Si qui uult letale medicamentum suspexit, quo seipsum uita priuaret, qualia multa in uita contingunt: aut etiam per insidias aliquorum illud datum fuerit, si quidem manifestum nobis est id quod assumptum est, statim ad auxilium conueniens deuotemur, uelut in tractatione horum dicitur. Si uero datum medicamentum nobis incognitum fuerit, statim ad ea quae in communi omnibus qui medicamentum biberint, competant, progredimur. Nam expectare conuenientia signa, omnino in curabile malum facit, quum ob auxilij tarditatem agere opem sentiant. Sciam igitur nulla dilutione facta, oleum calidum per se, aut cum aqua assumant, & ad uomitum cogantur. Si uero oleum non adu[m], buri nam cum aqua calida exhibeatur, aut melle, uel feminis lini, uel tragi, uel foeni graeci, uel feminis urticae decoctum. Non enim per uomitus solum haec euacuabunt, sed etiam aluum subducent, & medicamentorum malignitati se opponent, utquit acrimonia ipsorum abundans, & praesertim oleum. Hoc autem euidenter inde cognoscet. Si enim cutem ulcerare uolueris per cantharidem, aut calcem uiuam, aut eiusmodi acre quiddam, & oleo corpus prius illeueris, hoc non exulcerabitur. Immo neque adstringere corpus poteris oleo pressitum. Et alioqui homines non ob id solum quod noxium euacuant, utilis est, sed quod etiam acceptum medicamentum ostendit, ex odore, aut grumitate, aut colore. Ex odore quidem & amaritudine, papaueris succum: ex colore uero, seruissimum, aut gypsum, ex grumitate, aut recens in schistatiori animalis sanguinem, aut uirolicare, & quod licet ac odore, leporem marinum, & raram rubicam, ut per haec ad remedia unicuique congrua iter pateat. Amittendum porro est oleum, melle decoctum, aut uisceris adeps, aut pinguium cunilium, aut galinum, aut fuscum, aut liliatum, & cinere lignorum, facit etiam nardi cinis cum aqua mellea, & uinum uetus mulsum, & portiones ex adipe, aut buri ro. Ceteris his quae in uentre haeserunt per uomitus eductis, etiam id quod ad intestina delapsum est, aciori infuso euacuabimus. Postea uero lac bibendum datur. Molestia enim & uis medicata ab hoc facile alterabitur. Dantur etiam medicamenta in communi omnibus competentia, ex quorum numero est rubrica omnia, abroco nam, agaricum, iris, eryngii radix, pistacia, & semen uel calamintha, nardus celica, calosium, serui uiridis medula,

*Mithridates
contra uenenum
medicamentum*

*Ceteris omni
aduersus*

la, herij quod & rhododendron & rhododaphne appellatus, flores, marubij succus, lippium aut succus eius, sagap enon, o popanax, peucedani succus & radix, aritholochia longa, natx syluestris semen, cestrj quæ heronice appellatur, folia singulorum drachmæ pondus cum uino. facit & polij decoctio, & pix liquida delicta. Præclare auxiliantur etiam antidoti prædictæ, & magis theriaca ex niperis. Nō autem eandem uiam habent, si ante & post letalia medicamenta sumantur. Nam quæ magnitudo præsumpta satis ad hoc ut nihil perperitur, ea in quadruplum aut quinquaplum aucta si post accepta letalia pharataca dentur, prodest; & nō sicut in die, sed bis, ita enim etiam admirando illi Galeno uidetur.

Enumeratio supradictorum uenerum.

Cap. XXXIX.

Venerum seu
pitiorum
numerus

EX ueneris animalia mortifera sunt hæc, cautharis, buprestis, salamandra, erica pinus, lepus marinus, rana rabera, & rana palustris muta, hirsutines deglutitæ. Semina uero, hyoscyamus, costandrum, psyllium, cicuta, melanthium. Succo autem, papaueris succus, o popo carpasos, thapsia, dactylidium, man dragoras. Radices, chamæleon, aconitum, thapsia, toxias, ueratrum, agrostis nigra, ephemerus, quod aliqui colchicum uocant, eo quod in colchide nascitur. Ramosi & olæ, simlac, quam aliqui Thymion, Romanis Taxum uocant, solanum furiolum, quod & dorycnion uocant, Sardoniæ herba, quæ ranunculi species est, pap uer cornutum, pharicum, toxicum, nata syluestris, fungi. Ab animalibus sumpta, sanguis tauri recens, in cœca gulati, mel quod in Hieraclea generatur. Metallica, gypsum, cerussa, calx, auripigmentum, sandarach, spuma argenti, adarce, plumbum, & argenti uiam hydrargyros appellatum, lix familiaribus autem, uinum multum a cœca uiam & balneo potum, aut passum. Similiter etiam frigida aqua.

De cautharide.

Cap. XXX.

Caitharides

His qui cantharidem hauerunt signa grauissima adfunt. Nam ab ore feruens usque ad uentricum, omnia ipsis moreri uidentur. In gultu uero piceus ceditur simile quid percipiunt, dextrumque præcordium inflammari habent, & animam egre reddunt. Serpentes etiam sanguinem per urinam emittunt, progrediuntur aut ipsi per aluum, quæ in dysentericis solent. Erunt animi deliquita, at & cæcæ ac uertigines incedunt. Tandem uero mente morientur. Auxiliantur autem ipsi uomitus ex oleo & aqua, & potus lactis, & cimolia drach. iiii. cum aqua multa, ou dei piceæ, cucumeris semen, infusum bubulum pingue, aut aserium, aut osillum, carnes gallinæ, aut agnæ, aut ouillæ, aut porcellorum, illacida ac pingues coctæ cum lini semine, uiam dulcem mulsum, corticis thuris drach. iiii. post uomitiones autem infundere oportet per clyster, succum oryzae, aut alicæ, aut tragi, aut psylli, aut malus, aut seminis lini, aut alderis, aut feni graeci. Quandoque uero etiam aqua multa cum nitro, uiscerum detergere oportet, & illa rursum infundere. Postea autem inflammatas partes, cataplasmatibus ex lini semine & oideo mitigare. Nam ab initio hæc cedunt. Unde etiam balneis & quæsi dulci uiscida est. In potu danda sunt etiam ungenta, trini & rosæ, &

Delapso.

Capit. XXXI.

Delapso

Qui buprestim hauerunt, nitrolo nitro simile quid in gultu percipiunt, consequitur stomachus ac uentriculi dolor uentris. Tumor item uentris, uelut in hydropicis, circumscribitur ipsis totius corporis cutis, & urine supprimuntur. Auxiliantur ipsis eadem quæ ad uentris cantharides dantur, præsertim uero opem ferunt, post euacuationes per uomitus, & infusa per clysteres, si licet aridas sumant, & decoctum ipsarum bibant cum uino. Dedit nante uero acuminis periculo, melius habent ex palmularum Thebaicarum oleo, aut canulem tritum potum cum lacte, aut uino melleo. Itemque ex pisorum omnis generis oleo, & ex muliebri lacte potum.

De salamandra.

Capit. XXXII.

Salamandra

A Salamandra accepta consequitur lingue inflammatio, & mentis impedimentum.

Apedimentum, & tremor cum torpore quodam ac exolutione. Quædam cor-
poris partes mutescant in orbem, ita ut sæpe ubi intus manserit pharvacum,
putrescentes decidant. In hac accepta, omnia faciemus quæ adversus can-
tharides priuatim uero ipsi exhibemus resinam pinus aut piceæ, aut galba-
num cum melle, aut nucleos pini cum decoctio chamæpityos. Aut uricæ so-
la cum lissa cocta, cum oleo. Testudinis marinis aut terrestris oua cocta.
Ranarum osculum, cum quibus cocta est cryngij radix.

De erisipina. Caput XXXIII.

Erisipinas

Eruca pini hausta, statim dolor circa os & palatum consequitur, inflam-
matioq; linguae uehemens, & stomachi ac intestinorum dolor, cum pro-
riginosis sensu circumtentionis. Ardor itemper totum corpus, & anxietas.
His opitulandum est similiter uelut in cantharidibus haustis, priuatim uer-
o pro simplici oleo, meliq; in his assumemus.

De lepore marino.

Caput XXXIII.

Lepore ma-
rino

Leporematio potu consequitur sapor similis piscibus citius, progressu
uero temporis uentriculi dolet, & urinx supprimuntur. Si uero quan-
doq; excrete fuerint, purpurei coloris uidentur. Auersantur & odio habent
omnes pisces, sudorem excludit graueolentem, comitatur etiam uomitus
biliosus, aliquando sanguine mixtus. Dandum autem est ipsis lac asinini,
aut passum assidue. Aut malinæ radicis & foliorum decoctum. Danda etiam
cyclamini radix trita, cistino. Et ueratni nigri, aut scammoniz succi drach-
ma cum aqua malsa. Et anseris recens macerati singulis adhuc calidus. Sed &
caneros fluuiales solum in elbo admittunt. Signum porro salutis est, si
secedere possit.

De rubeis, et palatis.

Cap. XXXV.

Rubeis

Rana rubeta, aut etiam palustris rana accepta, tumorem corporis indu-
cit, cum pallore hæreo intento. Accedit spirandi difficultas, & oris gra-
ueolentia, & linguitus. Quandoq; etiam seminis emissio truitis, facile tamē
auxilium sentiunt, post uotatum, ex multo uini meraci potu. Item radicis
harundinis drach. ii. aut cyperi totidem acceptis. Verum cogere ipsos or-
portes, ut contentē ambulent ac curant, propter eum torporem quem in se
habent. Lauent autem quotidie.

De hirudinibus.

Cap. XXXVI.

Hirudines

Hirudines cum aqua deuoratas, & deglorationi adherentes, cognosces qui
dem ex eo quod osculum uentriculi uelut exugitur & mordetur, quod
facit signum est hirudinem deuoratam esse. Quandoq; uero etiam sangui-
nem flordum spumantem exscreant, hirudinibus gustari affixis. Enchir-
tem ipsas mortis si sorbeant, & succus cyrenaicus, aut solisilphæ, aut betæ,
cum aceto. Aut nix cum posca pota. Gargarissent autem nitrum cum aqua,
aut atramentum futorum cum aceto. Has uero quæ gustari affixæ sunt ex-
trahes, si in solium calidum ad collum usq; descendere inbeas, & aquam frigi-
dam ore detinendam præbeas. Egrediantur enim frigidiores aquam expe-
tentes. Quidā cimices dederunt his qui hirudines deuorauerunt. Ego uero in-
quit Galenus, alij si semper in his uentis, cimicibus non opus habui.

De chathedra.

Cap. XXXVII.

Chathedra

Qui chathedronem nigram samperunt, his uehemens uentriculi mor-
sus ac dolor adest, & cum euerfione totius corporis tremor. Deinde
etiam cōuulsio incidit. Et uomitus pituitosus ac spumosi. Quibusdam etiam
linguitus cum uocis interceptione, & faciei distortio. His conuenit succus
uriceus pinguis, calidus potus: & nimum dulcis aquosum calidum, & uo-
mitus, & lassis potus, & molle per clysterem infusum, & ex cataplasma-
tis fomenta. Ad eum uero qui strangulationem & liuorem
inducta, absinthij potus facit, aut natri cum aceto mol-
lo, aut raphanorum. Conueniunt etiam
præcordiorum fomenta.

Diagespamus.

Cap. XXXVIII.

Hypocistis

Hypocistis potus aut comestus, mentis percussionem velut in ebriis inducit. facile vero curatur, ut qui opem sentiat a qua multa pota, & lacte, maxime alutino, sin minus, caprino, aut bubuloi & ficuum arida cum decocto, faciant etiam nuclei pinei, & cucumeris semen cum passio acceptum. & vinum salum cum adipis suillo recentis ac passio. & urticae semen eodem modo. Aut nitrum cum aqua. Conueniunt etiam intyba, & sinapi, & nasturtium, & raphanus, & cepa, & allia, singula haec cum uino accepta. Verum cogere ipsos oportet ut quiescant, quo uelut hi qui uinum biberunt concoquant.

Dieriantra.

Capit. XXXIX.

Coriandrum

Coriandrum propter odorem latere non potest. Potum uero uncem erasperat, & infantem inducit, uelut ex ebrietate. Loquuntur itaque qui id hauserunt turpia dicta, & per totum corpus ipsorum coriandri odor transpirat. Auxiliatur ipsis post educationem cum oleo, aut irino, uelut dictum est factam, uinum meracum multum cum absinthio, & per se potum. Qua etiam in unum uasculum euasuta, mista quae ac cum muris absorpta. Sed & muria per se pota, & uasculum salum ex gallina & anseris. Et uinum dulcis cum lixiua acceptum.

De psyllia.

Capit. XL.

psyllia

Psyllium potum frigiditatem totius corporis inducit, & torporem cum exolutioe ac morore. Aduersant huic omnia quae estis cordis haustu.

De rinta.

Cap. XLI.

Cicut

Cicut pota uentrigines & caligines oculorum inducit, ut eminus ne parum quidem uideat singulum insuper ac mentis emouet, & exterminat partium frigiditatem. Tandem uero cōuulsi suffocantur, spiritu qui in arteria est suppresso. Ab initio igitur uelut etiam in alia, per uomitus, educationem ipsius facimus. postea misui ementatoris usu, id quod ad intellectum delapsum est excutimus. Et sic uelut ad maximum auxilium, uini meraci potu decurimus, interuallis interpositis, in quibus dandum est lacte bubulina, aut alutinum. Aut absinthium cum pipere & uino. castoreum item, & ruta, & menta cum uino. Ecardamomia aut syracis drach. i. aut pipere, cū urticae semine, ex uino. Aut lauri folia tenera. Similiter & silphio, & faccus ipsius, cū uino & passio. Vini quoque dulcis per se potu alium de cōpetit.

De papaueris succo.

Cap. XLII.

Papaueris succus

Ad papaueris succi potum consequitur delatio in profundiores somni cum refrigeratione, ac pruritu intemo. Ita ut si sepe praevalente pharma eo, tantus accedat pruritus, ut ab ipso excitentur. Odorigi medicamenti per totum corpus diffinibitur. His auxiliatur post educationem uomitus per oleum, & post infusa per dysiterem acta, acetum multum cum sale potu. Aut mel cum rosaceo calido. Et meracum uinum multum cum absinthio & cinamomo. Et acetum calidum per se. Uentrum cum aqua. Et origanum cum lixiua. Et ruta semen cum pipere & castoreo ex aceto multo. Aut sametis, aut origani decoctum cum uino. Oportet autem & hoc odora mentis exaltare, & in calidum solium transmutare. & propter accedentem pruritum somni mitigare. Et post balnei pinguis uisculis uti cum uino, aut passio. Sed & medulla, cum oleo pota ipsis opulatur.

De carpasi succo.

Cap. XLIII.

Carpasi succus

Carpasi succus potus, soporem grauiorem inducit, & repentinam suffocationem. Qui hunc hauserunt, auxilium ex illis terunt, quae ad cicut tam sunt descripta.

De mandragora.

Capit. XLIIII.

Mandragora

Sed & mandragora pota, statim grauis sopor consequitur, & exolutio, adeoque uehemens in somnum delatio, ut affectio nihil disterat a hypnello, uel uargo. Conueniunt antea quam horum quid accidat, & uomitus, & post

post hunc aqua multa. & nitram, & ablinthium cum passo aut uino dulci sumptum. Et capitis irrigatio, cum rosaceo & aceto. Excitatio item per corporis commotionem, & per odoramenta, uelut est piper, sinapi, castoreum, ruta cum aceto trita, pis, liquida, & lucernarum funiculi incensi ac extincti. Quibusdā zepre excitari possunt, etiam sternutatoria ipsi admoventur. Sed & alia communibus auxilijs, etiam in his utendum est.

De aconia.

Cap.

XLV.

Aconitum statim dum bibetur linguam cum quadam adstrictione edulcat, uertiginemq; maxime in exurgendo efficit, & oculorum humiditatem inducit. Gravitatem item thoracis & precordiorū, ubi cum hoc quibdamulsi flatus redduntur. In his per uomitus medicamentum edacere oportet, & alium per clysterem subducere. Propinandum autem origanum, & rutam, aut matrabium cum uino. Aut ablinthium, aut erucam, aut thapsionum, aut chamæleam, aut chamæpitum. Conuenienter ipsi etiam opobalsami drachmazundus pondus cum uino. Et coagulatum hœdi, aut leporis, aut hini si cum aceto. Et ferricrementum, aut ipsum ferrum, aut saruin, aut argenteum, in uino extinctum, ita ut unum hoc bibatur. Et firidum cum uino. Et gallinæ coctæ, aut carniū pinguū iusculum sumptum cum uino. Appellatur autem chamæpitum, quæ pristinam in his comperit, in Heraclea quidem pontica ubi etiam Aconitum nascitur, holocleron, Athenis autem lonia, in Eubœa uero Sideritia.

De lila.

Capit.

XLVI.

Ixias quæ & alophonon appellatur, in bibendo oculi & odorem, & saporem aliquem referri inducit autem linguæ inflammationem uehementem, & mentis percussione, & omnes excretiones supprimit, mummura si ualidè strepitus inducens, cum uini deliquo, citra hoc ut aliquid progrediar. Auxiliatur autem ipsis ipsi per uomitum educationem, & alui solutionem ablinthij cremor potius cum uino multo, uat aceto, aut aceto multo. Et rursus syactris semen, & silphij radix. Similiterq; Tragorigani decocti cum aliquo ex predictis, aut cum lacte. Aut resine cerebinthinae, aut nardi, aut castorei, aut silphij singulorū obolos cum uino. Conuenienter etiam nucia regie fractus trii cum uino. Aut resina, & castorei, & rute, singulorū drach. i. Similiter chamærese drach. ii. Aut succi thapsie drach. i. et aqua multa. Et acetum calidum per se posum.

De ephemeris.

Cap.

XLVII.

Qui ephemeram acceperunt, quod aliqui Colchicam, eo quod in Colchide nascitur, appellant, aliqui bulbum sydæstem, hos prius per totum corpus comitatur, uelut ab urica aut leſsa excitatus. Et circa interinas partes in osium percipiunt, stomachoq; unantur cuius multa grauitate. Inualeſcente uero afflictione, per aluum fertur cruentū quiddam ramentis amixtis. His auxilium ferendum est uelut his qui salamandram hausuerunt, & per uomitus, & per infusa per clysterem. At uero antea quàm inualeſcat uenenum, dandum est ipsis quereus foliorum, aut glandium, aut mallicorū, aut serpylli decoctum, cum lacte bibendum. Aut polygoni succus, aut uingulorū uitis, aut rabi, aut ferule teneræ medullæ, aut haccarū myrti succus cum uino. Sed & ipse myrti baccæ uille, triax, & in aqua maceratae opitulanti, cremore ex ipſis accepto. Similiter facti & castanearū, quæ glandes Sardianæ appellantur, mediis illa pesticula, cum predictis succis accepta. Et origanum cum lacte posum. Euxalum uero adeo auxilium ferunt, ex lactis bobuli posum, aut eodem in ore demento, ut hi quibus eius copia est, alio nullo auxilio opus habeant.

De basilice.

Capit.

XLVIII.

Smilax, quæ & quibudam thymion, à Romanis autem taxus appellatur, potius frigiditatis totius corporis inducit, suffocationemq; ac celerem mortem. Auxiliantur autem his omnia quæ ad citatam haustam relata sunt.

De

Aconitum

Sideritis uini
radixChamæpitum
Syrice quidā
Holocleron
loniaSideritis
Iris
ThapsionEphemeris
Colchicam
Bulbus syda
estSardianæ
glandisSmilax
Thymion
Taxus

De solano firsio, & quibusdam imperio appellatis. Cap. XLIX.

Solano fir-
sio
Dorycnium

DOryento sine solano, ut quidam appellantur, firsio pota, in gustu velut lactis qualitas quædam percipitur. Singultus adest affatus, & lingua humiditas, & sanguis accruatim rejicitur, incoque ipsi per aliam sentiuntur, velut in dysentericis solet. Verum antea quam illorum aliquid consequamur, opem ferre oportet per ea quæ ad opusculum acceptum telata sunt, per uomitum dico, & infusionem per clysterem, & quæ potum medicamentum educere possint, propitius vero ipsis auxiliatur aqua multa, aut lactis alinum vel caprinum. Et vinum dulceterpidum cum modico aniso portum, & amygdalæ amare. & pectuscula gallinarum cocta, & omne convulsionum genus crudum & assatum in cibo acceptum. Et locustæ, & gummarum, & iuscula ex ipsis pota.

De sardonis herba.

Cap. L.

Sardonis
herba
Lysia Sardonis

Sardonis appellata herba, ranunculi speciem est, quæ pota aut comesta, mentis emotionem inducit, & convulsionem cum laborum contractio, ne utrisque imaginem præ se ferat qui ipsam habuit. A qua affectione etiam Sardonis ritus, non admodum boni nominis adagio, vulgo circumferuntur. In his prius ac post uomitum convenit aqua multa multa data, & hæc, irrogatio ac pinguefacilio totius corporis per cales. Quia medicamenta, & solium ex aqua & oleo calido, ita ut post egressum ex sollo abunde illinantur ac confricentur. In summa velut ad convulsionem, totam curationem facere oportet.

De papaveris cornu.

Caput LI.

Papaveris
cornu

Papaver cornutum quod potum aut comestum, eadem symptomata quæ succus papaveris inducit, eisdem auxiliis subiacet.

De phario.

Cap. LII.

Pharium

Pharium saporis in potum nardo simile est, potum vero resolutionem inducit, ut namentis percussione ac commotione. Oportet autem post eductionem ipsius, cum vino absinthie bibendum ipsius exubere cinamomum, aut myrrum. Aut nardum ceticum, quam aliqui Salunciam vocaverunt. Aut speciem nardi deuch. & myrrum obolos 11. ammisso passis. Aut iridem, & croci florem, cum vino. Cataplasmata vero capiti præfusa adhibenda sunt ex farina orideacea, cum ruta trita, & aceto.

De toxicis.

Caput LIII.

Toxicum

TOxicum ex eo nominatum esse videmus, quod fluitanti sagittæ infusus, ut dicta, cum ipse illinerent. Consequitur eo pota, labium ac lingua inflammatio, & infans quæ denueri non potest, cum anxia imaginantibus inueniatur, ut etiam ob id difficilem curentur, & rari seruantur aliqui qui id beheant. Oportet tamen vinculis continenter deligatos cogere, & per vinum dulceterpidum cum rosaceo ipsi bibendum exhibere, & ad reuocandum impellere. Præcipuum vero capi semine cum vino potu ipsi conducto, & quinquefolio radice, sanguisq; hircinus aut caprinus, & quæ reus, aut phagi, aut illeis cortex, cum lacte tritum, & mala cydonia comesta, aut cum pulgemonia ex aqua pota. Anomum item, & balsami semen cum vino. Quod si percussus ex eo aliqui effugerint, longo tamen tempore & in lectis decumbant, & ubi sanxerint, quæ mente conservat reliqui vitæ tempus transigunt.

De fangi.

Cap. LIV.

Fangi

Fangi partim genere, partim copia lædunt. Inducunt autem omnino accipit suffocationes, strangulationibus per laqueus similes. His statim commone præcipuum exhibere oportet, per oleum ad uomitum cogendo. Melle ceuero opem lenius, sedulium ex cinere sarmentorum vitæ, aut lignorum pirastri, cum sale, & sale, aut nitro bibentes. Sed & ipsa pira sylvestria, aut pirastri folia, si cum sanguis coquantur, suffocandi vim ab ipsis auferunt. Ipsa quoque pira edisse prodeli. Commodat ipsis & gallinarum sterus in potu potum. Antilochæ drach. 1. aut absinthii, cum vino. Mel item si delingatur &

Aut & bibatur cum aqua. Et apiasrum cum nitro. Aut panicle radix & semen cum uino. Et fex uini uisita cum aqua. Et aramentum sotorium cum aceto. Raphanus etiam, aut sinapi, aut nasturtium in cibo. Quandoquidem uero quidam singula uenenatis bestiis arrosi, non solum suffocant, sed etiam ulcerant inestina, dandum est abstinendum largum, & sicum & origani decoctum, & aqua multa. Conducet etiam uomitus, & solum calidum, & cruda ordeacea farina precordijs imposita.

De sanguinaria.

Cap.

LV.

Sanguinaria
ma

Sanguis tauri recens maciati potus, spirandi difficultatē inducit, & suffocationem, & meatus circa tonsillas & deglutationem obstruens, cum uerberementi commulsione. Inueniturq; in ipsis lingua rubicunda, & densa colore infecti, & grumi inter ipsos. In his uomitum reculamus, eo quod grumi magis in stomacho compinguntur, dum per attractionem eluantur. Verum danda sunt ipsa quæ congelationē sanguinis dissolvere possunt, & aluum subducere. Dandi sunt grossi sicus sacro pleni, cum posca & nitro. Facit etiam coagulum omne cum aceto. Et silphij radix cum succo similiter, & brassicæ semen, & lxiuatum siculneum, & conyzæ folia cum pipere, & rubi sicus cum aceto, oportet autem aluum subducere. Ceterum his qui seruantur, fluida ac graecolentia per sedem reddi solent. Sed & stomachus & uentriculus ipsorum, farina ordeacea cum aqua multa cataplasmatis modo integre adus est.

De lacte coagulato.

Capit.

LVI.

Lact coagulatum

Quia e coagulatum sumperant, his acuatim ingens suffocatio immittit, eo quod in grumos cogatur. His in auxilium exhibere oportet, uelut antidotum ipsum coagululum cum aceto, seu ut sepe hoc bibere cogatur. Calamint hæ etiam folia arida, aut succum similiter. Aut silphij radice, aut succum cum posca. & thymum cum uino. & lxiuatum paleatorum, siluero nihil ingerant. Inde enim hac magis congelatur, & in cascum abit. Sed neq; his uomere expedit. In stomacho enim inhzrens in grumos coagulatum strangulat.

De melle in Heraclea.

Cap.

LVII.

Melle in Heraclea
radice

Qui melle in Heraclea ponti nascens ederent aut biberunt, his eadem accidit quæ ab aconito sumpto ingruunt. Conueniunt ipsis etiam ea quæ de illo relata sunt. Facile autem opem sentisse, ex uini multi assiduo potu, rursus folijs ipsi amittitis.

De gypho.

Capit.

LVIII.

Gyphi

Gyphus pota suffocationem inducit lapidescens, unde auxilia ad fungos congrua transferre huc oportet, & in his maluz decoctum dare pro oleo. Quum enim id pingue sit, in remouendo lubricitatem inducenda, corpora de radice non sunt. Gyphum enim lapidescens hoc facit. Conuenit etiam oleum in aqua multa, & sicuum decoctum, & lxiuatum siculneum, aut ex fermentis uitis, cum uino multo. Et origanus, aut thymus cum lxiuato aut aceto, aut passo. Oportet autem & his maluz decoctum per glysterem infundere.

De crassa.

Capit.

LIX.

Crassa

Crassa propter colorem latere non potest. Vtrouero accepta palatum inatbat, & linguam, & intermediam dentium partem. Inducit autē singultus & cussim, & linguæ siccitatem, & extremarum partium frigiditatem, cum mentis percussione, ac motus difficultate. His conuenit dare aquam multam, aut sicuum aut maluz decoctum, aut lac calidum, aut sesamum tritum cum uino, aut lxiuatum fermentis uitis, aut oleum amaracinum, aut irinum. Perlicorum etiam ossa cum ordeï decocto. Aut thus, aut prunorum gummi, aut ulmi liquorem illum qui in folliculis continetur, cum aqua tepida. Vomant autem ab unoquoque. Conuenit ipsi &

thapsia succus, aut scammonij succi oboli iiii.

cum aqua multa poti.

Perlicorum
ossa
Vini liquor

De ulco, fœdando, & auripigmento.

Cap. LX.

Cole
Sandaracha
Auripigmen-
ton
Arsenicum

CAlx & sandaracha & arsenicum sine auripigmento in pota, alui & inter
linorum dolores inducunt, cum morbo uehementi. Quare exhibere li-
pulis oportet omnia quae temperare & soluere possunt, & domendi facilita-
tem, & ad aluum lubricitatem exhibere qualis est hihllei & malug succus,
& semina lini decoctum, aut tragi, aut oryxæ. Lac item multum, & aqua
mulla, & fœcula pinguis & boni lactei.

De spuma argenti.

Cap. LXXI.

Argenti
Spuma

Spuma argenti pota, stomachi & uentris, & intestinorum grauitatem in-
ducit, cum torminibus inuenit. Quandoq; etiam intestina fœciat graui-
tate, & urinas supprimit. Intumescit autem ipsorum corpus, & plumbi co-
lorem induit, indecoctumq; efficiunt. In his conuenit post nomitum, hormi-
ni sylvestris semen cum uino potum, myrtæ oboli III. Abbinthium, hyssop-
um, aut apij semen. Aut piper, aut ligustici flos cum uino. Columbari beu-
si lucarium fœciæ aridus, cum nardo & uino.

De plumbo.

Cap. LXXII.

Plumbi res-
merita

ET qui plumbi ramentis, uel locura hauriunt, similia symptomaia habet,
& claudia auxilia requirunt, cum his qui spumam argenti biberant.

De argenteo uino.

Cap. LXXIII.

Argentum
uinum
Hydargyrum.

ET argentum uinum hydargyros appellatum, eadem quæ spuma argen-
ti inducit. Et in his, auxilia eisdem uti oportet. Videtur autem ipse pro-
deesse multo lactis potus, uerum & hi uolunt.

De aratro albo, pappi, clateris, agarici nigri, rati, flosleri, melanthii, ramentibus

Celi, flos pappi.

Caput LXXIII.

Thapsi.
Veratri albi.
Blatrum.
Agaricum
nigrum
Rata flos-
leri.
Melanthium
Pappi, qui
est
Callis flos.

PROuidentia utendum & in his quæ ob utilitatem exhibentur, pericula
uero non minora sepe inducunt quàm alia medicamenta, qualia sunt
propolice, dico autem, neratrum album, chapdia, claterium, agaricum nigrum.
Hæc enim suffocationem aut nimiam purgationem inducunt. In quibus
suffocationes quidem, uelut de fungis & similibus dictum est, curabiles
nimias autem purgationes, his quæ excretiones cohibere possunt, suppr-
imimus. Quia & ea quæ parum quidem ledere uidentur, aliquando autem
pericula inducunt, non negligenda sunt. Ex quorum numero est & thapsi-
stris rata, & melanthium, & recentes pappi. Sunt autem flores spinæ, quæ ce-
los appellant. In his solus nomen adhibens resistit eos qui illa acceperit.

De his quæ nobis similia sunt, ut si sit uinum, & flos aquæ.

Caput

LXXV.

Vinum esse co-
lum nobis fa-
uillura

ET frigida aqua accruata pota, & meracum mulum, & dulce uinum, ma-
xime a balneo, aut cursu, & ualida exercitationibus, suffocationes & do-
lores inducunt. In his autem uenit sectio, & insuper clysterem euacuatio
assumpta, imminens periculum exoluunt.

CAPITA SEXTI LIBRI.

In hoc sexto totius Operis libro, de his quæ per chirurgiam admini-
strantur, tractatur, tum his quæ in carue, tum quæ in ossibus considerantur,
quæ sunt in tractatu de fracturis & luxationibus absoluantur.

Premium de his quæ per chirurgiâ administrentur	Cap. I	De articularum sectione	Cap. IIII
De capitis uisione, in lippientibus, egre respirantibus, & elephante.	Cap. II	De uasorum excisione ac uisione.	Cap. V
De hydrocephalia	Cap. III	De hypospathismo	Cap. VI
		De periclyphismo	Cap. VII
		De palpebræ supernæ sutura, & alijs modis,	

- modis, in his quibus pili in palpebris successerunt. Cap. VII.
- De palpebrarum uestione per medicamentum. Cap. IX.
- De lagophthalmis. Cap. X.
- De palpebrarum infernarum sutura & uestione per medicamentum. Cap. XI.
- De palpebrarum infernarum euersione. Cap. XII.
- De inflammatione, & uestione per ferulum. Cap. XIII.
- De uisceris siue aquulis palpebrarum. Cap. XIII.
- De coherentibus palpebris. Cap. XV.
- De grandinibus. Cap. XVI.
- De uerrucis, & carnis in magno oculo. Cap. XVII.
- De pterygiis. Cap. XVIII.
- De graphyomatibus. Cap. XIX.
- De suppuratis oculis. Cap. XX.
- De fistulis oculis. Cap. XXI.
- De Aegilope. Cap. XXII.
- De auditorij meatibus non perforatis. Cap. XXIII.
- De his que inflantur in auditorij meatibus. Cap. XXIII.
- De polytis. Cap. XXV.
- De curis. Cap. XXVI.
- De epulide et paralide. Cap. XXVII.
- De dentium extractione. Cap. XXVIII.
- De incanatione. Cap. XXIX.
- De onchitis. Cap. XXX.
- De uasa. Cap. XXXI.
- De spinis faucibus infixa. Cap. XXXII.
- De summi gutturis sectione. Cap. XXXIII.
- De abscessibus. Cap. XXXIII.
- De strumis. Cap. XXXV.
- De sciatomatibus acheromanibus, et meliceridibus. Cap. XXXVI.
- De arteriarum dilatatione. Cap. XXXVII.
- De gutturis ramice. Cap. XXXVIII.
- De ganglio. Cap. XXXIX.
- De uicinis sectione. Cap. XL.
- De cucurbitula. Cap. XLI.
- De alarum uestione. Cap. XLII.
- De agnascensibus digitis, & de sediglis. Cap. XLIII.
- De chinugis, et uestione suppuratorum. Cap. XLIII.
- De cancro. Cap. XLV.
- De turgentibus mammis in uicinis. Cap. XLVI.
- De hepatis uestione. Cap. XLVII.
- De splenis uestione. Cap. XLVIII.
- De stomachi uestione. Cap. XLIX.
- De hydropis. Cap. LI.
- De umbilici prolapsu. Cap. LI.
- De abdominis siue peritonari membranis uulnere, & de intestini aut omementi prolapsu. In quo etiam modus feriendi ventrem. Ex Galeno. Caput. LII.
- De preputio curto. Cap. LIII.
- De hypospadiis. Cap. LIII.
- De phimo siue preputio circa glandem contractio. Cap. LV.
- De coherente glandi preputio. Cap. LVI.
- De circumcissione. Cap. LVII.
- De thymis in pedendis. Cap. LVIII.
- De catheteris, & infusi in militione, in uellicam. Cap. LX.
- De calculis. Cap. LX.
- De corporis circa testes. Cap. LXI.
- De hernia aquosa. Cap. LXII.
- De carnis et osseae hernia. Cap. LXIII.
- De uentriculi et flauosi hernia. Cap. LXIII.
- De intestini hernia. Cap. LXIV.
- De inguinis hernia. Cap. LXV.
- De scroti laxatione. Cap. LXVI.
- De castratione. Cap. LXVII.
- De Hermaphroditis. Cap. LXIX.
- De nymphis ac cauda praefectione. Caput. LXX.
- De thymis, condylomatibus, & hemorrhoidibus in locis muliebribus. Cap. LXXI.
- De non perforatis & de phimo. Cap. LXXII.
- De abscessibus uteri. Cap. LXXIII.
- De foras extractione ac exsectione. Caput. LXXIII.
- De secunda idia. Cap. LXXV.
- De coarctata uestione. Cap. LXXVI.
- De fistulis & fistula. Cap. LXXVII.
- De fistulis in ano. Cap. LXXVIII.
- De hemorrhoidibus anis. Cap. LXXIX.
- De condylomatibus, exuberantibus, & rimis in ano. Cap. LXXX.
- De ano non perforato. Cap. LXXXI.
- De uorticis sectione. Cap. LXXXII.
- De dracunculis. Cap. LXXXIII.
- De extremarum partium praefectione. Cap. LXXXIII.

De pterygij circa ungues. Ca/ put	LXXXV.	De patella genu. Cap. CIII.	
De ungue cōsuo. Cap. LXXXVI.		De tibia. Cap. CIII.	A
De clauis, uerrucia, & his quæ formi casæ uerrucæ appellantur. Ca/ put	LXXXVII.	De summo pede. Cap. CV.	
De telorum extrahione. Ca/ put	LXXXVIII.	De depositione cruris. Cap. CVI.	
De fracturis, et ipsarum differentijs. Caput	LXXXIX.	De fracturis cum uulnere. Ca/ put	CVII.
De fracturis in capite. Cap. XC.		De callo in fracturis superintrafien te	Cap. CVIII.
De naso fracta, & cōsuo. Ca. XCI.		De callo in distortionē. Cap. CIX.	
De inferna maxilla fracta, et de aure conuulsa. Cap. XCII.		De fracturis non callosis. Cap. CX.	
De clauicula fracta. Cap. XCIII.		De luxationibus. Cap. CXI.	
De scapula. Cap. XCIII.		De inferna maxilla. Cap. CXII.	
De pectore. Cap. XCV.		De clauicula, et summo humero. Ca/ put	CXIII.
De collijs. Cap. XCVI.		De humero laxato. Cap. CXIII.	
De costis, et pubis ossibus. Ca/ put	XCVII.	De cubiti gibbo. Cap. CXV.	
De uerticulis, et spina dorsī, et de os se sacro. Cap. XCVIII.		De luxatione iuncturæ ad manum, & digitorum. Cap. CXVI.	
De brachio. Cap. XCIX.		De uerticulis spinæ. Cap. CXVII.	
De cubito & radio. Cap. C.		De costæ luxatione. Cap. CXVIII.	
De summa manu, celsisq; digitis. Ca/ put	CI.	De genu luxatione. Cap. CXIX.	
De femore. Cap. CII.		De malleoli luxatione, ubi etiam de digitis pedum. Cap. CXX.	
		De luxationibus cum exulceratio ne	Cap. CXXI.
		De luxatione unguis cum fractura fiem te	Cap. CXXII.

PAVLI AEGINETAE REI MEDI-

CAS LIBER VI.

Medico Physico interpret.

Proemium de his quæ per Chirurgiam administrantur.

Caput I.



VVM totam tractationem de his quæ per Chirurgiam ad
ministrantur, huiusmodi diuisimus, tum in ea quæ in car
ne aggredimur, tum in ea quæ in ossibus, quorum consi
deratio & in fracturis, & in luxationibus consistit. Nunc
ab his quæ in carne administrantur ordinarè, consueto no
bis compendio etiam hic usi. Rursum igitur ex superiori
bus partibus incipimus, uisionem quæ in capite, et
tam maxime quæ in uertice sit exponemus.

Dysopsia uisionis in opprobrijs, ægræ respirationis, et in elephante

Caput II.

IN oculis humore ex superioribus influente, & in difficulter spirantibus, ob su
perflue humiditatis redundantiam, quæ ex capite deorsum ad thoracem
descenditur, & partes quæ ibi sunt, sua assiduitate affligit, uisionem circa
medium capitis faciunt, hoc modo. Præterea circa uerticem partibus, cute
res glutinuosas referentes inmittunt, ad os usq; cutem adurentes, & post
crustam elapsum os deridentes. Quidam uero etiam ipso osse usio, siquæ
parum excidere faciunt, quo illinc humorum in capite perspiratio ac eu
acuatio facili contingat, senantq; aliquandiu ulcus, deinde sic ipsum ad ci
caricem perducunt. At uero in his quæ ad Elephantiasin inclinationem ha
bent,

Vnde etiam
dicitur caput.

hem, quidam quinque crassas in capite insunt. Vnam ab anterioribus, paululus paululus supra nasum. Alteram hac inferiorem, paululus supra frontem, ad finem pillowum. Et aliam ad occipitum. Et reliquas duas, ita ut si qua misformis dicta agglutinamēta, paululum supra aures, ita ut altera à dextra parte, altera à sinistra fiat. Atq; hoc modo per plarium siqua marum detractionem, & multitudinem, & crassitudinem humorum exhalare facimus, & ex capitis profunditate uelut per canales educunt, & per hoc ne oculi ledantur prohibent. Sed & alium cauterem splenti adhibent, quo primarice acerbissimae humoris parti, per crassam in eam faciem, curatio coniungat.

De Hydrocephalo, Cap. III.

Hydrocephalus affectus nomen habet ab humoris, qui essentia aquosus est, proprietate. Contingit hic pueris circa ipsum partum, capite ab obstetricibus in epote compresso, aut ex causa obscura, aut ex ruptura delle siue uasorum, effuso sanguine in lentam substantiam commutato: aut per rarefactionem, materia persudante, et inter eam, ac membranam calvariam ambiētem delata. Nam aut inter calvarie membranam, et eam, humor consistit. Aut inter calvarie membranam, et os: aut inter os, & cerebri membranam. Quibus igitur inter cutem, & calvarie membranam est humor, his adest tumor ad tactum mollis, concolor, doloris exors, in aliam incuruatus, per exiguum corpusculum ad digitorum iunxum occurrit, facile cedens ac contra remittit. Quibus uero inter calvarie membranam, et os consistit, reliqua quidem similiter habet, tumor autem solus durior est, & tarde cedens, ut qui etiam per plura corpuscula occurat. Magis etiam dolent. Quibus autem inter cerebri membranam et os, his tumor quidem erit, sed non cedens, neq; similiter ad tactum mollis, & tamen uiolenta compressione impulsus cedit. Nam os infansium quam adhuc recens compactum sit, facile cedit, et maxime si uaria rarefactis si humoris transiens foras coniungat. Hoc uero facile cognoscitur, ex eo quod humor in compressione retrò redactus, in profundum decurrit. Dolor etiam his maior est, & caput uolum disparatur, et frons ipsa ex laprojecta est, & intentis oculis uident, & frequenter lachrymantur. In his igitur chirurgiam reprobamus, etiam si aliqui chirurgi terebello circumforam os eduxerint, uelut in loco de fracturis in capite dicitur. At si inter cutem & calvarie membranam humor consistit, & paruus sit tumor, unam dissolutionem per medium transversam faciemus. Si uero inter calvarie membranam et os, & maior fuerit tumor, duobus dissolutionibus uti sumus per medium sese manu separantibus. Si uero adhuc aliquotum maior tumor sit, etiam in his literam a. instaurantibus. Ceterum post chirurgiam excreto humore, & linamentis inditis, commodè deligabimus, & usq; ad tertium diem uino & oleo rigabimus. Post quem diem solutione facta, per linamenta modendi ductu curabimus. Et si moram trahas os carne non obductum, leuiter ipsam rademus.

De arteriarum sectione, Cap. IIII.

In fluxionibus oculorum diurnis, et si uertiginis affectione, arterias retro aures dissiccare conuicemus. Prægradenda igitur est posterior capitis pars & per digitos tentanda. Nam ex passu eius loci, arterie sunt facillime deprehendunt. Et postea ad os usq; secare ipsam oportet, duorum digitorum longitudinali sectione habere, et auramento scriptorio antea notata. Hæc uero non occurrente, tritum digitorum spacium ab auribus metiri oportet, & tunc chirurgiam adhibere, & arterias per transversam dissiccare, donec & fluxus sanguinis apparuerit pulsantius & organum congerit os ipsum. Ceterum post moderati sanguinis fluxum, densa calvarie membrana, ne ob dissolutionem inflammetur, & os densa, cuneolam ex lino inieciemus uulneribus, & linamentis ductu curabimus. Si uero calvaria nudum os permanserit, similiter huius ratione utemur.

Siquis ista
non agglutina
uerit.

Hydrocephalus
est affectus.

Superius est.

Anteriorum se
dunt.

Superius est.

De uulnere capitis, et alio.

Cap. V.

Vulnere capitis

IN dimidie capitis partis affectione, & in his qui diuturnis, aut etiam in acuta fluxione, calida & acris, oculos dolent, aut etiam calor circa temporum mufculos cum tumore oboritur, uulnorum excutionem omnes approbaverunt. Præterea igitur circa tempora pilis per digitos tentabimus, timentes præmiſſo, aut etiam colli contractione uſi. Vbi uero uafa ſub aſpectum, ueneritis, ipſaq; ſeramento norauerimus, utem ex lateribus, & noſtra ſine ſine manus, & ipſius miniſtri digitis leuabimus, & in ipſum uas ſuperficiæ uiam ſectionem faciemus. Deinde penitus inſectum, hamulisq; diſtendemus, uas, et per inſtrumenta membranis detrahendis apta denudatum, undique exolumus anollemus et liquidem tenuer facitis, hamulo ex eo id extenſum & obortum per totum penitus excidemus ita ut etiam pars ipſius apprehendatur. Si uero magnum ſit, duplo filo, aut lino crudo, aut alio quopiam ualido, per a eum ſubiecto, & primum uafe in directum per uenæ ſecandæ inſtrumentum diſiſſo, & moderato ſanguine euacuato, iuxta duas extremitates nuda cum filo deligabimus, & in eandem partem aut ſine aut ſolutionis tempore exciſam auferemus. Quidam uero etiam circa ſectionem, per cauteris oliue nucleos referentes uafa perurunt, ad multam profunditatem. At uero poſt chirurgiam linamentis ſiccis conuulſis inditis, & ſplenio ſuperimpoſito deligabimus. Poſt ſolutionem uero, puluillis incarnantibus, & his que linamentis excepta induuntur, & medicam enſis ad circa tricen perducenſibus, curationem tranſigemus, niſi iam ubi ſam compuerint ac exciderint ſiſe uincula deligationis.

Vulnere alio

De hypophthalmia.

Cap. VI.

Hypophthalmia

INſtrumenti ſpecies huic chirurgiam nomen ſecit. Vniura uero hypophthalmia in his quib. multa pteſita ad oculos deferunt. Sed et facies ipſius bicornis exiſtit, et circa frontem diſcurſam quendam uelut uermium aut formicarum percipiunt. Præterea itaq; circa frontem pilis, infernam maxillam mouere inebimus et uſito mufculorum temporalium motu tres ſectiones in fronte rectas conſimiles faciemus, ita ut unaquæq; duorum digitorum longitudinem habeat, et ad oſis profunditatem, et inter ſe trium digitorum ſpatio diſtent. Poſt ſectionem, hypophthalmiam inſtrumentum adhibentes, à ſectione ad ſiniftram tempus, uſq; ad mediam denicemus, totum id quo diſtinetur una cum caluæ membrana excutentes. Deinde rurſus ſpatalam à media ſectione uſq; ad reliquā immittemus. Et publica cunelli acuti acie ad primā ſectionem immiſſa, ita ut acutum ipſius latus internæ curvis corni adaptatum ſit, obortum uero oſi, uſq; ad mediam ſectionem ipſum impellemus, omnia quidem à capite ad oculos deſcendentia uafa, non tamen ad ſiniftram uſq; eandem diſſecantes. Et rurſus à media ſectione, ad ultiam ipſam adigentes ſimiliter uafa diſſecabimus. Cæterum poſt moderatam ſanguinis euacuationem expreſſis guttis, linamenta inſerta tria, ſingula in ſingulas ſectiones immittemus, & lincum complicatum aqua mar defactam ſuper imponemus, ac deligabimus. Poſtera die non ſolum ſcicera, ſed etiam temporum mufculos, & aures ob inflammationem, uſno & oleo irigabimus. Exerta die ſolutione facta, multa perſuſione utemur, & emplatro Baſilio cum roſaceo ſoluto linamentis illitis ac inditis conſequenter curationem à ſoluemus.

Formicarum diſcurſum

Hypophthalmia, ut quod ſpatala

Hypophthalmia

De periphthalmia.

Cap. VII.

IN quibus multa & profunda uafa flexionis copiam oculis immittunt, in his perſicyſiſimum, id eſt inſectionem circum ſcaphium, id eſt caluæ uiam adhibemus. Signa uero adiunt hiſta ſta. Primum tunc ſi ex agrotatione oculos macilentos ac paruos, et ad uſum debiles, angulos autem croſos, & palpebras exulceratas, et pilos ab ipſis deſluentes. Et lacryma tenuis ualde et acris cum caliditate deferunt. Et dolor eſt in capitis profunditate acutus & uelut emens, et aſſidua ſternutatio. Præſto igitur capite, et temporum mufcu

dis,

Alia, uelut dictum est uicinis, sectionem transversam à sinistro tempore ad dextrum usque ducemus. Habeat autem sectio terminos in paribus motus ex orbitibus, paulo supra frontem indicta, coronaria sutura à nobis uisita. Leuantes in mediam frontem sectionem facit. Denudato uero offe, cuneolis aut linamentis pluribus disparabimus, extremitates autem sectionis deligabimus, & uino ac oleo uelut ante dictum est irrigabimus. Post solutionem uero, inflammatione iam declinante, eos rademus, donec carnes producere incipiant, & ducta concatenationis curabimus puluillis in carnantibus utentes. Ex quorum numero est & is qui recipit farinæ criticæ partes duas, colophoniae partem unam, & qui priusquam puluillus capitalis appellatur. Item incunantia ex pomice composita. Cate.n. per crassiores eie scrieam densata, etiam ualorifera celsa celsa, prius fluxione ad oculos deferri prohibet.

Concarnatio
ut dictus

De palpebra supra sutura, et alio modo, in his quibus poli in

palpebra succrescant. Cap. VIII.

Pilorum ordo geminarius qui distichialis dicitur, est exortus pilorum pariter naturam ad naturalem pilorum palpebrae ordinem accedens, ex fluida affectione originem trahens, quam uulnus quidem, lenta tamen et non aeris fuerit indolens humor. Nam qui acris est, aut fuliginosior, aut alioqui mordax, is sua diuurnitate etiam naturales palpebrarum pilos corrumpit. Quandoque igitur in hac affectione sutura utimur. Quandoque in phalangia, ubi palpebrae margo innotatur et cum ipso phalangia & aeries pilorum intro uertitur. Quandoque uero etiam in laxatis palpebris, quae naturalis pilus oculi bulbum compungunt. Proinde aggroto in sella collocato, aut ante nos, ut à sinistro, supernam palpebram euertemus, & si quidem longos habuerit pilos, eos indice ac pollice sinistram manus apprehendemus: si breues, acum trahentem filum per mediam marginem ab interius foras transimimus. Deinde extensa per filum, cum sinistra manu, palpebra, cum dextra per specilli cuspidem, retro filum, ipsam filum euertemus, & paulo interiorius quam sint pungentes poli, subsectionem in marginem à magno angulo ad parum uel pertingentem faciemus. Filo uero post subsecutionem extracto, sinistra manus pollicis parum quoddam duplicatum in teolum subiciens super eum extenamus. Sed & alij parum complacitis limaculis in summos angulos iniectis, per ipsa ministrum retro statentem, palpebram distendere habebimus. Et tunc per scalpellum furantis destinatum, primum sectionem ueritatem appellatam faciemus, paulo supra naturales pilos, ab angulo ad angulum pertingentem, ea profunditate ut sola cutis diuidatur. Post ipsam uero, etiam hanc emadhibemus, in de initio summo, unde etiam ueritas incipiebat, in tantam autem altitudinem progressu facies, ut tota superflua cutis circumscribatur, ita ut similiter definamus, ubi etiam illa desinebat. Postea quam circumscripta per duas sectiones coela myrti folium referat, angulum istum ad dextram nostram hamulo transigimus, & totam hanc cuneulam excoriamus. Deinde ubi uicibus per spongiam detrita, tribus aut quatuor suturis, uulneris labia contrahimus à media sectione initio summo, & ac in ipsam subsectionem transmissa. Si autem filum ex lana, cuius superfluum non prope suturas resecatur, sed ut trium digitorum longitudo ab ipsa super sit, quam ad frontem extensam emplastro aliquo glutinatio agglutinabimus. At palpebrae pilos per acus aciem à suturis liberabimus. Sic igitur chirurgice modus communis et rarus est. Quidam uero fugient excoctionem. Quapropter post factam subsecutionem, palpebrae tenendae apta uollesia, hoc est ad circumferentiam palpebrae formata, distentam superfluum euerit per scalpellum rescindunt, & suturas uelut diximus adhibent. Quod si in parte quadam palpebrae solum fiat à pilis punctura, in illa etiam solum facere chirurgiam conuenit. Postea linetis complicatis posita defacilis & impolitis deligabimus. Ita ut adtertiam usque die mola aquosa irrigemus, qua soluemus, & resida superflua

Veritas filio
Lanaria filio

*Collyrium
croceum et
rosæ*

filis, aut croco aut glaucio, aut aliquo inflammationem arcente collyrio, ut
lati quodam ex rosis croceo, palpebras oblineamus. Si vero futura inflamm/
mate fuerint, etiam emplastrum quoddam molle ipsis imponemus, & quia la/
diammatis oculo infusus mitigabimus. Laxatas autem futuras rectas do/
trabimus. Nisi porro quendam excoitationem quidem palpebrarum facien/
ter uelut dictum est, futuris autem non utentem, sed per medicamentum
cicatricem inducens curationem perficientem. Coalescente n. uulnere, pal/
pebra ex parte externa pilos foras nutrire cogebat. Quomodo modum alius
quidam neq. palpebrarum excoitatione, neq. duabus extrinsecus sectionibus
utem, sed subiectione solli faciens, per digitos aut etiam per hamulum, hanc
palpebrarum rugam extendebat, & duabus arundinibus, aut solijs sine brachijs
quibuscum equelem palpebrarum longitudinem habentibus, latitudinem aut
angusti ueng. lacerat. scilicet scalpelli, totam intermediam superfluam cutem inter/
cipiebat, & utinens ipsa iuxta utrosq. lines construngebat. Atq. ita tota re/
tro curis non nutrebat, & propterea mortificabatur, intraq. decimum
aut decimum quincum ad summum diem, una cum arundinibus, aut solijs
sive brachijs excidebat, ut scire neq. cicatrix appareret.

De palpebrarum ulsione per medicamentum. Cap. IX.

*Ulsio per me/
dicamentum
Lagophthal/
mia affectio*

Palpebrarum equidem ulsionem per usorium medicamentum, omnes
ut uno uerbo dicam, ueteres reprobarunt, tum propter medicamenti acri/
moniam oculis infertam, tum quod ulsione modum excedere, lagophthal/
mia oboritur affectio, in qua hiis oculis palpebris, usus à quauis occurren/
te causa obeditur. At quum multi qui semper à pilis punguntur, & neq. uo/
lunt futuri sepe audire possunt, inuitos tamen sepe cogit, uelut in rebus despe/
ratu ulsione per medicamentum adhibemus. Et complicitatem quidem medica/
menti eiusmodi est. Calcis uelut partes at. saponis gallici aut cōmuni par/
tes. ii. Quidam etiam sphæronitri partes, i. ii. Hinc tria lixiatio excolato, aut
saponarico, aut alio ex ficulneo aut quercuo cinere, uelut poteri nōdum cor/
rupti excepta, per specilli caput palpebrarum injicimus, myrti folij figura tan/
tum spaciā adurentes, quantum etiam in futura detraxissimas. Adulsa uero
in prima aggressione cute, iterum illud per spongiam detrahimus, & rursus
injicimus, tandū medicamentum manere sinentes donec locus nigrescat.
Si uero non fuerit denigratus, etiam tertio injiciendum est. Denigrata uero
iam cute, et crusta de cætero facta, a bluto medicamento, balneis & perfusio/
nibus, usque ad crusta casum utemur. Post quem linamentis salis, & colly/
rijs teneris cicatricem inducere conuenit.

De Lagophthalmia. Cap. X.

*Lagophthal/
mia*

Lagophthalmos appellat eos qui supernam palpebram remissam habet.
Hæc autem affectio fit uel ex natura, uel ex uulnere cicatrice, & hoc aut
sponte, aut ex futura, aut ulsione, uelut paulo ante dicebamus, inepre admi/
nistrata, inducitur, in qua etiam solum moderata correctio fieri potest, si suffi/
cientem etiam similitudinem palpebra habet ipsam. n. cicatricem dividere oport/
et, & disparatis per linamentum habet, uelut cū ad absolutam usq. curatio/
nem uti, ita ut non ualde siccantibus utamur sed magis laxantibus pingui/
bus, qualis est foenigræci succus affusus, & regium tetrapharmacum solu/
tum, ac linamentis et ceptum inditum.

De futura palpebre infirma, et ulsione per medicamentum. Cap. XI.

*Phalangia
distictio*

Quot pilorum a sectionibus superita palpebra obnoxia est, totidem etiam
in inferna. Nam si & maior seipsa stet, eueritur, & phalangiam, & di/
stictiam, hoc est multiplicem pilorum aciem, et geminatum eorundem oculi
nem sustinet. Eodem igitur etiam hic futuræ modo utendum est, immutato
sistemine ordine, ita ut prius Lunarem sectionem faciamus, propter im/
pedi mentum quod ex sanguine contingit. Deinde neruam. Subiectio uero
reprobanda est, eo quod insita grauitate inferna palpebra promptè euerri/
tur. Sed & reliquam curationem, uelut in superna palpebra futura adhibee

re oportet, hoc excepto, ut filorum eminentia in fronte non agglutinetur.
 Si vero etiam hic chirurgiam fugientes, usitionem per medicamentum magis expectant, etiam hanc iam traditam habes.

De palpebra infera euerſione.

Cap. XXII.

Quemadmodum in superiori palpebra affectio lagophthalmica, ita in inferiori euerſio contingit, uerum non ex natura, sed aliquando propter laxationem ex medicamentis, quæ hanc inflammatione peggrella efficere possunt aliquando uero propter futuram aut usitionem inepte administratam, palpebra euerſitur. Acutaq; accepta duplicatum filum trahente, carnis olem palpebræ partem transigimus, à sinistro angulo, ad dextrum ipsam transientes. Deinde annexo extremitatibus ipsius uerſus filo, carnem per aciem extendimus, ac sic ipsam scalpello excindimus, unde cum ipsa auferrentes etiam aciem. Et si quidem receperit figuram suam palpebra, & in orbem conuersa fuerit, contenti sumus hac Chirurgia. Si uero adhuc euerſatur post carnis ablationem, auersum specillum iuxta externam partem scilicet palpebræ subijcimus, et iuxta internam palpebræ partem duabus fasciis sectionibus, à duobus angulis sectionis prius factis in initium duabus, has ipsas in acutum ducimus, & his in unam iam adductis corpusculis. *κ.* litere græcæ simile auferimus, ita ut sit quidem acuta ipsius pars inferne ad oculum, lata uero superne ad palpebræ marginem. Erpositæ disparatis partes acutis sanent filum ducente contrahimus, duabus futuris contenti. Si uero propter futuram, auersionem palpebræ euerſio fuerit facta, sub palpebra pilis in ipsam primam cicatricem, simplicem sectionem facimus, & disparatis labijs linamenta indemus, & reliquis uelut in lagophthalmia utemur, fomentum saltem ex cepis, donec futura conglutinetur.

De illauratione, et alione per firmam.

Cap. XXIII.

In quibus non sunt multi in palpebra pilis oculum pungentes, sed unus, aut duo, aut tres ad summum, prope inter se siti, in his illaurationem probamus. Aqua igitur tenuissima accepta, per auriculæ ipsam, nullibet pilis, aut simplicissimi filis byssini, duas extremitates simul coniunctas transmittimus, ita ut id quod transmissum est duplicem lineam siue anſam habeat: & alteram eiusmodi filum aut pilum, per anſam immitti ausus, transmissaq; in marginem oculi, ubi pilis illi superflui enati apparent, & per auricularium specillum pilo siue pilis illis in anſam inditis, atrahimus. Et si quidem palpebræ pilis in oculum ducant, anſam sursum trahimus. Si uero unus aut plures pilis ex eisdem, per principium filii inditi, rursus anſam detrahimus, & rursus pilos, ne pilis illas inditis atrahimus. Si uero unus saltem fuerit pilus oculum pungens, atq; tenuis, alterum cum ipso ex iustis palpebræ pilis simul atrahimus, ita ut ipsos quædam, aut alio quopiam glutinoso fillos deligemus, donec simul coalescant. Quidam usitionem illaurationi preferentes, euerſit palpebram, et extracto per pilorum eandem uolucellæ pilo, siue simis is filio, ut duo aut tres, specilli bicipitis caput, aut auriculari specilli, aut tale quoddam tenax instrumentum igne calefactum adigunt loco, unde pilus aut piluli fuerant eundi. Sic, uidentur ceteri, neq; alius pilus enascitur.

De aquila siue Aquila palpebrarum.

Cap. XXIII.

Vesica siue Aquila, quæ hydamæ græcis dicitur, substantia quedam est pinguis palpebræ cuti propter naturam subſtrata. In quibusdam uero, & maxime in pueris uelut humidioribus augeſcens, multorum symptomatum causa fit, grauians oculum, & ob id fluxiones inducens. Palpebræ itaq; ipsæ sub supercilijs aquosæ apparent, & uelut decer factum atroli non possunt. Et si dignis disparatis eas compreficimus, id quod in medio ipsarum est insatur. Qui uero ita affecti sunt, dilaculo maxime fluxione infecti sunt, neque solis splendorem inuasi possunt, nisi lachrymanſes. Sed & assiduis incidunt hirsutudines. Aegroti itaq; commode collo cato, de nobis dignis, indice & medio paululum disparatis palpebram compreficimus, ita ut col-

*Vesica palpebræ
Aquila
Hydamæ*

lectio quaedam aequalis in medio digitorum fiat. Deinde retro sitientem & caput fulcisthem miniliram, iuxta medium supercilium, moderate extendere palpebram ducebimus, & uenę incisionis instrumento accepto, ipsam per medium transversim diffecabimus, non maiore quam in uenę sectionibus diuisionem facientes, ea uero profundius, ut totam cutem diuidat, aut etiam ipsam uellicā cōtingat, diligenter in hoc habita animaduersione. Multi enim profundius adactio scalpello, aut coniformē tunicam diuiderit, aut omnino musculum palpebrae sauciant. Et sane si statim cōparuerit uellica, hanc extrahemus; sin minus, etiam rursus leniter diuidemus. Hanc autem confectā, per molle lintecum digitis apprehensam, hac illac & quāq; circū circa motū extrahemus. Et post extractionem duplicatum lintecum posca imbutum imponemus ac deligabimus. Quidam uero etiam salem tritum per specilli caput in sectionē induunt, ut si quid de uellica relictum sit, id ipsam consumat. Post solutionē uero, si ab his inflammatio, collapsusque obitū solent, aut lycopio, aut glaucio, aut croco, curationem absoluemus. Si uero inflammatio affuerit, cataplasmatibus & alijs auxilijs ad hoc commodis, medebimur.

De cataractis palpebrae.

Cap. XV.

Palpebrae concretio.

Concretionem sicut in et superna palpebra, quādoq; ad inferiorem marginē, quādoq; ad canicū oculi agnatā, quāq; etiam ad ipsam coniformē tunicam. Et hic morbus oculi ad functionē suam impediri elicit. Oportet igitur aut auriculari specillo palpebrae amplitudini subiectio, aut ipsa per hamulum dilata, concretionem per pterygiū secundū delinatum scalpello dissoluere, cauendo ut coniformis tunica ne sauciatur, ut ne prociat cutis ex oculi occasio ex hoc detur. Post sectionem uero, liquoribus oculis infusis, palpebras per linamenta disparabimus, ut ne iterum concretio fiat, & lina ouo imbuta impolita, post tertiam diem attenuantibus & cicatricem inuoluentibus collapsis utemur.

De granda palpebrae.

Cap. XVI.

Granda palpebrae.

Grande lēthimoria circa palpebrā collectio est, quae si ante externā palpebrae superficiem occurrat, diuisa extrinsecus transversim per scalpellum palpebrae, postea specillo auriculari aut eiusmodi quodam, grandinem eximemus. Et si magna aut hians fuerit secūto, sutura contrahimus labia, & emplastro utimur. Sin parua, omīsa sutura, similiter curationem pericitemus. At si intus fuerit grandio, ut per chondraginem transierit, uel uel palpebrae, & intrinsecus transversim diuisa, ipsam extrahemus, & uenę incisione utemur.

De verruca, et carnis in magno oculi angulo incrementis.

Caput XVII.

Verruca palpebrae.

Verrucas circa palpebram, & carnis iuxta magnam oculi angulum incrementum, quod encanthida, id est, carnem angularem uocant, uel sella prehensam, scalpello excidimus, & chalcitidem tritam imponimus.

De pterygiis.

Cap. XVIII.

Pterygia oculi.

Membrana neruosa h. magno oculi angulo omnino exorta, & paulatim inuolupente, haec affectio contingit. Latet autem oculum, tum quod contractione bulbi motum impedit, tum quod procedendo totam pupillā cōgredit. Quam igitur curatione faciliore sint teneta & albicanda pterygia, ad hunc modum chirurgiam aggredimur. Diductis palpebris pterygium hamulo modicē incuruato exceptum distendimus, & accepta acu setam equitamus, & ualidum filum in auricula suatrahente, modicē que in summa parte incuruata, ipsam in medium pterygium traheimus, & filo quidam deligatum pterygium, in sublime extendimus, seta uero partem ipsius ad pupillam, uelut serrando, ad finem usque suberectamus. Reliquam uero ipsius ad magnam oculi angulum partem, scalpello sursum delinatum exfundo excidimus, naturalem anguli carnem relinquentes, ne ipsa ablata & hoc eas ex decremento fluida consequatur. Quidam filo, uelut dictum est, exten-

sum.

tum, & alio loco pterygium excrescant, cauentes ne corniformem tunicam contingant. At post chirurgiam, modico sale nitrato in locum immittito, lanam quo imbutam superimponemus ac deligamus. Verum post exsolutionem, diu muriam instillandum, Si vero inflammatio consequatur, defertis pitis ad hanc auxilio utemur.

De staphylomate. Cap. XIX.

Staphyloma tunice corniformis incuruatio est, debilitate una effluuii formi, quandoque ob fluxionem, quandoque ob ulcerationem. Chirurgiam autem adhibemus, non ut uisum deperditum reuocemus: Hoc enim fieri non potest, sed ut moderatam decoremegro reparemus. Acum igitur ex inferius sursum, per staphylomatis fundum transire oportet, & alteram acum duplex filii ducentem, ab angulo qui ad manū est, ad alterū per staphylomatis fundū transigere, & manente potiore acu, filii aniam secare, & alterā staphylomatis partem ad superna, alteram ad inferna, per fila deligare, & tunc ab hac acu, lanam quo imbutam imponere. Post solutionem uero, oculum leuibus infusionibus mitigare, donec fila una cum staphylomate excidant.

De suppuratis oculis. Cap. XX.

De suppuratis oculis Galeni uerba apponere satis fuerit, quæ hoc modo se habent. Ex nostri temporis medicis oculariis quoddam nomine Iulius, etiam per capitis concussionem multos ab oculorum suppuratione liberauit. Efectos enim ipsos in sella collocabat, & apprebens utriusque capite hâteribus, ita ipsos concutibat, ut nos palam pos deorsum procedere uidere mus. Mane hæc autem inferni, ob substantiæ grauitatem, cuiusmodi suffusiones non manent, si non ualde accurate ipsas quis confringat. Eri dem rursus in progressu, sæpe, loquit, pus acernatum eucruimus, dissecta corniformi tunica paululum supra illum locum, iuxta quem omnes tunice inter se conercent. Appellat autem eum locum ita aliquid, alij uero coramam.

Hæc habemus in libro curatorie methodi dicta. Cæterum post puris excretionem, ulcere per infusiones aque mulis, aut succi feni greci addito melle, repurgato, consequenter reliquam curationem adaptabimus.

De suffusionibus. Cap. XXI.

Suffusio est lenti humoris in corniformem tunicam iuxta pupillam collectio, quæ aut uisum impedit, aut ne clare uideamus efficit. Fit autem maxime ob frigiditatem, & debilitatem spiritus uisori, & propterea senibus magis, & qui ex longo morbo agrosarunt accidit. Coningit etiam ex uisulento uomitu, & ex plaga, & propter plura alias causas. Ar uero de suffusionibus quæ adhuc sunt, & ad chirurgiam nihil pertinent, in tertio dictū est libro. Nunc autem de his quæ perfectam collectionem ac concretionem acciperunt tractabimus. Omnes igitur suffusi splendorem aut multum, aut modicum uidēt, atq; hac ratione etiam suffusiones ab obscuratione ac glaucedine separamus, quum obscuratione ac glaucedine affecti, splendorem omnino non uideant. Rursus igitur docet te Galenus & concretionem, & differentiam suffusionem, & quæ ex his chirurgiam admittunt. Concluso oculo suffuso, palpebras per magnam digitum ad oculū comprimitis, ipsamq; eum compressione hæc illac impellitis. Deinde aperto oculo, inspectam suffusionem consideramus. Nam si his quæ nondū sunt cœrety, suffusio quæ ex digiti cōpressionē accedit, & primi quidē iunior apparet, uerū rursus ad propriam figuram ac magnitudinē redit. In his uero quæ cœnere sunt, nulla inuolato neq; secundum latitudinem, neq; secundum figuram, ex compressione occurrit. Quandoquidem uero commune hoc est indicium, & earum quæ moderate, & quæ supra modum concreuerunt, ex colore has discernemus. Quæ enim ferri colorem, ut cœruleum aut plumbeū reserunt, hæ moderate concrete sunt, & commodè deducti possunt. Quæ uero gypsum aut grandinæ colore teneant, supra modū concreuerunt. Postq; igitur hæc didicimus ex Galeno, locato homine ad splendorem absq; sole,

oculum ita fere diligenter deligabimus, & diducis alterius oculi palpebris, ab appellata iride iuncta parvum angulum, ad capitis specilli mēsuram ipsas distrahentes, & tunc specilli cuspidē locū perpingendū notamus, ita ut in sinistro oculo, dextram manu operemur, in dextro vero, sinistra. Et cōvertē specilli acie circa sinē rotunda fortiter innitimur et per notatū prius parvū usq; ad internū locum transigimus. Modus autē progressus in profundū ea fiat mensura, quanta est ā pupilla ad iridem distantia. Ex superius igitur iuxta suffusionis apicem specillum desidentes (Nam ab corniformis tuncq; pelluēditatē conspicuē videtur) per ipsum in subiectos locos suffusionē deducimus. Bili quidē statim deducta fuerit, paulatim quiescentes expectamus. Si vero redundarit, rursus ipsam deducimus. At post suffusionis deductionē, specilli punctoriū educimus, sensim ipsum obtorquentes, & soluti in aqua modicum saltem cappadocicum oculo infundimus, & imposita extrinsecus lana cui candido cum rosaceo imbuta deligamus, simul etiam si num oculū deligantes, ut ne cum alio commoveatur, & reclinatū in domuncula subteranea penitus quiescere habemus, tenuē exhibentes vultum ad septimū usq; diem deligato, si non quid impediat. Post septimam diem deligatione soluta, visum ipsius experimur, rebus utilisibilibus obiectis, id quod in Chirurgia, aut fāctū post chirurgiam facere improbamus, eo quod ex violenta interventione suffusio promptē rursus redundet. Si vero inflammatio aliqua urgeat, etiam ante septimam diem facta solutione, huic nos opponemus.

De Aeglope. Cap. XXII.

Aeglope

Aeglope tumor est abcessus similis. Inter marginē oculi angulum, & nasum. Aegre vero curatur affectio, tum propter corporum tenuitatem, tū propter consensum ad oculum tumorem. Si igitur ad summam cutem eruperit abcessus, quicquid exuberavit ad os ulque auferemus, & si ad malam subierit fistulā, totam ipsam expandemus, & si adhuc incorruptum os est, rademus. Os vero corrupto, per exsterna olivaria peruremus, spongia frigida aqua imbuta oculo imposita. Quidam post eamdem resectionē terebra uti, humorem aut pus in malam traxerunt. Verum nos visio ne sola contenti sumus, per agilopica cuncta tantum adurentes, ut squama decedat. Et post unctionem lenicula cum melle, aut melleo nio cum melle, & reliquis resiccantibus auxiliij utimur. Si vero ad angulū repit Aeglope, & omnino non ad summam cutem, tunc scapello pterygia destituta, aut venae incisione, corpus id quod inter angulum usq; abcessum est exolvimus, & carnes ex profundo educimus, & tunc moderate resiccamus. Et utrum sanē in pulvillum detritum, his inspersum muricē liccat. Et aloē cum manna similiter. Reliquam vero aeglopum variationem libro tertio tradidimus.

De aditōrii membranis positis. Cap. XXIII.

Aditōrii membranas posita.

Hæc affectio ex naturae consuetudine membrana quadam aditōrii membranæ obdurante, quandoq; in superficie, quandoq; in profundo. Sed & postea superuenit, prægressa cina meatu ulcēratione. Nam superenascens caro ipsam obteat. Si igitur in profundo fuerit impediens membrana, aggressio dissiliē est. Conandum mē est, ut tenui quodam instrumento illam discitemus. Si vero in superficie, acuto cultello illam disciam, si opus fuerit, etiam exdemus. Si vero caro superenata fuerit, etiā hanc pterygia destituta, aut polypis excidentis apto scapello auferemus. Destituta namque mentum ex linco obortum, factum ad amplitudinem meatus, in aqua mardefacimus, & hoc in chalcidij crista aut eiusmodi quodam pulvisculo obvoluimus, in meatum indemus, ut ne rursus caro enascatur. Si vero inflammatio adiecta ipsam extrahimus. Aut si lingua ex meatu crumpat, spongiam frigida aqua imbutam imponemus, & assis ad hoc commodis utimur.

De hæc affectio in aditōrii membranis. Cap. XXIV.

Aditōrii membranas posita.

Neidone in aures nō solum oculi, sed etiam utrum, & labar, & fistularū fistulosa. Vitrum igitur & calcis in propria magnitudine perseverat, labg

uere

vero & si liquorum officula, & alia huiusmodi, ex naturali corporis humidi-
tate inque excreta, maximos dolores inducant. Auriculario igitur specillo,
aut hamulo, aut uollicella, hæc eximere oportet. Aut uolens capitis di-
stentione ac concussione, aure circulo alicuius imponit. Quin & per si specilli
sepe hæc exurgentes extra ximus, quemadmodum etiam aquam in aurem il-
lapsum, cera similiter circum cires et si quæ parte oblita, quæ ad aurem est,
ut nulla pars se spiritus transitus pareat. At calculos & eiusmodi moles, lana
specillo obuoluta extraximus, ita ut resina terribindina, aut glutinosa ali-
quo tinctam, leniter in auditorium meatu infereremus. Si uero non succel-
serit, sternutatorio naribus indito, os & nares obturato. At si neque sic le-
quantur illa, proutquam inflammationes, & conuulsionæ, & simpliciter per
riculum accedas, per chirurgiam ipsa educemus. Locato igitur ergo aure
superfusa, sectione parua lunari ad fundum auri retro fibræ utemur, & auricu-
laris specilli concavo, inlaticam molem eximemus. Post extractionem uul-
nus conuatur, & cruentorum uulnerum doctu curetur.

De polypo. Cap. XXV.

Polypus moles est corporis scilicet præter naturam in naribus consistens, à ma-
rini polypis similitudine nominata. Nam & illius carnis asinus est, & ut
huius ille circulus sita uenantes ulciscitur, manus ipsorum apprehendens. Ita
& hæc affectio ægrorum nares obturans, medicæ adhibendæ difficultatem,
& circa respirationem, & circa loquelam inducit. Duros igitur & resistent-
es, & subuidos, ac malignos polypos, uelut ad cancerum tendentes uitare
oportet. Erit biliores autem & laxos, & torpidos, & non malignos, chinu-
rgie subijcere. Proinde ad solis radios homine collocato, & nali meatu per si
ut iram manum expansam, cum dextra manu per scalpellum acutum, myrtilo
hum referens, polypis excidendis aptam, polypum aut carneam illam mor-
lem circum circa uel secemus, qua parte nari adheret ferri acie immissa. Por-
tio uero conuerso instrumento, per concavum ipsius refectam carunculam
educamus. Et si quidem nali meatum purum factum uiderimus, ad curatio-
nem devenimus. Si uero aliquid de corpore polypii restet, accepto illo poly-
pis eradendis apto instrumento, per aciem ipsius relictum corpusculum, os-
tensione & obpositione & ratione libenter educimus. At non malignos cau-
teris oliuæ oleo perimus, & post unctionem curatione ad perulæ com-
moda utemur. Cæterum post chirurgiam loca per spongiam ex acie deter-
tis, poscam, aut uisum, in nares infundimus. Et si permanserit liquor per pa-
larum ad fauces, recte administrata est chirurgia. Si uero non permanserit,
manifestum est quod circa ossa coliforma, aut in superius naris partibus ca-
runculae sint, quæ polypicis instrumentis non fuerint comprehensæ. Illum
igitur medio criter crassum, uel ut huiusmodi, est ut in ipso duorum aut trium
digitorum distantia, nodi ligari possint, specilli bicipitis foraminis inferi-
mus, & alteram bicipitis specilli extremitatem per narem sursum ad coliform-
mes meatus immittimus, ipsamq; per palatam & os transmittentes amba-
bus manibus attrahimus, quo uelut per ferram, nodis illis carunculae dete-
ritur. Et post chirurgiam, meatu per lucemario funiculo simile linamentum,
disparto conuersato, tertia die postea, Muste pastillo & confimilibus, in-
tus relicta consistemus, simulq; locum relinabimus. Postea uero etiam pa-
stillis cicatricem inducentibus utemur, plumbetis canalibus si opus fuerit,
per totam curationem naribus inditis.

De carie. Cap. XXVI.

Caria circa aures, a uel a hac ratione trahitur, ut primum quidem eu-
tem ex inferna parte excorietur, postea uero uulnerum labia inter se
contrahamus, & callis ablatis deinde sitamus, & conglutinemus.

De parulis & perulis. Cap. XXVII.

E Palis carnis supereminencia est in gingiuis, iuxta aliquem dētem obor-
ta. Perulis uero abscessus paruos est circa gingiua. Epulis igitur uol-
fella

Polypus marini

Coliformis
meatus

Coliformis
meatus

Caria

Epulis
Parulis

fella auctusculo extensam refecimus. Parulidema uero iuxta circumscriptionem excisam linamenti explemus ac disperamus. Scio autem saepe ipsam scapello uenit incisorio solum panchum, pure euacuat cessasse. Post chirurgiam uero uino colluere iubemus, postera die aqua multa, & post hoc putillum floridum ualneri inspergemus, donec perfectè curetur. Si uero putredo gingiuarum accedat, & per commodam medicamentis non curatur, ulli uarij cauterij hanc peruremus.

De dentium extrahendis.

Cap. XXVIII.

Dentium extrahendis

Dentem ad locellos usque circumscissum, & forcipe paulatim conculsum extrahemus. Si uero compositus fuerit, tenui linamento primum cauernam expleri oportet, urne frangatur dum ab instrumento edstringitur. Post extractionem, sale tenuissimo carunculas relictas conspertas consumemus. Postea uero uino aut posca colluimusque ad absolutam curationem. Quandoquidem autem & superuacui quidam dentes agnoscantur, eos qui dum locellis insiti sunt, per scalpra excidemus. Qui uero locellis insiti non sunt, eos per forcipem extrahemus. Si uero dens aliquis supra modum auctus sit, aut etiam defractus, preminens tamen aut superuacuum partem ipsius lima deterimus. At uero adherentes ipsi dentibus squamas, uelut sane fieri potest, ad specilli educto, uel ratorio instrumento, uel limula repurgamus.

De incuruata lingua.

Cap. XXIX.

Linguae incuruatae

Incuruatae linguae affectio aliquando ex natura fit, si declinantes linguam membranae duriores & cuniores sint ab initio: aliquando uero ex aduentitia causa, propter cicatricem aliquam duriores, ex ulceratione, sub ipsa lingua induruit. Qui igitur ex natura hanc affectionem habent, ex eo cognoscuntur, quod & tarde loqui incipiunt, & quod nulla praegressa ulceratione, uinculum sub lingua moderato amplius appareat. Qui uero ex aduentitia causa, cicatricem palam apparentem habent. Aegrotus igitur in sella locetur, & linguam ad palatam eleuet, & neruosum illud uinculum transuersum secetur. Si uero ex cicatrice, ea linguae incuruatio facta fuerit, hamulo transuersum excisam sursum attrahemus, & sectione obliqua facta curuata tem exoluiamus, ita ut corporum in profundum incisionem ueremus. Nam sanguinis eruptionem, quae aegri fieri potest, saepe induxit. Post chirurgiam, aqua frigida, aut posca colluant. Et postea laxatione & concinnante medicationis docto curatio perficiatur.

De tonsilla.

Cap. XXX.

Tonsillae

Antistes tonsillae

Quam admodum glandulae induratae appellantur Strumae. Sic tonsillae inflammatae, & ultra modum auctae, & uelut induratae, depluritionis & spiritui, difficultatem functionis inducentes, quum ex aduerso inter se posita sunt, antistes graecis uocari sunt, lemnis & pars, & affectio eodem consilium nomine censentur. Inflammatae igitur has chirurgiam non aggredimur. Sedata moderate inflammatione, manus admouebimus, & maxime illi albi fuerint, & contractae, & fundum angustum habuerint. Nam laeae & rubicundae, & fundum laeti habentes, ad sanguinis eruptionem procliuus sunt. Collocato itaque ad solis ipsius dorem homine, & hunc iussu, ministro ea put continente, & altero linguam per instrumentum ad hoc aptum, ad infernam maximam deprimente, nos ipsi a creptum hamulum in tonsillam dirigimus, ipsamque quantum eius fieri potest attrahimus, absque hoc ut membranae simul attrahantur, & postea ipsam totam ex fundo, per scalpellum lingue incuruatae aprem, & ad manum commodam, refecimus. Duo enim sunt eiusmodi instrumenta, flexura inter se aduersas habentia. Quare post unius extractionem, in altera eodem modo, manu & instrumento uice uersa multis operabimur. Post chirurgiam, aquam frigidam aut poscam a percoluimus. Ac si sanguinis eruptio aliqua accedat, etiam rubi, & rosarium, & myrti de cocto tepido utantur. Si uero copia sanguinis feratur, etiam plantaginis & symphyli succum, & passillum ex succino, & lemnium sigillum, ex posca

seca colluendum exhibemus. Sedata uero sanguinis eruptione, postera die rosarum flore & croco, & amylo, cum lacte illinantur, aut cum aqua, aut o-
ui candido, aut hydropisato. Quod si fordes ulceribus accedat, etiam ex me-
le collutionibus, ac illitionibus utimur.

Hydrophosia

De uia Cap. XXXII

Gargalis qui uelut plectrum quoddam uocis est, sepe et fluxionem à capi-
te facit, & præternaturam auctus, ubi longus & tenuis factus est, co-
lumella appellatur ubi uero crassius inferne ac rotundius aua, utroque nomi-
ne à similitudine ducto. Si igitur uniuersalibus auxilijs cedere noluierit, di-
co autem uenæ sectionibus, & euacuationibus per purgationem subducen-
tibus, item localibus adstringentibus ac repellentibus, aut etiam discutere
potentibus ad chirurgiam deuenimus: ut ne ex assiduâ irritationibus in-
fer & trigilis, aliquando etiam suffocatio consequatur. Contractas igitur
& rotundas uenas, & non oblongas, & sanguinolentas aut subnigras, chirur-
gia non aggredimur. Tennes uero & oblongas, & summa parte immisus-
tas ac resolutas, & non ualde sanguinolentas, sed subalbificantes manu trac-
tamus. Statim, n. hæc etiam inflammatione carent. Tantum uero de uia sal-
tem asserendum est, quânam naturalem excedit modum. Nam resectiones
ipsius in totum, omnes circa thoracem regiones extremè ledunt, & uocem
intercipiunt. Collocato itaq; ad solarem splendorem agro, multumq; haurie
iussu, uaria forcipe aut uossella super uacuam etus prehensum, & ad infer-
nam partem tractum, per scalpellum uisum, aut securis destinatum refe-
cabimus. Quæ uero post chirurgiam requiritur, ea uelut in uisorum exci-
sione dictum est, adhibeantur. Sepe uero aut ob ægri umilitatem, aut ob
sanguinis eruptionis formidinem, aut ob medicamentis præstantiam, ferri
recusantes, uisario potius medicamento uiam consumimus. Oportet igitur
medicamentum uisorium illud quod in palpebrarum uisione relatum
est, aut aliud eiusmodi accipere, et ex hoc uisorijs uarum instrumenti ca-
uitates implere, & agro multum haurie iussu, linguâq; per ministrum cum
instrumento ad id apertum depresso, tantam uiae partem instrumento quantum
facis est apertum comprehendimus, quantum uiae partem excideremus. Habeat
aut medicamentum compagem neq; liquidâ, ut ne diffusum ab uia abertet,
& subiectas partes comburatur: quæ propter inueniuntur hominem, ut per totâ
uisionis tempus non deglutiat neq; omnino duram, quæ facile uiae adhæ-
reat. Et si quid em ex una admotione summa uiae pars fuerit denigrata, con-
tenci sumus. Sin minus etiam his utamur, per totum operationis tempus ho-
mine inclinato, quo salua eliquescens, una cum medicamentis particulis, ex-
tra os effluere possit. Morficatur enim in una hora, excidit aut circa tertiam
aut quartam diem. Post uisionem uero, indice digito mollis lana aut stupa
obuoluta, partes circa gargalionem extergimus, aut etiam aqua colluere stu-
bemus. At uero partes circa collum irrigationibus ex oleo chamæmelino,
tam in his, ut in quibus tonsillæ blandæ sunt, propter affectionem per confectum
sum, conloquimur. Gargarismis item & illitionibus similiter utimur.

Gargalis
Columella
uiaMedicamentis
uisionis
facilis

De spinis facibus infestis Cap. XXXIII

Deuorantur sepe inter edendum spinæ aut piscium, aut aliarum rerum,
in diuersas partes. Quæ igitur sub conspectum ueniunt, eas instrumen-
tis spinis excutendis de sinu extrahimus. Quæ uero inferius hærent ad li-
pium guttus sine deglutitionem, alio modo. Quidam, n. maiora fossa ipsis
deuoranda censent, uelut sunt caules lactucarum, anthracellæ panis. Alij
spongæ puræ ac mollis non magnâ ad eam molem filo alligatâ deuorare iu-
bent, utq; filo prehensum rursus reuellerent, atq; hoc sepe facere, quo spina spō-
giolæ infixa simul educatur. Leonides cataplasmatibus concoctionis extrinse-
cus uti iubet, qualia sunt quæ ex eroda, ordacea farina constans, quo sup-
purati spinæ sua sponte excidunt. At si circa ipsam deglutitionis rempus, aut
etiam ante concoctionem in uentre, ad affectum hominem accesserimus, &

Spinæ facibus
infestis.

Leonides

quod infixum est nō compareat, ponere habebimus, aut digitorum aut pen-
narum densissime facta. Nam aliquando unū cum his quae per uomitum re-
ficiuntur, etiam id quod infixum est educitur.

De faciei gutturis sectione. Cap. XXXIII.

Anglia.

Optimi chirurgi etiam hanc chirurgiam descripserunt. Angylus igitur ita
dicit. In anginis, uelut circa uulnus modum trademus, reprobamus chir-
urgiam, quam in uulnibus hae diffectio, ubi omnes arteriae & pulmo affectus
est. At in his qui circa os & mentum inflammationem habent, aut etiam in
tonsillis, quae gutturis osculum operiunt, arteria ab affectione immuni, ra-
tioni condensationem est uti summi gutturis sectione, ad suffocationis peri-
culum evitandum. Proinde opus aggressi, infra gutturis caput, sub tertium
aut quantum ipsius circulum, pariem quandam arteriae diffecabimus. Tor-
nem. n. diuidere periculisum est, idcirco autem est hic locus, sum quia ear-
ne caret, tum quia uasa procul à diallo loco sita sunt. Reflexo itaq; retro-
sum agros capite, ut magis conspicuum fiat guttur, transuersa sectione in-
ter duos circulos utemur, ita ut non cartilago, sed membrana cartilaginea
continens diffecetur. Si uero quis circa aethionem timidius fuerit, hamulo
prius extentam cutem diuidat. Deinde ita ipsū guttur aggressus, & uas-
la quae occurrunt disparatis, sectionem faciat. Hic Angylus. Considerabat au-
tem gutturis diffectionem, tum ex spiritu per ipsam exeunte cum impetu
quodam, tum ex uocis interruptione. An post praetergressam suffocationis
periculum, ab ipso uulnere renouata, sanatur utemur, cutem solum ab ipso car-
tilagine continentes, & medicamentum cruentis uulnerebus aptum adhibe-
bimus. Si uero hoc nō glutinabitur, incantāte ductu uulnē est. Porro si quis
nobis offeratur, qui utit huiusmodi causa libere guttur incidisse, similiter ca-
rabimus.

De abscessibus Cap. XXXIII.

Abscessum
chirurgia

Quod abscessus corruptio sit & mutatio carniū aut carnosarum parti-
um, & qui sit generatiōis ipsius modi, & quot abscessuum differen-
tia, in quarto libro sufficienter dictum est. Nunc uero quae ad chirurgi-
am ipsius attinent persequemur. Postquam perfecta mutatio in pus facta
fuerit (hinc autem cognoscimus, ex eo quod & dolores, & febris, quae an-
tea fuerūt, et rubor, & pulsus, & reliquae inflammationis signa inuenerūt, et
tumoris moles in uentū fastigiat, & ad digitum tamixū pus subleuā, ma-
xime si in summa cute sita blecessus) tunc ad chirurgiam nos conuertimus. At
si uerū ad tectū subleuāt ac occurrat, neq; fastigiatur, eo quod in profundo
cōstitit, alia mutatiōis signa in tectū chirurgiā adhibebimus. Secūdi tamē
quētiā antea perfectū in pus mutatiōē aliquādo erudos adhuc abscessus seca-
mus, ubi uel articulis, uel principalib; partib; fuerit uicini, ut ne peruersā
seputrefactione simul corumpatur ligamētū, aut pars aliqua necessaria. Sed
& prope sedū abscessus, ante perfectū conuersionē, erudos secare iubet Hip-
pocrates, timēs ne in perforatiōē procedat. Secamus itaq; nō in omnibus
similiter sectionē facientes, sed si uis naturales, uelut in facie, & pilorū ex-
ortus, uelut in capite sequētes, decoris, quātū fieri potest, curā habebimus.

In abscessu

In uulnibus nō in directam secantes, uelut in musculis & tendinibus, & uer-
uosis arteriis, et principales partes uiscentes, securitatis rationē habebimus,
ita ut modo in directam fecerimus, modo transuersam abscessum diuidamus,
pro ut res singularem postulant. In minoribus itaq; abscessibus, unā sectio-
nem faciemus. In magnis, plures, pro magnitudinis ratione ubiq; teniores
& ad subefluxiōē commoda uulnacula secātes. Et qui quidē plurimum
fastigiat sunt abscessus, & erudi, & tenues, ac mortificati, eos amputamus,
aut triangulā, aut in y et i soli formā, aut aliam angulārē figurā, ablationē
facientes, quāto circuli aut figura inepta sit ad cicatricem inducendam. Qui
uero fastigiat non sunt, eos solum simpliciter secabimus. Aut magnum si-
num repererimus, si quidem carnosus fuerit, & glutinis ad ipsos uentis incumbē-
tibus, ad defluxiōem solum uiximus loci sectionibus. Si uero tenuis & uale-
de

Agros circa
lucē in ap-
paratū

de excarnatis sit curis, totum secundum longitudinem simplici sectione diuidemus. Et post simplicem sectionem, si tenuia valde, & non carnea appa-
 ruerint uniusg. conspiciunt, ipsa amputamus. Post chirurgiâ, facta per ipson-
 gâ de sectione, si parvus est abscessus, & sectio una, simplici linamento ute-
 mur. Sin magnus & plures sectiones, etiam lennificum qui per ubi possit,
 per ipsas docemus. Hos vero qui amputati sunt, similiter linamentis implebi-
 mus. At si sanguis erumpat, aqua frigida aut posca utendum est. Verum eru-
 ptione sanguinis perseverante, chalcididis pulvissum inspergemus, quo etiam
 ab haecidam putredinem sepe utemur. Ceterum splenia hyeme, & in
 nervosis corporibus, vino & oleo imbuta imponemus. Aestate vero & in
 corporibus carnosâ, aqua & oleo, aut etiam vino & oleo frigida, & facta
 digestionem, possidit his ipsis liquoribus irrigabimus. Tercio vero digfa-
 da solutione, & per spongiâ de sectione, tetrapharmaco linamenti alio
 utemur. Est inflammatio abla, eandem irrigationem ad linamentum conser-
 vationem imponemus. Si vero a dâ inflammatio, cataplasma concoctionis
 superedamus, perfusionibus prius usi. Sedata aut inflammatio, supputam-
 te & incarnante medicationis ductu curabimus. Sed & sinus glutinatoris
 medicamentis sanabimus, velut in quarto definitibus dictum est.

De Struma Cap. XXXV.

Struma est tumor induratus circa collum, & alas, ac inguina maxime co-
 nstans choetas graecis appellatur, aut choetadibus petris, aut à subum-
 eo quod multiplex loci fortè fortidum est animal, aut quia hoc eandem di colla
 habent. Nascuntur autem strumae aut circa anteriores colli partes, aut circa
 alteram ipsius partem, aut circa utraq. & aut una, aut duae, aut plures. Om-
 nes autem in propriis pelliculis continentur, quemadmodum stratomata,
 & atheromata, & melicerides. Dolorose itaque, et quae ad costum, ac
 impositionem medicamenti, deteriores sunt, malignae sunt, quas san-
 tiam canceratas quidam appellant & manifestum est ipsas non ita valde
 chirurgis cedere. Benignas igitur & ad tactum, & ad tempus tum medica-
 mentorum usum, hoc modo aggredi oportet. Quae in summa cute consi-
 stunt, & ad cutem repunt, simplici sectionis usi, ab incumbensibus cor-
 poribus excludimus, et diffusa hamulis cute, la bîa à pelliculâ liberabimus,
 velut in usuform exsectione docebamur, & paulatim auferemus. Maiores
 vero hamulis transfixas leuabimus, & similiter excoriantes undiq. à conti-
 nentibus ipsas corporib. absolueamus, ita ut ubiq. caronides appellatas, co-
 potas arterias, & recurrentes nervos vitemus. Si vero uas aliquod diu-
 lum opeti impedimento sit, laqueo ipsum constringimus, aut penitus per to-
 tum recidimus, si non ita magnum exstet. Et qui strumae fundum ad angu-
 stiam deuenerint, induratis ipsam referemus: hî demisso indice digito leu-
 tabimus, an etiam aliq. strumae adint, ipsasq. eodem modo auferemus. At si
 magnum aliquod vas, aut etiam plura circû strumae fundum suspectum ha-
 beamus, non ex bando ipsam recidemus, sed laqueo cõstringemus, ut par-
 ticulatim citra periculum sua sponte excidat. Et tunc sanè curationis per li-
 namenta ductum adhibebimus. Si vero illico resecetur, labia contrahemus.
 Omnes uero sectiones in directum facere oportet, & sinib. superfluis ha-
 buerint, statim consuamus. Si uero exstiterit mole, aliquid de cute redun-
 dat, parte ipsius ad m. yri folij figuram recisa, futuris utemur, & medicamen-
 tum crocatis uulnibus accommodatum super imponemus.

De Stratomatibus, atheromatibus & meliceridibus. Cap. XXXVI.

Quam abscessum generis & hae sine in hoc differunt, quod qui pro-
 prie abscessus uocantur, inflammati sunt ac dolorosi, atq. & erodenti
 humorem continent, & non in propria pellicula aut tunica continentur.
 Differunt autem hae inter se, quia hoc quod in stratomate continetur in-
 nota nominis ratio, seu simile est: quod in atheromate, pulsi ex frum en-
 to quod in meliceride, m. ellâ. Dinosces autem ipsa hoc modo. Stratoma alijs

Lenmifus

Struma
Choetadibus

Caronides
aut
fistulae
dentes
mores
mores

Stratomata
Atheromata,
Melicerides

durius est, & ad tactum remittitur, secundumq; solidius habet. Medicis autē tangētibz uelut corpus quoddam laxum cedit, & tardē quidem dissolu-
tur, cito autem rursus colligitur. At uero chirurgiam his similiter uelut strig-
mis adhibemus, in sectione, & excoriatione, & futuris, ac reliqua curatio-
ne, id modo ut uitemus, ne & pelliculam faciemus, eo quod contremus hu-
more effusus impedit chirurgiam: & ne partem ipsius relinquamus, quare
genera uolens plenumq; causa sit, circa manuum iuncturas, & malleolos, &
patres quae secundum articulum mouentur: quemadmodum etiam struma
si aut tota, aut pars ipsius relinquatur. Quod si tale quid relictum fuerit, me-
lus est non facere, sed erodentibus medicamentis relictā consumere.

De Arteriae dilatatione.

Cap. XXXVII.

Arteria dilata-
tio

Dilatatio arteriae, tumor est ad tactum mollior, & digitis cedens, ex sangui-
ne & spiritus generationem habens. Et Galenus de ipsa dicit. Arteriae o-
sculo aperto, affectio appellatur aneurysma id est dilatatio. Hae tamen arteriae
saueatae, ubi quidem incumbens ipsientis ad cicatricem deuenierit, manife-
ste uicem uulnus arteriae neq; conglutinae, neq; cicatrice obductae, neq;
carne obturatae. Cognoscuntur uicem huiusmodi affectiones, ex pulsū arte-
riae. Imo etiam ubi comprimuntur arteriae, tumor omnis disparat, subsi-
dit ipsa efficiens ad arterias recurrente. Haec Galenus. Nos autem ipsas
inter se distinguimus hoc modo. Quae ex osculi arteriae apertione fiūt, ob-
longiores apparent, & in profundo consistunt, & ad digitorum impressio-
nem, uelut strepitus quidam audiri, quum in affectionibus ex rupture
nullus sonitus audiat, & sine quoq; magis haec rotunda, & in summo oer-
currant. Quae igitur in alia, & inguinibus ac collo sumi, saepe in alijs locis,
si magnitudine excedunt, eas chirurgi non tentamus, ob magnitudinem
uulsi. Quae uero in extremis partibus, & amebis, aut in capite consistūt,
eas sic aggredimur. Si ex apertione tumor factus est, sectionem rectam in 15
graduum cursu insigimus. Deinde disparatis per hamulos labijs, uelut in
uulso excisione dicebamus excoriantes, & per apta ad hoc instrumenta
a membranis repurgantes, arteriam nudabimus, & acus sub ea transmi-
ssione, & per duo fila deligatione usi, ubi prius inter mediam arteriae partem
scalpello punxerimus, & quod consistit in ea euacuauerimus, suppuran-
teuratione utemur, donec deligamenta uiscula excidant. Si uero ex
arteriae rupture dilatatio facta est, totum ipsum quantum eius fieri potest,
una cum cute, digitis prehendere oportet. Deinde acum infra apprehen-
sam trahere, quae duplex filis trahatur post sectionē, ipsam duplici fili
ansa dissectare, & sic per duo fila tumorem hac illac deligere, uelut de
phylomate dicebamus. Quod si uisum, ne fila dilabant, erit alia acus trans-
missenda est, quae priorem per totum premit, similiterq; duplex filam
trahat, & ansa dissecta, sic per quatuor fila tumorem deligabimus. Aut aper-
to iuxta modum tumore, post excoriationem eius quod in ipso consistit,
cutem amputamus, eo quod deligatum est relictū. & splensomino ac oleo
imbuto imposito, curatione per linamenta utemur.

Prochoele
Pleuris gasta-
tio

De Gasteris tumor.

Cap. XXXVIII.

Tumor sit in collo magnus & rotundus ex internis partibus, qui bron-
chocele graecis, latine gasteris tam ex appellatus est. Differētia ipsius
duae sunt. Aliae a stomatia, aliae arteriarū dilatationes referūt. Quae igitur
dilatationes referūt, eas ex istis notis quibus illas cognoscemus, & uelut de
spertis reprobaui. Quae omnes arteriarū dilatationes sūt periculosam
aggressionē habent. Scipiam tamē quae circa collo consistūt, ob magnitudinē
arteriarū. Quae uero stomatia referūt, eas sūt uiscerum mota chirurgi tra-
ctabimus, discretis ac transgressis uis, eodem modo uelut de strumis dice-
bamus.

De Gasteris

Cap. XXXIX.

Gasteris

Ganglium uel in nodum coactio est, ex plaga aut laeore oborta, quae
plerumq; circa manuum iuncturas, & malleolos, & corporis cuncta quae
saepe

secundum articulum mouetur, consistit: fit tamen etiam in alijs partibus.
 A Consequitur tumor concolor, renitens, doloris exors. Si uero quis uolenter comprimatur, torpescit sensum exhibet, non in profundo, sed sub ipsa cute consistens, & a dila'tera quidem transfertur, prorsum ac retrosum nequaquam, etiam si quis per uim protrudat. Quare igitur in cruribus, aut brachijs, aut extremis partibus cõsistit, ea excidere tutum non est periculum. n. est ne multa pars fiat. Quæ uero circa caput aut frontem sunt, ea aggredimur, cutem scalpello diuidimus, & si quidem parua fuerint ganglia, uollicella ipsa præhendimus, & ex fundo recidentia. Si maiora, hamulis transfixa excoriamus ac amputamus, & labijs per funaras contractis, medicamento cruentis uulneribus commodo curamus.

De uena fistula.

Cap. XL.

Vener secunda modus etiam si omnibus in manifestus, tamen ut nihil quoddam chirurgiam pertineret, & propter artificiosos ipsius distinctiones, non citreobis negligendas. Primus itaq; uenæ sectiois scopus est redundans sanguinis euacuatio. Duplex autem sanguinis redundancia demonstrata est. Una ad uires, etiam si uenæ non plenè appareant, ob quæ cito debiles & infirmi sunt, quum natura grauitatem, ac ut onus quoddam ferre non possit. Altera ad continentia ipsam uenæ, quæ in ipsa sanguinis futura spectatur, etiam si uires citra molestiam ipsam ferant. Ex qua dum impuntur aliquando uas, sanguinis sputiones, aut alie fluxiones consurgunt. Redundantiam igitur ad uires, ex corporis grauitate cognoscere: ad uenas, ex distensione, & quodâ se repleta apparet. Ambæ uero euacuationem indicant. Proinde etiam in prima morbi die aliquando uenam secabis, si necessitas urget, sola ciborum in uenariculo concoctione, aut etiam perfecta in hepate sanguificatione expectata. Si uero ab aliquam causam, uenæ sectio ab initio non fuerit assumpta, etiam ultra septimum diem uenam secare non aliq'uid absurdum fuerit, si & necessitas exigat, & uires non repugnent. Considerare insuper oportet cum qui uenam secare uolet, num multum misericors sit in intestinis retentam, quod si est, mollispetus infuso per clysterem illud euacuamus, ac uenâ ab intestinis aliquam purgedinolam superfluitatum substantiam austrahat. Qui igitur ob præsentem morbum, sanguinis detractione opus habent, eis omni tempore uenam secabimus, uigore solum particulari exacerbatorem in febribus nitato. Si uero continis febris fuerit, omnino maturum tempus commodius erit. Qui uero morbo non præsentem, præseruationis tamen gratia, sanguinis euacuationem requirunt, his Ver commodum est. Ar uero in ætatis, usque ad annum de ceterum quorundam, euacuatio sanguinis recusanda est, quemadmodum etiam post sexagesimum annum, si non inuitabilis necessitas nos cogat: & in summa, qui debiliores uires habent uitandi sunt. In partibus itaq; recentis inflammatis, ex oppositis partibus euacuationem facere oportet. In diuturnioribus inflammationibus, ex uicinis. In multis equidem corporis locis uenam secamus, plerumq; tamen in ipsa cubiti insertens flexura. Verum attendendum est. Nam interne uenæ, quæ alaris appellantur, arteria subiacet: Medix nervus: Superna, humeralis etiam appellatur, penitus omni metu uacet. Et in morbis quidem circa caput, humeralem secabimus: In his qui sunt infra collum, alarem: Verique uero conuenit media. Oportet igitur partem aliquam circa brachij musculosa, angusta quadam scizta deligare, & per manuum frictionem mutuat, repletam uenam eam quæ necessitati commoda est, transuersim diuidere. secundum totam ipsius latitudinem solum. Nam maiora quam pro hoc modo uulnericula, magis cicatricem recipiunt: & quæ ualde angusta sunt, ad hoc et quod grossiora humoris transiunt impediunt, etiam inflammationem inducunt. At in quibus secunda die, aut tertia, quandoque etiam quarta, detractionem repetere uolumus, in his obliquis uenam secare oportet, quo in brachij flexura

Vena fistula

Sanguinis re-
dundancia du-
plexVena ex op-
posita parte
quando fecerit
Vena III. in
cubiti flexura
Humeralis,
Media,
Alaris.

xione hians, non cito cicatricem recipiat. Sic n. Antylo visum est. Cate-
 rum quantitas eius qui effunditur sanguinis, & virescens robore, & morbi
 magnitudine indicetur. Stigitur humoris multitudo subest, & materia fer-
 uet, licet ad animi deliquium usq; euacuamus, validis uidelicet adhuc vi-
 ribus, egroti non propterea quod humor ad stomachum defluxit, animi
 deliquium patiens: Nam hac de causa multas sanctas ob insulas, ante sufficien-
 tem euacuationem animo inquititur sed ratione euacuacionis, his animi de-
 liquium fieri oportet. Si vero multa quidem opus sit euacuacione, vires au-
 tem fuerint imbecilles, pariter euacuacionem oportet, & prima detractione
 defectu dolore facta, rursus si opus fuerit, & tertio dequibete. Euacuamus
 autem totum non solum in repletionis affectione constitutum corpus, ve-
 lut Galenus a. t. sed etiam ob magnitudinem affectionis, toto corpore in hu-
 morum commodatione constituto, velut in sanguinis ex naribus, aut ali-
 unde eruptione, quum non redundanti est quae profuit, etiam ex opposi-
 tis reuulsorio modo euacuamus. Imo etiam in vehementibus inflammatio-
 nibus, quemadmodum in colicis, & rheumbus ex calculo laborantibus, spi-
 ritibus hancq; & alia sunt morbis urgentibus. Nam dolor, & color par-
 tis inflammatae, caele sunt fluxionis, etiam si totum corpus non habeat su-
 perfluos humores. Tunc itaq; defectuosius hoc ipsam facere oportet, & ea
 euacuacione uti quae conuenire videtur etati maxime, & aegroti natura,
 considerando insuper etiam tempus, & regionem, & consuetudinem aegro-
 ti. At vero in quibus iuxta diuisam venam, inflammatio quaedam magna
 est, quemadmodum in pleuriticis & hepaticis, in his optimum est expecta-
 re sanguinis mutationem in colore & compage. Alia autem est singularis
 inflammatio, ab eo qui secundum naturam est. Nam dum amplius ex-
 lesa, si prius crudior erat, rubicundior & floridior euadit. Si vero talis prius
 erat, ad nigriorem colorem ad alium permixtus. Non tamen omni modo
 mutationem expectare oportet, sed aliquando etiam antes quam fiat, cessa-
 re conuenit, atq; hoc duplex de causa. Nam si iam aut ob vires debilitate,
 quam ex pulsum contactu cognoscere, inueniunt, ipsos inaequales in uhe-
 mentia & magnitudine, vel etiam obsecuros. Et fluxionis vigor labascens,
 debiles iam vires indicant, etiam ob inflammationis malignitatem. Quan-
 doq; n. nihil remissum, sed vehementer adhuc ista est. Aut si nihil horum impe-
 dit, & regre in vigore status fuerit, mutationem expectare oportet, & hoc
 eo magis si ambiens aer temperatus fuerit. Porro si sanguis ante sufficientem
 euacuacionem suppressus fuerit, id quod sit, apto ob similitudinem & animi de-
 liquium, aut ob grumum, aut ob violentam contractionem, ad singula hanc
 instabit inuasi & animi quidem deliquium, odoramentis renouantur: consir-
 ctionem uero, remisso uinculo laxamus: grumum autem oleo affuso, aut di-
 gnorum soto dissoluimus. Reliquas secundum uerum apparatus, omnibus no-
 tis est. Atq; hoc quidem in uenis flexu, & rubi competunt. Si uero a fronte,
 uelut in capitis doloribus, detractio fieri debet, solum enim prius adhibito, la-
 ta collum ipsi deligabimus, digito in pra gangra immisso, ut suffocacionem
 uitemus, & uenam in fronte repletam scalpelli uene incisori, aut alterius
 acie secamus. Eodem modo etiam singulares uenas in summa cute extantes,
 in hypochondriis diuersa secamus, per specilli concuum sanguinis effusio-
 nem facientes. Sed & sub lingua uenas, uelut in agnate affectione man-
 neris incidimus, usata contractione. Quidam etiam in magnis oculorum an-
 gelis conspicuas uenas, uelut in diuturnis capitis & oculorum morbis, eo-
 dem modo secant. In quibus etiam eas quae sunt nares sunt aut compres-
 sione per specilli caput, aut per asperas quasdam res irritando rumpunt.
 Quin & uenas retro aures, propter affectiones circa caput diu id sit. Aut eas
 quae circa poplitem sunt, in rheumbus affectis. Eas uero quae in extremis par-
 tibus sunt, ubi & superflui sunt partium uiscidit, & manuum contractio-
 ne, & pedum ambulatione repleuerant, secant, in sinistra quidem manu, in
 splente

Animi deli-
 quij causa in
 uenis sitione

Inflammationem
 uenarum singu-
 larem

Venae flexus
 solio

Venae sub lin-
 gua

Venae retro
 aures

A splenicis, eam quæ inter partium & annularem digitorum est: in hepaticis autem, eam quæ eodem loco in manu dextra est. Nam extremarum partium euacuatio, quum magis è longinquo fiat, efficaciorē reuulsionem facit. In pede uero, uelut in coxendicium morbo, aut in uteri affectionibus, superiorē interno talo uenam locant.

De cucurbitis. Cap. XLII.

Cucurbitas
non apte

Neq. in principijs affectionum, neq. dum repleta sunt corpora, cucurbitulis utimur, sed ubi totum corpus prius fuerit euacuatum, & nihil amplius insit parti, & opus fuerit aliquid mouere, agitareq. ac foras trahere. Leuis itaq. euacuita inflatione soluit, & stomachi flexiones sistit, & sanguinem attrahit, & eundem dilacerat, rursus sistit, stoppositis partibus adhibeat, & quod in profundo est, ad summam eorum educit. Et in summa, humorum quidem translationem, sanctorum autem euacuationem efficit. Quæ uero cum scarificationibus aliguitur, efficaciorē transpirationem, causis præbet, ea quæ adligunt exprofundo, ita ut sensu percipiamus, educens. Non. n. sanguinis solum, sed etiam aliorum humorum euacuacionem facit, & præterum si cū largiore flamma adhibeatur. Verum si de carnosis partibus detractionem facere uolumus, primò facia scarificatione, postea cucurbitam imponimus. Si uero minus cariosa fuerit pars, leuem cucurbitam prius agglutinabimus. Vbi uero in molem eleuata pars est, facia scarificatione rursus ipsam imponimus. Et si quidem parum uacare uolumus, una fissura contenti erimus: Si plus, plures incudemus. Et si tenuiorem consistentem sanguinem deprehenderimus, in summo scarificabimus: si crassior, in profundum, quam etiam grumos sanguinis ex plaga euacuare uoluerimus. Terminus autem moderate fissurarum profunditatis, crassius do sola curis est. Quidam instrumentum ad hoc excogitarunt, tribus equalibus scalpellis simul coniunctis, quo una aggressionē tres fissuræ instingeretur. Verum nos hoc inutile docentes, uno calpello utimur. Alij uitreis cucurbitis utuntur, eo quod euacuant sanguinis quantitas in ipsa attractione ex ipsa pellucet, sed magis trahunt aerem, amphorem flammam sustinentes, quam uitrea facile frangantur. Sed & qui per cornu ore surgentes attrahunt, minus quidem euacuunt, nihil autem resiccant, quemadmodum quæ cum flamma adhibentur, si opus fuerit. At ubi iam cucurbitam affigere uoluerimus, cresca parte figurata, ex latere ipsam agglutinabimus. Si. n. iacens ipsa funiculum lucernarum superne admouerimus, una cum flamma in cutem illabens euenienter urit, nulla necessitate hoc exigere. Quandoque uero etiam cucurbitæ magnitudo sit pro ratione subiectæ partis. Hac enim de causa etiam multe sunt cucurbitarum, iuxta partitalem & magnitudinem differentiæ: quemadmodum etiam aliquæ longiore collo, & ampliore ventre, sunt ut magis quam alie trahant. Cauendum autem est ne prope mammæ cucurbitam adhibeamus. Illabentes enim in t. ipsas, & quandoque inde intumescentes mammæ, faciunt ut ualde difficulter illæ uelli possint. Et tunc spongijs ex aqua calida cucurbitas circundare oportet. Ica enim remittunt. Si uero nequie remiserint laxate, iam perforare ipsas oportet.

De Alapstione. Cap. XLIII.

Alapstio

In humeri coarticulatione contingente luxatione, in quibusdam sepe & frequenter brachij caput excidit, aut ob redundantem humiditatem, aut quod ob assiduam eluxationē, loco huius uia facta est. Tunc igitur ad alapstionem decurrimus. Oportet itaque aut supino, aut in sinum lauis reclinato uergo, interiore maiore eum, qua parte maxime articulus excidit, duobus sinistræ manus digitis, aut uolucella distendere, & tenuibus ac oblongis ignitis cauterijs perurere, ita ut ex cauterio quod in aduersam partem pertrahi poterit, per unam aggressionem duæ cruræ fiant. Et si multi inter has fuerit spaciū, specilli capite per ipsas transmissi, aliam in medio cruram faciemus.

urentes donec cauteriū contingat specillum. Sed & alias duas crustas oculi fieri Hippocrates, ab utraq; parte medice relata, equali intervallo uelut illic distantes, iuxta quæ dranguli figuram. Profunditatem autem inuremus non altiores cute. Nervi enim & glandulae, & alia subiacent, quæ inflammationem & operis difficultatem inducere possunt. Curare autē oportet per poni cum sale trito impositionem, & per reliquam ad crustas pertinetem curationem. Et postea caute actiones per manus obducendas tractare.

De operationibus digitorum, et de pedibus.

Cap. XLIII.

*Digiti et
pedes*

A Gnalescuntur digiti circa manū, quandoq; prope magnos digitos, quandoq; iuxta paruos, raro autem circa alios digitos uili sunt. Qui uero ita agnalescunt, partim per totam carnosi sunt, partim etiam ossa in se habent quandoq; etiam ungues. Qui ossa habent, partim ab articulo exorti habent, in commensura ad articulum cum altero digito communicantes, partim ab intermedio enati sunt. Qui igitur ab intermedio, siue spacio inter articulos, enati sunt, penitus immobiles sunt. Reliqui quandoq; moventur. At carnosorum facilis est amputatio. Quicquid enim superuacuum est, per totū penitus scalpello resecimus. Eorum uero qui ab articulo exortum habent, difficilis est aggressio. At eorum qui ab intermedio enati sunt, carnem primū in circulum ad os usq; resecimus. Ipsam uero os excisione scalpello dillectamus, aut scissa amputamus. Deinde in curatione radimus ipsa, & cicatrice obducimus, quæ modo de uulneribus in ossibus diximus.

De chirurgiæ et aliorum suppurationum.

Cap. XLIII.

*Suppuratio
pectoris*

Efficacissimum auxilium pectore suppurata uisio inuenta est. Oportet igitur aristolochiam longæ radicem oleo imbutam, ipsa per ignita caute uisā, in crustas indere, quarum una inter clauicularū commissuram in uisā sit, secundum tracta cute, duæ uero parue, paululam ad incertum à suppurante reſeſcedendo, duæ sub manibus grandiores aliquanto, inter tertiam & quartam costam. Alia duæ inter quartam & sextam paululum nutantes, remotiores. Et alia in medium pectus. Brasia supra os uentriculi. Tres autē à tergo, una in mediis dorsum, & ab utraq; spina parte duæ, eam quæ in dorso est crustam transgredientes, non ita in summa cute. Alij uero, uelut etiam Leonides ait, cauterio olivari igni candefactio per intermedium costarum spacium, quæ paræ abscessum esse notarunt, usq; ad puri uisionem fecerunt. Quidam etiam chirurgia in his uisū uisauerunt, per medium quinque ac sextæ costæ, transversa sectione paululum suboblique cute diuisa, atq; ita per aequam cutellum membrana costarū contingente perforata, et pure excreto. Verum & hi, & qui per scissam in profundum discurrunt, aut scissam mortē inducunt, uisali spiritum acerrimum unā cum pure euacuat, aut fistulas in curabiles efficiunt.

De canore

Cap. XLV.

Cancer

Cancer tumor est inaequalis, asper, abominabilis, sublimis, dolorosus quandoq; absq; ulceratione, quem etiam oculis Hippocrates nominauit, qui etiam ex chirurgia deterior oradit: quandoq; uero ulceratus. Nā ex atra bile generationem habens, plerumq; totionem perperitur. Et in pluribus quidem corporis partibus consilii, maxime uero circa uentri & in diuinis in mulieribus. Habet aurem & uenas undiqueq; excentes, uelut animal cancer pedes, unde etiam nomen ipsi inditū est. Curationē equi de ipsius per medicamenta, in quarto libro sufficiēter diximus. Erus uero qui in utero consilii, libro tertio. Quando quidem uero corpora putrefacta, aut simpliciter à naturali fluxu digesta, ailationē expetunt, eos caneros qui in utero consilii, ut chirurgia tentemus, fieri non potest, neq; conducibile est. Proinde eorum qui in externa partibus, & precipue circa mamma sunt, chirurgiā trademus. Quidam igitur cauteriis totum id quod credundū consumit. Alij tota mappa excelsa urunt. Galenus chirurgiam per sectionem solum affert, hoc modo sentiens. Si tamen aliquando a uisū fueris per chirurgiā curare canerum, ab iracundia humoris purgatione euacuare incipe. Deinde

totam affecta parte exacte resecta, ut nulla radix relinquantur, sanguinem effluere sine, & non cito cohibere, sed etiam circumsitas uenas preme, crassum sanguinem ex ipsis exprimere. Postea similiter uelut alia ulcera cura. Hæc Galenus. Sed & reliqua maligna ac putredinosa ulcera, phagedænas, & gangrænas, & confusilla, eodem modo per chirurgiam aggrediemur.

*Phagedæna
Gangræna*

De Tergibus mammae in abra,

Cap. XLVII

QUemadmodum in foeminis, ita etiam in masculis, circa pubertatis tempus, mammae aliquantulum inurgescunt. Verum plerique rursus subsidunt. In quibusdam uero in isto sumpto augescunt, adipem subbenascentem. Hæc itaque res quam effeminatæ naturæ opprobrium afferat, chirurgiam merito requirit. Proinde lunata sectione in internam mammæ partem facta, & excoriatione sequenti, pinguedinemque detracta, summa oras committimus. At si forte ob magnitudinem mammae suis partibus deorsum, uelut in foeminis, nunc, duas lunares sectiones iuxta extremitates sese mutuo contingentes incidemus, ita ut minor à maiore comprehendatur, & intermedia cute excoriatæ, ac pinguedine detracta, similiter suturis utamur. Si uero aberrantes minus resecuerimus, ea parte quæ reddat rursus amputata consueumus, & medicamentum crassius uulncribus destinatum imponemus.

*Mamma uero
non tergitur*

De periti uisione,

Cap. XLVIII

Si cum gravitate dolor fiat his qui in hepate abscessum habent, carnosus ipsius pars affecta esse indicatur. Si uero acutus est dolor, in tunica magis pus est, & uestitionem sic facere oportet. Cauteris tenuis cisterna exacte candefacta, paululum supra inguen ad sinem hepatis immittimus, unam crustam incutientes. Perusta uero tota cute, & ad tunicam usque perducti, pus excernimus. Post cuius evacuationem, lentigula cum melle uti, medicamentum ex aqua mulla & incensantibus speciebus, postea uero etiam cicatricem inducensibus, utemur.

Periti uisio

De splenis uisione,

Cap. XLIX

Cum spleni incumbente per hamulos dilenta, longo candenti cauterio per totum ipsam penitus perurimus, ita ut una aggressione duæ crustæ fiant. Atque hoc tristiter facimus. Ut omnes crustæ sex fiant. Aruero Marcellus tridentis, aut cauterio tridentis formam habentis utens, una aggressione sex crustas inurebat.

Splenis uisio

De stomachi uisione,

Cap. XLIX

In diuertiis stomachi fluxionibus luniores uestitione uti sunt. Brasii quidem olisariibus cauteriis res crassas incutimus. Unam in cartilagine gladii referentem, alteras duas infertius, iuxta triangularem figuram, ea profunditate ut totam cutem perurant. Alij uero unam solam faciunt, eamque maiorem, iuxta ipsum uentriculi osculum. Quidam neque ferro urunt, sed sciti uocatis. Sunt autem istæ spongiosa quedam corpuscula, in querebus & nactæ regi arum arboribus nascentia, quæ Barbari magis in usu habent. Viscera uero aliquæ diu sinunt, nec cicatricem ipsa inducunt. Imò magis insuper ipsa hancinant, quo ob multum per ipsa exhalationem, os uentriculi fluxione non infestetur.

*Stomachi
uisione*

Quæ quid sit

De hydropi,

Cap. L

QUum hydrops fluxaque inter cutem constitutionem, & quot huius sint differentiarum, & quæ causæ, cognitionem item, & per medicamenta curationem, tertio libro tradiderimus, & in illo etiam antea ostenderimus, quod solus Aesculapius hydrops chirurgiam admittat, hanc nunc tradituri sumus. Eredimus itaque statuemus hominem, si minus id fieri possit, in sella collocaemus. Si uero neque hoc fieri possit, reguenda est nobis chirurgia in eo qui ad ranciam debilitatem deuenit. Stante itaque erecto homine, sub huius minimis tunc à tergoleptis stantes, ut tumores molles per manus comprimamus, & deorsum ad pedinem protrudant. Nos autem accepto cultello acuto, aut uenæ incisionis scalpello, si quidem à partibus circa inceslina hydrops obortus est, iuxta perpendicularum umbiliculi, tribus sub ipso digitis interpedibus, ab dor-

*Hydropicæ
fistula*

ad

ad peritonaeum usq[ue] appellatam membranam dissecamus. Si uero hepate pri-
mario affecto, ex sinistra umbilici partibus secamus. Si à splene, in dextris.
Non emulsecanda est ea pars in quam aeger decumbere debet: & excoriata
per instrumenta ei incumbente paululum supra priorem sectionē,
etiam ipsam peritonaeum membranam dissecamus donec ad duorum locū
scalpellum peringat. Postea uero arcuam fistulam, quā ad calami scriptoris
sinistram finem excelsis, & per abdominis, & per peritonaei sectionem de-
mittimus, & per ipsam humorem educimus pro uiribus moderatam, quā
ex pulsus contactu cognoscimus. Deinde educta fistula humorem sistimus.
Sedens enim statim eo alteram illam factā sectionem. Sed & nos securita-
tis graui, linamentum interius per solam abdominis sectionem demittimus
& reclinato ac resocillato homine, postea die rursus partē humoris pro ui-
rium ratione, per fistulam euacuabimus, acq[ue] ita consequentibus deinceps
diebus, donec quā minimum ipsū undiquaq[ue] relinquatur, acerrimam &
uariationem cauentes. Multi enim ex imperitia rem bene tractare cupidi,
unā cum humore etiam uitalem spiritum acerrimè euacuauerunt, acq[ue] ita ho-
minem occiderunt. Ceterum qui magis securitatis curam habens, modica
humoris per chirurgiam factā euacuatione, quo uires saltem à grauitate le-
uentur, reliquum per medicamenta aquam ducendā, & per arcuam, solem,
litm, & siccanda alimenta consumunt. Quin & uisione quidam uisunt, an
stomachum, hepate, splenem, inuē uentrem, & umbilicum, quinq[ue] eruitas
inuentes, alij ferretis tenuibus cauteriis, alij per ilicas appellatas, ut per alia
quandam eiusmodi materiam. Et multi sanè hac ratione magis sanati sunt,
aliquando penitus nulla facta perpunctione.

De umbilici prolapsu.

Cap. LII.

Vulsi scripto
legis

Vmbilici prolapsus fit aliquando rupta iuxta illum peritonaeum membra-
na, & aut omento, aut intestino prolapsio: aliquando uero lenis humo-
re sub umbilicum collectio, quandoq[ue] aut caue subter excrecente, & quan-
doq[ue] sanguine eo collato, obtinetur aut arteriarum ruptionem, uelut in arteria
dilatatione, quandoq[ue] non sanguine, sed spiritus solū illic collectio. Si igitur
omentum totas prolapsus fuerit, tumor circa umbilicum concolor, ad ta-
ctum mollis, doloris exors, & inaequalis apparet. Si uero intestinum, supra
relata etiam amplius inaequalis, & ad digitorum compressionem disparens,
quandoq[ue] uero etiam strepens, & ex balneis ac distentionibus magis auger-
scens. At si humor fuerit, mollis quidem similiter est tumor, sed ad compres-
sionem non cedit, neq[ue] minuitur, neq[ue] augetur. Si uero sanguis, ad praedicta
signa, tumor etiam liuidior fuerit. Carne uero subter enata, durior & reuulsa
erit tumor, & in eadem magnitudine permanens. Qui uero spiritus inflatio-
nem illic collectam habent, his mollicies ad tactum adeit, & sanus quidē
sequitur ad pulsationem, & disperet ad compressionem. Hoc igitur modo
chirurgiam adhibebimus. Erectū hominem subebimus, ut spiritus suppressio
seipsum distendat. Deinde tota umbilici prominētia circū circa stramento
scriptorio notata supinū locabimus, & antea notas factas, tumore scalpello
circūscindimus. Postea media parte per hamulos distēda, sili aut cho-
dam scarificationis circūdabimus. Sic enim retrahitur non distēbens, ansa-
to nodo connectione facta. Deinde contractio tumore circa uenientem aper-
to, indicem digitum demittimus, diligenterq[ue] peroraturabimur, anne aliqua
intestini conuulsio, aut omenti pars simul fuerit contracta. Etsi quidē in-
testinum fuerit id quod contractū est, ansato sili nodo haxato, ipsum intro
compellemus. Si uero omentum fuerit, hoc utraque quantum eius super-
uacui fuerit resecta mus, sili diligantes uelut par est, si quod uas intercur-
rat. Postea acceptis duobus acubus simplex silium ducētib[us], iuxta Chra-
sum, hoc est ad littera graece. χ figuram, ipsas per factam scarificationem
transmittemus. Ex dissectis siliorum ansati nodi similes, uelut in uena dilata-
tione dicebamus, ex quatuor principia contractionem faciemus. Post quā

quere

Nodus scripto

Chiasma

Auero computruerint ac exciderint corpuscula filia deligata, linamenta eorum ductu cura binus, ut cunior elatrx fiat semper studio habentes. Anghied quidem omento aut intestino affectionem indocentibus adhibemus. Si uero caro, aut humor, aut sanguis, affectionis causa fuerit, in media tumoris parte circum circa ablata, & quicquid extra membranam peritonæon, iuxta umbilicum in finem est, eo educto, iuxta concanationis modum curationē faciemus. Ceteram affectionem prolapsi umbilici, ex arterie dilatatione, aut spiritus interlapse obortam, repudiamus, uelut etiam reliquas arterie dilatationes.

De peritonæi membrane saluere. Et de intestini aut omenti prolapsu, in quo etiam mater ferendi uentris. Ex Galeno. Cap. LII.

Quomodo qua uulneram peritonæon membranam optime tractare, Peritonæi mē-
consequenter considerandū est. Si igitur parū fuerit uulneris, ut pro- bra uulneris
lapsum intestinum inflatum non amplius reprimi possit, necesse est aut fla-
tom enacare, aut uulneris manus efficere. Melius autē esse puro peritis sibi
facere, si fieri possit ut id assequamur. Quomodo uero quis hoc magis asse-
qui possit, si causam ex qua intestini inflatur amoueatur. Quæ igitur est hæc
ambusis aeris frigiditas, quare etiam per calefactionem sanatio contingit.
Spongiam igitur mollem a qua calida imbuiere oportet, deinde exprimere,
& per ipsam intestinum calefacere. Interim uero præparatur uisum a uulnere
rum calidum. Nam et calidius magis quam a qua, & intestino robur indit. Si
uero ab horū uisū, intestini adhuc permanferit inflatum, tamen de peritonæo
incidere oportet quantum opus habet id quod prolapsū est. Ad talem au-
tem sectionem comoda sunt fistulis secandis apta instrumenta, syringo-
toma recta appellata. Comoda est etiam ægro, uulnere in inferius partib.
facto, figura de cubiti furum uergens in supernis, deorsum; & in dextera
parte facto uulnere, in sinistram reclinari, & uicissim in sinistram, in dextram.
Atq; hoc cum magnitudo parui uulneribus commune est. Verum intes- B
torum repositio ues in propriū locum, in magnis uulneribus, ministro ad-
modum perito opus habent. Oportet enim ipsam suis manibus foris eus
apprehensum totum uulnus intro contrahere ac constringere, ita ut semper
exiguum quid sicuti denudet, & sanē etiam id quod confutum est modera-
te adstringat, donec erasit fuerit totum confutum. Quis uero sit modus su-
radu uentris ad huiusmodi idoneus, deinceps dicamus. Quando quid em
abdomen cum membrana peritonæo concretere oportet, ac ues initium
sumendam est, ac ues ab externa parte intro transmissa. Vbi uero cutem & mu-
sculū rectum totum penetrat, membrana adiacente præterita, transire
acum ab interna parte per reliquam membranam oportet. atq; ita hinc ab
internis extra per alteram abdominis partem transire, & ubi penitus, per-
transiit, rursus ab externis intro per hanc abdominis partem transmittere,
& adiacente ipsi membrana præterita, & ad oppositam membranae partem
translacione facta, ab internis extra ipsa perungere, & simul cum ipsa etiam
proximum totum abdomen. Deinde ab hoc rursus initio factū, ipsum cum
opposita membrana conuere, & postea per proximam eam extra tran-
smittere; illinc uero rursus intro transigere, & cum opposita membrana con-
suerere, ac per proximam eam extra transmittere; & hoc iterum atq; iterum
repetitis uicibus facere, donec totam similiter consuerimus uulnus. Inter-
uallum autem siue rarum, quantum ad constringendū subiecta attinet, bre-
uissimum esse debet, quantum uero ad hoc, ut cutis inter suturas infra facta per-
maneat, breue interuallū non est commodum. Fugiendus itaq; est uniusq;
excessus, & quod moderatum est, eligendum; iam uero & hoc commune
quodammodo omnibus ulceribus est, quemadmodum etiam ipsius fili com-
pagis. Quod enim durius est, eum si perit quod mollius, ipsū prius nun-
petat. Eodem modo etiam propinquissime ad summa labra acum transire,
facit ac cogit ut cutis quæ paucissima restat, plerūq; rompatur. At si multa
sit

se comprehensâ, angustias permittet. Atq; hæc quidem etiam si omnibus ulceribus communia sunt, maxime tamen in ventris fisione utiari oportet. Erat uelut antea dictum est facere, coniectura habita ut abdomen cum peritonæo concresecet, eo quod quam neruosum sit, uix concresecat. Aut uelut aliqui faciunt, ea quæ secundum naturam cognata sunt in se contrahere, peritonæum cum peritonæo, abdomenq; cum abdomine. Id quod hoc modo fit. A vicino nobis abdomine scilicet transire oportet, ab externa parte intro, per ipsam foram, & ambobus peritonæi labijs transgressis, rursus acum conuenire, et ab externa parte intro, per ambo peritonæi labia transire. Et deinde rursus conactam, ab internis extra, iuxta oppositum abdomen transirere. Hæc modus à communi illo & uulgato, quo per quatuor labia, una aggreSSIONE contrahitur, differt: quod peritonæum membranam intra abdomen exte-rius occulit. Cæterum in edicamenta comoda sunt eiusdem materia cum his quæ erascentis ulceribus competunt. Quo uero mala ex principalioribus partibus coactantur, lauam tunc moderato oleo calido imbutam, per totum spatium inter inguina & alas, circumdare oportet. Præstat autem idem oleum calidum per chyliterem intestinis imminere. Si uero etiam ex intestinis aliquid fuerit uulneratum, uindicta id quod immittitur nigrum, aut serum, sepi dum atq; hoc magis, si totum fuerit perforatum ad intestinum usque meum. Facilia igitur curantur sunt crassa intestina, tæ- grè uero curantur tenuia. Penitus autem incurabile est scilicet cum, cum propter multitudinem ac magnitudinem uulnorum, tum propter tenuitatem ac nervositatem tunicae. Sed & bilem puram omnem excipiat, & uiciniſſimum omnium est hepatis. At uero infernas uentriculi partes, carnosas illas, tentare oportet ut curemus. Fieri enim potest ut succedat, non solum quia crassiores hæc sunt, sed etiam quod curantibus medicamentis facilius sedes eo loco contingit. At uero uulnera in ore ipsius uentriculi ac stomachi, transita solum medicamenta contingunt. Sed & his quæ in ore ipsius sunt, sensus subtilitas aduersatur, quo minus curantur. Quam uero peritonæo rupto, omne tum proident, & aut si uidetur, aut nigrè factum fuerit, parte ea quæ ante nigrescit est laqueus conficta, propter erupcentis sanguinis periculum, resecare oportet eam quæ post laqueum est, ita ut a diuersiſſimo finem conſultationis, laquei inania loca propendeant, quo facile excipi possint, ubi super puras uulnera scicta fuerint.

De præparato uento.

Cap. LIII.

Propositi-
onem
curam

IN quibus parum quiddam est curi padendi, quidam de coris reparandi causa, duplicem chirurgiæ modum excogitant: quandoq; quid em circapsiendi initium superne contemplantur in orbem, quo soluta continuitate, uari deorsum trahunt, quo uisq; glans fuerit coniecta quandoq; uero scalpello subexcoriantes iuxta internam partem, circa glandis radicem. Deinde decorsum trahentes. Et postea molli quodam lineo præputium obligantes: nimirum linteo quodam in medio interposito iuxta factam excoriationem, quo præputium cum glande non concresecat. Hunc modum Antylus magis probat, latius ipsam exponens. Nobis autem summam solum artemingere satis esse uisum est, eo quod in artu operibus nobis talis chirurgiæ requiratur, quæ neq; functionis aliquam difficultatem hæc affectus inducat, neq; ita decore nictet, ut huius chirurgiæ commentum subire quis sustineat.

De hypospadi.

Cap. LIIII.

Hypospadi-
con-
positi
glans
preparat

MVLtis ex nativitate glans non est perforata, sed sub appellatione canebubi glans abloclatur, foramen est. Atq; hinc neq; minge- e in aneriori partem possunt, nisi ualde ad pedunculum membrum refrigerint, neque liberos generare, quia semen ipsos in directum etiaculari in uterum non coniungat. Itad hæc non uulgare dedecus affert hæc affectus. Simplicissimus igitur & periculi maxime exors chirurgiæ modus fit per resectionem. Oportet atq; affectum reclinare supinum, deinde glandem per sinistram manus digitos for-

titer

aliter extendere postea glandem scalpelli acie circa coronam amputare, non obliqua facta resectione, sed quæ similis sit sculpturae circumcirca factæ, ita ut in medio eminentia quædam apparet glandis similis. Quandoquidem vero forte sanguinis eruptio contingit, si quidem fieri poterit, per sanguinem sistita ipsam sedabimus: Sin minus, unctione per remedia ferramentis utemur.

Duplex, seu præputio circa glandem contractio. Cap. LV.

DVplex phimosis id est præputij circa glandem contractio causa est. Phimosis
Quandocumque præputium intra intexit glandem, ut rursus detrahi non possit. Quandoque retro abductum, non amplius induci potest: quæ species proprie paraphimosis appellatur. Prima igitur differentia sit, aut ob cicatricem in præputio factam, aut ob carnis accretionem. Secunda vero in purgendorum inflammationibus efficitur, quæ ab ducta remota cute glans intumuit, & non amplius præputium admittit. Si igitur prima contractio, nisi species fuerit, chirurgiam adhibebimus, hoc modo. Postquam hominē prout convenit collocavimus, attractio præputio in anteriorem partem, ha mulas tres aut quatuor in lumen ipsum immittimus, eosque minimis tenedon dabitur, & quantum fieri potest, extendere ac aperire ipsum iubebimus. Postea si ex cicatrice externa contractio facta fuerit, scalpello scissio, si venarum apto, aut cultello aculeato, ex internis partibus præputium dividimus, in tribus aut quatuor locis, iuncta internas partes sectiones facientes in directum extensas, & æquali spatio inter se distantes. Est autem duplex circa glandem præputium. Oculum igitur interius in ipso parvis dividemus. Ita enim contractionem ex cicatrice oborta exoluit, præputium abducentius. Si vero caro ex internis partibus agnata, contractionem effecerit, detractio præputio in omnem carnem scarificationes faciemus, & emittentes intermedias carnis inter impacta vulnuscula derademus. Postea vero plumbeam canalem papyro sicca obvolvamus toti glandi circumdabimus. Paraphimosis
Sic autem canalis undique æqualiter expansus. Sic enim propter canalis circumpositionem, præputium prohibebitur, ut ne rursus inductum concresecat, ut quod præ plumbo, & obvolvula papyro, distentum conseruetur. Papyrus enim ex irrigatione intumescens, cutem adhuc magis distendit. Hoc igitur facimus, siue propter cicatricem, siue propter carnis accretionem, contractio fuerit facta. Si vero paraphimosis dicta fiat, & in se terata fuerit, concresecit & incurabilis est, non velut in præputio cunctis, qui quis velit. At si nondum oculaverit, in directum factis vulnusculis tribus, aut quatuor, aut pluribus, & oleo calido multo affuso, ad externam partem ipsam attrahemus.

De contractis cuti glandis præputio. Cap. LVI.

VLceratione circa glandem aut præputium prægressa, circa utraque fit concretio ut cohereant. Oportet igitur subex cortare, & quantum eius fieri potest, per scalpelli, aut cultelli polypsi excidendis apti aciem, retinacula exolvere conari, & maxime quidem glandem à coherente præputio pure secernere. Si vero difficile hoc fuerit, magis aliquid de glande ad præputium assumere, quam vice versa. Quam enim tenue sit præputium, facile perforatur. At post exolutam concretionem, tenue lincum a qua irrigida madefacta, inter glandem & præputiū interpônatur, ut ne rursus concretio fiat, & adstringenti vino adhibito cicatrix ipsa inducatur. Præputium cum glande coherens

De circumcidendo. Cap. LVII.

Non de his qui gentilis religionis more circumcidantur, nunc nobis sermo est, sed de his quibus ex pudendi affectione præputium negrecit. Circumcisio
Oportet itaque totum id quod demigratum est in ipsa, in orbem dividere. Postea vero squama græ cum velle ostendendum est, aut etiam malicorio & erio, ad modum eorum quæ linamentis excepta indantur. Si vero sanguis eruperit, lunatis cauterijs utendum est, ad utranque rem conferentibus, ipsam quoque sanguinis eruptionem, & vulnus depascendo prosequemur. Si vero so-

in glans aliquando fuerit consumpta, plumbeco canali in meatum indito, ut
rinat per ipsum reddere inbecillitas.

De Thymi & palato.

Cap. I. VIII.

Thymi palato
dorum

Thy mi carnosae sunt emincinae, quandoq; in glande, quandoque in pre-
putio cōsistentes. Et ex his aliqui sunt maligni, aliqui nō. Nō Malignos
igitur scalpelli acie deradere convenit, & chalcidum inspergere. In mali-
gnis autem post ablationem ulsione utendum est. Si uero alternatim oppo-
siti in preputio Thy mi sunt, alij intra ipsam alij extra non omnes simul ag-
gredi oportet, ne preputium quod tenue est, non audiamus rēentes dissec-
imus. Verum primum interni auferantur, & post indeortam ipsa cicatricem,
etiam externos aggrediamur. Quidam ex recensionibus facillē perfectos
seia equina obligatos, ipsos curant: quomodo modum alij frigidō con-
terio ipsos adurunt.

Catheteris
figula

De Catheteris, & infusū in uessica in uessica.

Cap. I. IX.

Catheteris
figula

Syperstilla uisina in uessica, propter obstruccionem aliquam, uelut ex con-
creta sanguinis grana, aut ex calculis, aut propter aliam quandam cas-
sam, catheteris siliū ulz immessione utemur, ad recemēdū urīnē educationem.
Accepto igitur statu, & generi congruo cathetere, ipsum preparabim⁹. Pre-
parationis autem modus talis est. Lanam modicam per siliū in medio deli-
gatus, & filo cum iunco aceto per catheteris fistulam transmissio, lanā fora-
mini quod ad catheteris caput est adaptemus, & extra emicantib. lanae par-
tibus forcipe persequē, catheterem in oleum immittimus. Aegrotō uero in
sede collocato, & cum fomento prius, si nihil impedit, rigato, acceptum ca-
theterē immittimus, primum in directum usq; ad colū fundū. Et postea pe-
dendum ad umbilicem restringimus: Nam ab hac parte obliquus est ue-
sicę meatus: atque ita catheterem ulterius admouemus. Postquam uero ad
interfemineum prope sedem penetrerit, rursus pedendum insilio instru-
mento recto, ad figurā naturalem reducentes. Nam ab interfemineo
uessicę meatus siliū tendit, & catheterem propellimus, donec ad uicem
uessicę spaciū perueniat. Postea uero insilio in catheteris fistula siliū attra-
himus, quo unū cum lana attracta, urina sequatur, quomodo modum in siphō-
nibus contingit. Talis est immittendi catheteris modus. Quandoquidē me-
ro saepe opus habemus ut uescicam uescicam cultuamus, si uniculares
chyliferes insilium transmutare possunt, ipsa uemur iuxta prædictum mo-
dum eos immittentes. Si uero per hos fieri non poterit, corio, aut uescica
habula, ad catheterem adaptata, per immassam catheteris fistulam in-
silium immittimus.

Uessicam
figula

De Calculo.

Cap. I. X.

Calculorum
generatio

Calculorum generationis causam, & quod pueris quidem magis in ue-
sicis, uero prope uessicam in albenibus calculi generantur, hæc sunt quum
alibi docuerimus, nunc ad calculorum excisionis modum deueniemus, ubi
signa prius calculorum in uessica exposuerimus. Vrinum igitur excretio
aqua ipsa consistit, & subsidentia arenosa in ipsa, & dem assidue pruri-
m, pudendum lacerat, & nullus prater rationem incedit, eo quod ip-
sum assidue conuertitur humantur, & praeterimpert. Si uero in ues-
icæ collum calculus incidit, colū urina derepente suppuratur. Ceterum
ex his quibus calculi excitantur, pueri quidem usq; ad decimum quantum
annum facile curant, propter corporum mollitudinem. Senes autem dif-
ficiliter, eo quod ulcera in corporibus ipsorum ægrè sanentur. Mædici inter
has ætates, etiam in hoc mædio modo se habent. Et rursus facile curantur
qui maiores: alios habent, quia inflammationibus aduersi sunt difficul-
ter autem qui maiores, ob contrariam causam. His ita se habentibus, ad
excisionem deuenientes conuulsione utemur prius, per ministro quando-
que, & aliquando etiam ipso ægro ab alto quopiam deliciente, quo calcū
ad uescicæ collum subducatur. Deinde collocabimus ipsam ita ut erigatur se-
deat

A deat, & manus ad femora sua habeat, quo ad exiguum locum uelica decur-
 rat. Si igitur ad contactum nostrum foris eus iuxta interfemineum, inter
 anam & podendum calculus occurrat, præ cōcussione elapsus, tunc statim
 ad chirurgiam nos conuertimus. Si uero non occurrat, indice similiter ma-
 nus digitum, si puer fuerit agrotus: aut etiam medium, si adulescor fuerit, o-
 leo cōstitum in sedem immitemus, & supēns digitis perscrutemur, ubi oc-
 curret, præsertim ad uelicæ collum transferentes ipsum coarctabimus, &
 digito aut digitis foras protrudimus ipsum impactum, iussuq; ministro ut
 manibus uelicam prenat, alterum habebimus ministrum, ut per dextram
 manum testis sursum tendat, altera uero interfemineum distendat in al-
 teram partem ab ea in qua sectio est faciēda. Nos autem accepto instrumēto
 menso excidendis calculis idoneo, inter sedem & testes, non iuxta medium
 interfemineum, sed ad alteram partem, ad sinistram namq; obliquam sectio-
 nem faciemus, in ipsa occurrentem lapidem secantes, ita ut sectio exten-
 secus ampliitudinem habeat, intrinsecus autem non amplius, quàm ut lapis
 per ipsam excidere possit. Aliquando enim per intumescitū digitorum aut di-
 giti circa sedem, simul ut sectio facta est, etiam citra extractionem, lapis pla-
 cide exilit. Si uero non exierit, extractionem per instrumētum ad hoc
 paratum faciemus. At uero post eductum lapidem, sanguinis eruptione per
 puluillus sanguinem sistentes, & manta thoris, & alba, & symphyta, aut e-
 ritam masy ac similibus sedata, lanas aut lintea complicata uino & oleo im-
 buta imponemus, & calcularijs siue sena crura habentibus deligationibus
 utemur. Si uero sanguinis eruptionis tumor imminet, linteam complicar-
 tum ex polca, aut soluto cum aqua imponatur, & reclinato agrotō fre-
 quētius madefacimus. Tertia uero die facta solutione, & aquæ ac olei mul-
 ti affusione, cataplasma ac o linamentis ex cepso utemur, ita ut lapius ipso
 soluiamus ac curemus, propter uerine acrimoniam. At si inflammatio ali-
 qua succedat, cataplasmati & perinsectionibus ad hanc commodis utemur.
 Et in quacumq; rosaceum aut oleum chamæmelidum, aut buryram immitte-
 mus, si non inflammatio aliqua nos prohibeat. Similiter uero etiam si ser-
 pendō depascens, aut alijs quomodocumq; malignis ulcus fiat, ad singula
 convenienter instabimus. Postquam uero ab inflammatione liberum est ul-
 cus, facta ablutione, emplastro ex succis ad lumbos ac in uentrem, ute-
 mur. Per totum autem curationis tempus, femora simul uincire oportet,
 quo auxilij adhibitis inferians. Porro si paruas sit calculus, & in colem in-
 cidat, & per urinam effe non possit, præputio in anteriorem partem uehe-
 menter attracto, ipsum ad summam glandem deligabimus. deligabimus et-
 iam retro pudendum ipsum colem, ad finem qui ad uelicam est constructio-
 nem facientes, & postea inferne colem ad ipsum occurrentē calculum secar-
 bimus. Inflexo autem cole lapillum eiciemus, & exolutis uinculis, uulnus
 à sanguinis grumulis mandabimus. Eruinculum quidem retro obligatur, ut
 ne calculus retroorsum recurrat. In anteriore autem parte, quo post extractū
 lapidē, dum deligatum præputium exolutur, recurrens cutis sectionem
 factam contegat.

De Corporibus circa testes.

Cap. LXL

Q Vum corpora circa testes, ad hernias secandi doctrinam conferant, & de-
 finitiones ipsorum prius adscribamus. Ipse igitur testis substantia est gla-
 dulosa & instabilis ad gignendi sensus facultatem facta. At Adhærentes qui
 & cremastæres appellantur, neruosi exornati sunt, ex membrana medullæ
 doli, cum uenis arteriis ad testes pertingentes, per quos feminis ad pu-
 dendum emissio contingit. Vasa uero seminaria uenæ sunt, quæ à uena
 cava ad testes pampiniformiter inflexæ seruantur, per quas testes nutri-
 untur. Rubicunda tunica est natura neruosa, quæ iuxta globam partem, &
 ante testem absoluta est: iuxta causam autem partes, & retro testis adhæret,
 experitioris membrane tunica ortum habens. Hanc autem partem iuxta

Testis Affe-
 ctio
 Adhærentes
 Cremastæres
 Vasa semina-
 ria

Tunica Rubic-
 unda

ut a quam

Darti pellicule sunt quoniam testis adhaeret, polliciores accretionem nominant. Darti vero pellicule sunt extrinsecas cutem ad rubicundam tunicam agglutinet, & ipsi adherentes, qua parte etiam illa testis testibus adheret. Arrugosa illa extrinsecus cutis testibus circumdata, Scrotum appellatur.

Scrotum

De Scroti aequo.

Cap. I. XLII.

Hernia aquosa si hydrocele.

Silennus humor circa partem corporum scrotum peritæum colligitur, & tumorem testis expositum efficit, hydrocele, id est hernia aquosa, affectio nominatur. Confluit igitur plerumque humor in tunica rubicunda circa testem in anseriore parte, ubi maxime rubicunda tunica à testis separatur. Raro vero in partibus extra rubicundam tunicam affectio confluit. Scrope autem in propria tunica humor conuenit, & hanc affectionem chirurgi in supergenita tunica appellare solent. Si igitur ob prægressam causam, velut est partium debilitas, affectio confluit, sanguis qui adiment ratione affertur, in aquosam aut serosam lentam substantiam transmutatur. Si vero ob plagam, sanguinea aut seculenta essentia continetur. Commune igitur signum est tumor doloris exors, durans circa scrotum, qui iuxta nullam occasionem euasit, sed eodem quidem in his qui modicum humorem habent non autem cedat in his qui multum. Et in quibus quidem in tunica rubicunda confluit humor, hic tumor est fere rotundus velut ouum. Atque his testis oculus est, ut qui undique circumluitur. Si vero extra tunicam rubicundam, sub pelliculis dantis dictis fuerit, per parua corpora occurrit. At si in supergenita tunica humor confluerit, propter collisionem ac conglutinationem undique contingentem, tumor aliteris testis imaginem præseferat. Eni quidem aquosus fuerit humor, concolor tumor pellucet. Si vero seculentus aut eruentus, rubicundus aut luidus apparet. Si vero in utrisque

Tumores supergeniti

Hernia genita aut

scroti partibus signa hæc comparuerint, hos geminata hernia correptos esse scito. Ceteri chirurgi tam hoc modofaciunt. Denudata pilis pube & sero, si non puer fuerit, hominem supinum in lectum reclinamus, ita ut testibus linteum multipliciter complicamus, scroto uero spongiam magnam subiiciamus. De ex sinistris acri sedentes, ministrum à dextris ipsius acri se dextrum subemus, ut & pudendum in alteram partem distendat, & scroti cutem ad abdomen extendat. Nos autem accepto scalpello scrotum diuisimus à medio exorti secundum longitudinem, propemodum ad pubem usque, resecta sectionem facientes, similem & appellum et lineam quæ scrotum in duas partes secat, diuisione ad rubicundam usque tunicam progredientem. Si vero in supergenita tunica sit humor, qua parte aperimus, eius tunica significatione de se præbet, ea parte diuisionem facimus, & labijs sectionis per hamulum diducimus, & dantis appellatis pelliculis detractis per herniarum cutellum ac scalpellum, & denudata tunica rubicunda, mediam ipsam per anserem sectionem scalpello diuisimus, illa maxime parte qua à testis separata est, & humorem totum, aut maiorem ipsius parte, in duas quoddam excidit, rubicundam tunicam per hamulos inferimus, tenuissimam præsertim ipsius partem. At hinc tam Amylus sumas, & curatione cruentorum unguentum utitur. Re, centiores autem concinnantur appellato ducta. Si vero testis putrefactionem, nullamquam aliam affectionem habere conuerit, unde quæ cum adhuc est tunda sunt, per laqueum disparatis, & ipso adhuc dissecto, testem exancre oportet. Et in genita hernia apertis, eodem modo dupliciter operabimur, sectiones utrinque circa scroti ad inguina partes facientes. Postea uero inuicem per sectionem specilli capite, dextram ad scroti finem, & scroto per ipsum specilli caput discento, acuto scalpello sectionem secundum subfluxum facimus, quo sanguinis grumi, & pus per ipsam excernatur. Per ipsam uero specilli caput lenissime in longitudinem simplicium linamentum, ad supernam sectionem traicimus, & ubi testis spongia deterfis, lanas oleo madidas per sectionem dextram ad testem sumimus: & intrinsecus alias lanas uino & oleo imbutas, scroto, imo utrinque, inguinibus, interfecto testis, ac

Lentissimè

remouemus

lumbis

Alibis, superponimus: & linteo triplicato insuper expresso, & deligatio-
ne lena cura habente, & alijs ad hoc commodis facta, hominē reclinamus,
latis ad lumbos subiectis, quietis gratia: & pelle molli substrata, ad irrita-
tiones excipiendas. Irrigamus autem oleo calido, ad tertiam usque diem. Post
quā solutione facta, ad usum quiddam cerapharmaco linamēns excepto uti
oportet, ita ut leniusq; in solutione permittentis. Fortasse eus aut rursus ir-
rigationes adhibeantur propter inflammationē, usq; ad septimū diē. A quo
medicamentū ad conservandum lenam eorū adhibemus. At post ulcers re-
purgationem, & moderatam incarnationem, ubi iam de cetero laetior, Le-
mniscum aufere oportet, & reliqua curationis seque, uelut antea dictum
est, uti. Quod si inflammatio aliqua sit, aut sanguinis eruptio, aut tale quiddam
terrimū accedas, convenienti modo singulis occurrendum est, ut ne super eun-
dem sermonem repetamus. Si uero uisionem in hernia agnola libentius ad-
hibuerimus, uelut iunioribus placent omnia quæ ante chirurgiam, & quæ
post ipsam relata sunt, fiant, itensq; quæ in ipsa chirurgiā tetulimus, eo solū
relictis ut ne ferro secemus, neq; secundum sub illuxionem sectionem facia-
mus. Decem itaq; aut duodecim ferramentis linamēns. r. referētib; ignitis,
& duobus eulcratis, primum quidem scroto per gammā illā per mediū
peruremus. Et scalpello aut exco hamulo membranas exoriantes, eultra-
to cauterio uelut disseccantes uremus. Detudatam autem rubicundam tundi-
cam, quæ ex albedine & densitate facillime cognoscitur, summā gūmā cau-
terij parte perurimus, & hūmorem excernimus. Ac postea totum quod de-
nudatum est hamulis distentum eultra to cauterio auserimus.

De Cancri & Testiculi hernia.

Cap. LXIII.

Hernia
scroti
per
gammā
illā
per
urem

Si caro circa aliquam partem corporis uisibilis, quæ scroto committitur,
nascatur, carnosa hernia affectu oboritur. Et hoc ex obscura causa, teste
fluxione uexato, aut in scierhū indurato, aut ex plaga, aut ex imperita post
hernia sectionem curatione. Adest autem & hic tumor concolor, cum duri-
cia. Si uero induratus est tam op. color uidiatur, & sensus exors est. At si ma-
lignus est tumor, dolores punctorij consequuntur. Ad chirurgiam itaq; de-
uenientes, ego tam uelut prius collocaui, & similiter sectionem facimus.
Esi quidem cum teste caro concreta affectionem fecerit, & dantos pellicu-
lam, & subiectam tunicam similiter disseccamus. Deinde extento teste unā
eū tunicā rubicundā, ipsam foras educemus, & dissecto à uasis neruo un-
de testis dependet, uas quidem adiungemus, neruum uero disseccabimus.
Testem autem cum carne concretum, uelut alienum eiciemus. Si uero cir-
ca aliquam tunicam, aut uasidam, caro concreuerit, diuiso scroto & subie-
ctis casti pelliculis, quicquid carnosum est auserimus. At posterior accre-
tio eum carne concreuerit, circumscriptis partibus ablati, etiam testem unā
eum ipsa tollemus. Sicut enim non potest ut sine ipsa testis maneat. Ceterum
Tollit qui & circa testem, & circa tunicam rubicundam consistunt, ex multo
renu, & duricia, ac inaequalitate, à carnosa & aquosa hernia discernuntur,
Et hinc carnosam hernia chirurgiam requirunt.

De cancri & testiculi hernia.

Cap. LXIII.

Hernia
scrotiTestis
circa
scroto

Vas quæ circa testem, aut dantos pelliculas, uaricosa sunt, Varices sim-
pliciter appellant. Reliqua testem agnitiua si uaricosa facta fuerint,
herniam uaricosam affectionem uocant. Signa horum manifesta sunt. Col-
lectis enim tumidiōr, & obliqua, & aliquantulum racemosa, & testis cui la-
xatio apparet. Quædam item alia functionum impedimenta, maxime in
cursu, & exercitijs ac profectionibus. Chirurgiam autem facimus sic. Post
commodam locationem, cōtreclato scroto, neruum à quo testis pendet, ad
infernam partem detrudimus. Est autem cognos facili, & tenulior uas, &
solidior ac reuolens, ut qui fortis sit & ualidus. Sed & eger dolet, ad ipsius
compressionem, insuperq; ad colēm suus est. Vasa uero per digitum tum no-
stros, tam ministri, in scroto apprehendimus, & fortiter distentus obliquam

Varicos

Hernia
scroti

u i scalpē

scalpellantem contra ipsas uenas cuti indocimus. Deinde infixis hamulis, ubi subiectas cuti partes excorruimus, uasq; denudatum uelut in uulso rum excisione, & arteriarum dilatione discubamus, acum duplex filum habentem tranfigimus, & secunda filula uasa cum circa primam ipsorum uaricationem, tum circa inferam extremitatem, illaqueamus, sectione per medium in directum facta. Et collectio sanguine euacuato, supputato eto deinde ipsos curabimus, quo sanguinem uincula unâ cum uasis his sponte excedant. At uero Leonides, si quidem aliqua testem uasientia uasa uaricosa facta fuerint, ita faciendum esse dicit. Si uero omnia, cum ipsis etiam testem euellendum esse, ut in uasis ueritibus priuatis relinquitur. Ceterum si, tuolum huiusmodi, quæ in genere arterie dilataio est, Leonides penitus chirurgiæ aggredi recusat, ob præsens eruptionis sanguinis periculum, qui nullo modo sibi potest. Recentiores uero, quam duplex sit ipsius origo, altera quatuor uasis testem aluius exoritur, altera ab arteria in pelliculis dantis ductis ac scoto, hanc quidem reijciunt, priorem uero chîrurgia tractant. Discernimus autem ipsa, ex eo quod ea quæ ab arteria oriuntur, facile ad digitorum compressionem euadunt inque uero testem nutritibus uasis, aut omnino non, aut cum multa cautione. Chirurgiam uero adhibemus uelut in hernia uaricosa, dictum est, singulis uenis exceptis ac filo obligatis.

De hernia.

Cap. LXXV.

Hernia intesti-
nalis

Intestini hernia est prolapsio intestini in scrotum. Fit autem propter rupturam peritonæi membranae, circa inaequaliter locum rupis: Aut ob eundem membranae distensionem. Ambo uero huc, & ruptio inquam & distensio, ex uolentia aliqua progressa sunt, uelut est plaga, aut salus, aut clamor. Quæ uero ob distensionem sit, prius tim etiam propter resolutionem, & ob alias corporis debilitates oritur. Signa communia utriusq; hæc sunt circa testem uisum: & quod in exercitiis ac coloribus, et spiritus distensione, utiq; in eodem modis uisus ipse se ipso maior sit tumor, & quod dum digitis impressis uix sit, tarde quidem dum compellitur recurrat, citone uox uelut relabatur & intestinum in figura corporis supina, superne in suo locomanet, donec rursus erecti consistant. Sed & si testis in scrotum exeat, sæpe periculum ipsis induræ. Doler enim ex eo intestinum, quau doque etiam ad compressionem rugam sentit. At uero peculiaris signa eorum qui ob distensionem affecti sunt, habentur hæc quod non accurantur sed particularim, temporis progressu, & ob quolibet causis quandoque delapsio sit: & tumor æqualis ac profundus apparet, intestino delapso circum membrana contracto. Eorum uero qui ob compressionem affecti sunt, signa habentur hæc quod a cruribus ab initio sit prolapsio, & ob firmas locum causas: & tumor ingens inæqualis, & in superficie statim ad eum apparet, eo quod extra membrana intestini exeat. Si igitur membrana rupta, omentum solum in scrotum exciderit epiplocele id est omenti hernia affectio vocatur. Si uero etiam intestinum, enteropiplocele id est omenti ac intestini hernia appellatur. Si uero etiam aqua in tunica rubicunda apparuerit, composita ex tribus etiam appellatio imponitur, ut hydropiplo enteroccele id est aquæ, omenti ac intestini hernia nocetur. Neq; uero hæc, neque intestini propter ruptionem herniam chirurgia aggredimur. Verum solum ob distensionem abortam intestini herniam chirurgia tractamus hoc modo. Post supinam locationem, extentam cum ministro eitem quæ ad inguen est, tranuersam dissecamus, uelut in uulsum excisione dictam est secantes: Quidam uero non tranuersim, sed in directum secant & hamulo transeam sectionem expandimus, ea mensura ut testis eductus locus habeat. Deinde rursus hamulis infixis in intima cute tot quot uulnibus magnitudo requirit, hamulo excorruunt scalpello membranas & pinguedinem excorruantes dissecamus. Denudata autem undiquaq; membra-

na, immisso indice digito ad posteriores scroti partes inter membranam, & pelliculas darts appellatas, posteriorem accretionē exsoluimus: & postea dextra manu extremitatem ipsam duplicantes ad internas scroti partes, si multę sinistra manu membranam ad sectionem attrahentes, excipimus scrotem unā cum tunica rubicunda, & unum ex ministris testem extendere iubemus. Nos autem ubi posteriorem accretionem perfecte exsoluerimus, digitis iunctis figabimus num aliqua intestini involutio in rubicunda tunica sit comprehensa, atq; hanc deorsum ad ventrem detruimus. Deinde accepta aeu magna quę solum alias perfecte receptam, tunc duplicatum habeat, ipsam ad extremitatem membranę, ad ipsam sectionem in medio transfigimus, scđtq; ansa quatuor principia facimus, atq; his ex utraq; parte vicissim iuxta chiasmum id est literę gręcę χ . figuram implicatis, membranę vehemens contrahimus, & rursus obvolunt principia generose contrahimus, ut nullum ex nutriētib; uasis, alimentum impedire possit, ut ne hinc inflammatio obocurrat, & alterum magis extrinsecus uincibilis, minus quā duos digitorū spaciō à priore distans inieciamus. At post hac uincula cum membranę partem, quā ad digiti magnitudinem reliquimus, totam circum circa resecamus, asserentes uidelicet simul etiam testem. Et rursus secundum subeffluxiones scroti secantes, & lemniscum transmittentes, & irrigationes ex oleo, & deligaciones meluris hēntis aquosā adhibentes, omnia reliqua quemadmodum illuc dictum est peragemus. Notamus autē quosdam non in ep̃to chirurgos, qui post rubicundę tunicę exsectionem, cauterijs eandem extremitatem ipsius inurant, ob sanguinis eruptionis timorem, uelut nesciunt uidetur. Idem post chirurgiam istam etiam lauas affectis in selio longo liques aquam calidam habere, ad septimum usq; diem, atq; hoc quicquid in diei ac noctis minus spacio faciunt, & praesertim in pueris, & minime ipsi succedat, quoniam & ipsi abque inflammatione maneat loci, & uincula unā cum corporibus cito excidant. Interposito uero inter lotiones seipore, praedictas irrigationes adhibet. Sed & alius qui si supra testem, etiā pipere trito est oleo, ipsi ipsorū eo tempore confricabat.

De inguinis morbo.

Cap. LXV.

Herniam intestini quę ob distensionē sit, sanguinis hernia praecedit. Primum enim quāto distenditur peritonei membrana, laxatur intestinum, interimq; ad inguen secedit, & inguinis herniam facit: quā ueluti fores hoc modo chirurgia aggrediuntur. Post factam sectionem transuersam digitorum longitudine circa extremitatem inguinis partem, & post exempta pelliculis, ac pinguedine, circa mediū membranę denudant, quā parte insagiuntur, specilli caput adhibeant. Ita enim intestina in profundū detrahuntur. Eminentes igitur membranę partes, ab utroq; capitis specilli trahere, sursum inter se cōiungimus, deinde specilli caput extrahimus, neq; membranę resistentes, neq; testem eiciētes, neq; quicquid aliud, sed ductu cruentis uulnibus destinato curantes. Quandoquidē uero iunioribus uisio magis probatur, merito etiam hanc trademus. Homo itaq; post moderatum morbi uisum lenius iussus, ac intendatur cum spiritibus retentione. Tumore uero circa inguen apparente, arando scirpeorio aut collyrio ur̃dus locus circa scrobem ad triangulārē figurā, ita ut sursum ad inguinis sinum transuersa linea locetur, sed & nota in mediū trianguli inficiatur. Reclinato autē aggroto, igne candefacti cauteris in mediū nocti immittuntur, primi clausi, deinde in latera trianguli, gressu & tertio. Lateralis aut scintillarū totus triangulus exequitur, ministro per totam uisionem panniculo saniem detergente atq; ita in profundum uisio fiat, donec in his qui moderatum habebant, pinguedo amingatur. Neq; enim in his qui macilentī sunt notam hanc obseruabimus, ob licetatem, ut nefallimus, & membranā ingruamus: Neq; in crasis iocibus ac pinguioribus, in quibus etiam ante sufficientem uisionē pinguedo apparet. Imo potius ex artificiosa coniectura moderatam mensū

Chiasm

Hernia inguinis

Cauteris inguinis figura

ram comperiemus. Post unctionē uero solem cum porro tritum crasse inijcimus, & inguinalem deussara deligatione utimur. Sequentibus autem diebus, crustam de crassantibus medicamentis aromata, quale est lentacula cum melle, & similia ad perfectam usque curationem.

Defronicatione.

Cap. LXXVII.

Quam feroti cutis laenatur, absque his corporibus quae intra ipsum sunt, Rhacosis appellata affectio sit, maxime indecora. Leconides agitur super no reclinato homine, superfluum autem per scalpellum, contra subiectam tabulam, aut durum aliquod eorum siue corpus, rescabatur, & sanatis labia cōmittet. At uero Antylus sinu is tribus aut quatuor superflua cute per uis, forfice acuta, aut scalpello, id quod ultra sinuatus extabat, rescabatur, & per sinuatus munitio est facili, cruentorum uulnium ductu percurabatur.

Defrasiata.

Cap. LXXVIII.

Quam nostra ars scopum habeat, ut corpora à statu præter naturam, ad naturale reducat, & citatio contrarium eius profitemur. Verum quandoquidem sepe etiam inuiri ab aliquibus prominentibus ad castrationem faciliam cogimur, breui quadam summa appressionis modum referemus. Est autem hic duplex, alter per collisionem, alter per excisionem. Modus per collisionem ita abijciunt. Infantes adhuc pueri in peluin aq̃e calide collocaunt. Deinde ubi lavata fuerint in ipsa pelui corpuscula, testiculi digitis colliduntur, donec evanescant, & dissolent non amplius cōpacti ad radicem occurrant. At per excisionem modus huiusmodi est. Supinus in scēnum reclinetur castrandus, & per sinistram manus digitos scrotum unū cum testibus comprimant, & ubi rectū situm habuerit, duabus scētionibus per scalpellum in directum secetur, ita ut ad singulos testes una fiat. Vbi uero perfecerint testes, excoriantur ac excidentur, tenuissima solum ualorum naturalium continentia relicta. Hic modus præferat illi qui sit per collisionem. Nam quibus collisi sunt testes, quandoque eorum appetunt, parte quadam testiculorum, uelut uentilide est, in collisione remanente.

De hermaphroditi.

LXXIX.

Affectio Hermaphroditicorum per compositionem nocem, ab Herma & Aphrodyte, id est, Mercurio & uenere nominata est, utriusque generi ualde indecora. Quam enim quatuor sint ipsius differentiae secundum Leonidē, Tres quidem in uiris collidunt, una uero in foemina. Nam in uiris quandoque circa interfoemineam, quandoque circa mediam scrotum, muliebri pendendi pilosi sinus apparet. Supra haec uero tertia est in qua uelut per pudendum, per scrotum urinae effunduntur. At in foeminis supra pendendum interta pubem sepe uirilis pendendi sinus reperitur, tribus corporibus extantibus, uno ueluti cole, duobus quasi testibus. Tertia igitur in uiris, in qua urina per scrotum excernitur, incurabilis est. Reliquae uero tres curantur, si superfluae partes auferantur, & uelut uelut cura curatio fiat.

De nymphae aculei profectione.

Cap. LXXX.

Quiusdam ingenti magnitudine est Nympha, ita ut indecora turpiter sine ocentra, & quemadmodum aliqui narrant, aliquae per hanc partem etiam arriquant uelut uiri, & ad coitum concitantur. Quapropter sapientia loca muliere, quod superfluum est in Nympha, id uelut scēla apprehensum scalpello rescabatur, nitentes ut ne ex profundo ipsam excidentur, ne Rhachitis, id est sitis affectio, ex hoc sequatur. Sed & caudam, quae carnosa ab utero osculo excretio est, & muliebri pudendum repleat, aliquando uero etiam ad externas partes insulare aude prominet, similiter ut nympham rescatur oportet.

De Thyri, Candymanibus, & Hermae uisibus, & muliebribus suis.

Cap. LXXXI.

Thyrus eminentia quaedam est aliquando rubicunda, quandoque alba, plerumque sine dolore, Thyri herbae corymbis fiat ea cum minibus simi-

Alis. Condylomata vero rugose exuberantia sunt. Quomodo huiusmodi similes illis sunt quae in ano fiunt, quae aliquando etiam sanguinem fundunt. Omnes itaque eiusmodi eminencias, in feminis sub conspectum venientes, & deo datas, mollisilla apprehensas semispharulae acie excidimus, & galls trita, aut salinae serillo anperso, ad eas utimur. Maiores enim Chirurgi obligationem per fila in his non admittunt.

Condylomata

Membranae

Deus perforatae, & de plima.

Cap. LXXIII.

Mulieres quaedam genitales partes non perforatas habent, quandoque ex natura, quandoque incrementis postea factis, morbo aliquo progressio. Et hoc aliquando in profundo, aliquando in pendendi alia, aut in intermedij locis, & aut ex coarctatione, aut propter obstruktionem. Quod vero obstruat, aut caro est, aut membrana. Impedimentum autem malum inducit hoc affectus, partim in coitu, partim in conceptione, aut etiam partu. Quandoque etiam in mensis purgatione, si sane id quod obstruat, sine caro, siue membrana sit, penitus obstruat. Nam in aliquibus id in medio perforatum est. Causa itaque inuenta, aut in promptu est, potius est, aut etiam per instrumenti exploratori immisionem sensu conuenienter solum fuerit, recta sectione per scalpellum fistulae faciendae destinatae hanc exoluemus. Si vero obstruatio, hamulis infixa distentum corpus illud obstruans, siue membrana siue caro fuerit eodem scalpello dilacemas, & sedata sanguinis eruptione, siccatibus citra mordacitatem medicamentis, & postea cicatrice indolentibus utimur, prius forma linamentum, cicatricem inducente pharima eo illitum subijcientes, in quibus praesertim non ualde in profundo chirurgia facta est, quo partes rursus non coelescant. Porro primos quoque in uteri osculo constituta obstruamenta, eodem modo per chirurgiam tractantur.

Genitales partes non perforatae

De uteri abscessu.

Cap. LXXIII.

Si abscessus circa uteri osculum constitat, qui chirurgiae subijci possit, non prompte ad excisionem festinandum est, sed absoluta iam affectione, & plurimum aucta inflammatione, & humidis corpusculis incumbensibus ac tenuis, eo quo d principalis pars sit uterina. At uero in aggressionem loci uterini foemina supina in sella, ita ut circa summum ventrem conuulsa habeat, foemora uero inter se disparata. Subijcitur autem ulex ipsius ad poplices, & uinculis idoneis ad erutum delegentur. Qui uero chirurgiam exercet, ex dextris partibus sedens, instrumento exploratorio dioptra appellato, pro arate conuenienter exploret, & per specillum muliebris sinus profunditatem metiatur, ne si longior sit dioptra fistula, uterum comprimi contingat. Esi longior linea reperta fuerit dioptra fistula, lintea copulatae pudenti alii imponantur, quo super ipsi locetur dioptra. Oportet autem fistulam inuenire, re ut cochleam ad supernam partem habeat, & dioptra quidem ab operante teneatur, eo chile uero per ministrum obtorqueatur, quo fistulae laminae diductis sinus disparantur. Vbi uero occurrerit abscessus, si mollis ac tenuis sit, ad quod digiti cotraur cognosces, spatula aut acicula, in uertice diluatur, & post parui excretionis lemniscus mollissimus oleo rosaceo imbutus plagae inferatur, aut potius extra plagam, in sinum muliebrem, citra promotionem. Forissecus autem ad alas, & in pectinem ac lumbos, lintae siue etidae aut parae oleo imbutae imponantur. Tertia die aquae ac oleo calidatis insident, aut maluae decoctio, si itaque deterfione lemniscus leniter in plagam indatur illius tetraphaemaco perse, aut cum cocho melle. Sit autem dilutum tetra-pharmaco ex butyro aut rosaceo. Cataplasma atque exterius partes in tegantur, donec inflammatio sedetur, & purum ulcus fiat. Si uero difficulter repurgeretur, per auricularem clysterem, cum tritida aut arillo chior decocto, aut melle diutius, & per emplastrum ex cadmia uino dilutum, & lintamentis exoptum cicatrix inducatur. Ac si intra uteri osculum abscessus fuerit, chirurgia utetur.

Vteri abscessus

Dioptra

De fœu

QUum difficulter parientium curam nonem libro tertio tradiderimus, si
 non ad illam partem conuergatur, ad chirurgiam moribus deuotimus, quæ
 prius collectis, an superfluis curata sit mulier, aut non. Si si curata est, tunc
 chirurgi aggrediatur. Si minus, curabitur. Quæ igitur perniciose
 affectæ sunt, lethargico modo in somnum deferuntur, ac resoluuntur, & æ-
 græ excitantur, atque si excitate fuerint per uociferationes debilitæ respon-
 dentes, rursus in somnum deferuntur. Quædam uero etiam consilio mor-
 do contrahuntur, aut ueris dissidentur, aut alim entum non sentiunt. Pū-
 lis autem uehementer in tumescere deprehenditur, uerum obsecutus ac de-
 bilis. Atque curatur sunt, nihil tale patiuntur. Reclinata igitur in lecto su-
 pina muliere, & magis ut deorsum uergat, mulieres autem mittit quædam
 crura clorata utrinque teneant. Si hæ non adint, per uincula quædam thora-
 cem mulieris ad lectum deligato, ut ne dum attrahitur fortis, corpus ipsius
 sequens, trachus uigor exoluit. Deinde pulendi alii per ministrum didu-
 ctis, sinistram manum contrariam, cum robustis ac contrictis digitis pingu-
 factam, in uteri osculum demittit, ac ipsam dilatas, & infuso in ipsam o-
 leo latus reddito, & ubi commodè uncus insigi possit querit. Commodi
 autem sunt loci ad uncum insigendum, in his qui in caput deferuntur, occi-
 occiput, os ad palatum, mentum, clauicula, & circa costas ac præcordia lo-
 ci. In his uero qui in pedes deferuntur, ossa supra pubem, & costarum inter
 media spacia, & rursus clauicula. Erposset deorsum dextram a manu unam,
 & flexuram ipsius inter digitos occultatum, per sinistram manum lentius in
 ducta, & in quodam ex relatis locis insigito, usque ad inanem locum, & alter-
 rum huic oppositum, quo equalis, & non ad alteram partem uergens attri-
 ctio fiat. Deinde equaliter trahito, non solum in directum, sed etiam in latera,
 uelut in dentium extractione fieri solet, & inserim tensionem ne remitti-
 to. Postea immisso indice digito pinguis facta, aut etiam pluribus, inter ute-
 ri osculum & impactam corpus, ueluti excoeres, in orbem circumducto.
 Sequenti uero pro ratione uncus, ipsam in ulteriores partes uisum oportet
 trahit, atque sic facere, usque ad perfectam fortis extraktionem. At si manus for-
 tes premissæ sin. & impacta trahi non possit, obuoluto panniculo ut ne ob-
 lubricitatem claudat, aliquantulum attrahere illam oportet, & ubi prodes-
 rit totam de humero resecare. Idem etiam faciendū est, si ambæ manus pro-
 mincant. Similiter etiam pedes prominentes, reliquo corpore non suble-
 quæ, ab inguinibus resecare oportet, & postea conuenit reliquum corpus
 dirigant. Si uero ex eo quod maius est caput, obstructio fiat, si quidem hy-
 drocephalus est factus, spatula polypis destinata, aut acicula, aut aculeo
 cathello inter digitos occultato, caluaria diuidatur, quo aqua eua curata con-
 fidat. Si uero naturaliter ita amplum caput habet, diuisum sinistram & altera-
 zas, per forcipem dentibus ut ossibus extrahendis commodum contingerit
 mus, & si supereminet ossa, ipsa eximimus. At uero si protracto capite, cir-
 ca thoracem obstructio fiat, eodem instrumento loci circa clauiculas usque
 ad inanem locum diuidatur, quo humore eua curato thorax concidat. Si ue-
 ro non concidat, si cū dissectione clauiculas ipsas auferre oportet. Tunc et
 ita thorax concidat. Si uero immoderate inflatus fuerit, morbo facta, aut
 hydrope affecto, eadem ratione humor eua curatus unde cum ipsis intestinis.
 In his uero qui in pedes deferuntur, inclinatio facile ad osculum uteri dirigi-
 tur. Quod si circa thoracem aut abdomen impactus fortis hæreat, pannicu-
 lo obuoluto attrahantur, & eodem modo facili dissectione, ea quæ continen-
 tur euacuentur. At si reliquis ablatis caput recurrens deueniat, sinistram
 manum immittito, & si quidem dispersum fuerit uteri osculum, manum in
 profundum demittito, & reperiunt caput digitis ad osculum deuoluto, de-
 inde uncus uno aut altero infuso attrahito. Si uero conuersum sit uteri oscu-
 lum ob inflammationem, nulli uis inferatur, sed per inguibus ac largis infusa
 utendum

Tertio ca-
 italis

Extrahendis

Hydrocephalus
 la forma

utendum est, in scissibus item & irrigationibus ac cataplasmatia, quo disparato os uero educatur uelut dictum est. Porro qui in obliquum procedunt foras, si quid dirigantur, praedictis modis utendum est. Sin minus, uetus foras intus dissecetur, & particulam educatur, diligentiam aduersione habita, ne qua particula intus latens relinquantur. Post chirurgiam, curationibus ad utrum inflammationes utendum est. Si uero etiam sanguinis eruptio fiat, etiam huius curationem habes.

De secunda uulsa,

Cap. LXXXV.

Saepe numero post factam extractionem, secunda in utero detinetur. Patente igitur uteri osculo, & ipsa secunda ab utero exoluta, ac circa partem aliam quam uteri in ipso modo conglobata, facilis est eductio. Manum enim sinistram calidam ac pinguefactam in profundum immittere oportet, & occurrentem secundam eicere. Si uero fundo uteri adhaerit, manus quidem similiter immittatur, comprehensa uero secunda tendatur, neq. indirectum, ob uteri prolapsus timorem, neq. cum uolentia uehementi, sed leniter primum ad latera hac illac trahatur, deinde aliquantulum magis intente. Ipa enim obedit, & accretio exoluitur. At si conclusum repertum fuerit uteri osculum, relatis curationibus ad hoc utendum est. Quod si uires non debiles fuerint, etiam sternutatorijs utatur, & suffribus in olla ex aromatis. Et si huiusmodi uteri osculum, immissa manu conandum ut extrahatur, uelut dictum est. Si uero neq. sic educatur, non oportet perturbari. Nam post paucos dies, putrefacta, & in saniem dissoluta excidit. Ceterum quia fortore ea put obuiat, & stomachum euerit, suffimenta conuenienda ad hoc requiruntur, probantur autem cardamomum, & sicus arida.

De coxendicis uulsa,

Cap. LXXXVI.

Quemadmodum humerus, ita etiam coxa, ob humoris copiam, quibusdam emota, uisionem exigit. Sic ipsius Hippocrates ait. Quibuscumq. ex denturno coxendicum morbo uexatis, coxa excidit, his crura bescit, & claudicant, si non uisi fuerint. Oportet itaque etiam hic iuxta illum maxime locum urere, ubi articulus excidit. Sic enim redundans humor reficari potest, & locus ex cicatrice densatus, non amplius os excipiet. Quapropter etiam ad multam profunditatem, uisionem hac facere oportet. Iuniores porro res crassas urendo inducant, unam retro iuxta cauitatem dantis. Alteram ab externa parte paululum supra genu. Tertiam paululum supra extennum calam, iuxta carnosiores partem.

De fistulae fist.

Cap. LXXXVII.

Quum locus hic possulet, ut de fistulis sedis agamus, non malum fuerit prius de fistulis in uniuersum tractare. Fistula itaq. sinus est callosus, doloris aliquantulum exors, in plurimis partibus consistens. Fit autem plerumq. ex abcessibus non probe curatis. Callus autem solida quidam, & alba, & humoris exors caro est, quae dolorem non sentit, quum neque uena, neque uenae, ad ipsam peringat. Et sinus aliquando quidem siccus est, alio quando uero humectus. Et humor ipse quandoq. indeclinat serui, quandoq. quibusdam temporibus remittit, dum & obuiatur osculum, & rursus aperitur. Et quandoq. ad os fistulae terminatur, quandoq. ad neruum, aut aliam quandam principem partem. Et aut in directum tendunt, aut obliquum sunt, & aut unum osculum, aut plura habent. Quae igitur ad arterias magnas, aut neruos, aut tendines mem. osseiles, aut faccingentem costas membra, nam, aut ad aliquam principem partem peringit, his aut omnino non, aut cum multa cautione artificiosa, chirurgia adhibenda est. Reliquas uero hoc modo aggredierimur. Explorabimus primum, si quidem in directum tendit fistula, per calpellum si uero obliqua est, per hieps specillum quod facile flecti potest. Talia uero sunt flannea, & tenuissima ex are facta. In quibus autem duo uel plura oscula sunt, ita ut per specillum explorari non possint, his insuso per unum osculum in sinum immisso, ex insuli ad reliqua oscula

scula transitis comperiemus, an una auita ostenda habens sit fistula, aut plures. Et facta iam exploratione, siquidem in superficie fuerit sinus, & angustus, immisso specillo hunc expandemus, & scalpello callum iuxta propriam figuram auferemus, aut unguibus, aut acie scalpelli derodentes. Si uero etiam latitudinem habeat, superflua corporiscula auferantur. At si non in superficie sit, sed per profundum in directam procedas, quatenus id fieri potest in profundo ipso dissecto, totum callum circuecirca auferimus. Et si quid de ipso relinquatur, pharmaco ulterius hoc consumimus. Si uero multum id sit, & pharmaco non cedat, cauterijs ferreis aduremus. Quod si in os delinatis scula, & sit hoc illud, solum ipsam rademus. Sin carie, aut alio quodam modo corruptum fuerit, totum id quod affectum est per opposita scalpra excoisoria amputabimus, facta prius si opus fuerit per terebram perforatione, siue ad secundam lamina usq. solummodo, siue usq. ad medullam fuerit affectum. Si uero etiam ea supereminet, uelut caulis per transuersum fractum, ipsum resecabimus. Acceptis itaq. duobus locis, alterius medietatem proximendi ossi subijcimus, ipsumq. per ministrum sursum extendimus, alterius autem crassioris, aut etiam ex lana facili similiter medietatem carni quae sub osse est adaptemus, & iocis in fornem praebentis, ita per ipsam locum carnem deorsum trahi iubemus, ut uelut dentibus caro dilanetur. Atq. hoc modo nos de sectione facimus. At uero ubi princeps aliqua pars subiacet, uelut membrana succingens, aut medulla spinæ dorsæ, aut talis quodam, ubi excidimus aut defecamus os, membranae eussodem laminam subijcimus. Quod si os non fuerit affectum, sed totam circum circa carne denudatum, eodem modo terra resecandum est. Fieri enim non potest ut ossa quae circū circumstant excipiant, carne indicantur. Similiter autem si extremas ossis prope articulum affecta fuerint, resecare ipsam oportet. Et si totum os, uelut cubitus, aut radius, aut tibia, aut tale quoddam corruptum fuerit, totū amputandum est. Ceterum formosus cingat, aut coxam, aut spinæ dorsæ uelut uicium affectum aggredi nitimur, propter imminens ex adiacentibus ueteris periculum. Hanc igitur rationem ita in singulis sequi oportet, ut ubi quæ & sinus, & uelut nitens, & cognationem affectuam partium consideremus. Itemq. morbi magnitudinem, & aegri diuturnum robur. Sed & fauus, qui sinus est fistulosus mellea humiditate fluens, fistularum & aliorum finium chirurgiae ac curationi subijciatur.

De fistulis oss. Cap. LXXVIII.

Fistulae in sede explorantur, quæ quidem occultæ sunt ex eo quod non apparet osculo dolor ueniat, & pusillenta humiditas per sedem profundatur, plurimæ enim abscessus signa prægressa sunt. Conspiciunt uero ex specillo aut pili suillissimi missione. In profundum enim ad inane usque locum, in instrumentum descendit, & iocis digito in sedem immisso occurrat, perforata nimirum fistula ad internas partes. Verum in non perforatis, non sine medio instrumentum digito occurrat, sed per medium corpus id quod non perforatum manet. Oblique autem & labyrintho similes fistulae cognoscuntur ex eo quod instrumentum parum procedit, pus autem proportionem nullum effluit. Quæ uero prope intestinum sunt, eas cognoscimus ex eo quod aliquando hambrici & sterces per osculum feruntur. Atq. in omnibus ferme callus quidam circa osculum apparet. Incurabilis porro est fistula quæ uelut collium perforauit, aut ad femoris articulum colligit, aut ad ipsum rectum intestinum percessit. Acque uero curantur quæ ostentem non habet, & occulta, & in os delinens, & multifida. Reliquæ omnino facile curantur. Manum itaq. ipsi ita admouemus. Aegro supino locato, & crura sursum habente, ita ut femora ad uenter uergant, quemadmodum in his quibus infusum per clysterem in aluum immittit, ita si in superficie fistulae terminus occurrat, immisso scalpello aut auriculario specillo per osculum, simplici sectione cutem incumbentem resecamus. Si uero in pro-

A in profundum sedis fistulae finis desinat, immisso per osculum specillo, si qui-
dem perforata inuenerimus, alterius manus quae affecto cluni opposita
est, indice digito in anum immisso, specilli caput apprehendimus, & infer-
ram ipsum foras educimus, & corpuscula specillo incumbens simplici se-
ctione exoluimus. Ac si nondum perforata fistula reperiatur, sed solum in pro-
fundum sedis finiat, & explorantibus nobis per indicem digitum, specilli
extremam occurrat, squamosa quodam ac membranoso corpusculo inter-
posita, tunc hoc per specilli caput uolentius perforabimus, & educto per se-
dem specillo, rursus incumbens ipsi corpora exoluemus, uelut antea dixi-
mus: aut fundo sinus ad sedem per falcem fistulas secundas commodam per-
forato, ipsam instrumento per sedem transmissis, hinc totum id quod in me-
dio est, falcis acie resecabimus, & post sectionem, corpuscula circūsum uol-
fella aut forcipe cularia apprehensa ampuamus. Sunt autem omnino cal-
licea corpuscularia ut ubi, masculum adstrictorium, sphincterem appella-
mus uitemus. Quidam enim Chinus artificiose facta in profundo sectione, uul-
nerauerant illum, atque hinc in uoluntaria stercoreis excretio homini accidit.
Quod si quidam per timore chirurgis recusent, hippocratica lint ac filii deli-
gatione utendum est. habet enim Hippocrates linum quincuplum crasum
perforato aut bicipiti specillo insertam, per fistulam traicere, & intra lint
connectere, & quotidie adstringere, donec totum id corpus quod in medio
duorum osculorum situm est, dissectum sit, ac lintum respuat. Si uero exolu-
tio protrahatur, puerillus siocus psari nomine, aut eiusmodi quispian linum
inspergatur, atque ita trahatur. Quidam fistulari falcis forasini linum in-
serunt, & relato modo transiisse, quod logo minime faciendum esse puto. Nam
dum chirurgiam uitant supra hanc etiam curationis tarditatem incurrun-
t. Ceterum de oculis fistulis Leonides haec dicit. Quam profunda fuerit fi-
stula quae musculum adstrictorium perforauit, siue ab ano exorta, siue mul-
tum progressa, in musculo tamen consistens, post relatam explorationem,
instrumento sedem deducit, parat dioptra dico, sedem uelut muliebrem
suum ductio. Deinde ubi comparuerit fistulae osculum, specilli caput per
ipsum immitatur, & in profundum propellatur, & super ipsum occurrens,
totam fistulam per semipathulam aut spatulam fistulariam dissectur. Nos au-
tem quum in eiusmodi affectionem incidissemus, hanc chirurgie modo uni
non potuimus, eo quod fistulae antram uisum non occurreret. Erat enim in-
ter anam & musculum adstrictorium ad dextram partem situm. & instru-
mentum diducit, ut cloni magis tenebras offunderet. Postquam autem
per digitos facta dissectione, rima quaedam comparuerat, quae iuxta unam
quandam ani rugam, uelut defluxio fistulae esset: per enim per ipsam effue-
bat: conuenimus sane per hanc specilli caput ad fistulam transmittere, ue-
lut qui ad hanc ab illa deducere. Deinde dexterae manus indice ad mu-
sculum adstrictorium immisso, ubi inuenissemus corpus quoddam tenue
inter digitum ac instrumentum, impulso uolentius ad digitum specill-
lo, fistulae fundum sursum uersum perforauimus, & specilli capite per di-
gitum foras transmissis, totum corpus inter duo fistulae oscula situm, inter
id uidelicet quod ab initio ad antrum comparbat, & hoc quod iam ano-
bis factum erat, & alpelio resecantes, specillum solum eduximus.

De haemorrhoidibus aut.

Cap. LXXXIX.

QUum haemorrhoides ex eo quod euacuatur se nobis manifestent, ante
sectionis aggressionem, plenum per chlyster infuso uemur, quo simul
& superflua ex intestino euacuemus, simulq; sedem intrinsecus ut paratior si-
at ad eversionem, & ani exist. Locato igitur supino ergato ad splendidam
lucem, si quidem constrictione uti uoluerimus, filii lini quincupli labris ue-
narum circudabimus, & singulas haemorrhoidas cum hoc luniculo constrin-
gemus, una relicta ad superflui sanguinis educationem. Nam & Hippocrates
hoc praecipit. Post adstrictionem uero, linteo complicato ex oleo madente,

Haemorrhoides aut.

x & de,

& deligatione sedis idonea usi, agrum quiescere iubebimus, oleo tepido & aqua multa ventrem eunantes. Deinde cataplasmate ex micis panis ac croco uentes, & post hemorrhoidum elapsum, uino cicatricem inducentes. Leonides autem filii deligatione non utitur, sed uulnaria foreipe diu detentis scalpello excindit. Post chirurgiam manna thuris & amylo cum chalcitide, aut emplastro ex spongia usita cum piee usum cum eis sed et passillo seu fino ad perfectam curationem quidam usi sunt. Alij cauitates uulnarij cauteris ustorio medicamento explent, & quodamodum usi ita enim hemorrhoidas urunt.

De condylomate, excisioneque, acrimie in eia.

Cap. LXXXK.

*Condylomati
eni*

Condyloma in ano, solum loco differt ab eo quod in muliebus pedibus est. Est enim etiam ipsum rugosa sedis eminētia, inflammatione aut rima pregressa. Primum igitur eminētia appellatur. Vbi uero calcescit, condyloma. Oportet itaque ueluti illa, ita & hanc uulsellis prehensā excindere, & crustam inducentibus curare. At uero Rūnas pre duro maxime liberare oportet, & eo quod calliose sunt, cicatrice & ardus recipientes, renouabimus aurungibus, aut scalpello ipsas lancinantes, & comode ad cicatricem perducemus.

De Annon perfurata.

Cap. LXXXI.

*Annon per
furata*

Peris recens uaris unus ex natura aliquando imperforatus reperitur, eo quod membrana est obdursita. Si igitur hoc fieri poterit, ipsa digitis membrana distingatur. Sin minus, scalpelli acie illa excisa, uino curabimus. Quandoquidem uero etiam perfectis sepe propter uleus non probe curatum, concretio in ano contingit, etiam hanc instrumento comode distingere oportet, & curationem accommodatam facere, fistula plantis ea aut uicino quodam in anam indito, usque ad perfectam curationem, ut ne rursum concreseat. Est aut cuneus is aliquo ad cicatricē perducere medicamento illendus.

De Varium fistula.

Cap. LXXXII.

Variū fistula

Varix uenę dilatatio est, quandoq; in temporibus, quandoq; iuxta tui uentris partem sub umbilico. Aliquando etiam circa testica. Maxime uero circa crura. Generationem autem ex materia atrabiliosiore omnino habet. Foras igitur qui in testibus effluunt chirurgiam suam tradidimus, ubi de hernia uaricosa egimus. Sed & eos qui in crure sunt, similiter aggrediemur, in internis foemoris partibus aggressionem facientes, ubi etiam exortus ipsorum semet in totius reperitur. Nam inferius in plures ramos fissi, magis difficilem aggressionem exhibet. Lotum igitur hominem, laqueo in superius foemoris parte circumdato, ambulare iubemus, repletam autem uenam amento scriptorio aut collyrio, foemur suum ipsius, ad tris aut paulo amplius digitorum longitudinem notamus et reclinato extensis cruribus homine, alteri loquēti supra genua circumdamus, & eleuata infasti igitur uena, scalpello in loco quem notauimus secamus, nō alius quā per cutē, ut ne uenam diuidamus: & labes sectionis per hamulos dilentis, & membranis per incisionem scalpelli ad herniam equosam parata exortatis, nudataque uena, & indequaq; expansa, foemoris uineula solumus: & eleuato per eorum hamulorum uase, acum duplex filum trahentem subicimus, sinumq; filii difsecamus & diuisa in medio uena per uenę sectionem scalpellum, sanguinis quantum opus est euacuumus. Deinde uno filo superiorem uasiparē restringimus, & crure in diuersa extento, manu expressione sanguinē qui in crure est euacuumus. Et postea rursum inferius uas restringimus, aut parit uenę inter uineula interposita prosecta inferimus, aut eam manere permittimus, donec sua sponte non cum uinculis excidat. Sic linamentis sicci inditis, & splenio uino ac oleo imluto imposito deligamus, ac dicta suppuratorio medicamento cum linamentis excipimus curamus. Nec me tam est ueteres quosdam uinculis usos non esse, sed quidam statim nudatumus excidunt, quidam ex profundo extensū ipsum, cum uolentia extrahunt ac abrupunt. Verū optimus est relictus chirurgię modus, om-

niumq;

nitiq; securissimus. Quin in suo ventre confectus et uarices similiter tractamus. Idq; eos qui in de profundis ceciderunt, uelut in ualorū sectione dictū est.

De fransula.

Cap. LXXXVIII.

TRactionem de deunculis, ut qui maxime per medicamenta tolluntur, libeo quanto tradidimus.

Deunculi

De extremitatibus partium profectio.

Cap. LXXXIX.

Extremis partibus aliquando parafactis, uelut manu aut pede, ita ut etiam ipsa ossa corruptantur, uel ex lacessione externa causa fracta, uel etiam progressa interna causa putrefacta, aspic de sectione possidentane q; hoc fiat, necesse est circūssis ossibus corpora primū dissecare. Verum quia hoc primum facimus, deinde longiore tempore sectionem per serras adhibemus, & periculum est ne sanguinis erupcio sequatur, recte proinde Leonides non omnia primum corpora dissecat, nisi omnino fuerint putrefacta, sed est pars ubi non multas, neq; magnas utras, aut arterias esse putat, primū eelerit ad os usq; dissecat. Deinde os quam citissime terra desecat, lineā parafectū secis corpulculis circumdatus, ut ne dum trahitur per ipsā serrā, dolores inducat, & tunc reliqua resecto, candentes igne caeteros uasā adhibet, & sedata sanguinis erupcione, & linamētis inditus, & deligatione commode facta, curatione suppuratoria utitur.

Extremas
partes pro
fectio

De pterygijs circa Ungues.

Cap. LXXXV.

Pterygiū carnis circa unguis incrementū est. partem unguis operiens, in pedis & manus magnis digitis maxime consistit. Verum quia in pedibus consistit, ex offensione plerūq; sunt. In manibus uero ex paronychia neglectis, inflammata usq; ac in pus transmutata. Pus enim diuinus mori trahens, & radicem unguis erodit, & ipsum unguem corrumpit, & sepe totum consumit. Plerūq; uero mediā unguis partem ad ipsū aut radices partē quandam illius incorrosam relinquit. Aliquando etiam totā radicē illam sinit. Quādoq; etiam os corrumpit, & odor grauis obnoxius, & digitus in summo dilatatur, & fluidus apparet. His igitur chirurgiā adhibenda est, ut os non reliquū unguis partē scalpellū acie praefecimus ac amputemus, deinde praefectū ac ulceratū partem cauterijs aduramus. Est. n. nome, id est ex depauperatum ulcerū genere pterygium, & non solum hanc, nisi quā adurat, aded usq; neglecta fuerit, digitum corumpit. At uero si os & unguis affectione careant, & externa unguis angulus aduram ipsi carnem subiens ac pan, gressu, inflammationis causa fiat, tunc pungetur unguis partem tenui specillo, aut eiusmodi quopis subiecto eleuare oportet, & scalpellū acie auferre & idq; supereminet, modicamēto crustū inducentē consumere. Et praefecto plurius hoc modo per chirurgiā curati sunt. Si uero manus fuerit idq; supereminet, prius id scalpello praefectū, & postea ipsi medicamētū adhiberi debet.

Pterygia circa
ungues

Nome

De Vagariis.

Cap. LXXXVI.

Quandoquidē sepe ex offensionibus unguibus cōfusus, dolores conseruantur, ad chirurgiā nos impellētes. Galeni uerba apponere satis fuerit. Sic igitur ait. Conuulsus unguibus palam dolorē sedis auxiliū expertissimus sanguinis euacuationem, quā de pulsationes sunt, & dolores mentis illius uentant. Oportet autē obliquū facere sectionē, nō ē directā in profundū superne deorsum, per acuti scalpellū, quo ita secā unguis pars, sanguine ex re, uelut operculū quoddā subiectū fiat. Si uero in directū seueris, ex superioris deorsum, carnis excrecentia edinggetur nimirum per mediam sectionē, subiecta unguis carne aliud corpus producat. Atq; hinc rursus dolores corripit, quos in paronychijs nominauimus, dum nascēte caro ab ungue comprimitur. Doloris itaque exortes statim in huiusmodi sectione apnos uidetur. Sequens autem diebus licet nobis subiectam unguis partem leniter eleuare, sinē utq; unguis exprimere, & rursus subiecte carni uelut operculum, quemadmodum dictū imponere. Reliqua uero totius digiti curatione mitigatoria ac discutientia uti conuenit.

Vagari carnis
part

De clauis, verrucis, et alijs que similitudo verrucis appellatur.

liber. Cap. LXXXVII.

Clauis

Clausus callus est rotundus, albus, clauis capiti similis, per omnem corporis partem consistens, maxime in plantis & digitis pedum, dolorem & actionis impedimentum in subulando inducens. Circum circa igitur scari ficatum clauum, & uolvela praeclensum, acuto scalpello aut utriusve scissorii instrumento radicatus exuere oportet. Quidam uero ut ne rursus nascatur, cicerentis igitur usi sunt ferramentis. Formicaria autem Verruca, nascens in cutis parua, callosa, rosida, crassa, in basi inherens, circū scalpatur, formicarum moribus similem sensum inducens. In omni quidem etiam ipsa corpore consistens, maxime autem in manibus. Quidam igitur, inter quos est etiam Galenus, duræ pennæ fistula, quales sunt ueterum gallosum, & anseris, ac aquilæ, circum se arificandam esse censent, ita ut oborquetur per uim in profundum, & ex fundo ueritica formicaria tollatur. Alij uero, nec a ueritica fistula idem faciunt. Verum minoribus placuit eam circum scarificare, & uolvela perhensam, scalpello uelut clauos excindere. An uero Verruca, quæ a crithordon grecis appellatur, eminentia est cutis parua, doloris ex ore, callosa, rotunda ut plurimum, basin autem habet angustam, ut pendere uideatur. Unde ita appellata fuit, quod iunior chordæ parti similis existeret. Hætenam igitur eminentiam excidimus. Si uero minus, sicut saltem aut pilo ipsam deligamus. Notum autem quod & hæc, & reliquæ omnes eminentias plerique frigido cautere consumunt.

Verruca

Acrochordon

Cauter. frigida

De Telorum emolliendis. Cap. LXXXVIII.

Telorum ex-

trahitio

Quod ea pars chirurgie quæ tela extrahit, maxime necessaria sit, Poeta Homerus indicauit, dum dixit.

Medici

liber

Vnde ait Medici uelut et aspidochelone.

Telorum emolliendis, erunt pharyngis surgentis.

Telorum uari-

differentia

Recensendæ igitur primæ sunt telorum differentiæ. Differant itaque tela, materia, figura, magnitudine, numero, habitudine, potestate. Materia quidem, eo quod hæc illa ipsa aut lignea sunt, aut harundinea. Ipsa uero tela aut ferrea sunt, aut ænea, aut plumbea, aut cornea, aut uireta, aut ossæ, aut harundinea etiam ipsa, aut lignea. Ac tot quidem differentiæ, maxime apud Aegyptios, reperiuntur. Figura uero eo quod alia sunt rosida, alia angulosa, uelut sunt triangularia & cuspidata & ligata appellata, uelut quæ tres cuspidas habent, uelut aculeata, alia sine aculeis. Et ex aculeatis alia reuolutes aculeos habent, ut in extrahitione conuerti inligantur, alia aereolum, ut in impulsione idem faciunt, alia opposito inter se modo instar fulminum, quo & dum trahuntur, & dum impelluntur, conuerti inligantur. Quædam uero etiam per cardinem mouentur, & aculeos habent qui cōseruantur, quæ in extrahitione expanduntur, & teli extrahitionem impediunt. Magnitudine porro differunt, eo quod alia sunt magna ad trium digitorum longitudinem. Alia parua unius digiti longitudine, quæ sunt bilices in Aegypto uocant. Alia inter hæc media. Numero uero, eo quod alia sunt simplicia, alia composita. Tenent enim quædam ipsis inserunt ferramenta, quæ in teli extrahitione in profundo delitescuntia manent. Habitudine autem differunt, eo quod alia extremam partem acutam habent inflexam habent, alia subulum habent, cuius huius inflexum est. Et alia quidem in similitudinem adaptata sunt ad huius, alia nequidius, quæ in extrahitione separentur, et inuicem manent. Porro hæc demum, eo quod alia sunt medietate, alia non ueneno illa. Atque hæc quidem sunt telorum differentiæ. Verum extrahitionis ratio à nobis tradatur, nam in his qui in bello sauechni sunt, tum in his qui extra bellum, siue uoluntant, siue inuoluntant, ex qualicunque occasione, ex quacunque materia facta fuerint tela. Extrahitionis igitur telorum ex carne duplex differentia est, altera per attractionem, altera per impulsione. Nam in quibus leniter telum infixum est, exemptio per attractionem fit.

Extrahitio telorum ex carne

duplex

Sunt.

Similiter etiam extrahuntur tela, quae profundum quidem infixae sunt, uerū
 a oppositae partes si uulnerentur, ex sanguinis eruptione, aut conuersa, pericu-
 lum inducunt. Per impulsionem uero, in quibus et per profundum infixae
 sunt, & oppositorum partium corpora breuia sunt, & neque uetus, neque os,
 neque quicquam horum obstat, quo minus scitio fiat. At in osse fixato, mo-
 dus qui per attractionem fit adhibetur. Si igitur conspicuum fuerit telum,
 statim extractionem facimus. Si uero occultum, debet inquit Hippocrates
 si hoc fieri potest, uulneratus in ea figura qua erat dum uulneraretur consi-
 tui, ac exploratio fieri. Sin minus, faciens saltem ad illam figuram conforme
 tur, atque sic exploratio per specillum fiat. Etsi quidem in carne fixum est, per
 manus telum extrahemus, aut per additamentum quod basile uocant, si nō
 excidit, quod litigium maxime existit. Si uero excidit, per forcipem den-
 tibus, aut radicibus, aut telis extrahendis destinatum, aut per aliud quod-
 dam commodum instrumentum extractionem faciemus, carnem etiam alie-
 quando praefecimus, si uulnus instrumentum non suscipiat. Quod si in op-
 posita eius pars procefferit telum, & si non possit ut per eam partē ex-
 trahatur, per quam in fixum est, oppositis diuisis per illa ipsum educemus,
 aut extrahentes, uelut dictum est, aut etiam per fissurā impellentes, atque hoc
 aut basile aut si id excidit, impulsorij instrumenti immersione, cauendo ut
 ne neruum, aut tendinem, aut arteriam, aut aliquam necessariam partem di-
 uidamus. Turpe enim fuerit telum extrahentes grauius telo malum inducere.
 Etsi quidem telum extremam partē basile infixam acutam habet, id quod
 ex specillo immisso cognoscitur, impulsorij instrumenti foemina immissa
 ac adaptata, telum propellemus. Si uero tubulum habet, makulo. At uero
 si ex capite telum extrahens aliquas habere comperit, ut aut alia tenuia for-
 ramenta ipsi in se possint, rursus specilli exploratione ali, si illa inueni-
 mus, eisdem rationibus educemus. Quod si aculeos oppositos inter se
 habeat telum, & ideo non concedat locum uicinum incidere oportet, si nō
 necessaria aliqua pars appositā sit, & nudatum telum citra uexationem ap-
 prehensam extrahere. Quidam etiam harenadinem aculeis ipsi circumpon-
 unt, atque sic telum extrahunt, ut ne carnes ab aculeis dilanientur. Et si qui-
 dem inflammatio ab eis huiusmodi futuris adhibitis, euentorum uulnerum
 curatione utimur. Si uero inflammatum sit, per irrigationes & cataplasma-
 ta, ac similia inflammationem curamus. Porro in telis me dicatis, omnē car-
 nem quae ueneno participauit, si fieri poterit amputamus. Cognoscitur uo-
 tem ex eo quod si sana carne diuersa est. Vehementer enim pallida & lani-
 da, & uelut mortificata apparet. Ferit autem Dacus ac Dalmatus, oblinere
 aculeis helonium, quod & Ninum appellatur, atque sic hoc sanguinem uulne-
 ratorum conuergens occidere. Si uenit edatur etiam ab ipsis, innoxium esse,
 & nihil mali facere. At si telum in osse fixum sit, rursus instrumento explo-
 rabimus. Etsi caro impedimento fuerit, hanc amputamus, aut disipa-
 mus. Si uero in profundo ossis infixum fuerit, id quod cognoscimus ex eo
 quod in osse firmatum non cōcutitur, etiam si uis afferamus: excusso cultro
 circumfuso osse ablato, aut etiam cerebris, si crassum sit, prius perforato, telū
 exoluimus. At si in principem aliquam partem infixio facta sit, uelut est cer-
 rebrum, guttur, cor, palmo, hepatis, uretericulus, larynx, phrenes, uenter, uel u-
 tra, & lethalia signa iam apparuerint, & extractio multum uexationem in-
 ductura sit, aggregationem recusamus, ut ne supra hoc quoddam nihil profici-
 mus, etiam conuiciandi occasionem idiotis exhibeamus. Si uero euentus
 adhuc dubius sit, periculo praedicto aggredi oportet. Multis enim etiam
 ab eis ossi in aliqua necessaria parte oborto, salus preter omnem expectatio-
 nem contigit: quum sanē etiam leuiores fibrae, & osseae pars, itemque peri-
 tonaei membranae, & totus uterus saepe ablatas esse cognitis sit, & tamen
 mors in his sequuta non sit. Sed & guttur saepe de inuulsiis in anginis disse-
 camus, uelut de summa guttura sectione diximus. In his igitur relinquere

Extractio telis
 in osse fixis

Instrumenta
 ad extrahendum
 telum

Dacus
 Dalmatus
 Helonium, Nium
 apparet

Periculi inter-
 ne ablati ca-
 rene dona-
 tum

telum, inenitabilem mortem inducit, super hoc quod artem ab omni ho-
manis alienum id offendit. Ac eximere telum, multos uelut par est, serua-
re. Nec uero difficilis est, principalium partium fluctarum cognitio, ut
quae ex symptomatum proprietate, itemque his quae excruciantur, & parti-
um ubi reperitur. Membranis enim cerebri seu cruris, dolor capitis circum-
circa uehemens obicitur, & oculosum seruat, cum rubore linguae, & men-
tis emotio. Si uero cum cerebro laesae fuerint, collapsio, uocis interce-
ptio, faciei distortio, bilis uomitus, sanguinis per nares excretio, humoris
albi ac pulis cel per auditorii mearam euacuatio, si sanies per uulnus cran-
ium reperit. Si in uacris thoracis partes inditum sit telum, ita ut seruetur
spacii amplitudo, spiritus penetrant. Ac corde uulnerato, circa sinistram
mamam in telum apparet non in uacuum locum progreffum, sed ueluti in
alio fixum, & quoadque pulsatorium motum praefertens, contingitque sane
guis atri exteriori, si transiitum reperit, perfrigeratio item & sudor, & ar-
rimis deliquium, & circa dilationem mori sequitur. Pulmone uero flucta-
to, si spacium sit, per uulnus spumosa sanguis euacuatur. Si non sit, magis
eum uisum, & uasa circa collum cleuantur, & lingua colorem mutas, & ma-
gnum spiritum habent frigida appertentes. In septo transierit, uulnerato,
telum ad ipsius costas infusum apparet. Inspiratio fit magna, cum dolore
& suspitio per totam humorum nexu partem. Si uero in abdomini uulnus
fuerit, ex his quae excruciantur, manifestum fandi spacium sit, aut etiam telo ex-
tractio, aut hausti in uis fractio. Nam de uentriculo furcus euacuatur, de inte-
stinae lhercas. Quandoque etiam omentum aut intestinum prominere. At uelli-
ca uulnerata, urina excernitur. Proinde cerebro & membranis uulneratis,
telum per caluarie perforationem educimus, quemadmodum in capitis
fracturis statim dicitur. In thorace uero, si non sequatur, per moderatam spa-
cii inter costas medijs incisionem, aut etiam unius costae excisionem, mem-
branae custode sub oculo, telum extrahendum est. Similiter etiam in ventre,
& uelica, & reliquis in profundo partibus, si quidem sequatur telum, circa
curtollarem extenuatur. Sin minus, rursus ampliori incisione, et cruentorum
uulnorum curatione utendum est. In uentre tamca si opus fuerit, sutura ad-
hibeatur, uelut dictum est. At si in magno aliquo uase, uelut in singularibus in
profundum caronibus aut circa alas, aut inguina magnus arteria, in fixa se-
si, amplior sanguinis erupit, propter exemptione minatur, prius laqueis
ab utraque parte ipsa adstringere oportet, & deinde telum extrahere. Si uero
partis ad partem per telum adfixo sit, uelut si brachium thoraci adligatur, aut
cubitus alijs corporis partibus, aut pedes inter se, si quidem non per totam
utramque partes telum a uulsa transierit, sed incens cum acceptam, uelut in
una parte, extrahemus. Si autem per totam penitus una siue pertransierit,
defecto in medio ligno, particulatim singula educimus, iuxta facilem figu-
ram. Quisdoquidem uero etiam lapides lepe, aut mureces aut malle plumbi
horum, aut ciuis oculi quodam in fundo emissa infiguntur, cum oia uolensium,
cum quod angustola existunt, deprehendere haec ipsa oportet, ex eo quod
asper & inaequalis tumor occurrat, & quod non omnino in directum diutius
tendat, sed etiam maioris, & cito uelut conuulsa ac fluida, & quod cum
grauitate dolent. Haec igitur omnia per apta ad hoc instrumenta, aut per
specilli conuexam partem, aut per uulnerarium specillum eximere oportet.
Si uero uulnus adnatus, etiam per forcipem dentibus aut radicibus ex-
uellens delecturam extrahantur. Multis etiam infusa tela laqueantur, &
uulneribus ad cicatricem perducis, post multum tempus, ab effectu eo loco
facto ac rupto, telum existit.

De fracturae ipsam adstringere.

Cap. LXX XIX.

Consequens pro factio fuerit ut post doctrinam eorum quae per chirurgi-
am excruciantur in carne, etiam debet quae ossibus accidunt, fracturis in-
quam & luxationibus agamus, eo quod etiam haec clui usque generi subie-

ita sunt, & primum de fracturis, atque his prius quæ in capite consistunt, tum quod hæc inter chirurgias, quæ in carne, & quæ in osse sunt, medium locum obtinent, tum quod calvaria omnes corporis partes supereminet. Proinde Fractura in summa, diuisio est ossis, aut ruptio, aut dessectio, ab externa aliqua uolentia contingens. Differentiæ Fracturarum multe sunt. Aliqua enim raphanatis, alia scandulatis, alia affulose, alia in unguem, alia polente modo, alia per defractionem sicut dicitur. Raphanatis igitur facta, est ruptio ossis in figuram transversam per crassitudinem. Quidam etiam eucumeratim, & cruralim factam nominant, ex similitudine quæ cucumeres & caules franguntur. Scandalatis uero facta, est ruptio ossis oblonga. In unguem uero, eruptio est ossis parte quadam recta, ad sinem autem lunaris. Eadem etiam harundinatis facta dicitur. Polente autem modo facta, est ruptio ossis in multas tenues partes. Eadem etiam nuca tim facta qui busdam dicitur. Defractio uero, aut etiam præcisio, est ablatio partis ossis, per ruptionem superficiei, ita ut pars ablata deficiat. Atque hæc Fracturæ, tam differentiæ sunt.

De Fracturis in capite.

Cap. XC.

PROPRIETATE uero fractura in capite, diuisio est calvarie, quandoque simplex, quandoque multifida, ab externa aliqua uolentia inducta. Differentiæ autem fracturarum capitis hæc sunt, fissura, excisio, expressio, depressio, cameratio. In infansibus etiam consulsio. Fissura igitur est diuisio calvarie superficialis, aut profunda, in qua affectum os foras emotum non est. Excisio uero est diuisio calvarie, cum osse affectu refractione. Si uero etiam de fractum sit os affectum, de uelationem aliqui affectionem appellauerunt. Expressio est diuisio ossis in multas partes, unde cum hoc quod ossis cula fracta deorsum ad membranam secesserunt. Depressio est diuisio ossis, cum qua os affectum in naturali loco decedit deorsum ad membranam. Cameratio est diuisio calvarie, cum ossis affectionem eleuatione. Aut ut Galenus ait, ad interna secessio ac cauatio, similiter ut in expressione. Sic enim ille putat. Quidam etiam pilationem his annumerant. Est autem pilario fissura angustissima & senium latens. Quæ propter scopi delitescens, eo quod non exacte cognita fuit, moris causa existit. At uero consulsio non est ossis diuisio, id eorum meritis neque fracturam dicent quæ hanc affectionem, sed est impulsio, & uelut flexio calvarie interiorum, cauans ipsam circa circumstantiæ solutionem, quem admodum in anelis & crudis conuulsis uasis contingit, dum extrinsecus percussuntur. Sunt autem & consulsio hæc duæ differentiæ. Aut enim per totam suam crassitudinem os conuulditur, ita ut scopi etiam membrana abscedat, uel omnino per totum hæc calvaria prematur. Aut non per totam crassitudinem, sed circa externam solum superficiem usque ad secundam laminam. Quidam ad has differentiæ etiam Resonantiam appoluerunt, quæ ex ipsorum sententia, est ruptio calvarie in oppositis his quæ per cussis sunt partibus. Verum hi errant. Neque enim uelut in quibusdam uitreis uasis, ut ipsi dicunt, etiam hic contingit. Illa enim eo quod uacua sunt, hoc perpetiuntur. Calvaria uero plena est, & alioqui fortis. Eadem capite in multis alijs partibus percussio, uelut in cadendo contingit fissura calvarie quæ circa solutionem continuatæ curis contingit, postea abscessu circa ipsam facto, & hoc scito apparet, putata est ab ipsis iuxta oppositam plagæ partem facta esse. Sed & hoc uelut primum dicta fissura curatur. Si igitur fractura in capite facta est, manifestum id sit ex eis quod scimus fecit corporis acuminem, aut grauitatem, aut duriciam, aut uolentiam, & ex symptomatis quæ sauciato accidit, uelut est uertigo, uelut eis inter ceptis, repentina collapsio, & maxime in depressione, aut consulsione, aut expressione, aut ad interna cameratione, et cerebro compresso. Quin & ex sensus significatione percipitur. Si enim memorabilis fuerit curis diuisio, per ipsam promptè cognoscemus. Si uero omnino non sit diuisio, aut angusta quedam, fracturam tamen factam esse suspicemur, diuisa enim per

Fractura quid sit
Fracturam
differentiæ.

Fractura in os
par, differentiæ
a. v. habet
Fissura
Excisio
De fractura
Expressio
Depressio
Cameratio

Pilatio

Consulsio
Consulsio
differentiæ duæ

Resonantia

De fissura

uisum, & per insitum tibi explorationem, hoc cognoscemus. Si enim aliqua ex istis fracturis est, statim manifestatur. Si vero fissura solum angusta, & pilularis, sensum laesæ, pharmacum quoddam nigrum liquidum, aut etiam arena mentum scriptorium affundimus, & os radimus. Ipsa enim fissura nigra ostenditur, quare in radendo perseverare oportet, donec fissura lignum obsecuerit. Si vero ad membranam usque fissura tendat, à radendo abstinemus, & ad digestionem progrediemur, utrum ab osse discesserit membrana, aut affixa maneat. Si enim maneat, vulnus moderate inflammatione destituitur, & æger pausatim à lecto liberetur, & pus concoctum apparet. Si vero discessit membrana, dolores augentur, & similiter febris, & os alium colorem induit, & pus tenue ac erudum ferunt. Si vero neglexerit id Medicus, & perforatione non utetur, longè graviora symptomata accedent, bilis vomitus, coxustio, mentis periclitio, & febris acuta, in quibus aggressionem recusat oportet. At si hæc non adfuerint, si quidem membrana non discessit, & fissura solum fuerit, per rasorium instumentum solum curatur, etiam si ad profundè usque descendit. Si vero solum ad secundam laminam, ad illam usque radendum est, aut etiam fractum os tollendum, ac uti dicemus. Si vero etiam in tunc partes conuulsum sit, etiam hæc diligenter auferre oportet per idoneum instrumentum. Quod si etiam discessit membrana, & ea ab intus vulnus osti suscepisti, hyeme quidem ante decimum quartum diem omnino osse ablationem facere coneris, illatæ vero ante septimæ, ante quam relata symptomata accedant. Chirurgiam autem aggredieris hoc modo. Præfata pilis ad utriusque ipsam duas sectiones facimus, quæ ad rectos angulos se mutuo secant, ad similitudinem literæ græcæ χ . harum tamen altera ea sit quæ iam antea est. Deinde quatuor angula in vertice excoriatæ, ut os quod perforandè est ostendat, ut si quidem sanguis erupit, statim hæc postea imbuta indemus. Similiter, si ea deinde linæo complicato, vino ac oleo imbuto imposito, uinculo cõuenienti utemur. Postera die si non rectius aliquid symptomata impediat, perforationem affecti ossis aggrediemur. Aggro itaque in lecto, aut supino reclinatus, prout vulneri conuenit, & auribus ipsius lana obstratis, propter fontis impulsionem, aulæris uinculum soluemus, & a motu linamentis omnibus, factaq; per spongas detersione, duos ministros subhibemus, ut circumdanti tenuibus fasciis, quatuor incumbens fracturæ corporum angulos retrahant, & si infirmum os fuerit, nec naturæ, uel extrinsecus, oppositis scalperi excisorij hoc auferamus, primò enim his ratione inclipientes, & postea cum angustioribus permittentes, deinde etiam ad specilli formam habentia transcentes, & malleo leniter impellentes, ita ut uitemus capitis concussionem. Si vero robustam fuerit os, prius hoc cerebellis sensu demergentibus perforabimus: Talia autem sunt quæ paululum supra aciem eminentias habent prohibentes ne ad membranam demergantur, & tunc scalperi excisorij usi, affectum os auferemus, non æcumatim, sed particulatim, si fieri poterit digitis, si minus, foreipe demaris, aut assarta, auris ossella, pilularia, aut tali quopiam instrumento. Inter foramina autem tantum spaciare, in quantum quantum est maximam specilli caput. Pro funditas uero ipsorum erit, ut prope ad internam ossis superficiem accedant, cauendo ut ne terebra membranam cõtingat. Quapropter pro ossis crassitudine terebram esse oportet, pluribus ea de causa preparata. At si ad secundam tantum laminam caluarie fractura procedat, ad hanc usque solum perforabimus. Post ossis ablationem, explanata per excisionem indurata asperitate, cum rasorio aut specilli formam habente excisorio scalpro, membranae cuiusde subiecta, & ossicula aut aculei, uelut uerisimile est remanentibus, induratis eductis, ad linamentorum usum progrediemur. Hic communior similis scilicet & periculosa exars coniungitæ modus est. Sed & per scalprum excisorium lenticulari modum excidendi modus, insigniter à Galeno laudatur, circa perforationem, post scalpturam per caua scalpra sciam adhibitus. Sic igitur dicit. Si

uero

Perforationis
signa

Chirurgia

Terebra si
non datur,
genia

Scalprum lenticu-
larium

utro femel unam nodaueris partem, subiecto scalp pro excisorio, quod lenticu-
latus partem ad finem prominentem, obtusam ac leuem habet, ac uti ue-
ro in longitudinem rectam, quum latam lenticulam scalp partem supra mō-
bram firmaveris, prout malleolo impelleris, hoc modo calvariam dividet.
Contingit enim ex his actionibus omnia quibus opus habemus. Nam
membrana neli dormitans quidem quis operetur, facti iam potest, hanc soli
partem scalp lenticulam occurrentem. Et si alcubi calvaria adhæreat, cum lu-
tus appensionem et cetera lesionem acellit rotunda lenticula scalp exsternis-
tas. Sequitur autem hærge ipsam per genum, scalpnam calvariam difficit.
Quare neque qu magis periculo careat, neque qui citius operetur, alium perfo-
rationis modum reperire licet. At vero per urebras, & modiolos, chonici-
das appellatas chirurgia, hæc enorthus uelut prout reprobatum est. Atq; sic
quidem aggregationem uelut in fissura expellimus. Idem tamen modus cri-
mendorum ostium, etiam in reliquis calvarie fissuris conveniet. Sed &
quantitatem ostium quæ excindi debent, Cælius nos docet, ita passim di-
cens. Quæcumq; uero affecti ossis excindere oporteat, deinceps ubi expans.
Quod quidem uehementer contritum est, totum id excindere oportet. Quid
si quædam fissuræ ab ipso amplius extendantur, quem modum alioq;
contingere uidetur, has ad finem usq; persequi non convenit, ut qui probe
sciamus quid nullum damnum ex hoc sequatur, si alia omnia recte fuerint
peracta. Post chirurgiam, linteolum simplex pro magnitudine ulneris, ro-
saceo imbutum membræ integram, & hanc sic cum partem, similiter
rosaceo imbutum predicto linteolo imponemus. Deinde complicamus du-
plex linteolum uno & oleo imbutum, aut etiam ipso rosaceo, totum uelut
circumponemus, considerando ut ne membræ grauetur. Post hæc deli-
gamento utemur, neq; per hoc confringemus, sed ut tantum constrictur
linamenta. Proutq; inflammationem auersem et fibrilem condactis ex-

1100
 1100

habebimus, frequentius interim urigines rofaceo membranam. Tertia vero die lacta solutione, & per spongas detractione, cruentorum vulnere & inflammationem acente carationis ductu utemur, inspergentes membram aliquem pulvillum capitealem siccum, usq; ad conca nationem. Quamdiu etiam redites ossi foret opus sit, ob aliquos prominentes scutulos, aut etiam propter ipsam incarnationem. Quin & reliquam medicamentorum materiam, velut in vulneribus dictum est, adhibebimus. Quin & quidq; utro sipe post chirurgum membrana inflammatur, adeo non solum calus rix & effusio sanguinis, sed etiam ipsius cutem transgreditur, cum remissu, & naturalis ipsius motus pulchrioris impediatur, ad que consilio maxime, & alia gravis symptomata, ut more consequantur. Inflammatur autem, siue ob acutam aliquam ossis prominentiam pungentem, siue ob linamentorum gravitatem, aut ob frigida aerea, aut multum cibum, aut vini posum, aut etiam ob aliquam obcuram causam. Si igitur ob manifestam causam inflammatur, hanc cito recidenda est. Si vero ex obcura, plus comedere oportet, adhibendo aut vena sectionem si non si quod prohibeat aut cibi abstinentiam, aut vinctum ad inflammationem commodum. Sed & localibus utendū est auxilij, velut est calidi rofacei irrigatio, & perfusio ex decocto althææ, aut feni greci, aut seminis lini, aut etiam meli, & similibus. Caraplastis etiam ex cruda ordeacea farina, & semine lini, cum prædicto decocto, & adipi gallinæo irrigationibus quoq; per lanam in capite & occipite, insillando etiam sudoriparantibus oleum quoddam ex his que inflammationem accendunt. Sed neque ulcere negligenda sunt, quo minus caraplasta ipsi impendantur. Totius item corporis providentiam facere oportet, ut in illa quam calidam ipsos inducimus ac incutamus. Si vero perseveret inflammatio, & nihil aliud prohibeat, etiam hanc educente medicamēto Hippocratis ipsos ungere iubet. Porro denigrata membrana, si quidem in superficie sit nigricans, ex medicamento aliquo hanc utin habente inducenda, velut

Volume 1Before split
into:

Abstracts of
other relevant
work

in domestic

tripulum rosaceo ammixtam, per linamenta indemus, & sic curabimus, con-
sequenter etiam reliquis adhibentes. Si vero spontanea nigricies fiat, & ma-
xime in profundo, cum alijs malis signis, tunc sane de his desperandum est.
Infelix enim à natura caloris mortificationem significat. Non quendam qui
postea cum ab accepto vulnere, calvaria perforationem admisit, & super-
fici easit. Erat enim in incipite fractura ex telo inducta, & effluxionem ha-
bebas, propter quam membrana illa fracta servata fuit.

De naso fracto et contuso. Cap. XCI.

Nasus fractus.
Nasus fractus.

NASUS inferna pars quae arthraginosa est, non frangitur, sed contunditur,
& sine fistula, & disforquetur. Superiora vero, quae ossis naturae est, quan-
doque fragitur. In his vero Hippocrates deligationem reprobat, ut quae ma-
gis similitudinem, & ampliores dissolutionem inducit, propterquam si quae circa
medium nasum partes ob impulsionem supereminant. In his enim, conven-
nientem deligationem, cum medicamentis impositione assumit, quo oppres-
sus nasus naturalem figuram recipiat. Fractio itaque naso in infernis paribus,
iodice aut parvo digito immisso, directionem partium foras facere oportet.
In interioribus vero etiam cum ipse illi capite hoc faciendum est, statim in
prima die, aut non multo post eam. Nam circa decimam diem nasi ossa cor-
roborantur. Extrinsecus quoque indice & magno digito hunc conformare
oportet. Quo vero conformatus figuram suam incollapsam conseruet, cu-
neolos ex linteolo intortos ac inuolutos duos naso indere oportet, in lingu-
las nates unum, etiam altera solli nasi pars sit distorta, & hoc sinere, donec
os aut cartilago corroboventur. Quidam etiam pennas a ferum, vel ut cala-
mos adaptatas, linteis infusus naso indiderunt, quo & figura conservaretur,
& respiratio non impediretur, quod sine necessarium non est, quam per os
respiratio fiat. Quod si inflammatus sit nasus, medicamentum aliquod inflam-
mationem arcens imponemus, velut est emplastrum ex saecia, aut ex aceto
& oleo, aut tale quoddam. Aut cataplasma ex similagine triticea, cum man-
na & gummi cocta imponimus, tum ob inflammationem, tum ut nasus con-
tinetur. At si in alteram partem nasus fuerit distortus: Hippocrates post con-
gruam conformationem, iuber loci longi, digiti latitudinem habentis alter-
ram extremitatem, glutino aut gummi illitam, ad summam nasi partem, ex
eo latere quod inclinatum est agglutinare, & postquam siccata induruit, la-
ram iuxta oppositam aurem ad occiput & frontem ducere, atque eo loco por-
ticia alteram loci extremitatem firmare, quo in locus retractus nasus ad me-
diam figuram dirigatur. Verum hoc non valde probatum est iunioribus. At
vero si in tenuibus partes contracta fuerint nasi ossa, dilationem facere aut am-
pliare oportet, & tenuibus officulis uolvello pilaria exoptis, disparatas par-
tes iubaris coherere, & cruentorum vulnerum ac glutinatoria curatione uti.
Si vero etiam intra nasum ulcus factum fuerit, lemniscis diutius linamentis,
ex medicamentis congruis illis ac inditis curetur. Quidam etiam plūbeis
fistulis usque ad eicatricem inductū sunt, ut ne caro exulceribus excreveret.

De infra maxillae fractura et aure contusa. Cap. XCII.

Aure contusa.

Maxilla infer-
a fracta.

DE aure contusa in tertio libro tradidimus, eo quod talis affectio ad fra-
cturas non pertinet. Maxilla vero inferna frangitur ob multas causas.
Si igitur extrinsecus solum fracta, non autem instar caudae, inardescat, no-
te expolite sunt ad manum. Proinde alterius manus, dextrae, si dextra ma-
xilla fracta sit, sinistra, si sinistra, indice & medio digito aperti osi immisso,
internam fracturam gibbum indurui foras protrudere oportet, ita ut altera
manus foris illum excipiat. Maxilla vero reclinando, ex dentium inflexum
ipsi aequalitate colligatur. At si cauitum facta est fractura, tensione utriusque
retroclusus, & ministro tenente, directionem velut dictum est facito. Ceterum
disparatos circa fractam partem dentes, coniugatos velut Hippocrates ait
colligare oportet auro, hoc est auro lino sive filo. Verum quia hoc non om-
nibus promptum sit, filo lineo foent, aut bysso, aut sedis equinis, aut aliquo alio
huius-

huiusmodi. Quod si cum ulcere facta est fractura, explorandum specillo est, an etiam defractio ossis facta sit. Et si hoc ita habet, & parua est diuisio, ampliat ea, defractionem os siue unum, siue plura sint, per idoneum instrumentum eximere, & labia ulceris futuris contrahere, & cruentiorum uulnorum medimento adhibito deligare oportet. Si uero sine ulcere, cerato simplici maxillæ imposito, convenienter deligare, ita ut media faciei pars ad occiput locetur, deligationes autem utrinque ad aures in summum mentis procedant, deinde rursus ad occiput, postea sub mentum, & hinc per genas ad sinapsum, & rursus hinc sub occiput, ubi etiam sunt fasciæ debet. Adhuc rursus superfectio faciendæ est, hoc est aliud ligamentum fronti circumdatam in posteriori capitis parte cōnectatur, ad omnes prædictas deligationes cōstituendas. Quidam etiam scutulum leuem, uelut aliquam aequalis longitudinis maxillæ imponunt, & uelut dictum deligant. Alij deligatione quæ caput situm dicitur utuntur. Porro si ambæ maxillæ iuxta summum mentum uel lantur, quæ parte etiam coalescunt, ambabus manibus paululum diductas ipsas, rursus inter se coaptato, & coniugatis dentibus uelut dictum est, deligant, & congruus usus deligatione, quiescere ossa, tenuibus & fortilibus si mentis utantur. Manducatio enim ipsa inimica est. Et si quid de figura emortuam esse putaueris, tertio quæ die soluens rursus deligato. Atque ita factis donec callus obducatur. Obducitur autem callo maxilla intra tres maxime hebdomadas, eo quod & laxa, & medulla plena est. Si uero inflammatio quædam obortatur, nihil irigationum ac cataplasmatum ad hanc commendum est id quod in omnibus similiter tibi obseruandum est.

De clauicula fracta.

Cap. XXXIII.

Capitulum, de
ligatisClauicula fra-
cta

Clauicula in naturali figura iuxta internam partem pectori coalescit, iuxta externam ad summum humerum articulat. Et propterea quam humerum aut etiam ipsum brachium sustineat, si fracturam pertulerit in quacunque tandem parte, ea pars quæ ad humerum est plerique magis quam interna eius extremitas deorsum fertur, ut quæ unâ cum brachio detrahatur. Præstat autem cautissimè, & non scandalisimè, aut haeridissimè clauiculam frangi, ex multorum sanè sententia. Quod enim cautissimè fractum est, per extensionem & compressionem digitorum, promptè ad naturalem situm redit. Reliquæ uero emulgentias habent, quæ difficile adaptari possunt. Si igitur per totam crassitudinem quoque tandem modo fracta fuerit, duo ministri, alter brachium id quod est ad fractam clauiculam manibus amplexus, ad externam partem simulq; sursum trahens, alter oppositum humerum, aut omnino collum attrahens, sic in contraria faciant extensionem. Medicus autem suis manibus fracturam componat, promittentiora impellens, & quæ in profundum sunt extra attrahens. Quod si ampliore opus fuerit extensione, globum sanæ magni ex paniculis aut lamis, aut etiamodi aliquo molis alij subiecit, & cubiti flexuram ad eandem quæ ad ipsum est adducto, & reliquæ uelut dictum est faciat. Si uero extremitatem clauiculæ ad humerum, in profundum elapsam, ad superficiem attrahere non poteris, supino reclinato homine, & palmarum congruo dorso subiecto, & ministro ambobus humeros deorsum deprimente, ut os clauiculæ quod in profundum est restringatur, nunc ipsi digitis fracturam composito. Si uero pars quedam à clauicula defracta, & emorsa, inconstans se pungens sentiat, scalpello in directum dissecantes, & defractam auferemus, & reliqua per excursoria scalpri explanabimus, clauiculæ subiecto membranæ custode, aut alio excursorio scalpri, scutis firmamur gratia. Et si quidem inflammatio ab sit, futuris: si minus, lana emortuamur, & ipsius diuersis preparatis, ad supereminens ossis inclinationem, maiora & crassiora apponemus, si adhuc inflammatio, oleo madentiat, si non sit, sicca. Et cōgruo ex lana globo alij subiecto propinquas, cōuenienter inducimus deligationem, per alas, & affectam clauiculam, & scapula prout conuenit, deligationes ducentes. Et si clauiculæ ad humerum pars, deorsum

Brachij appen-
dit

sum inclinatae sit, latioris lori media parte cubiti gibbo, qui ad ipsam est, sub
scapula, totum brachium de collo suspēdimus, ex alia etiam scapula manu, quae
ad ipsam est, suspēnsa, uelut in his quibus uena in cubiti flexura scissa est, si-
ci solet. Si uero, ad supernam extremitatem uergit, id quod raro contingit,
recusanda est brachij appenditio, arger uero supinus reclinandus est, ac tenui
uictu nutriendus. Si uero opus fuerit, etiam irrigationes adhibeantur, & re-
liqua secundum rationem fiant, usque ad callum inductum. Inducitur autem
clauiculae callus ut plurimum in uiginti diebus.

De scapula.

Cap. XXXIII.

Scapula fracta
et
scapula flexa.

Scapula circa latam & mensuriam partem non frangitur. Verò fracta spi-
nam suam fracturam patitur, quae aliquando exprimitur, aliquando ru-
pionem simplicem sustinet, aliquando etiam defrangitur. Expressio tactu
cognoscitur causa occurrens, corporeque uicini brachij, & pectorum dor-
salem inducens. Ruptio uero tactus asperitate, & loci dolore cognoscitur.
Ambo autem inflammationem arcere dactis curantur. At de fractio, quae
etiam ipsa tactu cognoscitur, si quidem quiescit, conuenienti deligatione assi-
gitur. Si uero innatae & pungit, per sectionem, & ablationem, & suturis ue-
lut antea dictum est, curatur. Deligationes autem etiam hic similiter uelut
in clauicula adhibeantur. Et reclinatio in oppositum latera fiat.

De pectore.

Cap. XXXIV.

Pectus ossis
fractum

Media ossis pectoris pars frangitur & exprimitur. Summa uero pars de-
frangitur. Si igitur ruptio distorta facta est, loci dolor & inaequalitas se-
quitur, & ad digitorum innatum strepitus. Si uero expressio, dolor uehe-
mens, spirandi difficultas, tussis dum membrana costas succingens pungi-
tur. Raro etiam sanguinis eductio. Cautas quoque ossis fracti & celsio. Sed
& nunc cautio similiter disponenda est, uelut in scapula dictum est. Verò
in expellitione repositionis modus secundum Hippocratem assumatur, quò
ille in clauicula quae intro cecidit, exposuit, per supernam reclinatorem, & cer-
uicalem sub dorsum subiectionem, & scapulari depreffionem, unà cum hoc
ut & costae utrinque manibus contrahamus. In celsis autem costis cum lana,
circularis deligatio assumatur, subiectis antea in directam duobus loris ex
humeris dependentibus, ita ut postea amborum initia ad opposita conue-
dantur, & circulares deligationes decidere prohibeant.

De costis.

Cap. XXXV.

Costae doli et
an spatae

Ex costis, quae etiam spatae dicuntur, quae quidem osses sunt, in omni
parte ruptionem sustinent. Spuria uero, iuncta spinam solum. Nam hic
solum osses existunt. In anteriori uero parte, in cartilagine transuerse
contundantur, & non franguntur. Signa non difficulter colliguntur. Nam
loci inaequalitas digiti explorantis occurrit, & strepitus, & adductio ad
partem fractam. In his autem quae intro uergunt, etiam dolorum ehemens pun-
ctorius, grauior eo qui in pleuritidis sentitur, eo quod uelut aculeo membra-
na costae succingens laedatur: spirandi difficultas, tussis, sanguinis saepe
eductio. Et alias quidem emotiones digiti conformare licet, cum uero quae
intro ceciderint non item, eo quod desperata sit repositionis facultas. Unde quidam
flatusculum & multum cibum exhibere iubent, quo per inflationem & ten-
sionem fractura foras propellatur, id quod necessarium non est. Nil enim
commune est thoraci cum nutrioris membris, quantum ad hoc attinet, si
praeter hoc quod etiam inflammatio à repletionem augeatur. Alij coarctatam assi-
gunt, quod non alienum est à methodi ratione, nisi corporum ex coarctatio-
ne coarctatio, fracturam amplius ad interna impulsura esset. Quapropter

Soranus

Soranus dicit. Lanis oleo calido madidis partes integantur, & per lintheola
complicata, intermedia costarum pars expleatur, quo deligatio secundum
circularem obductionem equalis ac plana fiat, uelut in pectore. Omnia ue-
ro uelut in pleuritidis fiant, ad magnitudinis proportionem. Si uero magna
aliqua necessitas cogat, ob uehementem succingentis membranae punctu-
ram,

ram, diuidere eam in partes, & fractū collicis partem demodare. Deinde mē-
bram cutis de subiecto, ut ne succingens vulneretur, induit, & excindere,
& pungentia officula eijcere. Post hoc, ea quæ inflammatione carent con-
tangere, & velut cruentam vulnus curare. Inflammata vero, oleo tinctis li-
namentis tegere, & nutrire ac curare his quæ inflammationem sedant. Re-
clinare autem prout illi facile taliter.

De costis, & pectus ossibus.

Cap. XC VII.

Costarum autem ossa raro franguntur. Eisdem autem fracturatum dis-
serendas habent quas scapulae defranguntur enim iuxta fines, & rursus
puncta in longitudinem, & exprimentur in medio. Sequitur ad hoc loci
dolor punctorius, ac pulsatio ius sensus. Et cruris ē directio sibi corporis, si facta
est expressio. Exigunt eandem quam scapulae repositionem. Solutum uero re-
culant eius quod defractū est exemptionem per externas partes, per charu-
gram, quum si opus sit digitis conformentur. Consentaneam etiam reliquis
curationem facere oportet, irrigationibus utendo, & causas illam partes cō-
plicitis lincolis explendo: quodum circulares deligationes obducentur,
deligatio plana fiat. Eadem dicenda sunt & de pectus ossibus. Neq. enim ha-
bentur quicquam quod de his peculiis riter dicamus.

*Consuetudo
ossis fractum*

*Pectus ossibus
fractum.*

De verticilla, & pectus ossibus, & de ossi sacro.

Cap. XC VIII.

Verticulorum plexus ac ambitus aliquando consensionem, Raro etiam
fractiōnem sustinent, ob quas dum spinalis medulla membranae com-
primantur, aut etiam ipsa medulla, nervorum per consensum affectiones fi-
unt, & mors cito sequitur, & magis si etiam circa colli verticula consistat af-
fectio. Quare praedito periculo, si fieri potest aliquid audere oportet, & per
sectionem premens officulum eximere. Si minus, saltem inflammationē
arcente ductus hos mitigare. Si uero processus aliquis verticulorum, ex qui-
bus plexus constitutus est defrangatur, ita ut fragmentum ad digitorum con-
trectationem moueatur, & uicissim recurret, in cisa ante hoc eximere oportet,
& facta per sanas contraditione, eruentium uulnerum cura non uti.
A quo si os sacrum fractum sit, indicem sinistram manus digitum in sedem
demittere oportet, & altera manu fractam partem quamcumque fieri potest con-
formare. Si uero quid defractum sentiamus, etiam hoc facta diuisione exi-
mendū est, deligatioq. ac curatio commoda adhibenda.

*Verticillorum
fractura*

*Ossis sacri fra-
ctura*

De brachio.

Cap. XC IX.

In brachio fractio Hippocrates extendit, sic fecit. Oportet inquit, lignū
oblongum, qualla sunt signa quæ in foramina ligonum immittuntur, ab
extremis partibus sanibus iligare, & transversum de trabe aliqua suspen-
dere. Hominem uero in alia quadam sedelocatum, erectorem quā in ea
figura quæ erecta ceruice dormimus, manum suam supra dictum lignū erig-
minere, ut mediam ligni partem per transversum alæ sine adapet. Inflexo
autem in rectum aequalum cubiti gibbo, mīnister flexis genibus incumbens
manum eius tenet, & postea graui aliquo, uelut est lapis, aut massæ plumbæ
pondus, aut eiusmodi quiddā, de cubiti gibbo appenso, atq. ita ut sub
hinc dependat dimissio, fracturam dirigit ac composito. Aut pro graui il-
lo appenso, mīnister brachium deorsum trahat. Quidam uero pro ligno
quod in foramina ligonum immittitur, gradus scalæ uti sunt Soranus ait, uti
sic. Homine in sella collocato, aut quod melius est supinato, quominus
affligatur. Deinde manus iuxta articuli iuncturam laqueo ligata, & de cer-
uice suspensa, quo angularis ipsius figura teritur, duobus ministris impo-
nuntur, alteri ut supra fracturam, alteri ut infra, digitos apponant, atq. sic ex-
tensionem perficiant. Si uero in extensiore traditione opus sit, duo loca aequali-
ter secta brachio circundamus, alteram supra fracturam, alteram infra, &
ministris qui super caput agroti sit, itemq. alteri qui ad pedes, longum in-
tradamus, & in eorum animum extendere habemus. Si uero ad firmum huius-
rum fractura consistat, mediam lori partem alæ subacimus, & ei qui ad ca-

*Brachii fracta-
ra*

put adfuit tenendam damus, atq; ita altera oppositam in contrarium trahentem, extensionem in altera velut dictum est facimus. Que modum etiam si ad cubiti gibbum fractura sit, iuxta illius, aut etiam iuxta manus articulum locum ungiuntur. At vero ossibus fracturæ probe coaptatis, extensio remittitur, deligatio solum secundum Hippocraticam legem fiat. Verum si quidem inflammatio absit, & recens sit fractura, lineis utendum est fasciis, oblongis quidem, latitudine vero trium aut quatuor digitorum, æquæ aut posca madidis. Si vero adsit inflammatio, lanis tenuibus ac mollioribus oleo imbutis. Esi in medio brachij fuerit fractura, principalem fasciæ supra fracturam immittere oportet, & ubi iterum atq; iterum deligatis, scilicet femore, quo sanguinis influxiones intercipientur, atque illic desinat. Vendum etiam est altera fasciæ, initio eius similiter fracturæ immisso, & in reliquis eodem modo velut in priore, ut tamen ex superius deorsum tendas, atque hinc rursus ad superius recurras, ibique ins desinat. Moderata vero si adsit restrictio, & ad nostrum, & ad ipsius ægri sensum. Si vero ad summum humerum fuerit fractura, priori fasciæ hamæque & scapulæ ac pectus comprehendantur, quo grævia appellata deligatio fiat. Secunda autem atque ad cubiti gibbum distrahatur, illincq; ad superpositas partes recurras, comprehendens humerum, scapulas & pectus, velut priore. At si ad cubiti gibbum fractura sit, etiam cubitum simul deligare oportet, angulari figura servata. Eodem modo etiam in alijs artibus, velut sunt cubiti, femora, tibiae, si iuxta partem, aut etiam prope articulum, & non in medio artus fractura est, articulus simul deligandus est. Iuniores post deligationem fasciæ etiam ferulas imponant, quo figura repositionis contineretur, adstringentes ipsas ad sensum, & inflammationis molem. Verum antiqui post septimum diem ferulas adhibuerunt. Nam intra hunc decreverunt inflammatione, membrum tenuius redditur. Soluere porb deligationes Hippocrates tertio quoque die iubet, ut ne operto citra resolutionem membro, tensio aliqua aut prius accedat, neque diutius per spirationes impediantur firmata iam fractura, ob quas contingat, ut non solum ante quidam pruriant, sed etiam ut erosio persaniet acrimoniam cute exulceratio fiat. Affundendum igitur est aquæ temperate calidæ tantum, quantum satis est ad sanem dissolvendam. Post septimum diem, pluribus diebus interpositis solvere oportet. Nam neque partes sanæ excretionem amplius operari habent, & calli incrementum sic melius procedit. Ferulas autem hoc modo adhibere oportet. Splenis triplicata oleo imbuta fasciis deligatis circumdamus. Si igitur æquale fuerit crassitudine membrum, æqualiter. Si inæquale, cauiore partes splenis explentur, atque ita æqualis crassitudinis pars, ad ferularum impositionem efficitur. Deinde ferulas lana aut strappo moderate obuolutis, ipsas circum fracturam adhibemus, non minore quam digiti spacio inter se distantes, leniterq; adstringimus, cauendo quantum eius fieri potest, ut ferule articulum non contingant, & maxime iuxta internam flexuræ partem. Vlcera enim in ipsis aliquando, & nervorum inflammationes efficiunt. Proinde breviores ipsas circa articulos esse oportet, velut sanæ etiam fortiores, quæ parte fractura in gibbum atollunt. Præstat autem & brachium ad thoracem moderate deligare, ut ne si id commoveatur, figura inuertat. Si vero inflammatio adsit (hanc autem cognoscimus & ex circumfuso tumore, & rubore, & quod nunc magis quàm prius adsit) aut etiam fractura disiecta sit, aut etiam nihil horum, sed laxa apparent, aut rursus adstrictiones quam convenit deligationes, soluere ipsas oportet, & deligationem corrigere. Reclinatur itaque æger supinus, super stomachum manum habens. Brachio autem subieciatur cervical molle, corium inductum habens, quo irritationum influxiones suscipiat. Irrigetur autem quotidie oleo calido, & maxime si adsit inflammatio. Et nutriatur tenuiter quidem tempore inflam-

mationis

Contra deli-
gati

Ferulas
splis

mationis, postea uero moderate, ad calli generationem, & quiescat usque ad callum induratum. Concalescit & brachium, & tibia, circa quadragesimum diem, post quem facta solutio, & balneo adhibito, emplastris fracturis de sinapis curatio perficitur. Atque hic aggregationis modus ferri etiam omnibus alijs fractis artubus conuenit.

De Cubito et radio.

Cap. C.

Cubiti fractura

Cubitus & Radius quandoque ambo simul franguntur: quandoque alter solum aut circa medium, aut circa partem ad cubiti gibbum, aut ad manus articulum. Possimum igitur est ambo simul fractos esse. Deinde cubitum solum. Facillima uero curatio est, si radius frangatur. Erli enim maior sit cubito, illum ipsam tamen subiectam habet, in quo uertitur. Verum si quidem aliter solum fractus sit, iuxta illum maxime extensionem, uel contractionem facere oportet. Si uero ambo, similiter extendere et conuenit, figurata manu in angularem figuram, ita ut pollex omnium digitorum altissimus sit. Minimus contra, infimus. Ita enim continget, ut cubitus radio subiacetur. Quod si robustiore opus fuerit extensione, ambobus maxime fractis, non solum manibus, sed etiam loris facienda est extensio, uelut de brachio dictum est. Sed & omnem deligationem, & reliqua consequenter, una cum ferularum impositione, uelut in illo facere oportet, donec ossibus callus obducatur. Inducitur autem callus circa cubitum plerumque in diebus triginta. Sed & Deposito similis ei quae brachio fractio sit, adhibeatur, exceptis his quae subdesuntur.

De sinuata manu, usque digito.

Cap. CII.

Articuli ad manum, brachialis appellati, & oppositi ei partis ossa, ut tempus digitorum ossicula, quam laxa sine & natura fistulosa, plerumque conuinduntur. Raro autem franguntur. Collocato igitur argo in altiore sella, praecipendum est ei, ut in tabellam aliquam planam, marum pronam ponat, & extensis per ministrum fractis duobus digitis, pollice ac indice ipsa componantur. Verum appressa deligatione vincendum est, quo tempore inflammatio accedit. Nam propter laxitatem, facile in ipsis calli redundantia excrescit. Si uero intermedium aut simpliciter digitus fractus sit, si quidem magnus, qui & pollex appellatur, is facit, post idoneam deligationem, inferre ad palmam deligandas est, ut quiescat. Si uero index, aut paruum, ad uicinum deligetur. Si ex medijs aliquis, his qui ab utroque latere sunt alligantur: aut etiam omnes ex ordine simul colligandi sunt. Melius enim quiescunt, quemadmodum si fracti etiam ferulis adhibitis colligati essent.

Ossium critica
si ad manum
fractura
BrachialeOssium digito
intermedium
paruum

De Femore.

Cap. CII.

Femoris eadem est quae brachij ratio. Priusquam uero femur dum frangitur, magis in anteriorem locum disorquetur, atque in externum. Nam in hoc etiam naturaliter dilatatum est. Reponitur autem per manus, & lorae, ac laqueos aequaliter extensos, altera supra Fracturam, altera infra circumdato. Si uero iuxta partem facta sit fractura, si quidem ad femoris caput sit, medium lori lanas obuolutam habentis partem, ut ne corpus leceat, ad interosseum locamus, & initia ad caput adducenas, ministro tenenda tradimus. Infra fracturam autem circumdato laqueo, initia eius alteri ministro extendenda damus. At si ad genu fractum sit, lori supra fracturam circumponimus, & initia sursum extendenda praebemus. Ipsum uero genu uticulo adstrictum tenemus, atque sic iacente ad brachio, mane, & extenso crure, fractam partem componimus. Ossa uero pungentia sursum tracta tollimus, uelut saepe dictum est. Reliquam curationem in brachio diximus. Concalescit femur diebus quinquaginta ceterum dispositionis modus post totam de crure doctrinam dicetur.

Femoris
fractura

De pedibus Cap. CIII.

Pars os
falsus

I Arum os est genu parvella, & superne ac inferne à corporibus valde cō-
tinetur. Ex sepe quidem contunditur, raro autem frangitur. Patitur autē
raptionem per crassitudinem, & in tenues partes fractionem, cum ulnere,
aut sine ulnere. Notae conspiciuntur sunt. Solutio enim continuitatis occu-
rit, & caritas, & thepatur. Componitur autem pars crurae exterior ita enim
quae in duas partes diuisa est, digitis contrahitur, donec tibia fracturae ma-
iorem se coniungant ac cōmittantur. Quae vero in tenues partes fracta est, con-
formatur. Nam etiam si non fiat eam obductio, eo quod utraq; pars per con-
tectos musculos ac nervos, à formore & tibia in contrarium retrahatur, ta-
men malum de diffinita contrahetur, actione isq; difficultatem affectus inde
est. Neq; enim diu laborant, diutius id genu sustinet, & in deambulando
maxime impediuntur ad ascensum. Etenim ad motum in planitie, actionis
difficultas occultatur. Ad ascensum autem, eo quod genu nō flexatur, circa
cruris elevationē ac depositionem deprahenditur. Sed & nunc pungens
osticulum cum attractione exterius, ac consequentem mutationem adhi-
bentis.

De tibia Cap. CIII.

Tibia fra-
ctura
Fibula fra-
ctura

Consona est Tibiae cum cubito ratio. Nam & haec duobus ossibus con-
stat, crassiore altero, quod eodē nomine Tibia appellatur, altero tenuio-
re, quod ex similitudine fibula appellatur: eisdemq; fracturarum differenti-
as habet, ut quae ad omnem locum distorqueatur, quum ambo ossa cōsti-
ta fuerint, ad tres quum alterū, intus & extra, & tibia quidē est ā retro sum,
Fibula vero antrosum. Quapropter etiā similiter dirigitur ac reponitur, ge-
manus, aut laqueos, ita ut laquei supra fracturam aliquando ipsi tibiae ad-
cundentur, aliqui ad os femori. Quā robustius sit genu, articulus in exten-
sione illatus conservatur. Similiter etiam toris intra fracturam utendū est,
velut de cubito dictum est. Reliqua veluti de brachio tradidimus, fiant.

De summi pedis Cap. CV.

Summi pedis
ossum fracta
ne
Rationem et

T Alius omnino non frangitur, eo quod undiq; corporibus munius se per
tibiā & fibulam, & os cubito sume. At Nauticulare os, & ossa pedis
summi ac digitorū pedis, & ipsum os Cubito sume, frangitur similiter ut os-
sa in articulo ad manū, & opposita eius parte, et digitis manus. Quare ne se-
pius eadem dicamus, ea quae de illis tradita sunt, illis hoc transferantur.

De Depositione Cruris Cap. CVI.

Depositione
cruris modis

Post morte aut tibia fracta, depositionis modus non minore diligentia, quā
reliqua omnia quae ad curationem pertinent, adhibeatur. Nam fracturam
partium aequalitas maxime per istam probe adhibitam conservatur. Qui-
dam igitur in canali, alij ligneum, alij testaceum, fractum membrum depo-
nunt, aut etiam eras ipsum. Quidam vero sola cum ulnere fracta, eo quod
haec, inquit, ferulis adstringi non possint. Verum posteriores canaliculorum
usum penitus reprobant, ob multas causas, maxime tamē ob compressio-
nem ex duricia horum obortientem. Neq; enim negatum est, etiam cum uln-
ere fracta membra ferulis adstringere, velut offendimus. Superius itaque
ager reclinetur, & crassum quoddam pallium cruri longitudine aequale, ut
transq; contortum ac convolutum, canali iuxta mediam oblongam cavitatē
proportionis similitudine respondens, cruri, quia maxime parte fractura
est, subijciatur. Expādatur autem super istam cavitatem pallij pellis mollis,
ad irrigationes excipiendas. Deinde huius canaliformi cavitati, crus in lon-
gitudinem adapteatur, & a lateribus alia pallia, aut lane apponantur, ut ne
in obliquas partes membrum evertatur. Ad uestigium vero pedis, tabella
panniculo circumdata ob molliciem, erecta applicetur. Et maioris securi-
tatis gratia, duorum laterum ligamentorum medias partes canaliformi illi
pallio subijciuntur, & eum ipso simul fractum membrum leniter deligantur.
Si vero non tolerans hoc ager, totum pedem contrahere conetur, hunc la-
tera summum pedem obvolutum, leniter ad tabellam deligare oportet, ut

ne

ne inuitus inter dormiendum, uelut fieri possit, pedem contrahat. Quibus etiam stragula in medio lecti difficant, ut omnino immobiles sint, & per stragularum hiantem urinae ac alii recrementa excident, de nec callus obducatur.

De fractura cum ulnere.

Cap. CVII.

Si cum ulnere facta sit fractura, & sanguinis eruptio adfit, hanc prius sistemus. Si inflammatio, aut uilis ad ipsam utamur. Si uero carniū cōtussio, scarificabimus partem, ut de gangrena tumor succidatur. Si uero etiam haec ac cedat, aut alia quidam depascendo proserpens putrescens, prout conuenit occuremus. Habes autem singulorum horum curationem libro quarto. Quod si nihil horum adfit, neq. uulnam de ossibus nudatum sit, hamulus & suturis uel crueniorum ulnerum ductu hos entrabimus, de fractis ossiculis & pungentibus aut inearantibus prius exemptis. At si magnum aliquod os supereminet, quod ob magnitudinem in extrusione non commissum est, huic prospicere oportet. Hippocrates enim in femore & brachio fractis, eminentia ossis prius reponere distulades, periculi futuri his praedicis, propter inflammationem, aut etiam contusionem musculorū, ex tensione obortentem. Tempus nam reperit aggregationem aliquando conducemem. In quocumq. igitur os eminetum aggressionem facimus, nequaquam in inflammationem hotentabimus, sed prima statim die ante inflammationem, aut circa nonam, sedata iam inflammatione. Adaptamus autem ipsa per uicem, ferrum autem est id instrumentum longitudine septem aut octo digitorum, crassitudine moderata, ut inter agendum non inflectatur, circa summam partem acutum & lauem, et modeste incuruam. Huius acutam extremitatem incumbens ossis eminentie subijcientes, & iuxta alteram partem renitentes, simulq. moderatam membri extensionem facientes, fracturae extremitates inter se non componimus. Si uero hoc facere ad poterimus, per scalpam excelsioris apposita, id quod eminet amputamus, aut terra desecamus, quomodo infibulis tradidimus. Et ossium asperitatem explanat, membrisq. directis, linamentorum ductu curabimus. Maxime uero prouidendum est in coniugatis artibus, auriq. iugla appellatis, ubi utraq. in ipsis os ex parte defectum aliquo in contractum maneat membrum, ut etiam exacta extensione utamur. Deligatio uero ita adhibenda est. Circularis ab uoluntate ab utraq. uulnaris parte fiat. Oblique uero circa ulceris longitudinem, ita ut in xalitare graecis χ. figuram, chiasmōn dictam, & latinis decussationem cap. b. denarij numeri notam χ. similitudine, fasciae expandantur. Et si quid foetidum adhuc est uiscus, purgantia adhibere oportet. Si purum, incarnantia. linamenta q. ac reliqua experientia cognitam materiam. Hippocrates picato emplastro per linamenta utitur. Hoc autē dicit esse Tetrapharmacum regium. Post incarnationem adhibeantur ferulae. Quidam etiam ab initio ipsis apponunt, ulcens locum uitantes, & prout necessitas urget, ipsas adstringentes, aut remittentes. In quibus porro squamae emittunt, et id quod cognoscimus ex eo quod copiosius humor renuitorū excreuit, ut quod caro circa ulcen nacta ac laxa euadens attollitur: in his deligatione laetore utimur, hamulo uero aut eiusmodi aliquo instrumēto squamae exemptae, robustiore deligatione utimus. Per totum autē ulcerationis tempus, linamentorum cultor ex aliquo inflammationem acriter medicamento, uulnere in, cumbat, & simplex ligamentum adhibeat, quod in singulis citationibus soluantur, reliquis relictis manentibus uelut de brachio tradidimus.

De ulla in fractis supereminente.

Cap. CVIII.

Cum in fractura supereminens de eorum omnino uisat. Quodq. etiam actionem impeditur, si prope articulum fiant. Si igitur adhuc recta callus fuerit, alde adstringentibus medicamentis utemur, per deligationem ea apponentes. Aliquando etiam laminam plumbeam imponēte, id quod opus fuit pergitur. Si uero lapideus ac solutus fuerit, electum rademus,

Fractura cum
ulnere
Gangrena

Ulcus defixa
pie

Chiasmōn
Decussatio

Picatum res
Plastrum trip
pocentū est
Tetrapharmac
um
Remittit uis

Callus in frisa
Bani curare
fieri

scalpris excisorijs id quod supereminet tollentes, & si opus sit, etiam terribels circum circa perforantes.

De Callo in distorsione.

Cap. CVIII.

Callos in
distorsione
callosi

QUum ex callis in distorsione obductis, non modicum actionis impedi-
menti consequatur, maxime si in pedibus fuerint, refractionis modus
nō est assilendus, ut qui extrema pericula inducat. Sed si recta adhuc est
cassus, laxa torse perfusionibus, & cataplasmati ex casicis pinguib. et theri-
core columbino, & alijs medicamentis calli soluentibus utimus. Insuperq̃
frictione ac contractione per manus hunc dissoluemus. Si vero lapsus sit,
distissa per scalpellum super-effice, ossis continuitatem scalpris excisorijs sol-
uemus. Deinde fracturam curabimus, velut antea dictum est.

De fractura sine callo permanenti.

Cap. CIX.

Callos sine
distorsione
duratur

FRacturae quae dam callo non obducuntur, ultra praeteritum à natura ter-
minum, aut propter assiduas solutiones, aut ob immodicas perfusiones,
aut ob incunctum motum, aut ob multitudinem fascierum, aut quod
totum corpus alimentum non sentit, in quibus etiam tenetis membrum, sed
ei contingit. Proinde tum alias causas praestare oportet, tum principue a-
limenti sensum interceptum, ita ut partim per calidiorum adhibitionem,
materiam ad partem attrahamus: partim ut alimentum sollicitans suggera-
mus, balnea item ac reliqua animi exhilarationem. Signa vero in his qui-
bus iam callus obducitur, tum alia adiunt, tum maxime quod fasciae cruen-
tae sunt, etiam si non adsit vulnus, id quod fortassis idem sit, quod quum
substantia circa callum coit, dispersas in ossum cauetis sanguinis gut-
tas exprimit.

De Luxationibus.

Cap. CXI.

Callos obductio
non signum

Luxatio quae

Luxationum tractationem ad fracturas consequentem, par est ut deinceps
aggreddiamur. Luxatio igitur ut in summa dicam, est elapsio
articuli ex propria cavitate ad inconsuetam sedem, à qua voluntarius mor-
tus impediunt. Notius autem differentias alias dicere non possumus, nisi
sciam quae iuxta maioris ac minoris rationem consistit. Si enim perfec-
tē articulus excessit, communī generis nomine Luxatio appellatur abs-
fectio. Si vero solum motus est, aut usque ad cauitatis super-cilium de-
latus, subluxatio vocatur.

Subluxatio

De inferna maxilla.

Cap. CXII.

Maxilla inferna
laxata

Refusus igitur à superiori bus initio sumpto, de inferna maxilla dicamus.
Superior enim quum immobilis sit, luxationis affectionem effugit. In-
ferna vero Luxationem quidem non sustinet, eo quod capita ipsius ad su-
pernam maxillam firmiter sunt conductae. Subluxationem sicut saepe
patitur, eo quod musculi ipsam continentes, praeter assiduum mandendi ac lo-
quendi exercitatione molliores existentes, ob quaslibet causas facile la-
xantur. Nam verbum ξέρω apud Hippocratem laxatur significat. In qui-
bus sane citra aliquam molestiam sua ipse articulus ad proprium lo-
cum redit. Verum de perfecta maxillae luxatione, ista est illius uerba ap-
ponere, quae cum compendio, & citra defectum, clara existant. Sic igitur
dicit. Luxatur quidem & excedit maxilla raro: laxatur tamen saepe
in hiscebus, velut etiam alia musculorum ac nervorum irritationes hoc
faciunt. Manifestum vero ex his maxime sit, ubi excedit. Prominet e-
nim inferna maxilla in anteriorem partem, & in contrariam luxationi
partem obducitur: & ossis cornu circa supernam maxillam tumescit, &
& infernas maxillas difficulter committunt. Quae uero repensio his con-
uenit, manifestum est. Oportet enim aliquem vulnere caput dehere,
& alterum infernam maxillam intussecus ac extrinsecus alio mentum di-
gitis apprehendere, brante homine quantum moderate potis, & primum
quidem maxillam aliquandiu hac aeque illac manu abduci, & ipsam
hominem iubere, ut maxillam laxam habeat, & simul abneat ac quum
maxime tendit. Deinde repente tribus figuris simul laxae oponeat, disti-
genti

Quod apud
Hippoc.

genti in hoc animadversione habita. Nam & est distorsione ad naturam de
ducere oportet, & infernam maxillā retrosum protrudere, ita ut eger hæc
sequatur, & maxillas committat, ac non hiet. Atque hæc quidem repositio
est, & neq. alia figuris fieri poterit. Curatio vero brevis sufficit. Splenium
enim incertum apponitur, ac laxo deligamento deligatur. Securus au-
tem hæc aggressio perficitur, homine supino reclinato, & pulsatū pleni-
sime sacro capiti supposito, ut in ipsum innitens quā minimum cedat.
Insuper autem & caput vulnerati alicui detinere debet. Si vero umbra
xillæ luxata fuerint, curatio quidem eadem est, verum hi os minus com-
mittere possunt. Nam his genæ prominentiores sunt, sed indistortæ. Quod
vero distortæ non sint, maxime cognovimus ex dentium tum superno tum
inferno terminis, è directio inter se correspondentibus. His con-
fertur quā distorsione reponantur. Repositionis autem modus prius dictus
est. Si vero non reponantur, animæ periculum imminet, præ febribus
continuis, & rapido sopore. Soporiferi enim hi masculi sunt, & dum al-
terantur, & dum intenduntur, præter naturam. Solet etiam his alius
belli sa, meraca, pauca egere. Et si uoluerint, meraca uomunt. Hi i-
giur etiam moriuntur decima maxime die. Hoc repositionis modo etiam
nos sæpe visi sumus, fomentis prius ex aqua & oleo calidis, perspongi-
am ad luxatam maxillam adhibitis, ubi maxime agere cedit circa intro-
itus: hominēque in terram locato, nos toto ipsum stantes iuxta prædi-
ctum modum operamur.

De clavicula, & frange humeri.

Cap. CXIII.

CLavicula interia extremitate non excidit: Coniuncta etenim est pectus
circa neque circa ipsum movetur. Si vero per violentiam ab alicuius
extremi acuti clavicula, ad fracturæ ipsius directionem ac coaptationē
reducitur. Quæ vero ad humerum articulata est ipsius extremitas, non val-
de excidit, ut quæ & à bicipitis musculo, & à summo humero pendebatur.
Sed neque ulolento alicuius motu clavicula priuatim movetur, ut quæ pro-
pter solam thoracis distorsionem facta sit. Vnde solus homo inter animalia
claviculam habet. Si vero in palatio contingat, velut utile est, ac hæc
subluxetur, & per manus conformationem, & per multiplicem splendori
appositionē, unā cum convenientibus deligationibus reponitur. Eadem cu-
ratione etiam summus humerus subluxatus ad proprium locum reducitur.
Et tunc caralipholus officium, quod claviculæ cum scapula colligat,
& in excorticis cadaveribus laet, id si subluxatum sit, imperitis imaginatio-
nem exhibet, ac ut huiusmodi caput sit elapsum. Nam ob hoc summa humeri
pars acutor apparet, locus autem unde discessit cauta. Verum inter hæc di-
stinctionem facere oportet, ex signis quæ deinceps referemus.

De humero luxato.

Cap. CXIII.

CApor barchij ad scapulæ caputem articulus sæpe quidem excidit, sed
ne pariter, ob anchorem similem scapulæ processum neq. retrosum, ob
eandem scapulæ neq. in anteriorem partem, ob bicipitis musculi tendinē,
& ipsum summum humerum. Sed raro quidem inter & extra: assidue autē,
& maxime in infernam partem, minus carnosa. Verū hic facile quidem &
excidit, & rursus reponitur. Carnalis uto nunc versa, tarde excidit, & disti-
culta restituitur. Quibusdam vero etiam non luxatis, sæpe ob plagā elap-
sus suspicio oborta est, eo quod inflammatio vehemens sequuta fuit. Crete-
rum eos quibus ad infernam partem luxatio facta sit cognovimus. Affectus
humeri ad sinum collatus muscū differt. Nam & summa humeri pars, un-
de elapsus factus est, canis apparent & summus humerus, velut de ipso sub-
luxato diximus, acutor quā pro naturali modo videtur: & elapsum bar-
chij caput in ala manifeste occurrit: & huius manus cubiti gibbus magis
costis distellit. Si vero cogas ipsum, cum dolore ad costas adducitur: cum eq.
extremo cubiti gibbo, manum ad aures adhibere possim, acq. alium mul-

clavicula in-
teria

clavicula in
terio-
re

humerus sum-
mus subluxa-
tus
clavicula car-
ilaginea

humerus lu-
xatus

formem motum per ipsam laedere. In poteris igitur, aut his quibus recens & non multa facta est elapsio, etiam prominenti medij digiti flexi nodo, tū Me- A
dici, tū laci sunt manus, sinū pueri si, saepe restitutio facta est, uelut inquit
Hippocrates. Veram efficaciores repositio ones hae sunt. Oportet locum hor-
minem, & perfusionibus magis laxantibus usum, ad terram supinum reclu-
mare, & globum moderatum sine coriaceum, sine alium quendam, non ualde
mollem ad aliam adaptare, & sedentem medicum ad laeum affectum, ita ut
aspiciat laeum, si quidem dexter humerus affectus est, dextri pedis calcaneū
super pilam alicuius subditam accommodare. Si uero sinister, sinistri dē ap-
prehensam manum affectam ad pedes trahere, sinuq; calcaneo ad aliam re-
nitet, ita ut etiam minibus aliquis retro ad alterum humerum renitet, ut ne
corpus circumtrahatur. Est etiam alius repositionis modus, per humeri sup-
positionem. Oportet enim iunctumegro longiore, aut saltem altiore, ad
affectum, egri laeum stantem, humerum suum illius stantis alae subicere,
& manum illius extensam ad uentrem suum trahere, sicut reliquum laci cor-
pus retro eum qui humerum suppositū sublimē pendeat. Si uero leuis sit a-
ger, alius quidam, leuis puer ex ipso dependeat. Dum enim manus, & reli-
quum corpus, aequali momento illa anse, hoc retro, deorsum trahuntur, con-
tingit ut suppositus alae humerus elapsam articulum immutat. Quia & per
pissillam appellatam hoc facimus. Est autem lignum oblongum quod erectū
in solo supra aliud quoddam primum constituitur. Huius itaq; extremitas
superne rotunda, & non ualde crassa, neq; tenuis, alicuius aut stantis, aut
sedentis subiectam, prout longum fuerit pissillum, & manu supra pissillum
extensa ac deorsum tracta, alicuius autem corpore e contra deorsum uergen-
te, aut sua sponte, aut alio quodam trahente, repositio fiat. Sed & in scate gra-
de hoc fieri potest, uelut in brachij fracti extensione dicebamus. Hic uero
rotundum quoddam corpus gradum alligetur, quod alae egro si conuenit, et
brachij caput propellere potest. Si uero ob affectionis uarietatem, aut pro-
pter corporis duriciam, repositio difficultatem exhibeat, crepidinis etiam
instrumento utitur. Est uero crepida lignum longitudine bicubitali, lar- B
gitudine quatuor digitorum, crassitudine duorum digitorum, quod alteram
extremitatem rotundam habet, & alae cauitatem facile subit, postea ut pis-
silli extremitas. Hanc igitur extremitatem lino obliquam quo lenior si-
fiat, brachij capiti sub alam adaptamus, totam uero manum ad lignum ex-
tensam, ad ipsum alligamus iuxta brachium, & cubitum, & humerum ma-
num. Postea supra lignum transuersum, inser duas columnas rectas adapta-
tum, aut rursus super & alae gradum, manum cum ligno transuerimus, ut ala
transuersim gradui adpareat, & manum deorsum trahentes, reliquum cor-
pus in alteram partem sublimē pendere sinemus. Sic enim articulus im-
mutatur. Post repositionem autem, moderatam pilam ex lano, si inflamma-
tio abstergeam, si adhe, oleo imbutam alae subicimus, ac deligamus, ita ut
per hanc alam, & humerum, & alteram alam, satis deligationes iuxta chi-
astrum ad decussationem factae appareant, decussatione affecto humero in-
cumbente. Brachium uero ad costas deligamus. Caui tautē globum cum
summa manu ex ceruleo appēdimus, ut ne rursus recidat lapla articulus exel-
dat. Post septimum diem & tardius facta solutione, moderata frictione uten-
dū est, quo corpore duriore facto, articulus difficulter elabatur. Si uero saepe
exodat articulus, aut ob humiditatem, aut uia tam ex longa consuetudine
facta, ad uisionem progrediendum est, uelut antea dictum est. Quum uero
fortibus in uero, aut a parte dum adhuc augescunt, pars laxata fuerit, &
non iterum repositio, in humero quidem carnes nihil a naturalimodo desist-
unt. Neq; enim impeditur manus in quolibet opere naturae, os autem bra-
chij non augescens, breuiter manet, & uocatur tales anol, graecis galanco-
nes, quia simul scilicet cubito praediti. In feuiore uero, & os augmentum non
capit, & totam erui corumpit. Quam etiā corporis grauitatem ferre non
possit

Per pissillam
repositio

Per crepidinē
repositio

Chiastra
Decussatio

Anol
Galancoes

A possit, non exercetur. Sed & in alijs artubus, si luxati mancant, & non reponantur, subiectis paries omnino laeduntur.

De cubiti gibbo.

Cap. CXXV.

Quanto magis uaria est articulatio circa cubiti gibbum, quam circa hu-
merum, tanto difficilius existit circa elapsus, & tardius elabatur, & dif-
ficilius reponitur, propter eminentiarum & caustatum densitatem. Patitur
igitur aliquando subluxationem solum. Soepe uero etiam perfecte elabatur,
intra emorem figuram, maxime autem anteriorem & posteriorem. Cognito-
scitur facile, & ad usum, & ad tactu, elapso occurrente in loco in quem exci-
dit, & eo loco unde excidit cauo apparente. Hæc autem sunt cubiti gibbi in-
spectu maxime declarata. Statim igitur repositionem facere oportet, antequam
inflammetur. Quæ enim inflammatio præoccupauit, ægræ sanantur. Quæ-
dam uero etiam penitus incurabilia sunt, & præsertim si in posteriorem par-
tem eluxatio contingit. Omnium enim luxationum quæ in cubiti gibbo fi-
unt, dolorosissima est & maxime periculosa ea quæ in posteriorem sit par-
tem. Mediocres itaque emotiones etiam moderata intensio restituit, seruis qui-
dem manus exortibus circa brachium ac cubitum tenentibus ac retrahenti-
bus, medico uero manus sua uola id quod excidit in naturalem suam pro-
tudente. At uero Hippocrates eluxationē in anteriorem partem, per acer-
uatam manus flexionem ducit, uolam eius ad humerum ē directio impel-
lens. Eam uero quæ in posteriorem partem facta est, rursus per acceuatam et
multam extensionem, quandoquidem etiam eluxationes, quæ in anteriorē
partem sunt, per uolentiam extensionem maxime fiunt, quæ in posteriorem,
per uolentiam similiter flexionem. Si uero perseveret luxatio, etiam ueteri-
mentione extensio utitur. Talis autem maxime est ea quæ in fracto bra-
chio ab Hippocrate relata est, ubi lignū quod in foramina ligonum immi-
tuitur, assinit. Quidam ex recentioribus repositionem sic faciunt. Duobus
D ministris, ueluti dictum est, extendentibus manum, altero superne ad alam ue-
nientis, altero inferne ad manus articulum, medicus stans ex aduerso ipsi æ-
groto, ambabus uolens ad articulum brachium amplectitur, & ubi fuisse pal-
lium obuolutum oblongum, aut fasciam latam, suis manibus simulq; ægro-
ti brachio circumdare, & ad externam partem ac deorsum ad summam ma-
num retrahere, ipse sequens cum instillatione constrictas manus trahit, donec
cubiti gibbi articulum transgrediat. Oportet autem prius ægrum mandu-
lo illinere, quo lubrica fiat, & medici uolens prompte deducatur. Sic enim
ea quæ elapsa sunt, dum pertrahentium manus uolentia premuntur, in pro-
prium locum reuertuntur. Post repositionem uero, manus in angulum figu-
rata, curatione per splenia & conuenientem deligationem utitur.

De luxatione articuli ad manum, et digitum.

Cap. CXXVI.

Articuli ad manum, & digitorum luxatio, nullam habet difficultatem,
nisi cum ulcere fiat. De hac itaque dicetur, ubi de luxationibus cum ulce-
ratione agemus. Eos uero qui absq; ulcere luxati sunt, modera et excussio,
& curatione inflammationem arcente sanabimus.

De uentriculi fistula.

Cap. CXXVII.

Spina uentricula si perfectam luxationem sustineant, celeritatem in ortem
inducunt. Neq; enim leuem compressionem spinæ medulla sustinet, quā-
do sunt etiam nervorum solum ex ipsa cernas, si comprimatur, ad periculū
indecendum sufficit. At subluxationibus soepe apprehenduntur, & quan-
doq; in anteriorem partem, quandoq; in posteriorem, quandoq; in latera e-
motio contingit. Ex his prima Repandatio, & canda Githolitas, ceteris Ob-
stipitas appellatur. Quam igitur multa uentricula simul paululum emota fue-
rint, hæc plurium simul emotio, secundum circulares flexionis circumfer-
rentiam facta apparet. Et quidam decepti, uelut uentriculi multam emotio-
nem magnam emotionem esse putant, quum tamen magis a emotio non rotundam,
sed angularem faciat spinæ flexionem, quando etiam manus periculum im-
minet.

Cubiti gibbi
Luxatio

Articuli ad
manum

Ventriculi
fistula

Repandatio
Githolitas
Obstipitas

minet. Spina igitur ad interna emolio, nullo modo dirigi potest, quam ab anteriore parte per ventrem opposito fieri non possit. Qui enim aut in scapula extendens res ita affectos, aut cucurbitas affigentes, aut stimulations, aut calles, aut inflationes moventes, se aliquid efficere posse putarunt, scilicet ab Hippocrate conuicti sunt. Quandoquidem uero sepe distractio quoddam osseulorum spinae facta, eamum efficit locum, ubi de fractura dictum est, qui dam hanc affectionem repandam esse putauerunt. Deinde hac breui curam promptè enim callus obducitur, facilem curam Repandationem esse dixerunt, etiam si penitus incurabilis, aut et grè admodum curabilis existat. Nam uirorum, & intercoris suppressio in hac contingit, & corporis perfrigeratio. Posita uero etiam inuoluntaria recte mentis est excretio. Hæc autem obiter uonam & musculorum affectionem per consensum sunt, & ita affecti cito moriuntur, & maxime si in superius ac circa collum uentricula affectio consistat. At uero Gibbositatem ex paruo maxime puero factam, & diuiniorem esse, & non celerem mortem asserre, sed morbum inducere, eumque incurabilem Hippocrates pronuntiavit. In re uero autem facta gibbositate ex casu, machinatione pericula, & rectam agri suspensionem, & ueris inflationem, ridicula sunt. Sola uero Hippocratis directio ac repolitio sufficit. Oportet inquit, lignum magnum ea longitudine ac latitudine, ut hominem capere possit, aut scammum ligno tali æquale, ad parietem apponere in longitudinem extensum, non amplius quàm pedes ab illo distantia, & super ipsum ut, si inuenta quidam expandere, ut ne hominis corpus frangatur. Deinde hominem locum prosum supra lignum illud, aut scammum extendere. Et positis horum his & circum pedes obductis per alas ad dorsum deligare, inuicem lori ad lignum oblongum pistilli formæ erectum alligare, & hoc ipsum in parimento ad finem sub iecti ligni aut scammi statuere, & super a parte tenendam ministro retro eggi caput stanti præbere, ita ut dum inferna extremitas renititur, superna uero supra caput adducitur, oportuno tempore extensio fiat. Alio in super lori pedibus simul circa partes supra malleolos deligatis, & rursus alio partibus ad lumbos, ut huius connectio in lumbis fiat, rursus horum lorum extremisibus coniunctis, & similiter ad aliud lignum pistilli formæ prædictam deligatis, pistillum hoc in fine ligni aut scammi ad pedes statuimus, quæ modo dicitur illud prius. Asperita ministris ut per pistilla extensionem in contraria faciant subeimus. Quidam uero per appellatos Afellos extensionem faciunt. Sunt autem Afelli, hi axes qui in eredo ita tuto ligno uernuntur, & uirique ad magnum lignum sine scammis, huius prædictam ac capitis finem locantur, quibus lora obuoluntur. Dum porro ita sit extensio, nos manuum nostrarum palma gibbositatem deprimimus, & si opus fuerit, & nullo alio quæmetas sit, super ipsam insidemus. At si hoc modo spina non dirigatur, & si homo depreSSIONem, appositum parietem in longitudinem in scarænalis excavare oportet, è regione ipsius gibbositatis. Vnde rima excavata longitudine cubiti, quæ neq; altior sit, neq; humilior, quàm æget spina. In hanc rimam prius præparatam habere oportet. Huius enim gratia etiam lignum ab initio prope ad parietem apponere iussimus. Et posita tabula moderate alteram extremitatem in parietis rimam immittimus, altera uero gibbositatem deorsum deprimimus, donec spinae directio sensu percipitur. Verut Hippocrates dicit, Et extensio sola absque tabula, & rursus sola per tabulam depreSSio, ad id quo dicitur est præstandum sufficit. Si uero hoc uerum est, nihil absurdum fuerit etiam in repandatione & obli ipsa te, ab initio facere prædictam extensionem, extra uidelicet depreSSIONem. Cæterum post repolitionem, scammum ligneum etiam digitorum latitudine, longitudine uero ea, ut & gibbum, & reliquas sanas uentrebras contingere possit, linea aut supra fasci obuolutam, uentricibus imponere oportet, & convenienter deligare, ac tenui uictu uti. Quod si postea etiam reliquis aliquæ gibbositatis restent, curatione per laxantia ac mollimenta

Aselli, axes
uernuntur

A medicamenta, unâ cum lamine appensione utendum est. Quidam vero plumbea lamina utuntur.

De extensione.

Cap. CXVIII.

Coxæ luxatio

Q Vum reliqua hominis ossa quandoq; subluxationem, quandoq; etiam perfectam luxationem patitur, coxæ & humeri coarticulatio soli luxationis emotioni subiacent, & magis coxæ, eo quod profundam & rotundam cavitatem habet, attonibusq; marginum supercrebris munita est. Articulus itaq; buche mentem aliquam violentiam extra propriam cavitatem elapsus, prout magis aut minus hoc contingit, multe luxationis differentiæ fiunt. Et iuxta quatuor modos, aut potius locos, coxæ luxatio contingit. Aut enim intro, aut extra, aut in anteriorem, aut in posteriorem partem descendit. Et inrò quidem ac extrâ frequenter, & multis frequentius inrò in anteriorem aut em & posteriorem partem raro. Quibus igitur inrò luxatio facta est, his affectum cruris ad sanum comparetur, longius ap. parca, & genu promi. nentius, & iuxta inguen crur flexere non possunt, & iuxta inter femineum tumor manifestus occurrit, nimirum ex pte femoris illic firmato. Quibus vero extra elapsus est, his contraria signa adfunt. Nam & crur brevius apparet, & iuxta interfemineam cavatur, & ad nates in tumorem elevaris, & genu magis intus est, & crur flexere possunt. At quibus in anteriorem partem luxatum est, hi crur citra genu dolorem extendunt, sed dum ambulare conantur, neq; ad interna procedere possunt, & unius ipsius suppreman tur, & inguen intumescit, & nates rugosæ ac excarnes apparent, & in progressu calcaneo intumescit. Qui vero in posteriorem partem luxati sunt, nō extendunt neq; poplite, neq; genu, & neq; flexere possunt prius quam inguen inflexerint. Sed & his crur brevius est, & inguen laxius, & iuxta nates femoris capite ostendit. In quibus igitur ex puerili ætate, aut simpliciter multo tempore preterito, hic articulus elapsus neglectus est, & si mansit, in his desperata est curatio, callo membro iam obducto. Quibus vero recens luxatio contingit, his hippocratis curatio faccurret. Celeriter itaq; a dispositionem progredi oportet. Nam luxationes circa coxam moram trahentes, penitus incurabiles fiunt. In communis igitur in his quatuor luxationibus repositio conveniens, quæ secundum observationem ac circumductionem articuli fit, & quæ per extensionem. Si enim affectio fuerit recens, & affectus homo iuuenis, aliquando formur prehendentes, & hac illac circumducen res, articulus immittimus. At vero inrò facta luxatione, etiam crur solo acerrimè ac fortiter ad inguen penitissime flexo, successum sentimus. Si vero his non cesserit, extensione utendum est, primam per manus, ita ut alij crur inferne circa femur & tibiam apprehensum trahât, alij superne sub alas corporis apprehendant. Si vero fortiore opus fuerit extensione, laqueis ventris aut nexis, aut loris crur deligatur, omnino supra malleolam, & ut ne quid geni patiatur, etiam adhuc ipso superius. Verum parres circa pectus ligare non est necesse, sed ut ut dictum est, manibus sub alas missis apprehensio fiat: & lorum molle ac forte media sui parte ad interfemineam adaptatum, ab anteriore parte per inguen & claviculam, à posteriore per dorsum, ad humerum astringimus, & ambo lori initia in infro damus. Et postea omnes simul trahentes, ut egri corpus clarescat, extensionem faciant. Hic modus extendendi communis est quatuor luxationis formoris differentiis. Verum in unaquaq; priusq; in modis impactionis variat. Dum enim homo extenditur, si quidem inrò articulus excidit, lori circa interfemineum mediam partem, inter femoris caput, & ipsum interfemineum locare oportet, & per appositionem inguen ac claviculam ipsum lorum sursum ferre. Si autem unicus quidam, qui affectus formur crassiore sui parte ambobus cubitis amplexus, fortiter ad externam partem trahat. Hic modus repositionis alijs facilitior est. Verum si huic articulus non cedat, etiam alij utendum est magis varijs & efficaciæ modis. Excedere enim hominem oportet in magno ligno, aut cam-

no, in quo etiam gibbositatem in spina habentes extendimus. Insculpantur autem per totam formæ oblongæ quædam cauernæ, longitudine & profunditate tamen non amplius digiti, quæ inter se distant spacio digitorum quatuor ad summum, quo uelut extremitate in ipsis remittente, in unam partem opus fuerit, impulsio fiat. At in medio ligno siue scanno, aliud lignum infixum sit longitudine pedali, crassitudine ligni quo ad lignorum formis, nibus immittitur, ut dum homo extenditur, lignum hoc inter femoris caput & interfoemineum intrucatur. Nam & simul impedit, ne corpus his quidam pedes trahunt concedat, & hoc contingente, torpere neq. opus est supernit in contrarium extensione simulq. dum extenditur corpus, lignum ipsi sum ad externam partem femoris caput expellet. Extensio uero iuxta superius dictum modum fiat, & maxime pedis. Si uero sic non repositum fuerit, lignum quidem erectum in fixum tollendum est, à latere uero sinus eius quæ illud habuit utriq. duo ligna infigantur uelut postes, nō minores quam pedis longitudine. His autem lignis aliud adapteatur, uelut quidam scalæ gradus, ut sit trium horum lignorum figura similis litteræ græcæ 4. Hoc autem continget, si paululum infra summa duorum lignorum capita, medium lignum fuerit ad partem. Postea uero in sanum laus in eum homo, si nam ipsius crux inter postes sub illum uelut sic alæ gradum producamus, affectū autem crux supra ipsum gradum transferimus, ut ad ipsum femoris caput gradus adapteatur, instrato antea ipsi multiplici singulo, ut ne foemur a tera ruit. Aliud porro lignum latitudine moderata, longitudine uero ea, ut à femoris capite usq. ad malleolum pertingat, intrinsecus subiectum ad crux de ligetur. Dum autem sit extensio, aut passilis, uelut antea in gibbositate dictum, ut aliquo alio instrumento: crux deorsum unā cum adalligato ligno trahatur, quo per hanc uolentiam femoris caput in proprium locū reuertatur. Est præterea alius repositionis modus, citra extensionem in ligno, qui ab Hippocrate laudatur. Oportet, inquit, manus egri molliter ad latera deligere, & pedes ambos fortiter ac molliori circa malleolos & supra genum, quæ uxor digito nō spacio inter se distantes, ita ut lœsum crux duobus digitis amplius quam alterum sit extensum. Et postea hominem in caput suspēdere, ut atetra ad duos cubitos alit. Quo facto iuuenis quidam peritus suis cubitis lœsam foemur apprehendat quæ crassissimum est, ubi etiam caput femoris extat, & de repente ad suspēsi hominis corpus se appendat, facile enim ita articulus ingreditur. Hic repositionis modus per omnē, alijs simplicissimus est, ut quin omper multam apparatus fiat. Sed plerique ipsum uelut mœra bilem repudiarunt. At si extra luxatio fiat, extendatur quidem homo uelut superius. Verum locum ad inserendum eam per oppositas partes, inguen uel delict & clauiculam, forte conuenit. Medicus autem ad externa parit ad internam propellit, uelut iuxta conuenientem cauernam ex his quæ insculptæ sunt remittente, & ministro ad sanam natem obtinēte, ut nec cedat. Quod si in anteriorem partem facta sit luxatio, dum extenditur homo, uir quidam robustus dextræ manus suæ uolā in affectum inguen posita, altera manus eō primas, ita ut deorsum, & ad genu depresso fiat. Si uero in posteriorem partem facta est luxatio, non ut in sublimē eleuetur, hominem extendere oportet, sed supra solidum quoddam decumbat, sicut etiam quum extra facta est luxatio. Quemadmodum autem dictum est de gibbositate, supra lignū aut scannū pronus homo extendatur, non ad lumbos, sed in crure utriusq. latetis, uelut paulo ante dictum est. Videndum est etiam de depressione per tabulam ad nares, ubi etiam articulus prolapsus extat. Atq. hæc quidem de his qui ab extrinsecus lacerantur causa, coxam luxatam habent. Quandoquidem uero etiam ob humoris multitudinem, actu thumerus, ita etiam coxa excidit, uisione ad hoc utendum est, quemadmodum supra loco de ipsa diximus.

De gen. luxatione.

Cap. CXXIX.

Coxa luxata

Genu tribus modis cecidit. Intra, & extra, & ad popliteum. Nam in anteriorem

riorem partem ne excidat, à patella prohibetur. Eisdē igitur extensionis modis, quandoq; per solas manus, quandoq; etiam per laqueos uli, prout contemnit deligebimus, ac reliquam curationem adhibebimus, ita tamen ut paratius differamus, ne ullum morum facias.

De malloclaxatione, ab etiam de digiti potest.

Cap. CXX.

Contrictio iuxta malleolum si modice emota fuerit, per moderatam etiam extensionem curatur. Vbi vero perfecte laxata est, maiore coactione eget. Capandum igitur & hic forsore extensione per manus uti. Si vero repositio non fiat, homine supino in terra prostrato, inter duo formosa ad intersectum eum, longam quandam ac validum paxillum in alio erectum interram deligemus, quo ad ipsum corpus renitens, ad extensionem pedis non cedat. Imò potius antea quam homo reclinetur, deligatur. Quòd si adfirmatum illud lignum, quod in medio pedale lignum infixi habere diximus, in hoc extendi fiat. Manuistro autem femur tenente & retrahente, alius manuistro manibus aut etiam per lorū trahat pedem. Medicus autem manibus dirigat laxationem. Sed & alterum pedem alius inferi tenet. Post repositionem deligatis una fiet, sublevis partim ad summum pedem partim ad malleolum obdacta, ita ut utemur ne retrò ad calcaneum tendimus ad liliangamus. Et homo ad quadragesimū diem afferemus ne ambulet. Nam huius anae perfectam curationem ambulare conentur, parti functionis difficultas ē inducunt. At uero si quis ex saltu, uelut contingere solet, calcanei os emouisset, aut etiam aliam quandam inflammatariam affectionem incidisset, leni quadam extensione, & conformatione, & irrigationibus inflammationem arcensibus, & firmis digestionibus hoc corrigat. homine similiter in quiete seruat usq; ad integram restitutionem. Sed & digitorū in pedibus emotionem, uelut in manibus diximus, non difficile est moderata extensione reponere. In omnibus porro laxationibus ac subluxationibus, post repositionem & quietis dies, permanentem in articulis inflammationem aut tumorem, quæ etiam diuturnas functionis difficultates inducunt, mollimentibus medicamentis ad hoc paratis sanabimus, quorū materiam nemo ex his qui artis opera tractant ignorat.

De laxationibus, cum exulceratione.

Cap. CXXI.

In laxationibus cum exulceratione multa prudentia opus est. Nam hæc si reponantur, extrema pericula, quandoq; etiam mortem inducunt. Inflammatis enim per tensionem nervi ac musculi propinquis, dolores uehementes & conuulsiones ac febres acutæ succedunt, maxime in cubiti gibbis, ac genibus, & supinoribus articulis. Quanto enim principalibus partibus sunt ac citiores, tanto maius periculum inducunt. Hippocrates itaq; horum & repositionem penitus reprobat, & uehementiorem deligationem, solisq; inflammationem arcensibus & mitigatorijs auxilijs in principio uti iubet. Sic enim stridulis ulis ipsa coelegant. Quod uero ipse in solis digitis consuevit, hoc nos etiam in omnibus reliquis articulari facere conabimur, & statim ab initio, parte nōdum inflammata, articulum elapsum per moderatam extensionem reponemus. Et si quidem iuxta scopum successerit, in solis inflammationem arcens ductus usu perseverabimus. Si uero inflammatio aliaqua, aut conuulsio, aut aliquid ex prædictis accesserit, rursus cingere ipsos oportet, si quidem circa uolentiam remiserint. Si uero & hoc periculum reuerens, si fortassis enim non remiserint inflammari, melius fuerit in maioribus articulis repositionem differre. Vbi uero inflammatio defebuit hoc autem contingit post septimum aut nonum diem, tunc prædicto repositionis periculo, & quòd si non reponatur, manci omnino in posterum uiuent, conabimur circa uolentiam facere aggressionem, uelut etiam usu, quo facilius id fiat, adhibito. Ceterum ulceris curationem, uelut in

fracturis cum ulcere dictum est, fac

cimus.

De Luxatione iuxta cum fractura facta. Cap. CXXXII.

Luxatio cum
fractura

Si cum fractura absque ulcere luxatio fiat, communi extensione, & per manus compositione curandum est, uelut in simplicibus fracturis dictum est. Si uero etiam cum ulcere, ex his quae de fracturis ac luxationibus prius dicta sunt, conuenientem aggressiorem facere oportet.

SEPTIMI LIBRI CAPITA.

In hoc septimo ac ultimo totius tractationis libro, de medicamentorum omniumque simplicium, tum compositorum facilitate agitur, quarum maxime in superioribus sex libris mentionem fecimus. Hic autem ordo sic se habet.

De temperamentis quae linguis qua-
litatebus indicantur. Cap. IDe ordine & distantia temperamen-
torum Cap. IIDe facultatibus particularum sim-
plicium medicamentorum Ca-
put IIIDe medicamentis simplicibus pur-
gantibus Cap. IIIIDe medicamentis compositis pur-
gantibus Cap. VDe custodia eorum qui purgantur,
& quid sit faciendum his qui ex sum-
pta purgatione non purgantur
Cap. VI

De his qui nimis purgantur Cap. VII

De histeris annodosis Cap. VIII

Illitiones purgationis sedis, & umbi-
lici Cap. IXMedicamenta vomitoria, & iuxta
diuersi modi. Cap. X

De diuersis anodosis Cap. XI

De passillis Cap. XII

De puluillis qui inspergantur, & de
inseguatis Cap. XIII

Illitiones oris Cap. XIII

Iocunda & utiles potionis Cap. XV

Colliria & agglutinatoria Ca. XVI

Emplastra, & coctura ipsorum mor-
di, & de cere ad oleum addenda
modo Cap. XVIIMalignata & Epithemata Caput
XVIIIAcopa, Illitiones, dropacra, & Sina-
pismi Cap. XIXOleorum & unguentorum prepara-
tiones uariae. Cap. XXOctantiariorum preparationes Ca-
put XXI

Suffimenta & Cyphi Cap. XXII

Preparatio Masticha, quod aliqui

Mastaphiam uocant Ca. XXIII

Pessi diuersi Cap. XXIII

De medicamentis inter se uicissim
succedantibus Cap. XXV

De ponderibus & mensuris Ca. XXVI

PAULI AEGINETAE REI MEDI-

CAE LIBER VII. ~~DE TEMPERAMENTIS~~

Medico Physico interprete.

De temperamentis quae linguis qualitatebus indicantur.

Capit. I.

Calorem ratio



De sensibilibus corporum temperamentis coniectura in face-
re, neque ex odore firmum est. Nam quae modora sunt, cras-
sam quidem substantiam habent, sed nondum consilio,
quomodo in caliditate ac frigidityte se habeant. Olera
uero, penitus quodam modo sunt, & calida, quantitas tamen
tenuitatis, aut caliditatis non indicant: eo quod in aqua-
lis sit ipsorum substantia. Adhuc uero magis neque ex co-
loribus exacte colligere licet, per singulos enim colores inueniuntur & cali-
da, & frigida, & sicca, & humida. At uero in gustu, omnes partes corporum
sapore praedictorum linguae occurrunt, & sensum mouent, ut ex ipso manife-
stetur.

Calorem ratio
Asperitatis ratio

Alt etiam facultates ipsorum in temperamentis reperiuntur. Quod igitur adstringit, id ipsum cogere, obstruere, densare, repellere, & crassificare, infusa per se adhuc omnia, frigidificare & siccare potest. Quod uero acidum est, scilicet care, diuidere, attenuare, aperire & perpurigare, citra calefactionem. Quod autem acre est, similia acido facit, attenuando & purgando. Differt autem in eo, quod acidum frigidificat, acre calefacit. Et amplius in eo, quod acidum repellit, acre attrahit, dissolvit, effringit, & crassitas inducit. Sic uero etiam quod amarum est, perpurgat meatus, & extergit, & attenuat, & fecat crassos humores, citra manifestam caliditatem. Quod aquosum frigidum est, densat, compingit, cogit, obstruit, mortificat, & stupescit. Quod salinum, cogit, adstringit, conditum asseruat, siccatur, citra insignem caliditatem, aut frigiditatem. Quod dulce est, laxat, decoquit, molli, rarefacit. Quod oleosum est, humectat, molli, laxat.

De ordine & facultate temperamentorum. Cap. II.

Moderatum medicamentum, ita utilem sit temperantem cum eo cui adhibetur, in eo quod neque siccet, neque humectet, neque frigidificet, neque calefacit: hoc ipsum neque siccum, neque humidum, neque frigidum, neque calidum nominare conuenit. Quod uero siccius est, aut humidius, aut calidius, aut frigidius, hoc est predominantem facultate appellatur. Siccus autem est, ut in uino quoque predominans, quatuor, quantum ad usum attinet, ordines facit. Sic ut calidum non minus in primo ordine, quod nec calefacit, non tamen euidenter, sed ut opus sit rationali quadam demonstratione. Sic autem & frigidum, & siccum, & humidum, quod demonstratione indiget, non dum actionem fortem & euidentem habens. At uero quae manifeste tam siccare, aut humectare, aut calefacere, aut frigidificare possunt, talia uero sunt ordinis esse dicuntur. Quae uero tam uehementer quidem, non tamen ad summum, tertij. Quae uero ita calefaciunt, ut crassam inducant, & urant, quarti. Sic etiam quae frigidificant, ut iam mortificent, quarti ordinis & haec sunt. Ceterum si caetera medicamentum quarti ordinis nullum reperire datur, absque hoc uratur. Nihil quod summe siccatur, hoc omnino urit. Talia uero sunt chalcitis, & misy, & calx. Tertij tamen ordinis siccantiam esse aliquid potest etiam non urans, quemadmodum quae uehementer adstringunt omnia, de quorum numero est amphiacium, Rhus, & alumen.

De facultate particularium simplicium medicamentorum. Cap. III.

Aretonum calefacit & siccat in tertio ordine, estque dissolutor ac sectio-
nis facultatis, paucissima enim participat acerbioris, & si affricetur cum
oleo per totum corpus, rigores per circuitum repetentes sanat. Est autem sto-
macho noxium. Vibum uero magis quam non usum siccans, alopecia san-
nat, cum tenui aliquo oleo mistum. Agallochum lignum est indicum, Thy-
ris ligno simile, od oratum, quod commanum gratum omni odorem facit. Est
etiam suffimentum. Radix eius drachmae unius pondere potest, nimiam si-
machi humiditatem ac exolutionem sanat. Sed & hepaticis, & dysentericis,
& pleuriticis conuenit. Agaricum radix, est appendix à trunco exor-
ta, compage laxa, ex aëre ac terra substantia composita, uim habens dis-
cussoriam & sectionem crassorum humorum. Et oburationes in uisceribus
maxime repurgat. Ageratum facultatis est dissolutoris, & leniter quod-
modo inflammationem arcens. Agnus siue hygos, hoc est uirga, calefacit
ac siccatur in tertio ordine. Est autem tenuis partium, & flauis dissolvit. Vo-
de etiam ad castitatem facere creditur, non modo in cibo ac potu accepta,
sed etiam substantis. Semen ipsius ad hepatis ac splenis oburationem
facit potum. Si uero torreatur, minus flauosus est, & facile distribuitur.

Agrostis, id est gramen, ex parua semine maxime nascitur, siccatur & modera-
te refrigerat, & tenuis, & subaerbum est. Quae propter uiscera cruenta gla-
tiatur. Et decoctum ipsum lapides frangit. Anchusa quatuor non ciuidem
omnes facultatis sunt. Quae enim Onoclea appellatur, adstringentem & sub-

Temperamentum mod.

Ordinis 4. r. perant. non

simplicium are-
tonem
facilitas

Thyris lignum

Lignum
virga

Gramen

Onoclea
sub

subamaram radicem habet. Vnde splenicis & nephriticis prodest. In cataplasmate cum polenta erysipelatis convenit. folia minus quam radix frigida faciunt & siccant. Quae propter etiam ad alui profusum bibuntur.

Lycaplis At Lycaplos magis quodammodo adstringens, similiter erysipelatis educt. Onochalos autem quae & Alchibadios, uim habet magis medicatam, & a uipera moris prodest, in cataplasmate impolita, & aligata, & in cibo accepta. Quarta uero quae ferè sine nomine est, & reliquis minor, amarior autem quam Alchibadios, ad lacos lumbricos convenit, ac tabuli mensura pota. Adaree uelut spuma quodam est aequè salis, seorsis ac anadinitibus circumpacta. Est autem acerrima & calefactoria, ut propemodum urat, si cum alijs foris adponatur. Nam intra corpus ut sumatur, fieri non potest.

Aspidium Aspidium siccatur, attenuatur, discutitur moderate. Verum in medioloquo, damodo est calidi & frigidi. Itaque alopecias sanat, & tumores discutit, & lapides atrerit potum, & ex pulmone eductiones siccatur, & fluxum alui sistit. Atzooon id est. Semper ualium ex tertio ordine frigefacit. Siccatur uero & adstringit moderate. Quae de causis etiam ad ignes sacros, & herpetas, & inflammationes ex fluxione convenit. Actonychion in lapidum tractione refertur. Achera pulicula est forbilis, ex mollis Zee aut ex fra, mento parata, pueris conveniens. Comperit etiam in cataplasmata.

Avena erratica Aegilops, id est Avena erratica, discalforiam uim habet. Vnde etiam inflammationes induratas, & aegilops sanat. Aegirushoc est populus nigra, tertio quidem ordine calefacit, sed siccatur moderate, & est tenuis suis partibus. Huius folia cum aceto impolita podagricos dolores sedant.

Populus nigra Arresina ipsius quia floribus calidior est, acopi & malagmatu miscetur. Fructus autem cum aceto potus comitialibus prodest.

Pudenda ceru Aedoeon, id est pudendum cerui masculi, siccatur, & tritum, cum ulino potum, moris a uipera auxiliatur. Miscetur etiam compositis medicamentis.

Aethale Aethale, id est fuligo, quae etiam Ligeya appellatur, in litera. L. refertur. Aethiopis folia habet verbaeo similia. Radicis eius decortum potum coxendicibus opulatur, pleuritidis item ac sanguinem spurcentibus, & arteria asperitati cum melle. Aema, id est sanguis frigidus nullus est, sed Sullus humidus est, & minus calidus, temperamento maxime similis humano. Columbina autem, & palumbi, & turtoris, quam temperatus quodammodo sit, suffusos ex plaga oculos sanat, si calidus trisillitur. Et in perforata calvaria membranae crasse infundatur, inflammationem arceat. Nocturne sanguis cum ulno aut aqua potus, spirandi difficultati opulatur. Vespertilionum mammae uirginum tuerur, & si illinaur pilorum exortum arceat dicunt. Eodem modo etiam ranarum sanguis, & chamaeleontis, & ricinorum in canibus. Galenus tamen factio rei periculo, haec euentia esse dicit. Caprinus ob siccitatem aqua inter cures laborantibus prodest, si cum melle bibatur & renum calculos arteria.

Aema Gallinarum domesticarum sanguis, eruptione sanguinis ex cerebri membranis cohibet. Agninus comitalibus prodest. Hordius recens coagulatus dimidit hemine mensura cum pari aceto potus, sanguinem et thorace educens sanat. Visorum & caprarum syluestrium, & hircorum, & taurorum abscessus maturare dicitur. Terrestris crocodili sanguis uisum acuit. Equorum admissariorum in compositiones erodentes miscetur.

Ascor At uero antidotus ex sanguinibus, quae contra leuista medicamenta datur, a matis, & hordi, & asferis sanguinem recipit. Aera, id est solium, calfacit & siccatur prope ad tertium abscessum siue distantiam a temperatis, ut quod facultate tridit par sit. Acacallis fructus est fruticis in Aegyptonascentis, cuius cremor colligrit ad acuendum uisum destinatis miscetur.

Ascia Ascia tertij ordinis est siccantium, primi frigefacit uim. Si uero lota fuerit, secundi. Est autem acerbis & terrea. Acalyphea, id est urtica & semen, & folia, tenuium sunt partium, & cetera morum siccant, tumore discutunt.

Ascia Ascia tertij ordinis est siccantium, primi frigefacit uim. Si uero lota fuerit, secundi. Est autem acerbis & terrea. Acalyphea, id est urtica & semen, & folia, tenuium sunt partium, & cetera morum siccant, tumore discutunt.

Ascia Ascia tertij ordinis est siccantium, primi frigefacit uim. Si uero lota fuerit, secundi. Est autem acerbis & terrea. Acalyphea, id est urtica & semen, & folia, tenuium sunt partium, & cetera morum siccant, tumore discutunt.

discutiunt, ac extergunt, & uenentem subducunt. Moderate uero fluxuosa sunt. Quare etiam ad uenentem conueniunt. Acanthus, quem alij metampylum, alij pederota uocant, facultatem discuttoriam ac siccatoriam habet. Acanthidem tenuis ac calida facultate prædigna, conuulsis auxiliatur. Acantha leuca, id est spina alba, radicem siccantem & moderate adstringentem habet. Quare & stomachicos, & sanguinem fluentes, & dentium dolores sanat. Semen autem tenuis & calidè est facultatis. Vnde etiam conuulsionem sanat. Acantha Aegyptia, aurum alij Arabica, ualde adstringentis ac siccantis est facultatis. Vnde & sanguinem, & alias fluxiones sistit. Acinos, id est Orimastrum, simile est acino, & moderate adstringit. Vnde aluum sistit & menses pota. In cataplasmate uero impo-
sit, panos & sacros ignes sanat.

Aconitum quod Pardalianches uocant, erodentis ac uenenosè est facultatis. Vnde intra corpus assumendum non est, foris autem in his carnibus quæ erodi possunt, ipso uendum est. Quod uero Lycosion non appellatur, eiusdem est cum superiori etia facultatis, sed priuatum lapos occidit, quem admodum illud pardos. Acorum caliditas ac siccitas in tertio abscissa. Vtuntur radice ipsius ad ciendas urinas, & ad induratum splenem. Antennas etiam ceteræ oculorum tunicæ crassitudinem.

Acridæ, id est Locustæ suffragæ difficultatem mingendi maxime in maribus iuuant. Venum locusta quæ alas non habet, & scorpionis itis auxiliatur pota cum uino. Asie magna, id est Sambucus, & diamastrum, id est Ebulus, utraque siccatoriam uim habet, & moderate discuttoriam ac glutinosioriam. Quod si bibantur aut edantur, aquam per uentrem ducunt.

Ales, Sal omnis multum siccantem ac adstringentem uim habet. Vnde quicquid humidi in corporibus est, id totum depascitur. Quod uero reliquum est, adstringendo compingit. Quapropter etiam condias asserunt, & à putrefactione tuerunt. At uisus Sal maiorem discutiendi uim habet.

Althæa siue Ethica, species est asule & syluestris, discuttoria, laxatoria, inflammationem arcens, mitigans, tubercula matians. Radix autem & semen, reliqua quidem insensibilia habent, sed & utiliginis detergentis. Semen uero etiam calculus acrius. Alimon dissimilantem partium est, salum & sub astringens. Plurima ipsius pars calida est temperata, cum humiditate quæ confici non potest. Lac itaque & semengignit.

Alexa syluestris itidem malæ species est. Cum uino autem pota dysenterias & rosiones sanat, & magis radix ipsius. Alecyona omnis detergunt ac discutunt, acronq; qualitatem habent. Venum Miletum (Est autem uermi simile & purpureum) optimum est. Quapropter etiam uisum alopecias sanat, & impetiginis ac utiliginis detergit. Quod uero superfluum leuem habet, acerrimum est, non solum detergens, sed etiam excorians. Quod autem huius faccidis simile est, omnium debilissimum est.

Alme, id est Muria, si nullam aliam substantiam ammixtam habet, similem salis uim habet, sed debiliorem, ob aquæ mixturam. At salform piscium, & oliuæ columbæ dum muria, magis extergentem uim habet. Itaque coxendicum morbolaborantibus, & dysentericis infunditur.

Aloe primo abscessu caliditas, tertio siccitas. Commodat stomacho, extergit, discutit, & exulso stercore expellit. Lota uero minus extergit, sed magis stomacho commodat, inflammationesq; arcet, & ulcera ad cicatricem perducit, maxime quæ in sede ac pudendo exstant.

Alos anthos, id est flos salis, si quidam est medicamentum, magis tenuis un partium quam sal uisus. Satis item acre est ac discuttorium.

Alos acris, id est Salis spuma, spumosa salis efflorescentis est, magis tenuis partium ac discuttoria quam ille, sed minus compingit.

Alime quæ & auricula maris, helixine similem uim habet, frigefacientem & humefactam. Quare ad serpentes inflammationes conducit.

Alipi semen atram bilem doctum purgat, si pari copia velut epithymum sumatur, cum fide & aceto. Verum inefficax leniter exacerat.

Valper Alysson nomen ex eo habet quod h cane rabido morsu auxiliatur. Quod autem siccansem & discussoriam ac exterioriam vim habeat, thener ab oburatione libera, & maculas solares extergit. Alopec, id est uulper animal, tota in oleo usua aut mortua cocta, discussorium efficit oleum, quod humores ex profundo ad superficiem trahit. Vnde qui in solium sudant, & in hoc arthriticos loquuntur, ut diutius immorarentur, affectionem inclipientem sedarunt, inotratam vero moderatorem fecerunt.

Amaracum calefacti ordine tertio, sicut secundo. Amantum attenuat, & sicut. Menses itaque ducit potum cum uino, & sanguinis grumos dissolvit cum uino multo: omnes item fluxiones sicut stomacho inefficax.

Arena Ambrosia in cataplasmate imposita, vim habet adstringentem ac repellentem. Ammi tertii ordinis est calefactentium ac siccantium. Est & renium partium & discussorium, & unguis eius. Semen autem maxime utile est. Amiantum in Cypro gignitur simile alumini scisso, quod flamma quidem ab igne concepit, non autem uritur. Quidam ipso in pilothra siccantia utuntur. Ammos, id est Arena, quae quidem in litoribus maris est, multum siccatur. Foenes facta itaque sole, aquosa corpora in ipsa obruta exsiccant. Torrefacta vero siccum fomentum praebet, pro milio & fide.

Ammoni acum thymia sacus est mollioris facultatis intensae. Vnde scirrhos & totos dissolvit. Amurca secundi ordinis est calefactentium ac siccantium intensae. Haec itaque ratione ulcera in siccis quidem corporibus curat, in alijs autem aeger & exacerbat. Ampeloprason velut sylvestre porrum est, acerrimum & calidissimum ad extremum ordinem. Vnde etiam laedit. Secundi item vim habet, & ab oburatione libera, & stomacho ingratum est.

Vitis nigra Ampeli, id est uitis sylvestris racemi & uirgulae exterior foram vim habent. Et adstrictior quiddam possidens. Arutis facies similis quidem facies est, sed debilior. Vitis alba, quam & bryoniae et pilothrum uocant, gemina quidem velut stomacho grata eduntur, & urinam ciet. Et adix autem exterioria & tenuium partium est, ac moderate calida. Quae propter & ipse per pota consumitur, & forte cum siccibus imposita lepraes & lepra sanat. Vitis autem nigra, quae & ipsa bryoniae appellatur, praedicta similis est, sed debilior. Amygdala amara attenuant, & ab oburatione hanc & crassa ac viscosa humoribus in profundo inducant liberant, & vis utia detergunt. Sed & arbor ipsam eandem vim habet. At vero dulces moderate calidae sunt. Amylum ex tritico fit puro, quod in aqua sub ardoribus casualibus maceratur, quae aqua quinque in die diffunditur. Postquam autem mollium factum fuerit excoctum, & rursus affusa aqua similes separantur, & in sole siccantur cito prius quam accedat. Vim habet persingulatoriam moderate, & siccanem, & acrimoniam mitigatorem.

Amomum uim aconitum similem habet, sed aconitum siccus est hoc autem magis concoquit. Anagallis utraque facultatis est mollium exterioria, habet etiam quid subacidum & attractorium, ut & aculeos extrahat, & succus ipsius in naribus perget. Anagyrus strex est graue oleum & acris, calidum ac discussoria facultatis. Semen autem tenuius est, & nominis eius.

Portulaca Andrachne, id est portulaca frige facit tertio abesse, humectat secundum. Ideo sane & cardonem prodest uentri imposita, & fluxiones repellit. Vi scilicet item sua densum stuporem ex acida inducunt leuigat. Verum ob adstrictiorem, & dysenteriam, & sanguinis eruptionibus prodest.

Androsace Androsace mon duplex est, alterum alycyrum uel alycyroides nominatur, & est hyperici species: alterum dionysias. Semen ipsorum purgat. Folia uero magis siccant. Androsacea amara & acris herba est, discutiens ac siccans. Et ipsa, & semen ipsius in potu urinam ciet.

Anemone omnes acris & exterioria, attractoriaque ac oleosa uisum aperientia

aperientis sunt facultatis. Vnde pituitam allicunt, & lepras remouent si apponuntur: & ita attrahunt. Anethum calfacit secundo ordine ingresse, sicut propolis. Hoc si in oleo coquatur, discutit, doctorem eximit, somnum inducit, & crudos tumores concoquit. Vltimum autem tertij ordinis calefacientium ac siccantium quod sit, & nimium humidis ulceribus in perferi prodest. Humidius uero, & minus calidum ac concoctorium, est uride.

Anethyllis duplex est. Ambae autem siccant ulcera. Quae uero similis est chusae pituitae, magis tenuium partium est, ut etiam comitialibus conueniat. At. Est etiam magis exterioria. Anisi semen acutus est, calfaciens ac siccans in tertio abscellu. Ideoq; & urinam ciet, & flatus discutit.

Antirehin non sine Anarithmō similes habent uim habet, sed defectivo florem. Ex illo igitur etiam de hoc discies. Anomis aut Ononis calidam uim habet, maxime in radice. Huius siccitas potius cum urino urinas ciet, & calculos atterit, & crustas occipit, & dentes mitigat. Aparine quam alij phlethron, alij omphacocarpum uocant, moderate detergit ac siccit. Habet etiam quid tenuium partium.

Apios, id est pium, temperamentum inaequale est, partem et tream habens, partem aquam. Quare si edatur, ito macho commodat, & sitim eximit. Si uero in cataplasmate imponatur, siccit & moderate perfrigerat. Apocynon, aut cynocambe, id est brassica canina, dicitur etiam Cynomoron, quoniam chilime canes occidit. Est autem & hominibus uenenum. Hoc quidē grauior olet, & calida est, extra siccitatem. Vnde etiam in cataplasmatibus discussorias facultatem habet.

Apochymapix est quae uenas tam naubus deradit. Diffundit autem & siccitat ac discutit tumores. Araneum animal commoluitum emplastro, & impositum fronti, ac temporibus tertianis eluctus exoluere dicit Dioscorides. Tela ipsius imposita sanguinis eruptionem sistit, & ulcera in superficie absque inflammatione conseruat. Argemone exterioria ac discussoria est facultatis.

Anisiron & minus est multo quam arum, & acutus. Habet autem radicem oliuae magnitudine. Anisilochia omnis calida & tenuium partium est, & exterioria, & amara, & fibris, & ad medicinas utilissima. Verum rotunda magis tenuis est, & per omnia efficacior. Clematis autem odorata quidem est, sed debilis. Longa uero in reliquis medium in earum locum obtinet, sed calida non minus quam rotunda est. Arcuthon, id est luntperus calefacit ac siccit in tertio ordine. Fructus autem calefacit quidem similiter, siccit autem ordine primo.

Arcion quae & proscopites, id est personata uocatur, folia colocynthidis folijs similia habens, sed maiores & densiora, discutit & siccit, & adstringit. Quare etiam folia ipsius uetera ulcera sanant. Archion uerba leuissimum est. Radicem habet teneram & albam ac dulcem. Tenuis autem & siccantis ac moderate extergentis facultatis est. Armeniacum uim habet exterioriorum, cum modica acrimonia, & pauciore adhuc adstrictione. Quae propter oculis uisus compolitionibus miscetur. Et pilos in palpebris auget.

Annabo ex aromaticis est unde maxime in unguenta miscetur, ut quod calidum ac siccit facultatis in tertio ordine, castae ac Carpesio simile. Vnde etiam Psidionius, cinamomum non praesente, hoc usum se esse dicit. Arnoglossum, id est plitago, frige facit humida siccit in secundo abscellu, ex aqua & terrea substantia mixta est, adstringens etiam quid habens. Quapropter ad maligna ulcera, & ad fluxiones, & ad putredines conuenit. Et ob temperamenti commoderationem etiam sanguinis eruptiones cohibet, et plurimis competit. Nam & siccitate non mordente participat, et frigida uere nodum stupesciente. Aron primi est ordinis in calefaciendo ac siccando. Estq; & hoc ex terrea substantia & calida ac exterioria conflatum. Radices aut ipsae calidiores sunt. At uero Dracontion fortius est. Arsenacū uisum habet. Vtuntur ipso etiam ad obolendos pilos. Si uero diutius adhaeserit, etiam ipsam curā contingit. Vltimum autem magis tenuium partium erudit.

Ascendit ambæ calefaciunt secundo ordine, sic eant primo Sunt etiam tenuium partium, ut etiam calculos in renibus attulerant, & vesicæ foramen conueniant. *Panis* Artos id est panis si in cataplasmate imponatur, magis discunt quam pro tritici si cultas, ut qui & sale, & fermento participet. Nihil quæ in profundo hærent fermentum attrahit. *Fermentum* Alarum similem aëro uim habet, sed magis intusum. Asbole id est soligo qua pictores unguunt, ex utraque famitur officinis, & facultatis discussoris & acris est, ut sic urat, & ex rodas. Vitis uero ad cicatricem perducit cum rosaceo cerato. A scalabotes id est Scellio animal, ad reliqua quidem inutile est. Verum à corpore idis auxiliari ipsius impostum uiuat. Miltæur etiam in medicamentis incendendi membri uitis facultatem habentibus. A cleptus ualida & sicca & tenuium partium existens, cordiosis in uino pota conuenit in cataplasmate uero inopina ad ferarum uenenatarum morsus facit, & ad maligna in utero ac mamma ulcera. Ancyron in Androsyno dictum est. Alpalanus facultatem partium dissimilium habet, ut potest acris, & adstringens, & per utraq; siccans. Quapropter ad putredines, & fluxiones utilis est. Asparagus peritrus aut myscanthus, exteriorior est. Inter caliditatem & frigiditatem medius, rhenes & hepar ab obstructione liberat, & maxime radix ac semen. Dentium uim dolores sanat. Asplenum tenuium partium uim habet, non tamen calidum est. Hac itaque ratione & calculos auerit, & splenes conseruit. A simphis id est una passa, sania quidem concoquendi simulq; adstringendi ac discutiendi leniter, facultatem habet. Sybactris uero acris fortiter est, aded ut pituitam detrahat, & uehementer extergat. Aster Articus, quem aliqui bobonium, id est inguinariam uocant, eo quod non solum impostis, sed etiam appensa inguinum tumores sanare credita est, mixta habet facultatem discussoriam ac perfrigerantem. Astragalus frutex est exiguus, habens radices adstringentes, non ingenerose siccans. Vltæra itaque uetera ad cicatricem perducit, & aluum soluit Radix cum uino pota. Plurimas autem in phœneo Arcadia nascitur. Asphaltus id est Bitum, melleus & calfacit secundo ordine. Quapropter cruenta uulnera glutinat. Asphodeli radix exteriorior ac discussoria uim habet. Cinis autem ipsius uis calidior & siccior, & magis tenuium partium euadit. Quare etiam alopecias sanat. Atractylis siue Cnicus syluestris, ex spinosorum genere est, siccantem & moderate calidam uim habens. Atplex humectat ordine secundo, frigida est primo. Quapropter etiam per uentrem permeat. Semen ipsius exteriorior est facultas. Unde etiam morbo regio ex hepatis obstructione oborta utilis est. Aphæce adstringentem facultatem uelut lens habet. Si uero edatur, magis egre quam lens concoquitur. Vehementius autem resiccet, simulq; moderate calefacit. Aphronitrum discussorior ac exteriorior est facultatis, ut non solum sordida extergat, sed etiam pruritum sanat. Potum uero stomacho noxium est. Apheos nitri id est spuma nitri, similem nitro uim habet, sed substantiam tenuiorem. Quapropter etiam lœuis est uelut farina. Achras id est pyrum syluestre, similem piro saturo uim habet, sed magis intusum. Unde etiam uulnera magna glutinat. Absinthium calidum est primo abscessis, siccum tertio, adstringentem & amarum, & acrem qualis uelut adepium. Quapropter etiam hîlios in uentre humores, & per uentrem, & per urinas euacuat. In quibus autem pituita abundat, his propter adstringentem nihil prodest. Succus autem herba longè calidior est.

Incipientia à littera A.

Glauc argemone Balani myreplicæ id est gladii ugentariæ pars interna uelut carnosa, exteriorior simulq; incisoriam cum adstrictionem uim habet. Quare cum aqua multa pota drachmæ pondere, uomitum ei et, & infernam aluum subducit. Camposea uero ad uiscera obstructa conuenit. Cutis etiam uisita cum aceto illitum extergit. Cortex autem ipsius ualde adstringit. Baccharis boni

ni odoris herba est similis cinamomo, coronaria & acris. Huius radix decocta obdurata refertur, & urinas ac menses mouet. Folia ipsius adstringunt, & fluxionibus profunt. Balsmum illos est mali punice syluestris, uchementer adstringens, siccamq; ac frigidam uim habens. Vlcera itaq; superficialia ad cicatricem perducit, & fluxiones sistit. Balsamum id quod uetus lignum est, siccatur & calefit it secundo abscisso. Est & tenuium partium. Succus autem eius multo tenuior est. Fructus similis quidem est facultatis, sed minus tenuis. Ballothe quam Marabium nigrum uocant, acris & exterius est facultatis. In cataplasmae itaq; impoluitum cum sale à carne moris prodest.

Her mali punice syluestris

Marabium nigrum Ballothe

Bati id est rubra, frustisq; pars multam adstringit & siccatur. Quare & uulnera glutinat, et fluxiones sistit. Radix autem ad hoc quod adstringit, etiam non modice tenuium partium est. Ex quo etiam calculos in renibus attulit. Fructus autem immaturus est, calidior est cum moderata adstrictione, & deoq; etiam editur. Immaturus autem acerbus est, & uehementer resiccatur maxime siccatur. Similiter etiam illos. Batrachium id est raniculus herba quatuor differentias habet. Omnes autem calide & siccæ excellenter sunt facultatis, acrisq; ac uisoris, ut expleant cum dolore. Quod si quis moderate ipsis utatur, cutis nitida solum deterget. Radix autem sicca iterum astoriorum est medicamentum. Batrachi id est ranae, aduersus ferarum uenenatorum morsus in iusculo eduntur. Viliam ipsarum cinis siccatur, simus eiusdit, & sanguinis eruptiones sistit, & alopecias sanat, cum pice liquida. Bdellium & Scythicum, & Arabicum, uim habet molliendi in scirrhum indurata, maxime recentia. Arabicum uero & urinas citet, & lapides urinet, & concoquit. Beronica herba est exilis habens ramulos, pulegiis ramulis similis, & tenuiores, & qui gustantibus nullam ferit qualitatem exhibent. Nascitur maxime in locis petrosis, eaq; utuntur etiam in medicinalibus compositionibus. Est autem & alia apud Romanos Beronica appellata, quam discosides Celsus nominat, alij uero psycotrophus, eo quod frigidis locis gaudet. Hæc nihil simile prædixæ habet, præterquam adionem. Et ad hoc utrinam moueat, etiam alia multa facit, & maxime radix ipsam cum aqua mella pota uentum concitat. Folia autem alium subducit. Bechium hoc Bechicum id est Tusilago, dicta est ab eo quod uulsi et erectis ceruicæ spirationes lassum iacet. Composita uero est ex substantia calida & aequali. Blium editur, & est olus humidum ac frigidum secundo abscisso. Bulbus qui editur, amaritudine similisq; adstrictione quo dammodo participat, siccaturq; ac glutinat uulnera, & extergit. Vomitorius autem bulbus calidior est huius facultate. Botrys quam alij Ambrosiam, alij uocant Artemisiam, planta est ualde boni odoris, quæ cum uino pota recta ceruicæ spirantibus prodest. Babonium in Asiere attico dictum est.

Batrachium

Bati

Beronica Romanorum discosides Celsus psycotrophus

Tusilago

Ambrosia Artemisia

Babonium

Herba Sabina

Lepanthum

Avena

Buglossum humidum & calidum est temperamento. Unde etiam ulno insectum leprosum indocere dicunt. Bunium quod alij anclion appellatur, calidum est, & urinas citet, & menses ducit. Sed & Pseudobunium huic simile est. Baptesis animalculum est cicharidi simile. Reponatur itaq; eo dem uelut illa modo. Buryrum concoquentis et moderate discutientis est facultatis in mollibus corporibus. Inguinis itaq; & glandularum tumores, & parotidis tumores, & gingiuarum attenuat, maxime in dentientibus pueris, et humores in thorace hærentes delinchem concoquit. Baphthalmum floræ chamæmelo similem habet, sed multo maiorem & acrior est, & ideo discossorium, ut eius durities sinet ceruo ammittatur. Brachy id est herba Sabina similis est cupressio, calefacit ac siccatur insertio abscisso. Est & tenuissimarum partium, attenuans & discussorij exiens in cultas, si bibatur. Est item ad putredines simile cupressio. Britannica adstringentis & glutinantis est in cultas, similiter uelut lapathum syluestre speciem præferens. Succus ipsius putrefactiones in ore sanat. Bronius id est Avena similem cæneo uim habet. Siccatur autem & discutit moderata & citra modum citatem. Habet etiam aliquod

Musci mari- aliquid adstrictionis. Vnde & alii prostrusa sinat. Bryonia id est Muscus
mus manus frigidat & adstringit. Quare seruantes inflammationes impedi-
Musci arbo- tus acriat. Est & alius Muscus, qui i planchnon appellatur, & in quercubus
mus ac populis albus, & piceis reperitur. Hic discunt simulq; moderate molles,
Spilachnos praefertim qui in cedris repert. Bryonia dicta est in ampelo, id est vite alba.

Institutum liberat. 7.

Lactis onit Galla id est lac omne compositum est ex tribus subit seips. caseola, serola,
 & pingui, quam plurimam habet lac bubulum, ex qua etiam butyrum fit.
Serum Serum autem ipsius exterioriam vim habet. Vnde & alii subdactis, si quis
 ipsum in coctura separet. Caseola uero & crassa magis inferdens, & propte-
 rea acrimonia obondit. Coctum autem lac siue silicibus ignis immixtis
 siue aliter, optimum in edicamentum est dysentericis, & fluxionum ventris
 acrim. Totum lac ad acris oculorum fluxiones, & alias acrimoniae con-
 ducit. Temperatissimum autem est lac mulieris. Post hoc, caprinum. Deinde
Musci de asinum, & ouillum. Post remum bubulum. Gales id est Mustela cli-
 nis uuluum defecuit. Cum a cessa itaq; illius podagris & articulari morbo
 prodest. Sale uero condita ac assiccata, comitialibus commodat.

Galium ex eo quod lac coagulat nomen reperit. Simile est aparina, sic-
 cans & subact. Flos ipsius ad sanguinis eruptionem conducit, & ad ambu-
 sta abigat. Galopis quamalii galio belon uocant, similis est urticae de
 uior tamen & grauiolens. Vim habet discussoriam & mollisicam tumor-
 um induratoeum. Facit etiam ad serpendo depalcentia in cataplasmate im-
 positum. Garum calefacit ac siccit potenter. Quapropter & ad putredine
 sa ulcera fons ipso utuntur, & dysentericis ac coxendicium morbo laboran-
 tibus per chylerem infundunt. Gentianae radix multum efficax est ad at-
 tenuandum, perpurandum, extergendum, & ad obturata reseranda.

Geranium quod folia habet anemone similia, radicemicro quae editur,
 eius radicle una drachma cum uino pota, inflationes ueni soluit. Alterum
Terra arida Geranium ad medicinam inutile est. Gead id est Terra omnia siccit. Quae
 uero nullam aliam substantiam amixtam habet, etiam citra mordacitatem.
 Si uero ignea aliqua qualitas ipsa mixta sit, lota est hanc deponit. Quae
 igitur collitur terra pinguis omnis, utilis est ad curationem omnium parui
 um quae resiccatione opus habent. Itaq; Aegyptia terrae uero utuntur ad a-
 quosas & lienas affectiones, & ad Laxos tumores, & eundem utilitate
 tenuit. Ex medicatis autem terra Lemnia rubrica, quae spargis id est sigillu-
 lum dicitur, ad hoc quod resiccat, etiam moderat adstringens, aduersus her-
 talia medicamenta auxilio est, & maligna ulcera sanas cum aceto aut uino.
 Et sanguinis eruptiones sistit omnes, & dysenteriam serpendo depalcentie
 sedat, aqua mulla prius per chylerem infusa. Deinde maria. Miniori uero
 siue rubrica. Sinopica uehementior quam lemnia est, & in compositiones
 abducens mentis miscetur. Pota etiam lumbricos occidit. Multo uero
Mixta Syn- minor est Samia quam Lemnia terra, ut quae glutinosa est ac viscosa. Vten-
gum dum igitur ipsa ad ea quae mitigare oportet. Sed & sanguinis spora uideri
Rubrica Syn- eoque ueniunt, sanas. Sclimula & Chis magis exterioria sunt. Quae etiam
pica quodam modis ipsas pro sanguinis defractionis in facie utuntur. Ulcera
 item incarnant & ad cicatricem perducunt, & magis igne ambusta. At Cl-
 uosia mixta est facultatis frigidatentis ac discussoriae, si lota est. Lota ue-
 ro magis frigidat, & ambusta cum posca curat. Ampelitis terra (Est aut
 ea quae uillis insinuat, ut uermes in ipsis perdat) siccit & discunt fortites,
 neq; id citra mordacitatem. Cretica aerea est, & extergit citra mordacitatem
 Eretria euidenter adstringit. Vitis uero etiam siccit citra morum. Melior
 autem est efnera. Psigris similem Cimoliz uim habet, uerum nigra est.

Polis arida- Armenia quam & bolium nominant, siccit. Vnde dysentericis, & fluxio-
nibus nibus per uentrem, sanguinisq; sputo, & tabi, & respirandi difficultati ob
 humiditatem inducit, & humidis ulceribus, & pestilentiis affectionibus,
 genere

A generose conuenit. Bibitur cum uino tenui dilute. Sin febricitans, cum aqua. Sed & Alabastrum similem Armeniæ uim habet. Arochra calcitien di ac erodendipum habet. Vltima itaq; carne nitium excrecentia deprimita, & cana explet cerato amicta. Geras id est Serpenti serpentis sanis flectat. Aceto itaq; feruescida dentium dolores curat. As Aspidu exuuium tutum est melle ac stillum, maxime uisum acuit. Ges entera id est Intellima terro, siue uermes terrent utri fauciatis neruis imposita, itam misallice suuant. Gigareta, Vinacea secundo ordine flectant, singe facit primo. Quis itaq; facta ac ethalini, omnibus fluidis affectionibus conueniunt.

Gingidium caliditatem non adeo manifestam habet. Sic car autem in tercio abscissa, & adstringit Ideoq; stomacho gratum est. Glaucium adstringit cum quadam intra condititate. Sed & manifeste singe facit, ut etiam sacros ignes qui non sunt adeo uehementes curat. Glauxherba calida & humida temperamento est. Quare etiam lac generat. Glehon id est pulegium calefacit & antemur uehementer Vnde impositum rubefacit, & humores crassos ac uiscosos ex thorace & pulmone expuere facit. Glocos id est sordes halaeorum calfacit moderate, molit, ducunt, flectunt & condiglosa sunt tuberculis conuenit. Glycyrrhiza id est Radix dulcis tepidi ac humidi est temperamenti, habetq; aliquid adstrictionis. Vnde etiam asperitatem leuigat, non solum in ateria, sed etiam in uicis scabiosa. Est etiam sius exemptrix. Glycytide quæ alij pentorobon, alij pannoniam uocant, radicem habet acrem, & subamaram, ac siccantem, quæ & aliquid adstringens habet. Vnde menses mouet, & rheum ac hepar expungat, amygdala magnitudine pota cum uino. Si uero austerum utrimq; fuerit, etiam fluxiones per uentrem sistit. Alligata puerorum morbos cogniales sanat.

Gnaphalium nomen habet ex eo quod folijs ipsius, ut pote teneris, pro gnaphalo id est tomento utuntur. Sunt autem alba & moderate adstringunt. B Quis propter ad dysenterias cum uino austero bibunt. Gongilidia id est rapi & radia, & semen, flauosa sunt, & semen generant, & uenerem stimulant. Gordylium quod alij Sekeli uocant, calidum est, & urinam citat, & menses ducit. Radix ipsius cum melle delicta, humores in thorace educit. Gynis id est pollen, similem amylo uim habet, uerum calidiorum quodam modo. Gypsum ad hoc quod flectat, meatu obducendi uim habet. Vnde ad singulis eruptiones conuenit, cum polline, & oui candido. Vitem uero non amplius similiter meatu obducit, sed magis siccant, & repellit, maxime cum posca.

Initium literæ. 7.

Dodes id est Teda habent quid acre, & concoctorium ac exterforium. Vnde aceto coctis dentium dolores sanant, si acetum collegerit. Si uero etiam mel ammaxum horit, ptiuitam detrahunt. Atili in medicamenta que delinguntur miscantur, humores in thorace haerentes educu faciles faciunt. Damascena in loco prunorum referuntur. Damascenorum exterforium quandam uim habet. Quare calculos ateria & quæ per alium procedunt, ad urinas transferunt. Drucus qui & staphylinus dicitur, duplex est. Saurus cuius radix flauosa est, & uenerem stimulat. Sed & ipsum fatiui semen quod habet quod uenerem stimulat. Syluris autem semen pennis flauis expers est, & urinam citat, & menses mouet. Similiter autem & herba. Daphnes id est lauri arboris folia siccant & calefacit uehementer. Magis tamen fructus. A radice cortex amarus & adstringens aliquotulum, calculos ateria, & hepaticis commodat, uram obolorum pondere cum uino odorato potus. Daphne herba quæ etiam Alexandria uocatur, calida, & acris, & subamara est. Quapropter menses & urinam mouet. Sed & daphnoides eiusdem facilius est, itemq; chamodaphne. Hæc autem etiam edigit. Derna id est pelis ouilla recens denata adhuc calida, hæc qui flagris cæsi sunt cum dactylis, mirifice ipsos sanat. At Hippopotami pel-

Coler Alaba
serpenti
Aspidu
Intellima
Vitruu
Vinacea
Pulegium
Sordes halaeorum
Radix dulcis
Pentorobon
Pannonia
Rapi
Radia
Pollen
Teda
Staphylinus
Lauri arbor
Alexandria
Chamodaphne
Derna
Pellis ouilla
Pellis hippopotami
Pelis

Pellis viperæ lila uisita, & cum aqua trias imposita, tubercula dispergit. Vipera uero pel-
Selle arietis lis trita imposita, alopectia laborantibus mirifice pilos producit. Pelle siue
 coria soleam ueterum ustram, cinerem siccantem faciunt. Unde acritas
 ex calcemantis curant, si non amplius inflammata sunt, itaq; ambustia,
 & intertrigines, & extuberantia. Dictamnum magis tenuis est facultatis
 quam pulegium. Reliqua similia ipsi habet. At quod pseudodictamnium ap-
 pellatur debilius est. Dionysius dicta est in Androsimo. Diphryges
 mixta est facultatis. Habet enim & adstringens quiddam, & moderate acre.
 Quapropter etiam ad maligna ulcera commodum est medicamentum.

Dipsaci spina radix licet ordinis secundo, habet etiam quid exterforis.
Doryenium simile quid habet imperipento, papaveri & mandragora,
 immo etate perfrigerans. Nam modice sumptum stuporem inducit. An-
 pilas autem acceptum occidit. Dracontium simile quid An habet. Sed
 ipso acris & amarus est, calidius item ac tenuius. Habet etiam quid adstri-
 ctionis. Radix igitur ipsius uiscera purgat poia, & malignorum ulcerum o-
 ptimum est medicamentum. Sed & folia similia sunt. Semen autem fortius
 est. Dryopteris dulcis est & acris, & subamara. In radice uero etiam acer-
 ba. Vlm habet chodentem. Unde etiam pilos tollit. Dryosid est quercus
 folia & fructus siccantem & calidam uim habens, deobus & uulnera recte-
 ra glutinans, & inflammationes incipientes sedent. Quod uero sub glan-
 dis cortice est membranolum, circum fructus carnem, id quum magis ad-
 stringat, & ad fluxum muliebrem, & ad reliquos fluidos morbos datur.

Initium literæ c.

Ebenus lignum uim habet calefactoriam exterforiam ac tenuem. Un-
 de etiam ex quæ papillis tenebras offundunt extergere credita est. Sed &
 in aliis oculatis compositionibus miscetur. **Encephalos** id est cerebrum
 leporis cocham, & asirium, ac comestum, dententibus pueris commod-
 um esse fertur. Quidam etiam tremoribus auxiliari cerebrum etiam scripse-
 runt. At **Calli** cerebrum cum uino potum, serarum uenenatarum moris-
 bus auxiliari, & sanguinis ex cerebri membranis eruptiones cohibere,
 dioscorides dicit. **Cameli** uero cerebrum siccam cum aceto potum, comi-
 tales curare tradit **Calamus**. Similiter etiam muscelæ cerebrum. Verum
Hirundinis cum melle ad suffusiones facere. **Oculus** autem similiter
 preparatum, infantibus dententibus exacte opitulari.

Elæus id est oleæ ramuli tantum frigidi tatis habent, quanti etiam adstri-
 ctionis. Fractus exacte maturus moderate calidus est. Immanus adstri-
 genator est & frigidior. At oleæ **Arctopice** lachryma similis ammoniæ co-
 tenet, exterforiam uim habet. Quare ad cicatrices, & abugines, & uisus
 hebetudinem ipsa utuntur, & ad dentium dolores in caernas iadita. Qui-
 dam hanc yluocirum oleam esse tradunt. Oleum porro ex oliuis drupis, del-
 ce calidumq; moderate est, & magis humectans. Verum ex immaturis, in
 quantum particeps est adstrictionis, in tantum etiam frigidi tatis. At quod
 lotum est, magis mordacitatis exors est. Antiquum uero quomodo est an-
 quis, tanto est calidius, & in aore dissentendi ut prædium, & maxime si
 etiam ab initio tenuium partium fuerit. Hoc cognoscitur ex puritate & pel-
 luciditate, & si ex paucis multa corporis pars illinatur, & si elle è cute imbi-
 batur. Tale uero maxime Sabinum est. At uero quod ex sylæstri sit oleum,
 exterforium est simulq; adstringens, & pro oleorum ratione sicillimum.
 Sed & **Cicium** re qualem uim cum uetere habet. Reliqua uelut est **Sesami**
 nati, aut raphaninum, & alia, pro substantiarum ratione ex quibus facta
 sunt, etiam facultatis differentias habent. **Elæomeli**. In Syria extrunco
 quodam arboris oleum fuit crassius melle ac dulcius, quod dicitur cytho-
 rum mensura, cum aqua hemina potum, cradum & biliosum humorem
 per alium ducit. **Torpidi** autem sunt qui id accipiant, quod uereri nati o-
 portet, sed ipsos excitare. **Elæerium** appellatur succus fructus cucume-
 ris

ris sylvestris. Et est secundi ordinis calcaſcientium, menſesq; provocat, & foetus corrumpit appoſitum, propter ſummam amaritudinem. Eucuat etiam per nares, ſi cum lacte in ipſas infundatur. At infernè per clyſterem inſuſum punitum euaquat: quandoq; etiam ſanguinem. Eſter id eſt Abies arbor calcaſta ac ſicca ſimiliter ut populus nigra. Verù de reſina ipſius in reſinarum tractatione reſertur. Latine herba eſt ſimilis helxine. Frigefacit ac adſtringit moderate. Elaphoboſcus calidus ac ſiccus eſt facultatis, ſecundo ordine, & partium tenuium. Eleſiphæus id eſt Silium cuiusdam calcaſta, & ſubſtringit. Eleſiom calidum eſt & ſiccum cum humiditate ſuperflua. Quapropter in deſectis uniūxiū, humores ex poſtore e-ducit. Sed & partes per ipſum tubefaciū. Eleoſtium id eſt Apium quod in aqua ſaſaleſcit locis, eadem poteſt quæ ipſam horrenſe, ſed magis ipſis eſt. Elephæus ex ungue ramentis ſi in cataplaſmate imponatur, redolens curant. Oſium item ac detritum ipſius ramentis quam ſiccæ ſint & ex terſioris facultatis, talibus medicamentis miſcentur. Eleyſia id eſt argenti ſecre-mentum. Habet eandem uis quam plumbago. Adſtringit enim & atrahit. Vnde Emplaſtris ſuſcis & ad cicatricem perducenſibus miſcentur.

Eleborus id eſt ueratrum utruſq; calfacit ac ſiccat tertio diſceſſu. Eſt etiam acre ac exteriorium. Vnde etiam ad leproſam cutem conuenit. At niſtrum ſi ſiſtulis ſonatur, in tribus diebus callum ex ipſis eximit.

Elidryſon, aliſ chryſanthemon aliſ Amaranthum uocant, planta eſt coronaria, comam habens unicolor em, quæ cum uſito pota urinis diffiſcit, & reptilium moribus, & coxendicibus, & ruptionibus conuenit. Menſes item ducit, & ſanguinis grumos diſſoluit, cum uino melleo pota. Auxilia, ut etiam deſtillationibus. Elſine quam aliſ perdicam, aliſ parthenium, aliſ heractem uocant: uis habet exteriorium & leniter adſtringentem, cum ſubfrigida humiditate. Elſine quæ & Caſſampelus, diſſeuſſorie eſt facultatis. Elymos quæ & Moline id eſt panicum ſimilem milio uis habet, ſiccans ac frigefaciens ſorinſecus impoſitum. Siccatur autè & uentris fluxiones. Eſperron aut proſoides, medicamentum eſt purgatorium punitu ac liſſa. Eſi autem et ſaliſum. Vnde fuerit etiam exteriorium.

Epithymum ſiccatur & calefacit tertio abſceſſu, eſtq; Thymo efficacius.

Epimediſquis eſt moderate frigefaciens cum aquoſa humiditate. Hæc in cataplaſmate impoſita mammaſ erectas conferuat. Pota etiam ſteriles facit, redicitur.

Epimelis quæ Vnedo apud Italicos ruſſicos appellatur, eſt uelut malus ſylueſtris. Cuius fructus acerbus eſt, ſtomacho malus, & capitis dolorem inducens. Epipactis quæ & Elieborine, contra letalia medica-menta bibitur, & ad hepatis morbos. Erebiſſus id eſt Cicer, legumen familiare ſtomaſum eſt, nutriens, alio commodum, urinam ciens, lac & ſemen generans, menſes ducens. Quod uero Aries hæc Arictinum appella-tur, magis quàm reliqua urinam ciens. Decoctum ipſorum calculos rheum aſerit, & maxime nigroſum. Quod aut Orobus id eſt Erutium uocatur calidius his eſt, & ſabamarum. At agreſſe omni modo ſortius eſt ſatium.

Eſia id eſt lana. Sortida ad trigationes commodè ſunt. Oſſypus enim ſi-ſpſum concoctus eſt uelut butyrum. Aſnon ſecidie materia ſoli exi-ſtunt. Viſe uero uis habent acrem & calidam ac ſiccam, ſimulq; tenuiſſimam, ut etiam humore ſuccidas in ulceribus carnes ciſſione coſumit.

Erica diſſeuſſorie citra mordacitatem facultatis eſt. Flore autem & ſoliſa ipſius maxime utendum eſt. Ericeſ aquatica herba eſt. Cuius ſeminis dra-chmæ dux cum mellis drachmæ quatuor illiæ, oculorum fluxione ſiſſit. Succus uero ad aurium dolorem facit. Ermodaſyli radix purgatiſſima uis habet, ut ipſa, tum decocti ipſius. Priuſum aſter arthritis in ipſa ſu-ſionibus exhibetur. ſtomacho multum toxica eſt. Eryſſos id eſt Scapilum caleſcit, ut urinas & menſes moueat. Erythodanum rubra tiorum radix eſt, acerbæ & amara, quæ ſplenem & hepæ & thymæ expungit,

A. utitur

Abies arbor

Silium

Apium panicula

Argenti ſecre-
mentum

Veratrum

Chryſantha-
mon
Amaranthum

Perdicam
Parthenium

Heractem
Hirade

Caſſampelus
Dolom

Parium

Proſoides

Vnedo

Elieborine
Cicer

Lana
Oſſypus

Scapilum
Radix aſter
rubra tiorum

ut etiam cruciata per unam expellat, & menses moveat. Cutis quoque sordes
 erexit. Erysimi id est leionis semen feruidum est & calliflorum instar
 nascitur. Quapropter torrefactum in fermento, & in defunctis additum, thoracem
 purgat. Verum in caraplasmate daricis mollet, & oculos caneros
 sanat.

Crucis Euzomon id est cruca, similis superiori est temperamento, sed
 flavaola. Quare etiam ad venerem stimulat. Semen ipsius etiam urinam ciet.
 Sylvestris vero satius fortior est. Eupatorium venenam ac incidit rem uim
 habet, ab ipso manifesta caliditate. Unde etiam obstruendos hepatis expurgat.
 Habet & quid adstrictivum. Euphorbium venenam ac venarum partium
 uim habet, similiter et reliqui ipsi liquores.

**in filio
 uiperarum**

Ephemerum non uenenum
 illud, sed quod dicit sylvestris appellatur, mire facilius est, repulsorie ac
 discutiente. Echidnes id est uiperæ cames, calide & sicce sunt tempera-
 mento euidentes, totum corpus percusum expurgantes. Quare multi Ele-
 phanti ex ipsarum esu aut potu sanati sunt. Quæ uero in maritimis aut alijs
 licet locis degunt, etiam sanis magis inducunt. Echinus herba est acer-
 ba, ac repulsoria, & siccandi ut prædita. Echini id est Erinaei terrefrictis
 earo assiccata, fortiter discutit ac siccat. Pota igitur Elephanti, & malo ha-
 bitu præditis, alijsque pluribus auxiliatur. Pellis aut ipsius uis, magis sicca
 ac discutientior cædit. Alopecias itaque cum pice liquida illita sanat. At uari-
 ni pars ea quæ editur, urinam ciet, et alio commoda est. Testa uero uis, terre-
 stris Erinaei pelli similis est. Echion quam alij florida, alij etiam hanc
 Alkibadium uocant, herba spinosa est, quæ non solum a reptili bestia mor-
 sa copulari in uino pota, sed etiam prebibita eos qui mordentur illis
 conseruat. Ep'oma coctum multum est, quod alij Sireth, alij sapam appellant, ca-
 lescent moderatè ac concoquit. Meas etiam obducit, & morfus exorsit.

Innium literæ Z.

Zea similem tritico uim habet, medium obtinens inter caliditatem ac fri-
 gidiutatem, leniter autem siccat. Habet etiam uim obducendi meatus.

Zingiberis radix calefacit fortiter, sed non primo statim occurrit, quam
 inelaboratam quandam crassiori partium humiditatem habeat. Ob quam
 facile etiam perforatur. Perseuerantem autem confert ac caliditatem.

Cerussa Zytus quam cerussam uocant, compositam substantiam habet. Nam
 & acris est, uelut ex putredine factus, & frigidus, ex acida qualitate. Quare
 etiam mali humoris.

Fermentum Zyme id est fermentum etiam ipsum ex contrarijs
 componitur. Nam & aciditate frigida participat, et putredinosa caliditate,
 insuperque ea quæ ex sale & farina accidit. Est igitur non moderatè calidum,
 ac discutientum. Zomos, id est iusculum, ex recentibus piscibus aluum
 subducit, & per se, & cum uino potum. Priuatim uero id quod ex phucis,
 scorpijs, iulis, peris, & alijs tenentis petrosi sit simplex, cum aqua & oleo,
 & metho ac sale. Similiter etiam id quod fit ex his quæ testa integunt, ma-
 xime tellinis, chamsis, & conchulis. Seder galli antiqui cum sale plurimum
 coctum iusculum aluum subducit. At Gallinæ uicè uerba sunt.

Innium literæ s. hoc est e. longi.

Hedysolum Hedysolum id est menta, calida est & tenuis, & acris facultate ex seruo
 ordine, cum semicocta humiditate, ob quam etiam ad uenerem stimulat.
 habet etiam quid amarum. Quare etiam lumbricos necat. Versi acerbitate sua re-
 centes sanguinis eductiones compescit. Hedysorum aut pelecium, ama-
 rum & sabacitum est. Unde potum stomacho commodum est. Viscerum
 autem obstruiones expurgat. Heliozopium magnum quod etiam scor-
 pionem uocant, calidè est ac siccat & extensor facilius. Huic decoctum
 possum ducit pituitam & bilem. Semen ipsius in caraplasmate impollum,
 verrucas fornicarias & alia consimilia resiccant. At prurium & hanc tollit, &
 lumbricos occidit, cum semine, & nigro, & hyssopo ac nascituro bibantur.

Populi nigri Eledrum populi nigri lacrymam, circa Eridanum fluvium diffusam
 & congelari auro colore tradunt. Hæc tritum potum stomachi & ueni flu-
 xiones,

Lachryma

Scorpius

Populi nigri

Lachryma

Lachryma

Lachryma

xiomus, itemq; sanguinem sinit. Hemerocallis radix similem radici lilij uim habens, similiter ut illa ambobus auxiliatur. Hemerocallis adstrictio necum amaritudine participat. Quare etiam splenicis prodest cum aceto pota. Hepaticis ribentis affaenim si edantur, ab ipso morbo auxilium dant. Capre uero hepatis affaenim oculis nyctalops instillatum prodest. Sed & naporem ipsius coctis oculis suscipere iubent, & ipsum in cibo sumere. Si sedatur, comitiales manifestare. Eadem etiam harenum facere trahant. Ad lacertie secus corioleis dentibus inditum, dolorem eximit. Lupi uero hepar in medicamentum hepaticum ex Eupatorio constans iniegitur. Alinis num affatum si comitiales laborantes icterici edant, opem inde sentiunt. Aspidium recens siccatum tritum cu uino ad repellendum morbum bibetur. Mercurio uero hepar siccatum ponit calculos cecit. Eryngion id est Seneclio minus xamum habet frigefactoria ac moderate discussoria. Eryngium calefacit quid non manifeste, siccatum aut non obducere nec modice participat est.

Initium littere. I.

Thalassion hydor id est aqua marina acris & moderate calefactoria est, si ceciditq; uim habet. Ex pota quidem stomacho noxia est, aluum autem nutrit, & pituita duct. Acri calida affundatur, auerabit ac discussit. Thalassion uim habet siccatem citra mordacitatem. Diuturna itaq; ulcerum ad cicatricem perducit. Thapsia acris est & fortiter calefactoria cum humilitate. Trahit itaq; ex profundo uolenter, & atramentum discussit.

Thyon id est sulphur atractoria & ipsum est facultatis, calidumq; ac tenuium partium, ut ad multa uenenum elaculancia resistat, & maxime in pisinacia marina, & dracone siue sicum impergatur, siue etiam ad saluam, aut urina pueri, aut oleum, aut theol ammiscetur. Sed & scabiosa manifeste sanat. Thermos id est lupinus qui editur, mentus obducendum habet. Amarus autem extergitur, & discussus, & siccat citra mordacitatem, lumbricos tollit, cum in cataplasmate impositus, tum potus. Et uiscera expurgat cum ruta & pipere potas. Sed & cutis uia extergit, & tumores discussit, cum aceto mado impositus. Syloclitris autem amarus est, & per omnia uehementior fastidio. Thelypteris quam aliqui nymphagam, aut perni id est filixem nominant, quod sicculat filix similis sit. Hec pota cum uino latus & rotundos lumbricos occidit. Fetus etiam perdit. Folia uero eius comesta aluum molliunt. Thlaspis semen est facultate acris, ut etiam internos abscessus potum rumpat. Menes etiam mouet, & per sedem insusum coxendicibus prodest, euenta euacuando. Nam & alui balbosos humores sursum ac deorsum purgat, si aceti bulli mensura bibatur.

Thridax id est lactuca humidum ac frigidum olus est, non externè, sed iuxta fontanarum aquarum temperamentum. Quare ad calidas inflammaciones conuenit. Sinit item eximie & generare fluxum sinit pota, itemq; seminis per somnum effusionem. Sythetris uisus quam hec frigefacit ac humedat. Est autem succulentior. Thymus calefacit ac siccatur uento ordine. Vim habet secandi uiscosos ac crassos humores. Thymbra syluestris eadem quæ thymus potest. Hortensis autem per omnia debilior est. Sed ad elum melior. Thymctra ex qua granum chidum est, similem ipsi uim habet.

Initium littere. I.

Idgaradix sapore ac facultate acris, ad sanguinis eruptiones, & sinidas affectiones conuenit pota, ac foris imposita. Idrota id est sudorem per se colligere operosum est. Mafcenar autem in palatris eorum qui se exerceant ad puluerem, paten appellatum qui repulseriam solum uim habet, & eradicat hoc discussorium. Inflammatis itaq; mammae efficax est auxilium, & ad extinguendam in ipsis ferorem. Facit etiam ad claudicantium tumores. Si uero siccius id fuerit, cyprino aut rosaceo emolliantur.

Ixos id est uiscum calefacit cum acrimonia. Trahit itaq; fortiter ex profundo, & discussit similiter ut Thapsia. Sed longè inefficacior quam illa est.

Initium littere. A.

Hepatica

huc

Seneclio

Aqua marina

Sulphur

Lupinus

Nymphag

Perni

Filix

Lactuca

Granum chidum

Sudor

Paten

viscum

Viola Non id est viola folia habet, quae aquosam ac subfrigidam substantiam
Aerugo praepollens cum obtineat. Ios id est xerugo, aerem qualiterem gustantibus
 exhibet, discutitque ac tollit & consumit, non teneram modo, sed duram etiam
 carnem. Si vero quis parum de ipsa ad multum cerati miscuerit, exteriori
 um circa mordacitatem medicamentum efficit. Ippocampus marinum
 est animal, cuius visci cinis cum pice liquida alopecias sanat. Ippolapa-
 dum in paludibus nascitur, & lipothoe id est ramici simile est.

Ippomarathon id quod cadixyl id est rosmarini semini simile est, ma-
 gis siccatur quam marathrum id est fenicolum. Quare etiam alium sistit, &
 calculos avertit, & menses mouet. Quod uero semen coriandro simile ha-
Exposi-
uibile bet simile illi est, sed debilius. Ippopotami id est Equi thausastis testis sic
 cus potus, aduersus reptilium morsus prodest. Ippodanum similem Se-
 lino id est apionem habet. Sed tamen debiliorem. Ippuris adstringentem
 cum amaritudine qualitate habet, & propterea siccatur fortiter, simulque citra
 mordacitatem. Vulnere itaque maxima glutinat, & in testino ossi herniae pro-
 dest, & fluidas affectiones sanat cum uino pota. Ippophaesur hippopie
 os quo expulsum uentis, frutex est samentitius, cuius radix exsiccatur ut
 lut diaplia. Succo autem obolus unus cum crustaria datus, bilem ac pitui-
 tam purgat. Sed & tota planta siccata purgationem uim habet. Iris caler
 facioria & multum tenuium partium est, extergitur ac concoquit. Ad uul-
 sus itaque conducit, & humores in thorace eductus faciles efficit, & termina-
 sanat, & ulcera sordida purgat. Pota uero cum aqua multa aluum euacuat.

Iscis sarius quae tinctoria utuntur, siccantem uim habet, itaque ad strin-
 gionem. Itaque etiam magna uulnera durorum corporum glutinat, & sangui-
 nis eruptioni ex ipsis prodest, & laxos tumores discutit. & omnibus malis
 gnis resistit. Syluestris autem magis mordax, & propterea magis siccans.
Rosifolia ad humectas putredines fortius resistit. Ad alia uero prior est, uirpote mor-
 dax. Verum ob fortem facultatem etiam splenicis utilis est. Ispyrum aut
 phasellum, semen amarum ac subacribum habet. Extergit itaque & lecat cras-
 sos ac viscosos humores, ita ut simul corpora contrahat et adstringat. Quae
 propter etiam ea quae in profundo sunt purgat, & sanguinem spurcibus
 non aduersatur. Ilic id est Salix folia habet & florem, facultas siccandi
adix citra mordacitatem praedita. Habet etiam quandam adstrictionem siccior autem est
 cortex, cuius visci cinis ex fortiter siccantibus est. Nam & clauus & ueneris
Glossopis ea formicariis tollit cum aceto. Ichthyocolla id est glaciem piscium in colla-
 tem meatum obducens, & siccantem habet. Commodat ad emplastra ear-
 pumalia & glutinantia & ad compositiones ad lepra parata facit etiam ad faciem
 erugandam.

Inidum licere.

Cacani radix siccatur moderate, & citra mordacitatem meatum obducit.
 Quae propter etiam arteria spiritibus prodest ad indurata cum uino, & com-
 munda uelut tragacantha, & glycyrrhiza. Cancanum lachryma est ligni
 Arabici, quae myrrhae simile est, & odorata, quae etiam profusus utitur. Vitis
 habet et extremum obolus, exterioriamque ab obstructione liberantem.

Cadmeae ambros siccatur. Sed boorytis id est racemosa, tenuiorum partium est
 Phacelia crassiora. Vitis uero cadmea cum mordacitate siccatur & extergit, &
 sic utilis ad ulcera repletionem indiga, circa oculos & totum corpus, & maxi-
 me humidiora, in mollioribus corporibus. Nam in durioribus efficacioribus
 opus est medicamentis. Caccalia uim & usum cacani similiter habet.

Calamagrostis siccatur. Quae propter succus & decoctis radicis ipsius in os-
 cularum compositiones miscetur. Semen urinae cinis, & stomacho commo-
 dit est. Calamintha calida & siccatur temperantia est tertio ordine, tenuis
 ite partium & aeris, multoque fortior quam mentha. Est enim uelut spluens in mentha.
 Facile itaque ex profundo attrahit ad se ipsam, ideoque sudores mouet, & totum
 corpus discutit, & rigores per circuitum repetentes sedat, nam si extrinsecus cum
 oleo stremit affricetur, ut si intra corpus bibatur. Sed & ad coxendicis dolo-

res imposita, ipsos soluit. Et uisitas circa cutem humores detergit.

Calamus aromaticus calidior ac siccior secundo ordine. Habet enim quid te
nuit, partibus & adstringens, urinam citius, & copiosius in venter stomachi coram &
hepatis ac utero definitis ammiscetur. Qui uero pluragines appellantur ex-
teriores est. Folia uero ipsius uiridis moderate frige faciunt. Cortex aut u-
ltus calefacit & siccior tertio ordine. Radices ipsius cum bulbis in cataplasma-
te impositi spicula & aculeos atrahere dicunt. Camparid est fructus olens

Emacior

illius cum oleo, à moribus coram quæ uisus eluculantur tatos praestare dicuntur.
Cantharides quæ in tritico inueniuntur, luteas transuersas lineas habentes, aceti calidiori uapore suffocatur multa uisum sui exhibent. Nā & scabiosos
ungues eximunt cum cerato, & clauos ac scabiosos affectiones inuadit. Erodum etiam ac uisum. Quidam etiam urinam citius medicamentis potum qui & ex
ipsis misceantur ac exhibentur.

Cannabis semen flatus discutit & siccior, ad eum etiam geniturum relinquit. Siccior etiam uiridis ad aurum dolores ex ob-
suratione facit. Capnom sambucus flos est, de quo dictum est. Capnom aut
Capnos, id est fumaria lux fumus terræ, nomen habet ex eo quod succus ipsius
multum lacrymam atrahit. Nam uisus ac omne inducit. Acris aut & amara
est. Vnde etiam urinam biliosam multas propellit & oburationes ac debili-
tates hepatis sanat, stomachum corroborat, & uenter mollis. Capparis ra-
dix extergit & expungat, & amaritudine ac credineque sua siccior ac discutit, &
corbitate uero contrahit, adstringit ac densat. Quapropter lienes indura-
tos iuuat potum & fornicis imposita. Menses item mouet, & pituitam per
os educit. Maliginas quoque ulceribus prodest, & dentium dolores sanat. Tu-
mores etiam ac uiridines discutit, & uermes in uentibus necat. Folia ipsius
fructus similes quidam, sed de biliorum uisum habent. Cardamum id est nasciturum Se-
mē habet uisum uisum, acutis sinapi. Quare in cataplasmate impositum
rube facit. Siccior etiam crassos humores, si cum alijs bibatur. Sed & herba ipsa
siccior quidem similis est faciliatis, humida uero moderatior. Quare etiam
cradam ipsam edunt. Cardamomum acre quidem etiam ipsam est, sed na-
sturio debilius. Habet etiam quid amaritudinis ob quoque lumbicos necat,
& scabiosum extergit cum aceto. Caris id est squilla piscis tritus, & cum beyo-
nia radice potus, lumbicos occidit. Cancranum uisum cinis, si quidem
fluuialis sit, siccior similiter ut erinaceorum & cochlearum cinis. Verum
totius substantie proprietate, misce operatur potum in rubioli cinis mor-
tu. At marinorum cinis excellentem habens siccitatem, ad hoc quidem non
conuenit, sed his qui maiore reflectione indigent prodest. Fluuiatilis cinis
si tritus, in cataplasmate imponatur, spicula & aculeos eijcit. Caroi se-
men siccior & calidior tertio ordine. Flatus itaque discutit, & urinam citius, non
semen solum, sed & tota planta. Carpesium aromaticum est & tenuius par-
tium. Extergit itaque uiscerum oburationes, & urinam mouet, & rheum ex-
pungat calculo laborantes. Carys Nux arbor in germibus quidam adstringens
quid habet. Verum plurimum in nucem ipsam cordicibus. Succos
itaque ipsorum coctus cum melle stomachicam, ori commodum sit medica-
mentum. Putamen autem nucis istam, triquum sit partem, & citra mor-
daciū sit siccior. Quod uero ex ipsa editum, quum oleum sit, facit in hi-
les transit. At oleum ex ipsa, tenuius partium est, ac dissimulorum humorum
ac putredinum. Quæ uero rariæ idæ sunt nucis ob uetustatem, exterioriam
cutis uisum uisum habent. Citerum max pondica, quæ & tenuis ac parua
appellatur, frigidiore est & austri, in reliquis autem magnæ similis.

Tumaria
Tumaria

Capnos

Capnos

Nux arbor

Nux arbor
Nux arbor

Caryophyllon non pro nominis ratione etiam substantiam habet, quæ
folium nucis isto significatur. Vnde ex India uelut flores quidam arboris,
festuacum speciem præferentes, nigri digiti ferè longitudine afferuntur, a-
romatici, & acres, subamari, calidiores sicciores circa tertium ordine. Hi mul-
tiplicis usus sunt, nam in obsonijs, tum in alijs medicamentis. Cassiam
quidam balsami fructum esse dicunt, de quo supra in balsamo egimus.

A ; Cassia

Callia calfacit ac siccit tertio ordine. Est & satis tenuium partium, acrisque ac moderate adstringens. Secat itaque simulque discutit, & infirmitatis robur addit. Dicitur etiam mentes. Cuius res calfacit ac siccit ac cum partium tenuitate excellit. Ob quod supra alias ascribitur, etiam nervorum ex humorum copia affectionibus convenit. Experiri tracta facile recalc facit, tum foris adhiberi tum potius, ut nullam aliam partem laedat, etiam si virescentes eo moderate febri etiam, quomodocumque in delationibus in sopore, & lethargia. Mox etiam menses, & secundas eiecit. In cerebri vero & pulmonis affectionibus sufficiens per inspirationem magnopere prodest. Caucaus quod alij daucaus sive est rem appellat. Nil & velut daucaus calfacit, & siccit, & urinae ciet, & sale codinus reponitur. Cenchros id est melle frige facit primo abiectione, siccit secundo. Est etiam quod modo partium tenuium partium. Poris scilicet itaque in sacculis pro fermento adhibetur, & in ea plasmate impostum siccare solet. Cedrus est quae fructuosa, iuniperio similis est, cum quae arbor est, calfacit ac siccit tertio ordine. Oleum autem ex ipsa, quod Cedrus vocant, etiam quartum ordinem attingit, multum tenuium partium existens. Teneras itaque carnes prompte & citra doloris erodit. Duras autem & maxime montuorum siccit, & in potestate affertur. Pediculos itaque, & lenides, ac ascarides, & aurum nemes necat, & alia plura facit. Cetrarij magni radices acris & calidae, cum terra adstringuntur est. Menses itaque propellit, & foris necat ac eiecit. Vulnere itaque glutinas, & sanguinem spiritibus prodest, itaque alia circa thoracis affectionibus. Ar parui cetrarij radice quidam inefficax est. Ramuli vero fortiter & citra mordacitatem siccit. Unde supra ea quae de magno Cetrario dicta sunt, decoctum ipsius ex capexendi cum morbo laborantibus per sedentarium, biliosa evacuat, quibus etiam cruenta, & magnopere auxiliatur. Ceras id est cornu caprae ac cerui visum, dentes nitidos facit, gingivas nimia humiditate flaccidas contrahit. At ceruini cum vino melle, deinde oblitus, dentes mobiles sunt. Post unctionem aurei lotum, dysenteria, & colicis, sanguinis spiritibus. & morbo regio prodest, duorum cochleariorum mensura. Misceatur etiam in oculares compositiones. Taurini autem cornu est aqua potius sanguinis eruptiones cohibet. Cerasia dulcia quidem plura magis sub est, aspera vero magis stomacho commodum. Acida propter siccitatem, pluviositas & excrementis stomachis conveniunt. Argemmi arboris ex asperitate arterias leugit, & calculi labores citiusque possiduit. Cerasia arboris, & fructus ipsius cerata id est silique, sic clausae ac adstringentes sunt facultatis. Hae vero etiam dulcedine quadam participant. Cephalae id est caprae sale asperantur mrenati usque, siccantur acquirunt facultatem, non valde acere. Rimis itaque sedis, & gurgulionibus diu induratis commodant. At cerri pilis caput totum usum ad alopecias facit cum adipe ursino. Item facit & maris caput usum cum melle. Ceterum melle caput siccum sine phumia, quantis tribus digitis prehendi potest, cum aqua potum, podagricis prodest. La cerre vero rocaput aculeos educere tradit, & formicarum nectares, itaque alias, & clausas.

Cicis id est Gallia omphacitis acerbum valde est medicamentum. Unde siccit, & fluxiones repellit, & contrahit ac adstringit laxas ac debiles partes. Omnibus itaque fluidis affectionibus conducit. Exsiccat tertij ordinis in siccando, secundi frigidificando. Altera vero flava, ac laxa, et magna siccit qui dicitur, sed minus quam illa, quantum etiam adstringendi inferior est. Asiniam mationes in sede, & prolapsas sedis coctae adunat. Vitis vero gallicae & aceto resimidae sanguinis sunt. Cepae pomulaceae similis est. Folia eius potius scabiose velicis auxiliatur. Radix cum asparago myacanthino potius, unius stillicidii ex obstructione obortu sanatur. Cera quod temperata sit, aliorum medicamentorum materia est. Ipsa vero per scriptum ex lentius concoquenda est. Habet enim exiguum quid discoloris & calidae facultatis. Ceryces id est mures, siue baccinae, testis habent, quae usum utrumque dedit siccit & citra mordacitatem habet. Quapropter malignis ulceribus convenit. In putredine odore est cum aceto, aut urino, aut aceto mulso, ipsa utendum est. Quae vero velut caro ipsorum

est, aut urino, aut aceto mulso, ipsa utendum est. Quae vero velut caro ipsorum

est, aut urino, aut aceto mulso, ipsa utendum est. Quae vero velut caro ipsorum

est, aut urino, aut aceto mulso, ipsa utendum est. Quae vero velut caro ipsorum

est, aut urino, aut aceto mulso, ipsa utendum est. Quae vero velut caro ipsorum

rum est adhuc uigentium, ea in oleo coquitur, oleumq; hoc auribus dolentibus prodest, si ipsis infusileque. Ciccos id est risina semen purgat, exteriorumq; ac diffusorum uim habet. Ita enim soliti, sed debilius. Verū de oleo dictū est. Cinamomus acris moderatē facultatis est, habet etiam quid adstringentis. Cinamomum summe tenuium partium est, nō tamē summe calidum, sed ex tercio ordine. Nilil nisi siccū adeb, ex his quę ex aqua est ipso calefaciant, propter partium substantię tenuitatē. Cinamomus uero uelut debile quoddā Cinamomū est. Quidā ipsum Pseudocinamomum uocāt. Cinna radix calefaciens & odorata est, quę est uino potius uteros expurgat. Semen cum sobrietate potum, sac generat. Cissaris, id est pamelis, exteriorius maxime densū est, nō sedum sagittate, sed etia alperitate. Inseitur & in medicamentis carcer in ulceribus generata, & in ea quę curis uisū eurgēt. Si uero uratur, magis tenuiū partū & mordax fit. Lotus mor diuinitē deponit. Cisthos aut Cissaris frutex est adstringens, & leniter frigidus facultatis. Folia ipsius ac gemina tantū siccant, ut etia uulnera glutinent. Flores aut sicciores circa tertiu serē ordinē, dysenterias & alias fluxus affectiones sanāt poti. Forinsecus aut patredinosa ulcera iuuat. Cissos id est hederæ ex cōstantis cōposita est facultatis. Adstringit. n. & frigefacit, acrisq; est ac calida, aquosa ac tepida substantia participat, quum uirilis est. Huius folia cocta cum uino uulnera glutināt, ambūsis & splenicis proficiunt. Succus medicamentū est quod nambus insanditur, & diurnas in auribus fluxiones sistit. Lachryma ipsius ut quę acrior sit, pediculos necat, & pilos abolet. Cistū quod & malū Medicū, media sui parte acidū aut quāliuū exorēt habet. In qua semen tertij frigefaciendum ac siccatum ordinis est. Cortex siccus secundo ordine, non etiam frigefacit, sed acris est. Cero ipsas crassi succi & pituitosa ac frigidā est. Semē autē discutit et siccāt secundo abfessū. Sed & solasiccans ac diffusoria sunt facultatis.

Cithoristū pteris, uelut syluestris fens est, frigefaciens ac siccis primo abfessū. Habet etia quid adstringens. Vnde hepatēta dysenterias conducit. Clematis quā alij daphnoides, alij myrsinoides, alij polygonoides uocāt, saramēta habet longa, crassa uidine iunci bolo seboeni appellatū solū simile lauro. Vim habet siccantē. Itaq; alui profluvia, & dysenterias, & dentī dolores sedat, & moris alij bestias uenenatis succurrit. Altera clematis arboris abasoluitur uel ut similia, acrisq; ac uisoria est facultas. Huius semēti aqua potū, pūriti ac bilē deorsum ducit. Folia cataplasmati modo impo, sita de præsremouēt. Clinopodū calfaciens ac siccitū est facultatis, modū uisitis, sed tertij ordinis. Cnici semine ad purgationes solū utimur. Si uero quis foris ipso utatur, tertij calefacientis ordinis fuerit. Conchyliis similē buccinis uim habet. Cociis id est uentrē mergi aut rectū coctis, aut assiccat, stomacho cōmodū esse dicit, si edatur. Similiter etia gallinarū internū in tra uentriculū iunici, si siccā bibat. Verū Galenus factū experimētū, ambo falsa se compenisse uisit. At palatibis uentrē paulatim potū, calculos per urinā expellere, tradit dioscorides. Mustela uelut potus cōtra omnes uenenatas bestias medicamentū auxiliare dicitur. Coccus Cnidius, id est granū Cnidii fructus est Thymelææ, nō chamelææ, uelut quidā putat. Estq; acris ac urentis facultatis. Potū aut aquam deorsum purgat. Coccus ba, phicus id est Grandi tinctorum citra mordacitatē reliscat. Quapropter magis uulneribus cōducit, & faciens nerual, est aceto aut aceto misto tritam. Coccymelex id est pruni fructus alui subducit recens magis, siccatus minus. Decoctum etia collatum gurgulionis inflammationes sanat. At gummi arboris incidit & tenuiū partū uim habet. Hoc est uino potū quidam lapides arere dicit. Cum aceto uero impetigines porrorū sanant. Ceterum syluestriū prunorū fructus euuldet adstringit, & alui sistit. Nominatur autem planta hæc in Asia prumhon. Videntur autem domestica pruna siccata esse ea quę nunc Damascena appellantur, ut dicit Galenus.

Gluten Collo, id est gluten, quod ex singulagine & polline fit, in eoque obducentur
Cucurbita di & concoquendi utrum habet. Colocynthis, id est cucurbita humidi ac frigidi
 temperamenti est in secundo abscissa. Vnde nota in casaplasmate im-
 posita calida inflammationes refrigerat. Colocynthis, id est stylus, id
 est cucurbita utrum fortem purgatoriam habet. Iplius viridia faccus asfrictus, co-
Arbutus arbor xendicum doloribus prodest. Cornus, id est Arbutus arbor est acris
Menocylus ba sua qualitate, nisi co fructu, quem Menocylon appellatur. Est autem hic
 stomacho noxius, & capitis dolorem inducit. Commi, id est Gummi
 siccatissimum & in eoque obducentis facultatis est. Et minimum etiam asfrictum
 sanat. Coma, id est Lixivium appellatur quod velut lotura cineris est.
Lixivium Quod ex siccatissimo & Tithymalorum cinere fit, prae omnibus extergit ac sic-
 cat maxime, ut fere erodentem tam habet facultatem. Si vero etiam calce
 assumat cinis, ulcera ut praedictum lixivium facit, quod sanet etiam protulsa
 don nominant, & medicamentis quae per chlyterem in sedem adundantur
 maxime miscetur. Omnium autem siccissimum est, quod ex sola calce fit.

Coryzae ambo siccant ac calefactione terro abscissa. Vnde etiam ole-
 um in quo coquuntur, rigores per circuitum repetentes sedat. Sed & flor-
 res similem vim habent, quorum decoctum mentes movet, & fetus efficit.
 Quae vero in aquosa locis nascuntur, graevior & facultate debilior est.

Stercus asini Copros, id est Stercus omne calide & maxime siccantis ac discussoris
lana facultatis est. Euria autem iuxta animantis et ex erentis ipsam temperatu-
 ram, & usum. Canum itaque sterces quam olla voraverint siccant, cum
 scillo lacte potum dytnericos sanat. Item vetusta ulcera, si medicamentis
 ad haec idoneis ammiscantur. At in anginis & inflammationibus melle ex-
 ceptum illinitur. Hi autem & puerorum non superfluo visum forum ster-
 cus magnopere prodest. Stercus laporum quod & ipsum albidum inquit
 buidum fructibus reperitur, colicis generose opitulatur, non potum modo
 sed etiam appensum. Appendere autem ipsum oportet ex lana de oscula
 quam lupus dilaniavit, aut ex pelle cervina. Caprinum sterces acris est,
 & magis discussorium, & induratos tumores discussit impositum, & maxi-
 me in duris carnisbus. Vsum vero, magis exteriorum & tenuium partium
 curat. Bubulum habet etiam cum quadam atra doria. Vesparum itaque
 & apum plagas sanat. Sed & si hydropicorum totum corpus bubulo sterco-
 re in solet illinatur, magnifice prodest. Quillum si cum aceto adhibeatur ut
 riacas fornicarias & alias, itemque furunculos ac clausos sanat.

Columbarum stylus, id est sterces, multo acris quam aliarum est, & est
 nascitur semine rubefacit. Gallinarum domesticarum cum aceto mulso,
 aut aceto, aut vino mulso potum, strangulantes fungos per vomitum edu-
 cit, & auxillare medicamentum fit. Hoc etiam colicis bibendum quiddam de-
 dit. Aliquis etiam eleoniarum sterces potum, recta ceruice spiritibus auxilia-
 ridicunt. Musium sterces magis quam alia extergit, alopeciasque convenit.
 Ex puerorum sedi appositum, ad excitationem prolicit. Scarnorum sterces
 ubi corpus edent, exteriorum fit, ut etiam maculas solares exterat.

Crocodilorum terrestrium visigines exterit, quemadmodum Nilia-
 corum crocodilorum sterces, allugines attenuare creditur est.

Corallium velut arborea planta est, quae in lapidem indurefcit, non in
 terra nascens sed in concha maris parte. Est autem colore rubicundum, la-
 pidis simile. Vm habet valde siccantem, & moderate asfringentem. Con-
Cinior venit itaque sanguinem spuentibus, & dysentericis. Coris, id est Cimi-
Hypericum ces animalis, acrem urum habent. Scribunt itaque aliqui, quod si cum aceto bi-
 banatur, hirundines effugant. Coris herba, quam alii hypericum vocant,
 acris est & odorata. Semen eius potum urinas & menses movet. Auxillare
 etiam morbis hyslangis. In episthotonicis qui retro conagelluntur cum o-
Coriandrum leo illinatur. Corisanam aut Corion, hoc est Coriandrum ex contrariis
 facultatibus compositum est, tenuium quidem partium terrea, amara quoque
 fa uero

si vero humiditate tepida. Habet etiam parum quid adficcionis, ut inflammationibus & ignibus fieri non ualde feruida conueniat, & tumores molliores est alioquo ad id idoneo discentiat. Semen modicū potū cū passio lumbicos expellit. Amplius acceptum mētem percellit. Corydalis sine Corydalis, id est Galerita sine Alanda. uel cula cocta cum simplici iure, colicis opulatur. Verum assidue & sepe edere ipsam cum iure oportet.

Galerita
Alanda

Coronopodis radix etiam ipsa coctiua commoda esse, in cibo accepta creditur. Cossus modice ualde amare, plurimā acris ac calidæ qualitatis particeps est. Vnde ubi aut calficere partem aliquam propoliū est, aut humorem aliquem ex profundo ad superficiem trahere, ad cōsum desingunt. Vt namque etet, & menses ducit, & fibricos occidit. Habet etiā quid tharactos. Quare & uenerē stimulat est uino mulso potus, coxendicūq; morbo laborantibus, & resoluīs, & rigorib; per circuitū redeantibus conducit est oleo assitū. Coryledon persfrigerat & repellit, extergitq; se discunt. Pila ipsius est radice in cibo sumpta, calculos auerere credunt, & urinas ciet. Cochleæ usq; multū siccantis sunt facultatis, & moderate calidæ. Pro sunt dysenterij nondū putredinosi, si ad quatuor partes harū ammiscantur, piperis albi pars una, & gallanam partes duę. At uero nō uisit totæ trię ueniū imponit in hydropicis, & articulis in antritit, donec sua ipse de ciderint, uilesant. Et in summa humorem in profundo fortiter reddeant.

Crantz, id est Corni arboris fructus acerbus si edatur, fortiter uentrem supprimit. Sed & folia ac germina acerbitate sua fortiter siccant, ut & maxima uulnera glutinē in duris corporibus. Crumba, id est brassica siccantē uim habet, si edatur, & foris imponatur, non tamē euidenter aciem. Vulnera itaq; glutinas, & maligna ulcera, & tumores argē solubiles sanat. Habet etiam quid extersorium, per quod sepius curat. Semen ipsius potū lumbicos tollit, presertim Aegypti. Causium ipsius uisum etiam uenē uim habet. Cum a dape laterum doloribus diuturnis conducit. Syta est ris fortior facina est per omnia. Vnde neq; intra corpus citra lesionem sumitur. Marina subasta & subamara quomā, uentrem mollit. Cetraxogoni herbe semon, acie gustantibus est, & uehementer uentibus, nillo simile. Cetraxomon silium quod modo est, est modica amaritudine. Quis propter etiā usū ipsius extersorium est ac siccatoria.

Cornu
Brassica

Crithe, id est ordeū siccificat ac siccit primo ordine. Habet etiam quid extersorium modice. Magis aut quā farbarum farina siccit, & magis stans discunt. At polenta longe adhuc magis quā ordeum siccit. Psilana uero ad hoc quod magis humectat, magis etiā extergit. Crimmon appellatur crassa pars farinae ex tritico & ex zea. Magis quidē nutrit quā polenta, sed ægrius cōcoquitur. Crinā, id est liliū hos temperamēto mitius est, ex subastis tenuiū partū ac teretis, & aqua quadam temperata. Vnde et oleū ex ipso compolitū, discussorij ac mollitiū tenuim habet, inflammationib; uteri conducens. Radix & folia sicca, extergit ac discussorij moderate. Quare ad ambusta cōtinent. Succus liliorū etiam neruos facit iuuat est aceto multo. Crocodilij semēt succus, calidus & siccus ac discussorij est facultatis. Urinas itaq; mouet ac mētes. Radix aut expulsiōes ex thorace iuuat. Ducit etiā per nares sanguinem. Crocus se cundi ordinis est calidior etiam, primi siccantium. Adstringit & cōcoquit.

Ordeum
Polenta
Psilana
Tritici crassa
Lilium

Crommyon, id est Cera quarti ordinis calidior etiam est, et crassius partū subastis. Vnde hemorrhoidas appositū aperit. Est itē extersoria, & uulsiōnes aufert cū aceto. Et alopecurā aluēctis citius q; Aleyonū pilos producit. Succus ipsius suffusus oculis aut herbis, ob crassum humorem predest. Cynamos, id est faba, nō multū a medio si peramēto abest, si persfrigerādo, tū calidior. Caro ipsius etiam extersoria quodā faculā participat. Itaq; expulsiōib; ex thorace & pulmone cōuenit. Quā autē cortex habeat quid adficcionis tota faba coacta ac dysentericis predest in aceto cocta. In ea si plasmate uero imposita inflammationes & tūores sedat, et lac in mētem cōtingit.

Cera
Faba

Cyanos

Cynops a crem uim habet, deprimentem ac confumentē, itemq̃ difficul-
tatem seriem ampliorum quā est in Cansabari, participat etiam adstringēte.

Cyclaminus uariam uim habet. Nam & excregit, & secat, & aperit, & attrahit & discutit. Succus itaq̃ eius appositus hæmorrhoidas aperit, & duricias discutit cum alijs. Verū cum melle suffusus oculis commodat, & per narem purgat, & imo uentri illius alium subducit, & fortis contumit. Radix tota succo quidem dechior est, uchemens tamen etiam ipsa, de b̃ ut et aqua multa pota trum dechmarum pondere, interna expurget. Extergit etiam cutis uisita. At uero alia cyclaminus, quā & Ciliathemon uocit, quum radicem inuicem habeat, sem̃ eñ habet efficiētia ut potum priori sū milia faciat. Cyminum calefacientis est facultatis tertio ordine. Vrinā etiam ciet, & fluxus discutit.

Cynosbati id rubicini fructus non inge-
nerose adstringit. Folia uero moderate adstringunt. Vitare oportet id quod fructu uelut lanuginosum est. Nam aeternam herit. Cyparissū, id est cypressū pilule ac gemina siccantem uim habent, cui nihil manifeste calidū, tatis ad est, adeo ut uisura magna glutinet in duris corporibus, & in sacculis putrefactionibus humiditates in profundo citra molestem depascatur, & inest innotum ramici opifulentis.

Cyperus, id est tuncus quadraus ca-
lescit ac siccus, citra mordacitatem. Vnde humidiora ulcera in istice ad cū carcerem perducit, & ulcusculis in ore commodat. Habet etiam uim incidē-
tis, calculosq̃ acterit, & urinas ac menses ciet. Cypri, id est ligni sili folia & ramuli mixtam habent facultatem, discutioriam & adstringentem, & citra molestem ac mordacitatem siccantem. Vnde decoctū ipsorum affusum ambrosia sanat, & fer uisidū inflammationibus conuenit. Feruidū sem̃ ulcusculis oris, communia profant. Et splendentis compositionibus nascuntur.

Cyuli folia leniter discutioriam ac tepidam facultatem habent, quem-
admodum, & malure. Conium, id est Cicuta, quod summe perfrigeran-
tem uim habent, manifestum est. Coni, id est strobili arboris cortex & folia, similem pino uim habent. Verum acriora sunt & efficaciora. Fructus autem quem strobilum, id est nucem pineam nominant, quum uisidū est, habet quid amarū & acre cum humiditate. Quapropter affectionibus thoracis ad facilem educationem commodat. Qui uero editas, in aqua maceratus ut acrimoniam deponat, temperatus uisidū, mordacitatis tunc exore est, ac meatus obducit. Quare etiam a periculis lenigat.

Initium literæ. A.

Lagopus sic canis est facularis, & alia fluxiones resiccat. Ladanum ē cistibō Ladone dicto sit. Nam capella ipsam depascentes, in barbis ac for-
moribus suis, id quod pingulus est & succulentū auferant, id collectum Ladanum existit optimū medicamentum, calidum in secundo abscisso, & renitum partium, moderateq̃ molliens ac discutiorum & concoctorum. Quapropter ueri affectionibus priuatis comperit. Habet etiam quid adstringens. Vnde deffusus pilos corroborat. Lathyrus species est Tithymalli.

Quidam tradunt succum eius similiter ut illum purgare. Verum semen hu-
ius maxime purgatoriam uim habet. Lapsana si edat uisidū humores generat. Si uero in cataplasmate imponatur, extensoriū quid ac discutiorū habet.

Lapathum, id est Rumex, discutiorum moderate uim habet. Ac-
oxyla pathum supra hanc etiam repulsoarium quid habet. Semen autem pro-
ferum oxylapathi adstringit, id eoq̃ alui profluuiū ac dysenterias sanat. Ce-
terum folia contrario quodam modo se habent ad semen. Nam hoc alium exuriant, illud autem potum alium cohibet.

Limonij fructum ut qui sa-
lterum sic, cum uisidū dant coctis eis ac dysenterici & sanguinem spumantibus, & ad multebē fluxum ac erubili mensura. Lichen qui in petris nascitur, uelut muscus est, extensorum & moderate frigiditatem ac siccantem ha-
bens facultatem. Cuius autem impetigines lichenas dictas, & inflammatio-
nes arceat. Quemadmodum autem dioscorides ait, etiam sanguinis eruptio-
nes si-

nexilibit. Lichenes equorum impetigines cum acetositas, comitiales
 & omnis uisulente bestiarum morsum sanare dicunt. Leonopetali radix
 calida ac sicca in tertio ordine, itemq; dissilioris est facultatis. Lepidi
 um quam etiam Iberidem uocant, ex quinto caliditatem in ordine est. Et si
 millem quidem castrum uim habet, sed minus ipso siccat. Lepus, id est
 Squama omnis fortiter siccat & adstringit, & non in genere oleosior est.
 Verum quae ex ere est, amplius siccat, & magis tenuium partium est, ha-
 bentq; aliquid atraginis, & magis ea quae ex cypriss clausi decurrit, quam
 propter Heliolum, id est clausum nominant. As ferri squama plus adstri-
 ctionis habet, atq; hac adhuc magis stomomatis. Unde etiam ad maligna ul-
 cera praestantior est. Sed & carnem magis deprimit ac consumit, quoniam
 ex ere est. Leucacanthum, alijs Polygonatum, alijs Lichada uocant. Huius
 radix secat ac siccat in tertio ordine, calefacit in primo. Leucas cassia
 ac siccat tertio ordine. Prædominatur tamen acrimonia. Leuconij, id
 est uiole albae rosi quidem frutex exteriorum & tenuium partium uim ha-
 bet. Magis tamen flores, & quae ex his sunt succiores. Quare & menses mo-
 uent, & ferus perdit ac expellunt. Et si quis ipsorum uim per aquae ammix-
 tionem abundat, etiam ad inflammationes conducunt, & maxime eas quae
 in utero sunt. Radices item eandem uim habentes, crassiorum partium sunt et
 magis terrent. Hæ cum aceto induratis inflammationibus profunt.

Leuce arbor, id est populus alba, ex a quo fa ac tepida & terrea substantia
 constans, exterioria facultate participat. Libanosides tres sunt. Una
 sterilis, duas fructifera. Vim habent extergendi, incidendi, dissolendi ac
 molliendi. Harum succus cum melle uisus hebetudinem ex humorum cras-
 situdine cohortans sanat. Eius uero quae in coronas necilum decoctum potui,
 regio in oculo laborantibus prodest. Libanura, id est Thus, calefacit or-
 dine secundo, siccat primo. Habet etiam modicum quiddam subadstringens.
 Cortex ipsius manifeste adstringit. Quare etiam siccat secundo abiectione coeple-
 to. Est etiam crassiorum partium quoniam thus, & minus acris. Unde & sangui-
 nem spuentes, & dysentericos, coelacostis ac stomachicos sanat, & foris et
 intus assilapit. Suligo autem thuris calefacit ac siccat in tertio abiectione, ha-
 bens etiam quid exteriorum, quod ulcera in oculis repurgare ac extergit.

Lignys, id est fuligo, quarundam rerum dum ununtur est, uelut thur-
 ris, myrrha, terebinthi, styractis, picis liquida, cedri. Haec siccat, & terrea ac
 tenuium partium existit. Differentia ipsius secundum speciem, iuxta usum
 materiam sunt. Fuligo autem ipsa maxime ad compolitiones ocularias,
 et ornanda palpebris destinata. Præ omnibus in usu est fuligo sturis, uelut
 mitor. Fortior autem est pins, conis, ac picis. Unde ad glabras palpebras,
 & puridos ac erosos & lachrymantes oculorum angulos commoda est.

Ligustici & radix, & semen, in tantam calefaciunt, ut menses moueant.
 Flarus item ualde dissoluit. Lithargyros, id est Spuma argenti, modis
 inter metallica ordinis est. Quapropter uelut materia saepe ipsa utimur, ad
 alia medicamenta in compolitiones ipsam ammiscentes. Siccat tamen mo-
 derate, & extergit ac adstringit. Quare etiam ad hemorroidum impetigines co-
 modas. Lithi, id est lapides omnes, quemadmodum etiam terra, siccat.

Verum Hamatites adstringit & multum siccat, ut a speerudibus oculorum
 conueniat, si ab illis inflammatio, cum aqua diluit, cum quo. Conducit
 etiam sanguinis spumo potus, & ulcera nimia carne excrescentia deprimit.

Schistos, id est scissilis lapis similem huius uim habet, sed debiliore est. Et
 post ipsum Galactites. At Melites habet etiam quid caliditatis. Morocans
 quem & Leucographiden uocant, quare huius molliore est, eo quod nullam
 habet efficacem qualitatem, tamen moderatior est, magisq; dolorem eximit.
 Quapropter in mollibus corporibus ad ulcera cicatrice induranda, cum ce-
 rato ipso unantur, lassis subuiculis fortiores uim habent, clatrices & pe-
 rrygia extenuat. At uiridis lapis stomacho prodest, et appetitus, et in digito
 gelatus,

gestatus. Iuliacus lapide calculos in rheumbus atterit. Vnde etiam Terebinthi uni res ipsas appellauerunt. Pyrites ex fortiter discutitionibus est ad moros et sanguinis gramos. Hoc non per se, mylice utuntur. Phrygius unicum hoc quod fortiter liccat, etiam ad strictionis ac moris citatis quid habet. Vnde & repellit, & discutit. Quare etiam ocularis compositionibus miscetur. Aggratus adstringendi, ac discutendi in habens, gurgulionis, inflammationis prodest. Adde per se illos in tantum tenuium partium est, ut facidas carnes et transordactum in relinquit. Ciagates quum multum liccet, inflammationibus diuturnis maxime conducit. Magnetes qui & lapis Heraclius, similem hermeti uim habet. Arabicus eboris similis est, liccat & adstringit. Alabastrum uisum quidam stomachicis habendum exhibent. Smiris extensa riam uim habens dentes expolit. Lapides qui in spongis reperiuntur, calculos in rheumbus atterunt. Similem his uim habent qui in Agro Cappadox et in monte generantur. Similiter & qui Ophites appellatur, qui etiam à uisera moris alligatus prodest. Ostrea etiam & Geoden multum liccare produnt, ut etiam tumores inflammatos sinent. Coris Naxiae detrimentum frigefacientum esse dicunt, ut & uirginum mammis, & puerorum testes conseruat. Quod uero ex olea costa detrahitur, extensorium est, & alopecij commo- dum. Hieracium & Indicum lapidem sunt appensum hæmorrhoidum sanguinem sistere. Saphirum autem portu à scorpione percussis prodesse. Aphrodisiam uero comitialibus. Armeniacum aluum quidem deorsum purgat. Est autem stomacho nocuus. Lithospermum quod alij Nosporon, alij heracium uocant, herba Arctonichi dictæ semen est, lapidolum, album. Hoc cum uino albo potum, calculos atterit, & urinas dact. Lithospermum, id est linc semen, calidum est in primo ordine. Medium autem inter hume- dantia ac siccamta. Si edatur flammofum est etiam si roreatur.

Linozotis, id est Mercurialis aluum satis largè subducit. In cataplasmate uero appolita discutit. Nolle uero hoc conuenit, quod mercurialis se- men eminentius corporis præter naturam affricum, ipsa abolere comper- tam est. Has autem eminentias uisgè naphia uocant. Oportet autem uisgè de semen esse, & eminentias sepe ipso conficcare. Lithum siue Nitrum in medio est facultatis a phroni ac salis. Vsum autem tenuiorum partium ac magis discutientium quadit. Esti intra corpus sumatur, siccet & attenuat crassos ac uiscosos humores plus quam sal. At chalystrum (Est autem locus Thessalonice Chalystra) acris est & magis liccat. Quare etiam ad fluxiones et capite, & ad articularum affectiones ipso mutantur. Lonchitidis quæ semen triangulare habet, uelut cuspis, radice similis daniel radici, uisum ciet. Eius uero quæ scolopendria similis est folia uis idia quidem uis nera glutinosa, licca autem cum aceto pota, lienes induratos sanat.

Lycapli radicem ut quæ adstringens sit, dicitur orides ignibus sacris conuenire dicti, si cum polena in cataplasmate imponatur. Tritum uero ac eff oleo istam sudores mouere. Lycium ex diuersi generis facultatibus compositum est, altera calida & tenuium partium ac discutientia: altera terrea frigida & leniter adstringente, ut secundo ordine liceat. In calefaciendo uero ac frigefaciendo medium tenet. Quapropter uel ut extensorio ipso utuntur, in his quæ pupillis tenebras affundunt. Verum uelut adstringente in oculis ac dysentericis, & ulceribus malignis. At in inflammationibus uelut discutienti. Primarium autem est Indicum. Lysimachium adstringentem facultatem prædominantem habet. Vnde uulnera glutinat & ipsa, & succos ipsius, sanguinemque sistit, & dysentericis prodest pota, & per sedem infusa. Lychmidis quæ in coronas nebitur, semen calidum est & siccum secundo ordine completum. Lotus herba salua, quam aliqui triphyllum id est trifolium uocant, extensoria & moderatè siccantem uim habet. Temperata autem est in caliditate. At syluestria semen secundi ordinis est calefacientium, habet etiam quid extensorium. Vtrum Aegyptiæ semen etiam

in panes conficiunt. Lotus arbor tenuium partium est, & siccatur. & adstringit moderate. Unde ad fluxum muliebrem, & ad alui fluxiones pota conductum uino aut cum aqua uetustam per sedem infusa defluos item capillos corroborat.

Initium literæ. *l*.

Macer cortex est qui ex India adestur, siccans tertio ordine, Medicus in caliditate ac frigiditate. Est etiam adstringens, tenuium partium. Unde coctis & dysentericis conducit. Malabathri folium spicis nardi simile uim habet. Malache, id est Malua, folio est moderate discutit ac molli. Hortensis ut humidior, ita debilis est. Semen autem tanco fortius, quam siccus. Mamas uelut radicle quæ datur est herbe, habens frequenter quosdam uelut nodos. Hæc cicatrice & albogines attenuare creditur: nimirum quæ exteriorum habeat facultatem. Mandragora tertio frige facientum ordinis est. Mala uero citius etiam caliditate aliqua participant, itemque humiditate. Unde etiam saporosam uim habent. At radice cortex uehementissimus, non frige facit solum, sed etiam siccatur. Interna uero ipsius pars debilis est. Manna Thuris similis thuri uim habet, remissam tamen, & leniter adstringentem. Marathum, id est feniculum calefacit tertio ordine, siccatur primo. Quare etiam lac generat, & suffusa oculis optulatur. Mastichæ, Chia quidem calefacit ac siccatur secundo abscissa. Est autem compolizæ facultatis, adstringentis simulque mollientis. Unde si marchia, alui, intestinorum, & hepatis inflammationibus conducit. Aegyptia uero nigrior quodam modo est, siccaturque ac discutit magis, sed minus adstringit. Ideoque surmuculos discutit. Melan, id est Atramētū, Indicum ut Dioscorides dicit, ex his est qui leniter frige faciunt, & rumpunt inflammationes ac tumores laxos, ulceraque purgant. Atramētum autem quod scribitur facit etiam ipsum siccum. Verum si posita diluatur, ambustis illiusm fuscis auxiliatur. Melantheris, id est atramentum metallicum melam adstringit, cum partium tenuitate. Melanchium calefacit ac siccatur tertio abscissa. Est etiam tenuium partium. Unde distillationes ostensa sunt, & si in ura sumatur, flatas maxime discutit. Est etiam amarum, unde lombricos occidit. Exerget item ac siccatur, unde recta exurget spirantibus conducit, & lepras deterit, & fornicariis uerrucas eximit, & menses mouet.

Meli, id est Mel calefacit & siccatur secundo ordine, & si abunde extergit. Cochum minus aere & exersorium est, & uentrem subducit, sed magna nutrit. At anaram mel, uelut & id quod in Sardonis sit, mixtam habet facultatem, terram ac calidam. Cæterum Saccharum quod ex felice Arabiæ adestur, minus dulce est eo quod apud nos est, sed æqualem uim habet, ad hoc quod neque siama cho noxiū est, neque si in inducit, uelut hoc noxiū. Mella, id est fraxinus nota est arbor. Cuius folia pota mortis à uipera commovent. Cortex uisus & cum aqua dilutus, lepras remouet. Ligniamenta pota letalia esse dicunt. Mellotum mixtam uim habet, adstringentem ac discutientem & concoctantem. Melissophyllon, id est Apiastrum similem marubio uim per omnia habet.

Memecylon comari, id est arbuti fructus relatus supra est in litera. *æ*.

Mespila quæ asyricæ ceæ, a tribus quæ habent grana appellant. Acerbus admodum hic fructus est & uix ediposset, uentremque cohibet. Sed & germina & folia arboris ipsius abunde acerba sunt. Medij radicaliquarum contrarium semina uim habet. Hæc enim acriora est, & fluxiones sistit, ut etiam muliebrem fluxum sistat. Semen autem menses propellit, uisus tenuium partium & incensorum uim habens. Mecon, id est papauer multas species habet. Verum hortense, quod & Thylacium uocant, in cibi usum uenit, & cum panibus comeditur, estque moderate somnificum. Quod autem Rheos uocatur, eo quod semen ipsius cito defluat, id fortius quàm hortense est. Blatur itaque non per se, sed paucissimum ad copiosius mel mis-

B siccatur.

fecum. Quod uero uelut desidentem ac depressum calicem habet, id semen habet nigrum & medicatum, abundè frigidum. Ac quod oblongiorem calicem habet, & alius contractiorem, id omnium medicatissimum est, utroque porem inducit usque ad mortificationem. Est enim quarti frigefacientium abscissus, tam ipsam nam focum ipsius, quem per excellentiam optum appellat. Ceterum papauer Ceratidis, id est cornutum, exterioriam uim habet. Quare radice ipsius decoctum potum, hepaticis prodest. Folia uero & flores ualde sordida ulcera purgant, & crustas remouent. Heraclum & spumosum appellatum papauer, semen habet quod pituitam purgat.

Optum
Ceratidis

Maluorum

Maluorum est mala omnia humiditatem superfluum in se habent ac frigidam. Verum exoluta & aquosa, frigidiora & humidiora alia sunt. Dulcia uero aquosa quidem sunt, non tamen manifestè frigida. Austera si frigidiora dulcibus sunt, sed minus humida. Acida frigida quidem & ipsa sunt, sed humores in uentre secant. Acerba uelut sunt cydonia & sibirutia dicta, frigidum ac terreum temperamentum habent, et propterea aluum subant, & uulnora glutinant. Ita etiam folia, & facies, & cortices arborum inter se differunt. Mali per se & germina ac folia manifestè amara sunt. Lumbricos itaque occidunt, uita umbilico imposita. Fructus ipsius, malum uidelicet hoc perficum quod edimus, humidum est ac frigidum secundo abscissu. Mali Armeniaci fructus, quem nunc precocia uocant, eiusdem cum perficis facultatis est. Mei radices calidè sunt tertio ordine, sicca secundò. Menis igitur & urinas ciens. Quod sitam en uberius sumatur, capitis dolorem inducit. Milax & leuis, & aspera, quæ arborescunt, calida & acris est facultatis. Mily ex crustam inducentibus ac urentibus, cum forti adfrictione, medicamentis est. Minus autem mordet quam chalcitis, eo quod tenuissem partem existit. Sed & chalcidem & Sori, ob uiscositatem in Mily transmutari Galenus dicit, mutatione ex superficiè incipiente.

Præcocia

Plumbago

Plumbum

Plumbago, id est plumbago spumæ ægenti similem uim habet, à medio temperamento ad frigidum progressa. Molybdeus, id est plumbum, uim habet perfrigerantem. Habet etiam humidam substantiam plurimam à frigiditate compactam. Si igitur in ipso aut uinum, aut oleum erodam, aut alioquem frigefacientem succum contraheris, ad ulcerosas inflammationes circa pendenda ac sedem, optimum medicamentum habebis. Lamina porro plumbæ circa lumbos gestata, seminis per fornicem effusiones cohibet. Sed & ganglia, hoc est nervorum in nodum coactiones diffundit lamina plumbæ ipsa imposita. Vtrum plumbum magis quidem siccat, sed habet etiam quid amari. Si uero locus læset, circa mordacitatem siccat, & malignorum ulcerum optimum est medicamentum. Moreas id est mori, fructus maturus alui subducit, & in medicamentis ori destinata, stomacica dicta, & ad alia quæ moderata adfrictione opus habet, utilis est. Immaturo autem siccatus medicamentum ualde adfrictonum enadit. Cortex radicis arboris purgatorius est cum quadam amaritudine. Vnde semum humbricum necat. Foliorum autem & germinum media quodam modo est inter alia subducens ac silientia facultas.

Mora

Myagros

Myi

Myelos

Myi

Myagros quæ alij uocant melampycon, herba est stermentis ac pinguis. Pinguedo ex ipsa corporis asperitates explanare uidetur. Et semen Myagri pinguis est, & quod in ipso & oleolum, mentes obtundendi habet facultatem. Myi, id est Mili uiti eadem quæ hucina faciunt. Magis autem proprie loti, palpebrarum crassitudinem & albugines deserit cum melle. Caro ipsorum mollia à cane utiliter imponitur. Myelos, id est Medulla uim habet indurata & in scirrhos coacta corpora molliendi. Optima est ceruis. Deinde utulina. Ac taurorum & hircorum asinis est, & magis siccat. Et quæ quidem ex utrobis est, pinguior est, & magis mollet. Quæ uero ex spina, durior ac squalidior. Mycetes, id est fungi, siccidi & humidi admodum temperamento sunt. Quidam etiam ex ipsis in cibo accepti necant, & maxime qui ex ipsis naturam putredinis ostendunt per

permixtam habent. Myosote, id est auricula maris dicta est in alfine. *Auricula maris*

Myxa fractus arboris est minor primo, sed facultate similis.

Myrica secandi ac exurgendi vim habet, citra hoc ut manifeste licet. Habet autem & aliquam adstringentem. Decoctum itaque ipsius lentes sicut potum. Sanat etiam dentium dolorem. Fructus autem & cortex ipsius prope ad galli facultatem accedunt. Cinis arboris magis licet.

Myriophyllum, id est millefolium siccansem adeo vim habet, ut uulnere glutinet. Myrha siue Myrrhis secundum ordinis calefacientium est, habens etiam quid tenuium partium. Radix ipsius odorata ac dulcis est, men-
Millefolium

sesq. mouet, & quæ in thorace ac pulmone haerent repurgat. Myrtinus, id est myrtus ex contrariis substantiis constat. Prædomina-
Myrtus
tur tamen in ipsa, terra frigida. Unde fortiter licet. At myrtis, quæ in
Myrica
marco ac ramis eius erumens appendix est, licet & adstringit uel emol-
lus. Sed & folia licetiora magis quam uiridia licent. Fructus quoque ac suc-
cus similem vim habent, cum foris a dila, nam inra corpus allimpta.

Moly quidam rutam syluestrem, alij arisan, Syri hēsalan uocant, ter-
Ruta sylvestris
tij ordinis calefacientium est & tenuium partium. Unde etiam crassos ac ui-
Arisaema
scosos humores secat ac diluit, & urinam propellit.

Inisum literæ. 4.

Nascaphthon quod alij Narcaphthon uocant, indicum est aroma,
Nascaphthon
quod ad uerum adstrictum sufficit. Napy, id est Sinapi calefacit ac sic-
Sinapi
cat in quarto abscessu. Nardo itachys, id est spica nardi. Huius radice
Spica nardi

calefacit primo abscessu, licet secundo. Habet etiam quid adstringens, &
acre, & subamarum. Proinde hepati & stomacho conuenit foris adhibi-
tum, & intro potum. Urinas item citæ, & internarium partium fluxiones li-
sit. Indica fortior ac nigrior est quam Zyriza.

Nardus autem gallica siue Celtica similem relaxe vim habet, sed debili-
Celtica nardus
or est, præterquam ad urinam citandam. Nam calidior est quàm illa, & ma-
Thysactis
nus astringit. Ac montana Nardus, quæ & Thysactis & pyritis dicta,
Pyritis
prædictis debilior est. Nanthetia, id est ferula semen atenuat ac calefa-
Ferula
cit. Quod uero intus uelut medulla est, dum adhuc uiridior est, adstringit.
Quare sanguinem spumantem & coeliciis prodest.

Narce, id est Torpedo marina, si caput dolentibus adhuc uis appona-
Torpedo maris
tur ad caput, dolorem extime. Fortassis ob hoc ipsum quod torporem indu-
Narce
cit. Sed & oleum in quo uis cocta fuerit, illam aciores morbi articulares
dolores mitigt. Sedem etiam prolapsam, ipsum appositam reprimere fe-
runt. Narcissi radice secandi uim adeo habet, ut etiam maxima uulnera
glutinet, usque ad tendines etiam dissectos. Habet etiam quid extensorium
ac attractorium. Neuras quam alij poterium uocant, siccansem citra
mordacitatem uim habet, ita ut & ipsa neruus dissectus glutinet. Radices
autem hoc maxime faciunt impositæ et potæ. Nerion siue Rhododan-
Rhododaphne
thos, si foris secus in cataplasmate imponatur, discussoriam uim habet. In-
tro sumpta occidit. Nymphæa uim habet siccansem citra mordacitatem.

Proinde & uenerem silit, & genitale semen reficit. Verum quæ albam radi-
cem habet fortior est, adeo ut etiam fluxu muliebrem sanet pota cum uino ni-
gro & austero. Quæ uero nigram radicem habet, extensoriam etiam quid
habet, quæ intelligens cum aqua illica sanat, & cum pioce liquida alopecias.

Inisum literæ. 5.

Xanthium aut phasganium, id est Lappa semen habet discussorie facul-
Xanthium
tatis. Xiris siue Xyris tenuium partium uim, discussoriamque & mira-
Lappa
cloriam habet, & nimium siccansem, & magis ipsius semen, ita ut urinas in-
creat, & splenem induratum sanat. Xiphid est gladioli radice attracto-
Gladiolus
riam & discussoriam ac siccansem uim habet.

Inisum literæ. 6.

Oz arbor, cuius fructus oî, ab aliquibus uero uî id est Sorba uocantur, *Sorba*
B. adstringit.

adstringendi vim habet, sed minus quam mespilus. Otheonnam aliqui
 faciem esse vident herbae in Arabia quae ad Aegyptum est nascentis. Alij
 lapidem Aegyptium. Extergit autem & mordet omnia quae popillis tene-
 bras offundunt deterens. Onanthen plurimus usus sythetichis visis sto-
 rem esse nonit, qui abunde adstringit & corroborat maxime partes circa
 ventrem. At dioscorides aliam huius facientiam contrariam describit. Vnde
 & secundas ipsum ejicere dicit, & urinae stillicidium ac morbum regium
 sanare. Onos id est unius ex secundo ordine est cori quae calefaciant ac
 secat. Quod vero admodum vetus est ex tercio. Mulsum autem in pri-
 mo. Oclypes in lanum tractatione relatus est. Olyndi id est
 grossi, aerem ac discussoriam vim habent, propter eum qui in ipsis est suc-
 cum. Coch igitur durus nimis disc utunt. Crudi vero uentucas formi-
 casas, & eas quae thymi appellantur eximunt. Olosieon secansem
 vim habet cum adstringente. Vnde ipso etiam ad ruptiones utimur.

Omphachum forcus est trux acerbior. Adstringit abunde, & siccat tercio
 abscessu. Vnde fluidis affectionibus & maxime stomachicis conuenit.

Oenagra quam alij cenotheram, alij cenochurim vocant, frutex est ar-
 borosus, cuius radix in cataplasmate imposita, fera ulcera mitigat.

Onosma sive onomis, aut phlomisitis, aut ononis, acris & amara est.
 Vnde solis ipsius pora cum uino, scortis necant ac eijciunt.

Onobrychis rarefacientem ac discussoriam vim habet. Tubercula ita-
 que discutit, et urinae stillicidia sanat, & sudores promouet. Oni id est as-
 kelli qui sub natis aquarum reperiuntur, & in globum se contrahunt, dis-
 cussoriam ac secansem vim habent. Inq; post comestio urinae difficultas,
 tem, & morbum regium sanant. Angina laborantibus insinuantur cum mel-
 le. Et ad aurium dolorem tria cum rosaceo calefacti in mali panici putami-
 ne insistantur. Onyches conchylionum Indicarum opercula sunt hae
 suffrag eae quae ab utero strangulantur excitant, itemq; a comitali praehens-
 so. Potu uero absumuntur.

Ononis radicem habet calefacientiam
 circa portum ferme ordinem. Cortex ipsius extergit ac secat. Vnde etiam
 calculos interit.

Oxos id est Accum uixit facultatis est frigida ac ca-
 lidia, quae ambre tenuium partium existunt. Preponderantur tamen frigida
 calide. In tercio autem ordine secat. Oxyacanthos arborisastro simili-
 lis est specie ac facultate, habetq; etiam quid tenuium partium. Fructus e-
 ius myri baccis similis est. Opini in tractatione de papasere dictum
 est.

Opos id est Succum: & cynaieus, & Medicus, & Syriacus, per
 excellentiam dicuntur. Sunt autem ualde calidi ac flammosi. Verum Cyter
 nascens omnem calidissimus & maxime tenuium partium est.

Origani omnes species secandi ac attenuandi, secan diq; ac calefacienti
 di vim habent in tercio abscessu.

Oroselia non id est apium montanum
 similem apio vim habet. Sed fortius est. Orobanche seccae frigidi tem-
 peramenti est in primo ordine. Orobus id est Eruium calidit ordine pri-
 mo, secat secundo. Est autem amarum. Vnde secat & extergit, & apertit ob-
 surata. Si uero amplius sumatur, sanguinem per urinas ducit.

Osmanon in rubio specie simile est, calidumq; ac moderate siccum, &
 extensorum. Vencrem itaq; stimulat, & oculorum crassitudines depurgat
 emmelle, & nimios laeos discutit, & aculeos extrahit, Sythetichis fortius
 est latius.

Oryza habet quid adstringens. Quare etiam uentrem mor-
 derat sibi. Orchis herba appellatur etiam cynorchis, id est Fellicus
 hircanis, habetq; radicem duplicem bulbo similem. Vis maioris humiditas
 est ac calida, quare etiam ad uentrem stimulat. Minoris autem calida est ac
 secca. Itaque uersa uentrem cohibet.

Orchis quae & Seraphis, & ab
 alijstiorculus, quasi tritescularis dicitur, magis priore secca. Tumor-
 es itaque laeos discutit, & ulcera sordida ac putredinosa purgat, & herpes-
 eas sanat. Seccata uero magis secat. Quia uero sibi adstringit, inde adeo con-
 am

am aham silit cum vino pota. Oleris ex qua scopus faciens, amara est, & hepar ab obstructione liberat. Ossa urtica discussoria & admodum siccantem uim habent, & maxime humana, pelusium. Scillum cereta, lum usum, inflammationes & tormota sanare tradidit. Est quidam qui ossa urtica bibenda exhibet, & morbum comitalem ac articulare curat. Ac bubulum talum usum, mobiles dentes firmare dicitur. Idem cum melle potus tumebicos rotundos exigit. Cum aceto multo uero splenem confumit. Illius etiam uuliginis leucas dictas iuuat. Idem etiam uenerem stimulat. Sed & foemora bouis urtica pota, sanguinis eruptiones & alui fluxum siliunt. Ostraca id est testis ex fornacibus trite, siccantem & extersoriam uim habent. Vnde dentes polunt. Et cum aceto illita pruriginis, & pustulas, & podagricos iuuat. Cum cerato uero strumas discutiunt. Ostrorum testa urtica buccinorum testis similes facultatem habet, sed minus crassam partem. Faciei itaque urtica extergit, & dentes dealbat. Si uerolawetur, mordacitatem amittit, & humidis ulceribus ad exsorptionem, & cicatricem inducendam commodatur.

Ouromid est urina omnis calida & acris est. Sed debilissima inter animalium urinas humana est, exceptis suisbus castratis. Est autem admodum extersoria, eam aliqui in peste pota seruatim sunt. Leprasitem & puritrida ulcera, & manantia capitis ulcera, & furfures curat. Atrox quoque pedum ex offensione, si non fuerint inflammati. At impubium puerorum urina fortior est, ex qua etiam chrysocolla fit. Mulorum urina in articulares compositiones conuenit. Cam elorum & caprarum urina alium subducit, unde hydropicis bibenda exhibetur.

Initium literar. w.

Panacratum & specie & uiribus simile est squilla, sed debilius.

Palluri folia & radix adstringunt. Vnde etiam fluentem uentrem siliunt. Sed & tubercula discutiunt non ualde calida. Fructus instantum fecat, ut etiam calculos auerat, & expuitionibus thorace afflicto.

Panaces heracleum est ex quo oppopanax fit, qui tertio ordine calidior est, sicut autem secundo, molliorem ac discuti. At radice cortex succo debilior est habetque quid extersorium ac incitant. Semen eius etiam mentes mouet. At uero Asclepium & Chironium panaces priore sunt calidiora. Vnde ipsorum floribus & semine ad maligna ulcera ac panos utuntur. Papyrus non ulla materia quidam est. Vt ita uero siccatur, quem admodum etiam charta urtica. Verum papyri cinis debilior est.

Paronychia herba dicta ex eo est quod paronychias id est reduntias digitorum sanat. Vis eius tenuium partium est, siccaturque mordacitatem. Pentaphyllos id est Quinquifolium, siccatur tertio ordine, minime uero acris, idcirco ad multos usus comoda est.

Peplos quae alij papauer spumofum uocant. Et hic strux succum habet, & purgat similiter ut Tithymalli. Peplion quoque succum habet, & nascitur circa mare. Et in reliquis quidem inutile est. Verum semel ipse feruidum, similiter ut peplos purgat. Piperis radix costo similis est facultate. Fructus autem ipse recens germinantis, est piper longum, elidit humidus ac calidum. Qui uero uelut una immatura est, piper album est, quod acris nigro existit, quum id sit nimium asharum. Ambo autem calefaciunt ac siccant. Peps extersoria uim habet. Vnde caro ipsius maculas solares & similes extert. Semen uero ehenes ab obstructione liberat. Perilymeni folia & semina, siccantur simulque calefacient uim habent, adeo ut urinas cruentas excernant pota ad sextum usque diem: uerum si ad quadraginta dies bibantur, lientosis & difficulter ipsantibus profunt. Perilisteron id est Verbenaca tantum siccatur & adstringit, ut uulnera glutinet, & sanguinis eruptionem siliat. Persica arbor est Aegyptia, cuius folia siccant & adstringunt. Quare & sanguinis eruptionem siliunt.

B 1 Petalica

Petasites extractio ordine siccantium est. Vnde in malignis & phagedenicis ulceribus ipso usuntur. Petroselinum semen calidum ac siccum est terdo absterfus, nimis secandi habens. Urinam item & menses largitur. Flatus quoque discutit. Peucedani & liquoris & succo admodum calefaciente, discutientesque ac attenuantur unum, tum pro odoramento, tum in portione, ad affectiones in pulmone ac thorace, ex humorum crassitudine obortas, & ad induram lientem. Sed & dentibus corrosis induratis, dolorem statim sedat. Conuenit etiam affectionibus nervorum. Radix autem etiam ossium squamas remouet, & maligna ulcera sanat, calefaciens ac siccans ordine tertio. Peuce, id est picea similempino uim habet, sed moderatiorem. Peganum, id est ruta, syluestris quidem quarti ordinis est calefacientium ac siccantium. Sarius uero tertii. Secansque ac discutit crassos et uiscosos humores, & menses mouet. Elixir tenuissimum & flans discutit. Vnde & nenerem colidit. Picea secundo ordine licet, minus calefaciens. Liquida uero uice uersa. Habent etiam quid extensorium ac concoctorium, discutitoriumque & acre. Quapropter & scabros ungues exiguos, & impetigines exterunt, & tumores concoquunt. Fortior autem est liquida, ut etiam anhelosis & pectore suppuratis deinde commodet. Asicca negas uulnera glutinat. Pistacia id est oleum piceum ex liquida picea, & insubstantia magis tenuissimum paratum est quod ipsa picea. Pistacia si fructus in cibo acceptus moderate stomacho commodus est, & hepatis obstructions aperit, & maxime purum ipsi, ut aromaticorum decoctum ex uino. Auxiliatur etiam morsu uiperarum. Pityides uocantur fructus pinorum, estque uirtus facultas, adstringens & acris. Vnde ad expulsiōnes e thorace facit. Pityocampeid est pinorum, ex succo eandem uim habet, quam cantharis & buprestis. Pini cortex ad stringentem uim predominantem habet, qua interungines & ambusta insperasunt, & uentrem saluū ponunt. Folia uero etiam uulnera glutinans. Pityosam quidam cithymalli speciem esse dicunt, quod & succum habeat, & similiter uulni perueniat. Placemus humidiores ac frigidiores uim habet. Vnde etiam folia utrida inflammationes que ad uicem sunt iuuant. Cortex autem & pilula magis siccantem uim habent, ut ille in acrococtus dentium dolores sanat. Pilula uero cum adipe ambusta cunctis. Aruius cortex magis siccans ac extensorius uisus, ut lepras & humida ulcera sanat. Pneumonid est pulmo agnitus & fauillus atritus ex calceamenta curate creditur. Aruiolpinus asiccatus si bibatur, anhelosis. Marinus autem pulmo recens minus, podagricis & pemonibus prodest.

Polemonium quod est philetarion uocant, tenuissimum paratum est & siccat. Vnde aliquando coxendicium morbum, & dysenteriam, & induratum splenem, radicem eius habendam proberit cum uino. Polium minus quo etiam d antidosis uentum, tertij ordinis est calefacientiam ac siccantium. Omnia itaque uiscera ab obturatione liberat, & urinas ac menses mouet. Erubidulic uiride est, magna uulnera glutinat. Sicut autem maligna ulcera inspersum ipsis sanat. Polygalon folia habet moderatè asthera. Potum autem, lac generare uidetur, calidum nimirum ac humidum habens temperamentum. Polygonum mixtum est ex adstrictione, & acrimonia ac amaritudine & quadam inuicunditate quae nominari non potest. Quapropter neque multum usus est. At radicem ipsius quidem uulneribus imponant, & maculis facies cum ipso exteri. Polygonum id est Sanguinaria habet quidem quid adstringens. Verum predominant in ipsa frigiditas aquosa in secundo ordine. Prodest itaque frigida symposita his qui stomacho exuruntur, & ignibus sacris, & inflammationibus calidis. Quum uero tale sit, fluxiones repellit, atque ea de causa siccandi uim habere putatur. Est autem mascula fortior quam femina.

Polychemon calfacit ac siccant secundo ordine, ut etiam uulnera glutinet. Polypodium

Polychemon calfacit ac siccant secundo ordine, ut etiam uulnera glutinet.

Polychemon calfacit ac siccant secundo ordine, ut etiam uulnera glutinet.

Polychemon calfacit ac siccant secundo ordine, ut etiam uulnera glutinet.

Polychemon calfacit ac siccant secundo ordine, ut etiam uulnera glutinet.

Polychemon calfacit ac siccant secundo ordine, ut etiam uulnera glutinet.

Polychemon calfacit ac siccant secundo ordine, ut etiam uulnera glutinet.

Polychemon calfacit ac siccant secundo ordine, ut etiam uulnera glutinet.

Polychemon calfacit ac siccant secundo ordine, ut etiam uulnera glutinet.

Polychemon calfacit ac siccant secundo ordine, ut etiam uulnera glutinet.

A Polypodium siccatem abunde uim citra mordacitatem habet. Potum purgat decoctum. Pompholyx citra mordacitatem sicca, ut canerolis ulceribus, alijsq; malignis opusculatur. Misceatur etiam in oculares compositiones. Purpure uisum similem testis uim habent. Operculum uero ipsarum esse oleo coctis fluentes capillos corroborant: cum aceto pora lienis tumentes sanant, suffusa ab utero strangulatas excitant, & secundas eiciunt.

Potamogeton frigida cit & adstringit similiter ut polygonum, ut cui similem facultatem habeat. Potentilla alij phrynion uocant. Huius radices coctis, ac coctisq; nervos dissoluit ac uiscera glomerat. Decoctum aut ipsius potui, affectionibus circa nervos opusculatur. Prasion id est Marrubii cathartici secundo ordine, magis autem siccat. Hepar & lienum, & thoracem, et pulmonem ab obturatione liberat. Menies etiam propellit. In cataplasmate impositum extergit ac discutit. Sed & alia exteriorum est, ac incidendi ut praedita.

Prasion id est portum mali succi est & acre. Ut uero dioscorides ait, etiam grauis semina inducit, & uentri commodat, & urinam eicit, et arterias. Habet etiam quid extensorium. Nam & pulsanis in coctis, in Thorace horrentia educit. At lienum ipsius in rheumales compositiones miscetur. Folia habet etiam quid adstrictoria. Unde succus ipsorum sanguinem cohibet.

Primos id est illex similem quercui uim habet. Sed multo fortior quam ipsa est. Propolis calefacit secundo abscissa, & moderate emergit. Huius uim tenuium partium, & ab obturatione liberantem. Pramnica folia siernum rationem mouent. Totas autem frutes uitis, singillatim, & altos li uores ab humoribus sub eorum effusis discutit. Est enim calida & sicca uti dicitur quidem secundo, sicca uero tertio gradu. Poetia id est alnus, siccatem & extensoriam uim habet, ut etiam vulnera glutinet. At cortex adhuc magis, si quum recens est, uulneribus uelut ligamentum obducatur. Sanat itra lepras cum aceto. Sed & radices eadem uim habent. Quare decoctio ipsarum fracturae quae calli inductione opus habent perfunduntur.

Pectis id est filix, siccandi uim habet, & amara est. Unde & scortis nocet, & latus lumbicos occidit, quatuor drachmas uim pondere cum aqua mulsa. Quia uero moderate adstringit, ulcera siccat citra mordacitatem.

Pycnocomon discussoriam & aeternam uim habet. Folia igitur panos & furunculos discutit. Semen uero ad haec & aculeos extrahit. At radix: hilem suam purgat. Pyrethri radix urentem uim habet, & densum perfrigit ratorum dolores mitigat: Et ante rigores per circuitum repetentes afficitur cum oleo. Insuperq; corporales ac resolutas sanat. Pyros id est Tritium primo ordine calefacit. Verum inter sicca & humida medium tenet. Habet etiam quid nictosum, & obturandi uim habens. Pitya id est coagulum omne acris & attenuat, ac discussit, & nimirum siccantis est facultatis. Veram leporinum comitales curare scripserunt, si cum aceto bibatur, fluxum siem meliebrem sanare, & lacini gramosi in uentriculo concretum dissoluere. Similiter autem & spota sanguinis ex thorace ipsam cohibere dicunt. Ae equinum coagulum coctis ac dysenterici, conuenire scripserunt. Phoece autem coagulum castorei uim habere.

Inuitum licere. f

Racos id est panniculus uisus, sextans est, haec uisus similem uim habet. Laniens autem panniculus dum adhuc uisus, tenuium partium summum edat, qui & desiliationes in capite obturatas soluit, & uentis facilius currentibus conuenit. At ubi idem iam uisus est, prope ad laxum uim accedit.

Rhizus siccat secundo abscissa, frigida cit primo. Unde herpes et ignes sacros sanat non ita de feruidos. Viendum autem est folijs tenuis.

Raphanus calefacit tertio abscissa, siccat secundo. Syllustis efficacior est. Vniuersa autem semen uehementius est. Disscutiunt itaq; singillatim & alia licet sicca. Rheon alij rha uocant, compositum est ex terra frigida, & tenuium partium aerea substantia, calidatq; ac leniter occi. Unde comussa

B. 4. & rep.

phrynion

Marrubium

Portum

lex

Vitis

Pectis

Tritium

Coagulum

Raculus la
uenter licet

Rha

& tupa & creta ceruice spirantes iuant. Item liuida, discutiendo. At adstringendo, sanguinis sputionibus, & coeliactis & dysentericis prodelli. Varyq; uero facultate, hepaticis. Resinae omnes calefaciunt ac siccant. Sed Trebitimima prima leni, quae discussoria & mollitoria, tenuissimq; par tium ac exteriora exsunt. Quare etiam scabiem sanat. Larix quoq; huius modi est. At resina picea & adhuc magis strobilina, acrior quidem est, non tamen disc utit plus, neq; atrabilis. Modice uero inter ipsas sum, resina ex pi nu, & ex abiete. Rosae compolice naturae sunt, ex aquosa substantia calida adstringente & amara. Flos ipsatum adhuc magis adstringit. Vnde est amliccat. Rhodia radix calefacit in secundo abscessu, estq; tenuium par tium ac discussoria facultatis. Rhoe id est Mala punicea, omnia quidem uim adstringentem predominantem habent, propter quam frigefaciunt ac siccant. Verum dulcia ambo hec minus quam alia habent. At aultera ma gis quidem frigefaciunt, sed sicciora sunt, & stomacho commoda. Acida uero plus frigefaciunt, & incisionum quid habent. Ceterum nuclei ma gis adstringunt ac siccant quam succus. Et his adhuc amplius putamina, sida & malicoria ap pellata. Similem autem his uim habent flores, cythi dicti. Rhoeis conserji uocant fructus maxime ac succus, medicis in usum ue niunt. Alande autem adstringit, & sic catordine tertio, frigefacit secundo. Rhypos id est Sorbes ex cereis stauis, aut uasa in quibus largum oleum remanet, habens etiam quid zruginis, discussoriam uim habet, & mo dera siccantem ac mollientem. Crudos itaq; panos discutit. Aruero de sorde in palestra, quam aliqui etiam poton uocant, in sudoris tractatione dictum est. Ceterum aurum sordes, reduitas sanare dicitur.

Initium literae. α.

Sagapenum succus est uelut ferula, calidus & tenuium partium. Habet etiam quid exteriorum, ut oculorum cicatriceibus ac suffusionibus com modet. Salamandrae usq; cinerem aliqui ad compositiones erodentes, & ad lepras ac scabiem delinatas amolient. Sampuchum calefacit ac sic cat tertio abscessu. Est autem & tenuium partium & discussorium.

Sandaracha urendi uim habet, quemadmodum etiam arsenicum.

Sandryx aut Syricum, tenuium partium & siccantem uim habet, non ta men calidam. Saprotes id est caries lignorum, maxime ulmi purgat & replet ulcera humida. Sapo exteriorum uim habet. Sarcocolla lachry ma est arboris persicae, meatu obducens & citra mordacitatem siccant. Et ob id etiam vulnera glutinat. Sarciphages hoc est Saxifraga, & urinam ciet, & calculos auert. Saryrium aut Triphyllum id est trifolium, humi dum est ac calidum temperamento, itemq; flatu osum. Vnde ad uenrem sit uolat. Quidam etiam retro dissentos ipsaq; sanare dicunt, cum uino auste ro potum. Ceterum in libro de Theriaca dicit Galenus, trifolium quae hia cyntho similis est, quum ueris tempore pregnans, semen habet cnico syl uestri simile, aune deo oleum ipsius si ad phalangii aut uiperæ morsum assu datur, ipsum curare. Si uero sano loco adhibeatur, simile affectionem efficere inquit, his qui ab horum aliquo commossi sunt. Sauræ id est lacerta he par & caput, in proprio loco relata sunt. Tota uero resecta et impulsa i scos ascorpio sanat. Selinon id est Apium calidum est in tantum, ut & urinas ciet, & menses fluxus item discutit, & maxime semen ipsius. Seris sub arum oleus est, admodum frigefaciens ac humectans. Habet etiam quid adstrictionis. Seriphon calfacit secundo ordine, siccac primo. Estq; simile abinthio, sed minus ipso adstringit, & magis calfacit, ac humectans ocell dit. Modice quoq; stomacho noxum est. Seletis radix, & magis semen, a bunde calfacit cum partium tenuitate. Vlnæ item ciet, & ad comissale m morbum, & testa ceruice spirantes commodat. Sepix testa, ostri testis similem uim habet, uerum tenuium partium est, & magis exterioria. Vnde siusta fuerit, pterygia oculorum attenuat cum sale fossili. Non ulla uero,

fycoles

lycoles exerceat afflicta. Vitis item cunctis detergit. Sesamoides magnitudo quod & Anticyricum uerorum nominatur, eo quod semen eius similiter ut uerum purgatum hoc & reliqua fabulose uerum simile est, & extergendo, & calefaciendo, & siccando, similem illi uisum habet. Sesamoidis albidum semen calefacit, & extergit, & rumpit. Sesamum non exiguum habet ut sesosigenae ac pinguiusmodum. Unde meatus obducit, & mollescit, & modeste calefacit. Sepi equum aliqui Lacertum Chalcidicum uocant, in uino potum, morbos abspasmat. Salomon id est Salina hominum scilicet uerum maxime discussorium ac extensorium uisum habet. Imperiginis itaq; puerorum illi hira extert, & furunculos concoquit; si cōmilio commanilo imponatur, suggillata item tollit. Belsis quoque ueteratis hominem occidit caribus maxime aduersatim. Sideritis heracles quae etiam Helixine dicitur, relata est. At Achillea sideritis illiusdem similis est, sed magis adstringit. Unde fluxus de affectionibus conuenit. Sideros id est Ferrumina aqua soepe extincta, siccitatem abunde uisum in ipsam deponit. Haec itaq; pora splenicis competitis. Sideros in uino ferrum extinctum fuerit, coactis & dysentericis, & cholera morbo uicinis, stomachoq; exolutis, uisum id potum auxiliatur.

Vitruum illi
lycicum

Lacerta chalcidica
albidus
salina hira
na

Seruos

Cucumis

Elaterius

Elate

Elapheus

Carduus

Aphron

Sicya id est cucumis qui edatur, dum adhuc uisus est singefacti et huius est secundo ordine. Ex raro quidem ipsius feruenter mitigat inflammationes. Semen autem extergit & secat. Urinas itaq; auocet, & aridum corpus efficit. Ardicus primo ordine siccatur, & magis extergitur semen, cum radice. Ceterum syla elatris cucumeris fructus succus, elaterium dicitur, relatus est. Sed qui ex radice ac folijs est succus, similis quidem elaterio est, sed debilior. Radix extergit, discutit, mollescit. Siccitatem uero uisum succus habet.

Sillybon plana est spinosa similis chamaedion albo, in cibi usu ueniens. At radice ipsius succus drachmæ unius pondere positis cum aqua molli expurgat. In epistimaq; impositus uisceros educit. Silphaz id est hircus, qui in pistrinis ubi panes sunt, reperitur in crassa cocta uisum uisum dolo resiliant. Silphium id est laurpitium calefacit strenue. Est & statuosum ac egre concoquitur. Verum extra corpori adhibendum efficacius est, & magis succus attractior uisum habens. Habet etiam uisum conseruandi ac deprimendi carnem. Sison calidus est, urinas efficit, & concoquit. Menfes item ducit, & uiscera obstrukione liberat. Sion calidum est, urinas efficit, & discutit, calculos item in renibus auerit, & menses ducit. Sifari radix cocta stomacho commodat, & urinas efficit, caliditas est secundo ordine.

Silymbrium tenuius parum discussoriumq; ac calefaciens & siccans est facultatis ac temperamenti tertio ordine. At Semen quoque tenuius parum est discussoriumq; ac forte. Quare etiam singulientibus datur, & his quos tormina uexant cum uino. Silymbrium quod & Cardaminem trocheis, rasilueto simile est. Et aridum quidem calefacit ac siccatur ordine tertio. Vbi uero humidum est, secundo. Scammonis calida est ac discussoria & biliosorum humorum extensoria facultas, & magis succus eius, qui sine ei amples discutit, & apoplexiam foras perdit, & lepra educit. Ad diuturnos item capitis dolores irrigationis uice usurpatur cum oxystodio. Radix postpurgat tam ipsam, decoctum ipsius. Cum aceto autem & farina ordeacea cocta, coxendi cum morbo in cataplasma se imponitur.

Scandix sylvestris alba est calefaciens ac licca secundo ordine. Urinas etiam efficit, & uiscera obstrukione liberat. Sine partes circarhenes, uelut medicamentum arigen; membrum uirile bibuntur. Verum contrariis ipse affectum inducit & uideri laetare semen cum aqua potum, itemq; lenius decoctum cum melle. Scilla secandi uisum habet. Calfacit autem & siccatur secundo ordine. Praestat uisum ipsam affatit aut coctum fumere.

Scelopendra marina cocta in oleo & illata, pilos uolet. Sed & educta puritatem exaltat. Scolopendrium est asplenon. Scolymus id est Cardu

uus calefacit & siccatur secundo ordine. Radix ipsius copiosam graueolentiam urinum educit cum uino cocta. Sed & alarum & totius corporis graueolentia sunt. Scordum uarium est, ut quod amarum sit, & acerbum, & acre. Purgat itaq; simulq; calefacit uiscera. Urinas quoq; ac menses mouet. Perfrigerata haec omnia calefacit, & uulnera glutinat ac repurgat, et ad cicatricem perducit, si sicum impergatur. Scordon id est Allium calefacit ac siccat quanto abscessu. At ophiscordon silybescere allium, satius fortius est.

Allium
Ophiscordon

Scorodoprason & sapore, & facultate mixtum est ex allio ac porro.

Scorpioides calefacit tertio, siccatur secundo ordine. Scorpius terrestris crudus impositus, propter plagae auxilium affert. Similiter etiam si allatus edatur. At marinus id habet uile ad oculos suffusus. Scoris id est recementum omnis metalli abunde siccatur. Sed ferri amplius, quod coctum ac leuissime tritum cum aceto, aures pure illidas mirum est sanare. Sed & his qui

Scorodoprason
Scorpioides

Tacti oler
Myrrha

Aconitum bibentur auxiliatur potum cum aceto mulso. At plumbi recrementum plumbo resoldet, magis tamen adstringens. Smilax aut Taxus arbor est ueniens ex facultate. Smyrna id est Myrrha secundi ordinis est calefacientium ac siccantium. Vulnera itaq; capitis, inperis ipsa glutinat. Habet etiam quid amari. Vnde lumbricos & formas necat. Intergrum ite, ideoq; in ocularias compositiones miscetur. Thoracis quoq; affectiones expurgat, citra arteriae exasperationem. At Boeotica myrrha uim habet calidioris, molliorem ac dissidentem. Sminium alij hippoidisium, alij apium, silybescere nominant, calefacit ac siccatur tertio ordine, apio solum fortius, petroselinio uero imbecillius. Menses itaq; ducit, & urinas et.

Hippoidisium
Apium silybescere

Gentia

Sonchus adstringit & frigefacit manifeste, & impositus, & in cibo acceptus. Si cocatur autem moderate calefacit. Sparganium siccantem uim habet. Spatamid est Gentia, qua uires ligant. Huius semen & flos potum cum aqua mulsa obolorum quinque pondere, super ne purgant, uelut uerum album, citra periculum. Semen uero etiam infans purgat. At uigilata coxendicibus profant. Spacula ut, quidam perph. Sphecarium scribunt, id est lapis specularis, quo quidam pro speculis in fenestris utuntur, quare etiam diaphana & pelluciditate appellatur, gypsum substat est. Verum nim habet similem uisibilibus sine ostreis. Spongia noua quae adhuc maris odorem conseruat, uulneribus cum uino, aut aqua, aut posca imposita, & pla glutinat. Vitis uero aerem ac discoloritatem uim acquirit. Sed & cum pice liquida aut bitumine si uratur, & ita ardeat apponatur, sanguinis eruptio necessest.

Lapis specularis

Diaphana

Spodium similem porphyrygi uim habet. Scaphylinus id est palinaca, urinas mouet, & menses propellit, semen proferit ipsius & radix. Folia exteriora uim habentia, phagedenicis affectionibus communiunt utridia cum melle. At silybescit palinaca ad omnia debilius fortius est. Stachys similis marubio fructu tertio ordine calefacit. Menses itaq; mouet, & fetus necat, & secundas expellit. Sterta id est Adipes omnes humectant ac calificant corpus humanum. Verum iuxta diuersum animalium temperamentum o in ipso eruat. Sallus itaq; humidissimus omnium est, prope ad oler uim accedens. Vnde etiam mordacitatem obtrudit. Caprinus siccior est & cito congelatur. Quare etiam his qui in recto in testino morbum sentiunt infanditur. Aferinus calidior et magis tenuium partium est. Medium horum gallorum ac gallinarum adeps obtinet. Leoninus omnium calidissimus & maxime tenuium partium est. Vnde etiam maxime discutit. Bubulus medium temperamentum inter salinum & leoninum habet. Vulpinus alopecias sanat. Vulpinus aurium dolores. Quemadmodum uispius pilos aboleret, & oculorum lachrymas impedire ne flant dicitur. Inter omnes autem semper calidior ac siccior masculinum adeps est, & ex his eorum quae testes habent animaliam quam ex flosorum, & gratenigenarum quam aliorum. Vt uispius uero omnis adeps seipso calidior eius dicitur.

Spodium

Adipes animalium

Subtilis

Simum id est Subtilis ad hoc quod siccatur, etiam ad strictionem habet. Vnde

dein ocularia collirya miscetur. Stoebe semen & folia siccat tertio ordine, adstringentemq; uim habet. Vnde uulneca magna glutinans & ipsorum decoctum dysenterias, & sanguinis eruptiones, & aures pure manantes sanat & oculorum ex plaga confusiones, in cataplasma et impolita sanant.

Stoechas ab oburatione liberat & attenuat, extergitq; ex carbore uisceris omnia, & totum animalis habitum. Stratos aquaticus frigidum uim habet. Terrestris autem etiam quid adstringens. Vnde ulcera glutinat. Quidam etiam ad sanguinis eruptiones ipso unantur, & ad fistulas.

Strychnon id est Solanum hortense & quod eduxit adstringit, & refrigerat secundo ordine. Halicacabum uero hortensi simile, frustum habet quod uirnam ciet, acino uix simile. At fomentis solani radices cortex cum uino drachmæ pondere potas, somnum inducit. Huius quoq; semen uirnam ciet, estq; tertio frigefaciendum ordinis. Vnde si plures quàm duodecim corymbi ipsius bibantur, letantiam facit. Quartum genus inuile est ut infra corpus sumatur. Fortis autem impolitus ulcera serpendo depascenda curat, estq; secundi ordinis in frigefaciendo ac siccat. Seyerteria id est

Solanum

Halicacabum

Alumen omne acerbissimum est & crassarum parum. Præ alijs tamen magis tenulum paritum est fissum. Post hoc rotundum & astragalos. Crasium uero abunde paritum est liquidum, & id quod placitis, & quod plurimis nominatur. Syrax calfacit, molliat, coequat. Ad uiles magis & defeculationes ac grauedines commodat. Menis item prope lit potus & ap potus. Syca id est ficus, arbor quidem calida sunt secundo ordine. Verum pingues magis coequant duris tumores. Aciores autem extergit & discussant. At decoctam ipsam ad mellis crassitudinem redactis, quod sane & ipsam aliqui Syraon uocant similem mellum habet. Viles ficus siccis imbe, illiorem uim habent. Ambe tamen aliam subducunt. Ficus autem caprificorum acris & discussioris sunt facultatis, quemadmodum etiam grossi ex his facitis.

Alumen omne

Plantis

Plumbis

Ficus

Syrax

Syrax

Caprificum

Grossa

Ficus arbor

Caprificum

Caprificum

Sycamori fructus non nutrit, et stomacho noxius est. At arboris succus uim habet mollientem, glutinantem uulneca, disculentem tumores. Bibitur autem & illinitur ad repulsum morbus, & lenibus induratis, & ad stomachi dolores, & ad horrores. Symphytum petraeum ex contrariis compositionum est succulentissimum. Habet enim & quid incisorium, quo & pus in thoro nec, & rhemes expurgat. Habet etiam quid quod contrahit, quod ad sanguinem spūctus. & rupta ac conuulsa, & rubicundum fluxum, & intestini rumicentiam conuertit. Habet item quandam calidam humiditatem, per quam litum exsistit, & asperitates in arteria sanat. At aliterum symphytum magnum, viscosum quod & pruriginosum habet, scilicet simile. Vniuntur autem ipsa eadem, ad quæ etiam petreum. Sphondyli sonita ac radix acris ac incisoria uim habens, ut anhelosos, & comitales, & morbum regium sanent. At radix circumscissa & fistulis indicat, callum ex ipsis eximit. Sarcocolla flos ipsius in auro infillatur, diuurnissimis ulceribus compositis.

Caprificum

Caprificum

Caprificum

Caprificum

Caprificum

Caprificum

Caprificum

Caprificum

Caprificum

Caprificum

Caprificum

Caprificum

Caprificum

Caprificum

Caprificum

Caprificum

Caprificum

Caprificum

Caprificum

Caprificum

Caprificum

Caprificum

Schinos id est lentiscus per omnes partes suas secundo ordine perfectio siccat in calefactione ac frigefaciendo medius est, instantum adstringens, ut hypochondriis succo in adstringendo propemodum accedat. Schoni anthos id est iunci rotundi odorati illos calfacit moderate, sed minus adstringit, & lenitum parium natura non alienus est. Vnde & uirnam ciet, & menses dirigit, & ab oburatione liberatq; fomentis & posonibus ac cataplasmatibus assumptus. Ex radice quidem ipsius magis adstringit. Flos autem calidior est. Schoenos lea id est iuncus leuissimus duplex est. Sed eius qui oxychoenos id est iuncus acutus appellatur, semen somnificum est. Qui

Lentiscus

Lentiscus

Lentiscus

Lentiscus

Lentiscus

Lentiscus

Lentiscus

Lentiscus

Lentiscus

Lentiscus

Lentiscus

Lentiscus

uero holoschorus, quasi totus sanguis dicitur, eius semen minus id potest. Capins idem dolorem inducit. Ambo autem fricti cum uino bebantur, fluxiones uentris faciant, & nodulosam fluxum cohibent. Sori similem Misylinum habet, sed multo magis crassarum partium est quam illud.

Initium hinc. 7.

Assamentum Tarichorum id est assamentorum caro aspera & siccantem uim habet. A preliis itaque aspera mors datur, ut quibus plurimum edant, & uinum bebant copiose, & reuesant. Conuenit etiam ad acuti esum. Vtiliter quoque in canis morfu imponitur, itemque in aliorum reptilium moribus.

Xylocolla **claus** Taurocella quam alij xylocollam uocant, gluem est quod ex bibulis coriis fit, sa cultatemque habet admodum exterioriam. Unde aceto diluta impetigines & lepras superficiei remouet, & ambusta infirmari prohibet aqua calida resoluta. Est etiam uulneribus eodem cum aceto multo mita.

Terebinthus Trilline assiccate uis cinerem urendi ut praedictum efficitur, qui ceteris modis si infirmitas, pilos palpebrarum radicitus euulsos, rursus nasci prohibet. Terminthos id est Terebinthus calfacit secundo ordine, siccac

at ubi uiridis est primo ordine, ubi sicca, secundo. Fructus aut sicca tertio ordine siccantibus est. Ideoque & uiridis cinis, & licet prodest. Tentigies id est

Cicada Cicada dantur a quibusdam crude siccari tres, aut quinque, aut si post bibendum colicis cum pipereis granis eiusdem numeri. Alij totas ipsas subidas ex bibentibus qui ueliscam afficiam habent.

Teulon **beta** Teulon id est beta mitiora est. Unde & exangis & discant, & per nares purgat. Erbo magis ea quae alba est. Coda uero uim habent urendi inflammationes, leniterque discutit.

Teuention Teuention calfacit secundo ordine, siccac tertio, incidendi ac tenuium partium uim habens. Unde & lienes sanant.

Clastrum **claus** Tephra id est cinis non omnis idem exaeque temperamentum habet. Sed iuxta uisum materiam differentiam euariat. Et acerborum quidem cinis, uelut quercum & siccam, non modicam adstrictionem habet, ut etiam sanguinis eruptionem cohibeat, nullo alio praesente. At actium cinis, uelut fici & Tithymalli, acrior est, & magis exteriorius. Telephium calefacit primo ordine, siccac secundo.

Teuon **proli** Est etiam exteriorius. Unde ad putredinosa ulcera condat, et uisilignes nam leucas tum albos dicitur, sanant cum aceto. Tels id est fenum graecum calidum secundo ordine est, siccac primo. Quare feruidas inflammationes exacerbat. Verum minus calidas & quae induratae sunt discutiendo curat. Tithymalli omnes ex quarto calfacientium ordine sunt cum acrimonia & amaritudine forti. Verum radix quum aliquo modo de hisior sit, corolorum dentium dolores cum aceto sedat. Ceterum succi uehementiores uim habentes, in euersionem quidem dentium indantur. Verum reliquum corpus si contingant, ipsum adurunt. Quare etiam pilos auferunt uel modice illini. Eruenticae tum alias, tum fornicarias, & alia huiusmodi auferunt. Affectiones item circa autem extergunt, & maligna phlegmedentia ulcera sanant. Quum autem sepe sint ipsorum species, fortissimum sunt characias, & myrsinites, & qui in petris nascitur arboris specie. Deinceps autem qui uerba sco similis est, & cyparissias. Deinde parilius, & polireum huiusmodi scopius. Tinasos id est Calx uisus uehementior uis, ut crustam efficiat. Exstincta uero, uis quidem statim, sed post dies non amplius. Con

Uitellus **hispans** trahit tamen & consumit carnes. Si uero leui fuerit, modica citatem amittit, sepe ex aqua lora. Arsi fuerit ea aqua marina, abunde discusso inde eua dit. Tragacatha similem gummi uim habet. Tragion planta est in

Cab Creta, lentisco similis, calida ordine tertio. Vim habens discussoriam atradiorumque ac renuuium partium. Aculeos itaque educit, & calculos auerit, & menscos mouet, drachmis pondere pota. Acaliad Tragion amarulentius quum hoc, colopendrio simile, ubique quidem nascitur, sed abunde adstrigit. Quare etiam ad fluidas affectiones conuenit. Tragionanus origanum uim similem habet, assumpsi quoque insuper aliquid adstrictionis.

Tribulus

Tribulus moderatè frigefacit, sed terefris in ficcando fortis est. Aqua ticus etiam leniter humefcit. Ambo uero ad inflammationis generationes, aliasq; infirmitates conueniunt. Atterreftris fructus quò tenuium fit partium calculos in rheumibus auerit. Tragos frumifracus æquifimilis est, sed magis aggrè concoquitur, & aluum molle. Trigla pifcia, id est mulus, si albidus edatur, nilius habetradinem indach. Verum crudus difficilis & impositus, dracontemanni, & icorpij & aranei morium sanat. Tripolij radix uim calidam habet terrore abscellit. Est & acris. Trifolium, tripbyllion, alijs & phaltion, alijs oxytriphyllion, alijs menyanthes nominata. Est autè uis ipsius calida & sic ea tertio ordine. Triches, id est pili uis, laniis uis similes uim habent. Trigonis, id est pastinaca maris aculeus, denti debili illius, auerit ipsum & exardescit. Trys, id est sex uini nò uita quidem cōposita est, ab idè ficcans ac discutiens. Adstringendi uero uis, iuxta uis ex quo est specieem, ipsi accedit. Vncudum igitur ipsi in humidioribus & fluxidjs affectionibus. Sed & panos discunt, & in uagantibus uisneris hoc extinguit. Ait uis, quam enī ipherles, hoc est fecem sue feculam priuatim appellant uisoria euadit, ut etiam uentibus in edicamentis ammiscetur. Vnques itaq; cabros ejicit cū resina, & pillos flauos facit cū lenitissimo oleo per totam nocte illita. Lota uero exteriorijs oculorū cōpositionibus ammiscetur. Ceterum acuti sex per omnia fortior est uini force, & magis adstringit.

Trogodytes passer est minimus omnium auculorum, regulo excepto. Versaturq; maxime circa sepes. Hæ & allatus, & crudus sic assiccatus, in cibo sumptus, calculos in rheumibus auerit. Sed & isti ipsius cinis ponitur idè facit. Tyros, id est castus recens compactus & molli, repulsiorem uim habet leniter perfrigerat, us & uulnera glutinet impositus. Aquij oxypylacti nus dicitur, ultra repulsiorem etiam descussoriam modicè acquirit, & plus glutinat uulnera. Verus autem castus, & magis qui pinguis est, discunt, ut etiam ad topicos arthriticorum commodet, maxime cum suffice canis decocto, quæ salta sita cingula.

Innum litere. 5.

Hiacynthi radix bulbi specieem habet, primi ordinis est in ficcando, secundum in frigefaciendo. Proinde pueros diutius impuberes censensare creditur, licum uino in cataplasmate imponatur. At semen leniter extergit & adstringit. Iazg regio morbo laborantibus datur cum uino, magis siccans, minus frigefaciens. Hyalos, id est uirum uirum posum est uino tenui & albo calculos in uelica auerere dicitur. Hydnon, id est uiber terre, substantiam magis terram habet, cum modica quadam tenuium partium substantia. Hydragyros, id est argentum uisum ad medicum usum nò ita ualde assumitur, quò uenenum cauet. Verum quidam usum ipsum ac incinerem redactū, alijsq; speciebus permixtū, colicis & uulnibus bibendum dederūt. Hydropiper calida est herba, sed nò uelut piper. Virides aut uis est semine in cataplasmate imposita, suggillata, & induratos tumores discunt. Hydor, id est aqua, optima & nullam aliam substantiam ammixti habens, frigefacit & humectat iuxta propriam substantiam. Verum ubi ac quicquid caliditatem suscepit, quando ipsam confusus calefacit. Vbi uero frigida sit, frigefacit. At uero quæ aliquā ammixtionem habet, uelut nitrofa, aut bituminosa, ea ammixtæ substantie uim acquirit. Phantelis autem & adfrictionis quid habet, propter quam in ocularijs cōpositiones miscetur. Qualem uero optimam aquam esse oporteat, in primo libro dictum est.

Hyoecyamus qui nigrum semen habet, & qui si uis, ueneni osi sunt. Apyllis uis autem ad medicinas est sic citius & semen & flos alium colorem habet, exterioriq; frigefactionum ordine est. Hyperici duplex est, alteri Androsimon & quod ascyron appellatur, dictum est. Alterum calefacit ac siccat, tenuiumq; partium substantiam habet. Vnde urinas & menses utitur ipsius fructus mouet. Si uero eam solijs uisidis imponatur, uulnera ad ei

Mulier pifcia

Trifolium

rili

Pastinaca mar

rina

Teraboli

Sphale

Pessir troglodytes

Caste

Vitrum

Tuber terre

Argentum uisum

Aqua canis

Androsimon

Ascyron

caricem perducit. Asida uero folia ulceribus humidis ac putredine ossis inspecta, ipsa sunt. Datur etiam coxendicem morbo laborantibus bibendū. A

Hypericon frigescit tertio ordine, prope ad papauer accedens.

Hypoglossum frutex est. Fluit radix & succus mollementem uim habet.

Hypocistis succus est cisti qui uelut cyrti ad radices cistib. itēq. cistha rī appellari subnasctur. Est uī efficax medicamentū ad omnes fluxūs affe-

Hippophan ctiones, secundo ac corroborando partes. Hippophan ipse uis est ipsi

ne nulliū, & quomodo modum etiam Hippophan. Fluit ex capite, & folijs ac radicibus succus siccatus, inum obolorum pondere cum aqua multa, a, quam & pinatam euocat. Idcirco autem conducit ad recte curandis spīs non es, comitales, & ad affectiones circa neruos. Hyssopum caliditas ac siccitas tertio ordine. Est etiam tenuium partium.

Initium literae. φ.

Leno Phaeol, id est lentes siccant ordine secundo, uerum caliditatis ac frigidi, tatis medium obtinent. Habens etiam quid adstrictionis. Ipsam itaq. lenis corporis leuatur, & uentrem sistit. Decoctum uero propellit. Quapropter prius aqua diffunditur, ubi siliendi uentris gratia lentes sumuntur. Ceterum

Leno phalangis lenis patulitris humectat, & frigefacit ordine secundo. Phalaridis succus, & folia, & semen pota, uelut a doloribus opitulatur, nimirum ut quae

tenuium partium quid habent, insuperq. calidum. Phalangis nomen habet ex eo quod moris a phalangio optulatur. Est autem tenuium partium.

Suber Vnde & his qui torminibus uexantur, auxiliari uidetur. Phelios, id est Suber, & maxime id quod est uisumq. usula, uisum siccantissimum cinerem efficit, qui in dysentericis maxime compositiones miscetur.

Philyrea arboris folia, similiter ut fucus olea folia adstringunt. Cōmodum uelut in ore, si manducetur, & si decoctum ipsum colluatur.

Phyllos Hoc autem decoctum si bibatur, urinam & menses citet. Philomos, id est

Thyallis uerbascum plura genera habet, inter quae est etiam thyallis. Omnium folia siccantem & moderate exterioriam uim habent, & maxime eius quod auri colorem refert. Quia uero acerta sunt, fluidis affectionibus conueniunt. Quidam etiam ipsa ad dentes colluant.

Rhus Phoenix, quam alij rhum uocant, herba est lilio similia. Vin habet adstringendi. Pota itaq. in uino uisero omnes fluxūs affectiones sistit.

Saluarher Phoenax, id est palma arbor. si uisū quidem habet ita manuum, moderate calidum & corroborantem, & stomacho gratum, siue intro sumatur, siue foris impotetur. Verum quod reliquum est in ipsa abunde adstringit unde stomachicis & hepaticis compositionibus amiscetur. Omnis autem maxime adstringit id quod ascescens fructus uelut inuolucrum quoddam est.

Phormion tenuium partium exterioriamq. ac irractionum uim habet. Itaq. albugines attenuat sermen eius cum melle, & aculeos educit. Phu nardo similem radicem habet, sed ad plurima debiliorem, urinas tamen magis quā ipsa propellit, similiter ut celtica nardus.

Rheo Phycos, id est fucus frigefacit ac siccit secundo abscissu, habens etiam aliquid moderate adstringens.

Phyllis quum acerbam qualitatem habet, non absq. ratione alui profluxu pota sistit.

Initium literae. χ.

Galbanum Chalbani, id est galbanum calefacti propemodum tertio ordine, siccit prope secundum, ut quae mollementem ac dissolutam uim habent.

Chalcitis adstringentis & acris, & urentis ac crassam indecentis facultatis est. Tenuitate uero partium medium inter masy & fori obtinet, uia ue-

Atramentum siccum ro magis tenuium partium euadit. Chalcanthos, id est Atramentum siccum, aqua est congelata in metallis in Cypro, quae fortissimam adstrictio-

nem cum caliditate habet nō ingenerosa, & pra omnes humidos carnes assentare ac siccare potest. uerum longiori temporis progressu in chalcitidē transit.

Art agum Chalcos, id est Aes, uisum quidem habet quid acris, & adstrictioem participat. Optimum igitur est ad cicatrices ulceribus indur-

gendas

condas in flectionibus corporibus. Si uero lenum sit, teneris corporibus magis commodas. *Chelci anthos*, id est Aëris flos tenuium magis partium uti habet quæ res usitæ, & ipsa ipsius. Signatur collyrijs ammeliscatur, asperitates & sycoles palpebrarum detrahit. *Chamedrys* calidior est ac siccat tercio ordine. Lienis itaq; consumit, & urinas ac menses mouet, & uiscerum obstructions expurgat. *Chamaecissi*, id est hederæ teretioris flos, quum abunde amarus sit, hepatis obstructions aperit. Datur etiam ad coxendicium dolores. *Chamaeleuce* calfacit tercio ordine, sicut primo.

Chamaeleonis nigri radix calfacit ac siccatur propè tertium ordinem. Extergit autem uitis cinis, & desiccatur molli duris tumores, & phagedænice ulcera in cataplasmate impolita sanat. Arteris corpus si accipiatur, ut nenosa est. Ceterum albi radix similis est nigri radici, sed amarior est. Hæc cum uino austero acerbuli mentura pora lumbricos latus necat. Facit itæ ad hydropicos.

Chamaemelum siue anthemidis calfacit ac siccatur primo ordine. Est & tenuius partium, & discutit, & laxat, & rarefaciendi uim habet. *Chamæpius* secundo ordine calfacit, tercio siccatur. Quare uiscera & maxime hepatis purgare extergit. Ducit etiam urinas & menses, & magna uis coagulans, & putredinosa sanat, & durities discutit. Decocti ipsius etiam mod coxendicium morbi facit.

Chamedrops ab alijs item *chamedrys* appellatur, ab alijs etiam *Troaction*, similem autè *chamedryi* uim habet. *Chamaelyx* exterioribus & a cremulæ habet. Quare & fornicarias, & alij uerrucas auferant, cum ungula ipsius, sive fureus. Exerit item cum melle crassas in oculis etiamites, & uisus hebetudinem & suffusiones incipientes sanant.

Chamæra exteriori est faculata. Quare sordida ulcera & crustas purgat cum melle. *Chelidonium magnum* calidior tercio ordine. Est & fortior exteriorum. Succus ipsius ad uisum acriendum utilis est. Radix morbo regio laborantes ab obstructione liberat, cum uino & amaro pota. Communis dentium dolores eadem sanat. Ar minus *Chelidonium* quum quartæ ordinis caliditatem sit, acutus est, ut cutem exulceret in cataplasmate impoñitur scabros item ungues efficit, uerò succus ipsius pernares purgat.

Chelidones, id est hiruindines si nigræ sint, cinis ipsarum cum melle illitur, anginosas inflammationes sanat. Facit etiam ad uisus claritatem. *Chole*, id est fel sine bilis, calidissimus est omnium aliorum animælis humorum. Differt autem colore quidem, eo quod illa calidior est quæ pallida, & æruginosa quæ flaua. Verò pro differentia animalis quæ ipsam habent, eo quod suilla omni debilissima est, ut etiam ulceribus in auribus citra inordiecitæ opuslenar. Hæc acrior est ouilla, & hæc caprina. Hæc autem similis est uisina & bubula. Taurina uero fortior est, & hæc hyrnarum, quæ tamen eulionymii piffica, & scorpiæ bilis superat, quæ oculorum suffusionibus, & hebetudinibus ac albuginibus cõuenit, itemq; marinæ testudinis. Ad fel capræ syluestris etiam nyctalopibus prodesse dicitur. Pombocastilium fel omne acutius est, & magis siccatur quadrupedum. Et ex illis ipsæ gallorum & perdicum fel præstantius est. Sed accipitris & aquilæ fel acutius quodam modo est & corrodens coloreq; æruginosum. Quandoq; etiam nigra. Chordelle ferè diu species est, & subamarum quid habet. Quare etiam magis quæ illa siccatur. *Chondros* tritico similis est. Sed magis illo uiscosus.

Chrysocolla quædam est quæ in metallis reperitur, quæ di præparatur, ita ut in aris rubi pila, pulillo eiusdem aris, uina pueri impubis teratur, in andoribus sub cane. Hæc itaq; extergit, discussoria ac siccantem uim habens, magis quàm ea quæ in metallis reperitur, adeo ut etiam carum citra mordacitatem consumat. Visceribus itaq; malignis conuenit. Sed & si illam uisceribus minus mordacem efficiet. *Chrysocome* quæ & *Chrysis* ærem siliuq; adstringentem uim habet in radice. Quapropter neq; multi uisus est. Datur tamen in peripneumonijs & hepaticis affectionibus cocta in aqua mulla. Mouet etiam menses.

Initium literæ. ✧.

Cruſſi

Pſeudobunion ſpecie ſimile eſt bunion. Calcfacit autem & diſcutit, ac ex tergh. Terminaſtq; & in una ſillitidia, & clacrum dolores ſoluit. Diſcutit item ſtremas, eſt ſile & uno in cataplaſmate impoſita. Pſeudoditſam num debilis diſſamini uim habet. Pſymnium, id eſt cenſiſa frigeſcit, & meanus obducit. Pſylli ſemen ſecundi ordinis frigeſcitiuum eſt. Verum ſiccando & humectando medium obunet. Pſoricum ſi, ſpumę argenti ſi duplum chalcitidis miſceatur, & chæ acetoterantur, & in nonam ollam data, ſimo ad quadraginta dies obruantur. Ita enim & magis ſiccatur, et magis tenacum partium, minusq; mordax chalcitide citiſſe.

Initium literæ. α.

Cura

Oſi candidum & tenue ex his eſt, quę omni penitus mordacitate car rent, moderate trigeſfaciens. Viendum itaq; ipſo in oculis, & in ulceribus in pudendis, & omnibus malignis. Muſceturiæ ſanguinem liſſentibus meas tus obducenſibus medicamentis. Sed & luteam ſimilem uim habens, medi camentis inflammationem arcentibus miſceatur. Si uero aſſectus, magis qui dem ſiccatur, ſed minus mitigat. At uero a ceto coctum totum ouum, ſi odatur, ſtirciones uentris relinquit. Si uero cui addatur aliquid ex acerbis, uelut eſt galli, auriculi, aut balauſtiæ, itaq; ita in ſtiragine ſtigatur, multo efficitur uis euadit. Sed et ambuſti ſtircin auxiliatur, ſarum ouum crudum impoſitum. Aſci forſale exhibeatur, thoracis affectiones concoquit ac mitigat, & artice aſperitatis leniſcat. Preferendum potro eſt recens uetiſſo, & galli, ſarum ouum reliquorum animalium ouis. Oſium ex ſecundo ordine eſt eorum quę calcſcunt. Habent autem humiditatem ſuperius eam. Vnde neque uſile eſt in ſtira corpus ſuſcipiatur. Extrinſecus ſarum adhibe rum, calcum & concoquit. Oſemodes quam aliqui Philiterion nomi nant, radicem quidem ſarilem habet. Verum ſemen tenacum partium eſt, & extra mordacitatem ſiccatur.

Philiterion

De medicamentis ſimplibus purgantibus. Cap. IIII.

Quę bilem ſarum ducunt.

Aloe ma
danda

ALoe drachma uno cum aqua multa manet deſur. Qui enim uelſeri dñr, aut poſt cibum, ſedant. Corruptus enim alimentum accuſat uim fla uorem bilem. Si uero minus deſur, nimirum triam obolorum pondere, ſitico ra ſolum abunde euacuat. Quis uero omnia purgantia ſtomacho noxia ſint, ſola aloę ſtomacho grata eſt. Qui autem amritudinem eius non ſuſtinent, hiſin catapota efformata exhibeant. Siquide quod purgantia medicamen ta non ſimplici aliquo temperamento euacuat, uelut coliditate oportebat enim omnia calida euacuant, uelut eſt piper quoque ſed totius ſubſiſſe pro prietate, quomodo Magoetes ferrum trahit, demonſtratum eſt. Ceteris ex purgantibus ea quę ſolem molliora, primo libro reſata ſunt. At eſſe ſariori bus ex ipſis uim, aut et materiam transferimus, aut ut affectionem inducamus, ſarum uim euacuat, ac euacuetur aut ut corpus tranſmutemus, & tempe ramentum iplius euacuetur: aut ut inſolentem humorem ex ipſo educa mus. Sunt etiam quidam iſti ex reſatis modis, in eis q; ſe cōnerat. Viendum eſt purgatoriis, in hiſ qui uires robuſtas habent, & uolentatem conſtantē, & qui primas etates exceſſerunt, ugendum autem ad extremas deuenerūt, & qui ſtomachum robuſtum habent, & multam ſarilem materiam in cor pore collegerūt, nec multē multum ſanguinem habent. Tempus porro pur gationum, ſi uires non uigant, maxime uerum, & autumnale eſt.

Purgantia
deuacuant
quiditatePurgantia
ſarumPurgantia
tempus

Ex bilem quidem educenſibus uſedum eſt omni tempore, excepta hye me. In aſter autem uigoris, & declinante. In habiſibus ſicciis, & maculoſis, & nigri colo ris uires robuſti. Et in uiris potius quā in feminis. Et in hiſ qui aſſidue cibos conſumpunt, & uentrem ſubdiſtrictum habent, & bile ſarum abundans, iracundiſſi ſunt, & paucas uires excernunt in hiſ item qui ſiccis alimentis uuantur ac calidis. Et in affectionibus morbi regij, hepatis,

cūq;

ctis, pleuritidis, phrenitide, angina, infantia, cephalæ, hippodurine, igne fa-
cto, lepra, febribus, & in quibus humor biliosus abundat.

Datur porro Alos, capite grauitas, hippocentibus, siticulosis, & quibus
in somnis imaginationes obuersantur circa febrem. His etiam qui horrois
discursum percipiunt, & qui status acres excrescunt, & intestina morde-
sentiant, & circa stomachum feruorem, aut fastidium caeterorum percipi-
unt, & quibus ob recrementorum copiam infusum per clysterem exhiberi
non potest. Nam abunde euacuat, totumque dem corpus non euacuans, ni-
si ualde multa detur, sed infusentem intestinis utitur, ac stomacho bilem
educens.

At ueratrum cōuenit in acutus morbis, & diuturnis, qui bilem
docente medicamento opus habent, uetus sunt infans, altera capitis疼
uexat, oculos fluidos habentes, etiam thoracis affectu. Maxime autem do-
neum est in febribus, utero se uelleg, si bilem docente medicamento hanc in-
digent. Cotinodum est etiam in aspera arteria diutius affecta, ad morbum
regiam, ad pēlūlas, impetigines, herpetes, ignes sacros, lepras. Nigium
ueratrum bilem ducit maxime statim ex toto corpore, cura molellissimā
Vnde etiam non grauitur febrientibus datur, & magis se bre cauentibus
drachma una radicem in aqua mulla tritarum par aqua, ut ut pīus i et
nariot. Aut exhibetur cum melle in catapota efformatum. Quidam amide
scent ipsi polegion, aut rhyndrum, aut aliquod ex citro melleumibus sto-
macho gratis.

Scammonia similiter ut ueratrum purgat, & magis fla-
uam bilem. Venit magis quam omnia purgatoria, stomacho noxia est.
Detur itaque non febrientibus, & stomacho bene affectis pondere obolo-
rum quatuor, cum sale aut pipere, aut zingibere, aut quodam oxyporo ci-
tro transeunte, stomacho grauant cum melle. Fiant & catapota cum gum-
mi.

Colocynthis medulla bilem potissimum uacuat, & mucosa, non
de sanguine quemadmodum ueratrum & scammonia; sed de uenis & par-
tibus uernosis, drachma pondere, in aqua mulis cyathis duobus, in qua ru-
ta & cincocta. Teratur autem diu, non aspretudines ipsius in totis partibus
ulcerantes, ulcerationes & uernorum per consensum affectiones inducit.
Danda est his qui caput affectum habent, aut quibus membrana cerebri,
aut ea que caluatiem ambit affecta est: uetus sunt ueriginosi, alteram ca-
pitē partem dolentes, & cephalæ uexat, comitiales, fident, canino modo
commuisti, diutina oculorum fluxione laborantes, recta ceruice spirantes, im-
bellosi, diuturna uassi uexati, infuperque arthritici, & qui circa renes aut uer-
ficam affectionem habent.

Elastrum similiter ut scammonia euacuat
Eligendum ad quod praesentis coloris est, & leue, & non uetulus anno. Da-
tur uetus obolorum pondere tritum cum lactis hemina una.

Tubymallus ducit bilem similiter ut elastrum & scammonia. Dantur
sucet gurgis quatuor aut quinque, cum polenta subacta, ita ut cito deuor-
rentur. Nam in ore detentus diutius, linguam & circumfatas partes exulce-
rant.

Lachrydes purgant bilem, sicut ueratrum & scammonia. Den-
tur septem aut octo, & ad quatuordecim usque, ita ut robustis, & ampliore pur-
gatione opus habentes, ipsam mandere iubentur. Debiliores autem & sto-
macho male affecti, totam ipsam deuorent. Peplij uirgulta que semper
fice a sunt, octo obolorum pondere dantur in aqua mulla. Ducunt bilem si-
militer ut ueratrum. Planta non erumpere faciant.

Agaricum similem colocynthis uis habet, tarde quidem operans, non
autem ualde stomacho noxium. Datur tritum duarum drachmarum ponde-
re, cum aqua mulla. Sit autem albidissimum, & maxime triabile, & non ita li-
gnosum, neque cotinosum. Iris Ilyrica similiter purgat, octo obolorum
pondere data, in aqua mulla. Sit autem non uetula, nec triodites habet.

Cotinosum paruum bilem & mucos purgat, priusquam coxendicum
morbo laborantibus conuenit. Bibitur ipsius decoctum, sic ut centaurij
qui drachma, in aqua hemina coquatur, donec ad dimidiam deueniat.

Tragerigani Tragerigani ros cum semine datur durarum drachmarum pondere, in aqua multa, his quibus etiam uterum nigrum. Est autem (stomacho magis) gratum quam uterum, sed minus purgat. *Chamelæ* Chamelæ drachmæ quantitas in aqua mellis cyathus duobus coquitur, ut ad quartam partem deveniant, similiter ut uterum purgant. Aliqui chamelam cum duplo sabinæ in capsula efformant ac exhibent. *Aritholæ* Aritholæ drachma una in aqua multa data, purgat ut colocynthis. *Polypodij* Polypodij radix sicca trita aqua multa dispersa, aut cum ipsa trita, id est quod colocynthis facit. *Bilem atram* Quæ bilem atram evacuant.

saurontia Atram bilem educere utendum est præcipue in melancholicis, his qui facile exacerbantur, iracundis, homines avariis, aut in feces degentibus, et in his qui ubi morbo se recoligant, purgatione opus habent. In autumno fervente. In habitibus sic citæ parum misculatis.

Epithymi purgatio Epithymum optimum est ex his quæ atram bilem evacuant. Datur ex ipso drachmæ quinque trice cum sennæ homina. Epithymum quod super Thymum nascitur, similiter epithymum evacuat, sed debilius est. *Epithymi* Pulegium atram bilem ducta, acerbulem trita in aqua mellis potum. *Pulegium* Tragerigani heracleotici eadem mensura similiter ut pulegium trahunt. Sed modo sicca. *Tragerigani* Alypi semen atram bilis deorsum purgare dicuntur, et si parvi copia uelut epithymum sumatur cum sale & aceto. Verum inest illi uelut diascorides silenter exulcerat. Est aditus arbitror, ea quæ nunc slypiis appellantur. Datur in aqua multa. *Alypi* Parthenium similiter sic cum potum eadem ducit. *Parthenij purgatio* Alyson cum sale potum, similiter ut hoc purgat.

Alyson purgatio Quæ pituitam evacuant. *Pituitam* His quæ pituitam educunt utendum est in frigidioribus habitibus, & his qui consueverunt, et hyeme, item in resoluendis, & siccatis, & qui laxitate moribus in namacriti. In his quoque qui multam pituitam in ventre, aut thorace, aut stomacho habent, & in muliebri fluxu. Conueniunt etiam multa emungentibus, & crassa excreantibus, cibumque salidicantibus, & coxendi cum morbo laborantibus, ubi articulus tuberculosus aut pinulosus fuerit. Maxime autem conueniunt hydropicis, ex ea specie quæ proprie inter cunctas dicitur, laborantibus. *Syracti* Syracti albi drachma una, cum resina terebinthina aequali pondere pota, pituitam evacuat. *Albi* Olei radice cortex drachmæ pondere cum vino aut aqua, eadem præparatio oboli nouem cum aqua. *Lychnidis* Lychnidis seminis drachmæ duæ. *Cyclanidis* Cyclanidis radices drachmæ una, cum aqua multa. *Scordij* Scordij drachmæ duæ cum melle. *Chamepitys* Chamepitys tres & in capsulis data. *Squamæ* Squamæ cypræ drachmæ dimidia cum pari sesina in capsulis. Hæc uelut pituitam purgat. *Fosforum* Fosforum hanc uisum sesquidrachma. *Cucumeris* Cucumeris syluestris radice corticis oboliduo. *Ricini* Ricini grana quodraginta, qui crotonis appellantur, decore sua eduntur, & sinistres faciunt. *Apij* Apij diuisionem id quod ad radicem est, & ab aliquibus choma: phonus vocatur si edatur.

Syracti Syracti albi drachma una, cum resina terebinthina aequali pondere pota, pituitam evacuat. *Albi* Olei radice cortex drachmæ pondere cum vino aut aqua, eadem præparatio oboli nouem cum aqua. *Lychnidis* Lychnidis seminis drachmæ duæ. *Cyclanidis* Cyclanidis radices drachmæ una, cum aqua multa. *Scordij* Scordij drachmæ duæ cum melle. *Chamepitys* Chamepitys tres & in capsulis data. *Squamæ* Squamæ cypræ drachmæ dimidia cum pari sesina in capsulis. Hæc uelut pituitam purgat. *Fosforum* Fosforum hanc uisum sesquidrachma. *Cucumeris* Cucumeris syluestris radice corticis oboliduo. *Ricini* Ricini grana quodraginta, qui crotonis appellantur, decore sua eduntur, & sinistres faciunt. *Apij* Apij diuisionem id quod ad radicem est, & ab aliquibus choma: phonus vocatur si edatur. *Bilem atram* Bilem atram educere utendum est in hydrocypis ex aceto hydrocypis laborantibus, & in mulieribus fluxu albo mistis, & his qui fluida ulcera habent. Squamæ cypræ drachmæ una cum aqua multa pota, aquam ducit. Verum aceti parui insuper ferbere oportet, ut ne renouetur. Cerasum enidi non de cortice nam ritum cum melle cocto deuoratum, ut ne gulam sine transfigurationem contingat, aquam ducit. Danda sunt grana origini, aut uisum quod est, aut origina, sortioribus quodraginta. Euphorbiæ drachma una cum melle cocto deuorata, pituitam ducit. Magis tamen aquam. *Lonchylidis* Lonchylidis seminis oboli cocto, cum aqua multa aquam ducunt. *Cereorum* Cereorum similiter aquam purgat, eum polenta notatum. *Cera* Cera seminis drachmæ quinque continet cum pilula concoquuntur addito panis sale, & torbentur. *Ammoniaci*

Aquam atram Quæ aquam evacuant. *Aquam* Aquam educere utendum est in hydrocypis ex aceto hydrocypis laborantibus, & in mulieribus fluxu albo mistis, & his qui fluida ulcera habent. Squamæ cypræ drachmæ una cum aqua multa pota, aquam ducit. Verum aceti parui insuper ferbere oportet, ut ne renouetur. Cerasum enidi non de cortice nam ritum cum melle cocto deuoratum, ut ne gulam sine transfigurationem contingat, aquam ducit. Danda sunt grana origini, aut uisum quod est, aut origina, sortioribus quodraginta. Euphorbiæ drachma una cum melle cocto deuorata, pituitam ducit. Magis tamen aquam. *Lonchylidis* Lonchylidis seminis oboli cocto, cum aqua multa aquam ducunt. *Cereorum* Cereorum similiter aquam purgat, eum polenta notatum. *Cera* Cera seminis drachmæ quinque continet cum pilula concoquuntur addito panis sale, & torbentur. *Ammoniaci*

moniaci Thymiamatis drachmæ duæ in aqua multa potæ, aquam ducunt. quidam spenicis ipsi cum posca exhibent.

De triduum compositis purgatoris. Cap. V.

Catapota ex aloë. Colocynthis medullæ partem unam, succi ablin-
thi partem unam, aloes partē unā, scammonie partes duas. Cum aqua in
catapota efformato effertis magnitudine. Dantur ex his grana undecim.

Purgans
composita

Acetum multum Iuliani. Rutæ quadrans, origani quadrans, co-
mæ thymolentem, anethi sesquicentiam, triditis unciam unā, radiciæ Man-
dragonæ sesquicentiam, a garici sextantem, sedarum pinguium unciam. xij.
gram. Cnidii trientem, lathyrum quadrantem, alypsiadis quadrantem, po-
lypodii sextantem. Collii unciam unam, collii unciam unam, spicæ nardi un-
ciam unam, Rhei pontici sesquicentiam, scillicet quadrantem, sambuci uir-
gultorum quadrans, canopi, qui est sambuci cortex, quadrans, asari unci-
am unam, pulegii quadrans, epithymi sextantem, uicatri sextans, acori se-
xtans, siij. uncia unā, anomi uncia unā, hyperici unciam unā, cymini unci-
am unā, anisi sextantem, aceti sextarios decem, mellis sextarios quinq. Her-
bas ad triduum in aceto macerato. Deinde facta coctura, donec plus quàm
dimidium infumatur, mel adijctus & facta coctura, lathyrus additus, collii
item & granum Cnidium, & spicæ nardi trid. Aut si uoles, postquam acetum
multum perfecte fuerit coctum. Dosis perfecta est uncia una, aut pro uir-
bus. Facit ad podagricas affectiones, & ad conuulsas, & in quibus euacua-
re similes ab obstratis amovere opus crassos humores.

Acetum mul-
tum Iuliani

Composita

Purgatorium aquam ducens ex Caryophyllo. Aloes, epithymi, ca-
ryophylli, grani cniidi, pericelini, rhei pontici, singulorum semuncia m, eu-
phorbi scrupulos quatuor. Mellis quod satis est. Datur cochlearij mensura.

Purgatorium
aqua

Purgatorium ex Rhodometis Alexandri. Rosarum succi sextar-
ius, mellis sextarius unus, scammonie trientem. Dosis perfecta cochlearia
quinq. Minor cochle. duo. Media cochle. tria. Alius. Mellis libris unā,
Rosarum succi lib. unā, pipetis drach. duas, scammonie drach. octo, ma-
stiches drach. quatuor, zingiberis drach. quæ. Alius quo ego uide. Spicæ nardi,
asari, epithymi, singulorum semunciam in aqua hémina per triduum macera-
to, & moderata facta coctura, rosarum succi sextarium dimidium ad aquam
adijctum. & mellis sextar. dimidium, & facta ad compagem usq. coctione,
scammonie sesquicentiam addito.

Purgatorium ex malis cydonijs. Malorum cydoniorum assatorum
trientem, piperis semunciam, scammonie drach. j. Mellis quincuncem,
ex tritis peribechlearium unum, aut pro uiribus.

Purgatorium ex malo cisto, stomacho grati. Malicini corticis et car-
nis libram unam, in aquæ sextario. j. & ad tertias coquito, & mellis sextar. j.
adiecto, ad mellis spissitudinem coquito, & piperis longi uno. scammonie
in fermento tritis uno. j. tritis ac inspergato.

Baccellatus purgatorius. Scammonie triduum. j. piperis & seminis
apij, singulorum scrup. j. scneuli, anisi singulorum unc. i. mellis lib. j. De
moderate tollis dato uno. j. in condito.

Baccellatus
purgatorius

Oliæ purgatorie. Scammonie unc. j. piperis unc. j. epithymi, cymi-
ni terefacili, pericelini, foliorum rutæ, mentæ triditis, singulorum drach. iiij.
silphij drach. j. palmularij quincunces, mellis quincunces, aceti hémina s. ij. or-
luzæ colymbadum maris innatantium fistulam uidelicet, sextarium. j.
Quidam etiam gari modicum addunt. Dantur ex his. v. aut vij. aut viij.

Oliæ purga-
torie

Pastillus purgatorius. Scammonie drach. iiij. euphorbi drach. iiij. fo-
lij drach. ij. piperis drach. ij. Mellis libram. j. Datur uncia. j.

Posca purgatoria, & stomacho grata. Cumini, feniculi singulorum
unc. j. pulegii, apij anisi, singulorum semunciam, epithymi, scammonie,
singulorum unc. j. salis sextantem. Dosis perfecta scrupuli. ij. in posca. Qui-
dam euphorbi scrup. iiij. adijciunt.

Posca purga-
toria

Vini purgatorii Vinum purgatorium in hydropicis. Scilicet quadrantem, apii seminis
 feruncem, piperis drach. j. capparis radice drach. iij. grani enicthi decori-
 ciat drach. j. folij malabathri globulos. ij. Vini heminas. xij. mellis sextar. ij.
 Scillam confusam in uino macerato. Reliqua trita amantifecto.

Sal purgatori Sal purgatorium. Salis communis torrefacti drach. vj. apii seminis, zin-
 giberis, panis siccij, singulorum scrup. vj. anisi, piperis, singulo seminictam-
 te ammonitæ, epithymi, singulo unc. j. Datur cochleis j.

Purgatoria ex Hermodactylo podagrica. Hermodactyli quadrantem,
 anisi, cumini Aethiopici, ameos, thymi corymboeum, piperis albi, zingibe-
 ris, singulo. scrup. iij. epithymi seminictam. Dotis. scrup. iij. Aliquis. vj. dñs
 Datur etiam cum condito, aut aqua multa, aut uero feruifaclo.

Aliiter eadem purgatoria. Hermodactyli unc. j. cumini Aethiopici,
 anisi, agarici, zingiberis, singul. scrup. vj. malliches scrup. ij. spica nar-
 di scrup. ij. moschi siliquam. j. enicthi scrup. ij. Datur scrup. iij. cum
 hydromelo. Scammoniam reprobamus, eo quod stomacho noxia sit.
 Si uero amplius euacuatione, opus sit, misce ad dosim scammoniae fili,
 quas. ij. datur loto.

Caripona ex lapide Armenico, quæ in morbo articuli maxime dan-
 tur. Aloeis intenzem, scammonia sexaricem, agarici unc. j. epithymi unc. j.
 lapidis armenici scrup. xj. callicæ unc. j. spica nardi unc. j. scilla assata se-
 xuncem, croci scrup. xij. Excipe rhodomelite. Datur. scrup. ij.

Purgatoria ex cornopodio, faciens ad quæ etiam ea quæ ex hermoda-
 ctylis, stomacho commoda. Zingiberis scrup. ij. piperis scrup. j. agarici
 scrup. x. enicthi intenzepanis scrup. iij. cornopodij radice scrup. vj.
 Datur scrup. iij. His uero qui aluum agere solubilem habent siliqua. xxiij.
 quæ faciunt omnino vij. aut proptermodum. viij. obolos. Erpost euacuatio
 nem ubi lausit, ex ouis & pane nutritio.

Purgatorium ex cyreniaco succo, ad febra quantitas. Sacci cyre-
 naci, piperis, zingiberis, rutæ foliorum, singul. drach. j. datur nuca
 ponice magnitudine.

Pellicula purgatoria, faciens ad tumefactos, elephantiacos præcipuè,
 etiam quibus crassum ac viscosum humorem quis emergere uelit. Colo-
 cynthidas. ij. resicinas semine euacuato, & dimissa medulla, oleo dulcissimi ex-
 plecto, impositisq; resicinis ab ipsis operculis, per diem ac noctem finito. Por-
 titera die euacuato oleo, colocynthidas in aqua doctæ succellant coquito.
 Deinde ipsas quidem resicito, oleo uero ad aquam amantato, uerani nigri
 obolos. iij. adjecto, & scammonia drach. j. Cum his autem puluiculam ex
 similitigine, aut panem siccum rism coquito. Postea ex hac, agro simplici
 antea tritu ufo, dabis tu componicam. viij. aut x. magnitudinem, aut
 ad summum. xiiij. & aquam calidam bibendam.

De castoreo coram qui purgatur, & quid sit facienda huius qui ex sumptis purga-
 tione non purgatur. Ex phlogia. Cap. vi.

*Pulicula pur-
 gatoria* IN omnibus efficacibus in summa purgatione, homini simplici antea ut-
 tu ufo, ieiunio & probe facta concoctione, medicamentum dero, et uis ad
 perfectam usq; purgationem ne dormiat prohibeto. Maorem etiam modera-
 tum, si fieri potest, faciat, & ab omni cibo ac potu tunc abstinere, ad perfectam
 usq; purgationem. Si uero in mediam non ferant, aut propterea quod odor uen-
 triculi in ipsis facile bilem concipit, ob longam in mediam pergressam, aut
 aliam quandam eiusmodi causam, dandus est ipsis panis ex uino aquosus
 aut pessantæ aut alioq; succus, non ubi iam euacuatio incipit, ut ne corrup-
 tatur, sed statim post medicamentum potum. Sic enim aliquando etiam gra-
 uitate sua, ad celerem medicamentum monum cooperantur, si tamen quis por-
 to quocunque tandem aluum subducatur medicamento, non purgantur,
 neq; euacuantur, si quidem nihil molesti adest, nihil sollicitum esse oportet.
 Si uero res urgeat, ob magnitudinem morbi, aut eger lancinetur, & disten-
 datur

*Non purga-
 ri efficitur*

Adatur, & uelut terra fecetur, necessario ita tunc infusum per clysterem adhibetur. Si uero neque sic obediens, si quidem corpus mortuum sentiat, & uelut eueratur, lauare & largo oleo illinare oportet: si uero repletum sit, & graueat, uenam secare praesentim si multo sanguine homo abundet, & oculos rubicundos ac prominentes, non naturaliter, sed aduentitio modo, ob ponam medicamentum habere. Ac si nihil horum infelicit, sed mortuus & insanabilis adsit, à balneo situm nutrire oportet, & unum largum bibendum exhibere, & interim clysterem adhibere, si non soletus, & rursus lauare. Sit autem oleum quod per clysterem infunditur rursus eum, aut ex alijs quopiam flagis discentente paratum.

De his qui nimium purgantur.

Cap. VII.

Nimium purgati

Eorum qui nimium purgantur cutis confricetur, & collida sanetur, ante balneum dato uino tenui fuluo ac flavo. Tale enim celerrime ad diffinitionem procedit ex pane madido, ac malis punicis. Quod superfuerit euaenato, arduo deligetur, ita ut uincula ex superius deorsum procedant, & adstringant, & quid sanguinis ac spiritus intercipient. Denique enim medicum de Theriaca ex carnibus uiperarum bibendum. Transiit enim ad euerem, & humorum in uentres lationem breui reuellit, & quod uenenosum ac medicatum est in purgatorio medicamento, id obandit. Et si hac desit, de passillis Theriaca, & amplius de passillis ex feminibus, & de anidoto philonio appellato dabit. Sed & cucurbitis ad stomachum uentem est, & cataplasma ex polenta & uino mulso. Post haec epithematis adstringentibus utendum. Maxime autem utilitatem sensum ex totius corporis frictionibus, & medicamentorum potionibus. Abstinentia praeterea ab aeris frigido ac calido ualde. Ille enim materiam ab externa innoceat pellis, & fluxum angit. Hic uero discuit & exoluit uires. Si uero ob mortuum intestinis situm euacuatio angeatur, praedicta cataplasmata imponantur, & hebetantia per clysterem infundantur, adeps nimium asferens, & uinum dulce, oleum nardinum & similia.

De Hiera Antiochi.

Cap. VIII.

Hieracis

Hiera Antiochi Chamædryos, agarici, colocynthidis medullæ storchadis, singulorum drachmas. x. opopanax, sagapeni, petroselinæ, aristolochiae clematidis, piperis albi, singulorum drachmas v. cinamomi, spicae nardi, myrrhae Troglodyticae, croci, scillæ, singulorum drachmas iij. Mellis quod satis est.

Alia Hiera. Colocynthidis medullæ drach. xx. scillæ assæ, agarici, ammoniaci Thymiamatis, neratri nigri corticis, scammonis, hypericidis, galorum drach. iij. epithymi polypodii succi, bdelli, aloes, chamædryos, marrubij, cassiæ, singul. drach. viij. myrrhae Troglodyticae, opopanax, sagapeni, piperis communis, & longi, & albi petroselinæ, cinamomi, croci, castorei aristolochiae longæ, singul. drach. iij. Mellis quod satis est.

Hiera lusi. Epithymi drach. xij. marrubij, storchadis, chamædryos, neratri nigri, scammonis, agarici, piperis longi, scillæ assæ, singul. drach. xvi. euphorbiæ, colocynthidis medullæ, aloes, croci, gentianæ, petroselinæ, ammoniaci Thymiamatis, sagapeni, singul. drachmas. viij. opopanax, polij, cinamomi, myrrhae, spicae nardi, floris lunci rosmarini odorati, pulegij, singul. drach. iij. aristolochiae longæ & rotundæ, singulorum drach. ij. Mellis quod satis est. Dosis scrup. ij. aut. ij. aut. iij. cum aqua mulsa, & sale.

Hiera Galeni. Chamædryos, piperis longi, piperis albi, storchadis, neratri nigri, scammonis, spicae nardi, scillæ assæ. Quidam etiam epithymi: singulorum drach. xvi. myrrhae, croci, ammoniaci Thymiamatis, euphorbiæ, singulorum drach. viij. Excipie melle.

Hiera Russi. Syctoniae sive colocynthidis medullæ drac. viij. chamædryos drach. x. sagapeni drach. viij. petroselinæ drach. v. aristolochiae rotundæ

Syctonia colligitur Colocynthidis

tunde drach. v. pipēris albi drach. v. cinamomi drach. iij. et cassiæ drach. viij. spice croci, croci, polii, myrrhæ, singul. drach. iij. Mellis quod satis est.

Hiera Archigenis. Marrubij, agrosti, chamædrysos, colocynthidis medullæ, stoechadæ, singul. drach. x. opopanaxis, sagapeni, petroselinæ, anisodochæ rotundæ, pipēris albi, singul. drach. v. cinamomi, spice nardi, myrrhæ, solij, croci, singul. drach. iij. Arida tando sicut ac cribraro. Opopanaxem & sagapenum, & myrrham contusa, in pila cum aqua multa nocte una macerata, deinde terito, & arida adhiesto, & melle optimo excepto, in utrum aut plumbeum vas reponito. Hic modus communis est omnibus hieris. Dosis autem ipsarum perfecta drachmæ iij. Assumatur autem & salis drach. j. & mellis cyath. j. & aquæ quantitas satis est. Quid si magis purgatorias efficere volumus eas quæ communiam non habent, ad has quoque singulas obolus. j. de ipsis ammiscantur.

*Hieram de-
js*

Illitio sedis

Illitio sedis et vmblicæ purgatio. Cap. IX.
Illitio sedis ad flatus prouocandos. Ruræ cum melle conteritur, ut unguis succiat, & pretissime mira sedem illinuit. Efficacissima si, si parum cumini, & niri, aut succi cyclamini assumpserit. Sed & laniæ tomento exopta in sedem inditur. Aut melle addito glans efformatur. Flatu enim prouident inde multi, qui alleviationem faciunt.

*Cheramanæ
Catacops*

Illitio sedis uentrem mouens, appellatur Cheramanæ, id est Cacacops. Alumen cum melle tritum concoquitur donec fuligine fiat. Ex cum hoc sedes illinuit. Facile enim multa quidem, sed non citra laborem educit.

Vmblicæ illitio

Vmblicæ illitio aluum subducens. Cyclamini drach. iij. natri drach. ij. uentri nigri et albi utriusque drach. j. colocynthidis drach. iij. scammonie drach. ij. elæterij succi drach. iij. grani Cnidij drach. iij. caricarum pingulum sextantes, fellis taurini unciam i.

Illitio

Alis optima.

Elæterij, lathyridum, galbani, cyclamini, uentri nigri, singul. drach. iij. colocynthidis medullæ drach. viij. cucumeris syluestris recentis, & ammoniæ, grani Cnidij, singul. drach. j. Thymallidrach. j. terebinthinæ drach. iij. Excipe hæc felle taurino, & uelut unguento utere. Quidam ceræ septemce addito, & olei licyonis quantum est satis, uelut emplastrum impoluerunt. *Medicamenta non uera, et simulata uentri medi.* Cap. X.

Vomit ipse

Vomitibus uentur etiam sanis, ab alimentis aut humorum copia grauari. Sed & hi qui ex acuto morbo aegrotant, quoniam pituita, aut tali quodam humore infestantur. Verum uomitoria medicamenta ut uentur, neque sanis, neque ex acuto morbo aegrotantibus permittenda est sed in affectionibus diuturnis, & maxime induratis, & quæ forti exactione opus habent, uelut est podagra, morbus comitialis histomacho oriens, elephas, hydrops, melancholia, & conuulsiones. Contraria autem sunt uomitoria medicamenta sanguinis spuris, & stomacho male affectis, & qui fuso cari solent. Promptissimum itaque ex uomitorijs medicamentis est oleum cyprinum, si digiti aut pennæ in ipsam diagantur, & in gurgulionem immittantur. Sed & nardi cestici & radicum drach. viij. in aqua multa potæ, fortiter sursum purgant. Similiter etiam cestri. v. aut vi. drach. in aqua multa potæ. Et daphnoidia folia. iij. uiri diastrita ac comesta.

*Vomitioria
medicamen-
torum ipse*

Elæterij quocunque obolus. j. in aqua potæ, pituitam & bilem sursum purgat. Et staphidis syluestris grana. xv. cum aqua multa crassa. Ex bulbis item hi qui consuetudine mori edunt, si erodi edantur, & narcissi bulbi cocti, sursum purgant. Apij quocunque radicis pars ea quæ ad aërem uerget, si edatur sursum purgat. Quidam ipsam chamæraphanum uocant. Quæ uero ad radicem effusa, deorsum purgat. Tota uero si edatur, sursum ac deorsum. Raphanides nero minus quidem prædictis purgant, sed utilius. Oportet autem ipsas diu acris ualde ac recentes sunt in uentris frusta comidere, & duabus aut tribus horis antea in aceto multo maceratas quotquot possunt sumant, ita ut

*Apit
Chamæ-
raphan*

ter aut quater à cena uomant, & semel ieiuni. Saepe autem insuper forbetur acetum mulsum. Vbi uero duabus horis obambulauerint, aquam tepidam bibentes, immixtis digitis aëre pinnis uomant.

Modi sumendi ueratri. Veratrum dandum est diutinè egrotantibus, & ex forti morbo, & qui ex alio auxilio salutem desperant, eo quod morbus omnibus ipsis sit fortior. Dandum autem siue assidue uexarit morbus, uelut hydrope, elephas, malis habitus, resolutio, & similes: siue per quoddam temporis circulus repetatur, uelut comitialis, & podagra. Quem autem modum siue sumendi ueratri modi, simplicior & potior preparatio ad sumendum ueratum, hic modus est. Postquam raphanidas prius arundine perpanis eris, ueratri albi optimi radicem farculos festuaceos in fissuras impingito, & ubi noctem permauerint, ipsos tollito, raphanidas autem concisis cum aceto mulso dato iuxta relectum modum, assueto nimium antea ad uomitum, nec egrotato, & relectis horis interpositis, ut insuper ad uomendum cogatur.

Praecipuus autem sumendi ueratri modus hic est. Veratri optimi sext tantum in aqua hominis, quinque autem diebus macerant, coquito donec tertia aqua pars restet. Expresso deinde ueratro, ad aquam aequalem in illis modum immisceto, & facta ad erigendum coctura, dato egroti antea iuxta relectum modum ad uomitum exercitatio, ita ut idem illi ieiunus, & bene concoctis, & alium decoctum exonerauerit, aut sua sponte, aut etiam semel aut que iterum in falo per clysterem immisso pro uitibus.

Efficacissimus porro omnium modus talis est. Radices ueratri ad seorsum magnitudinem concideas. Nam in puluillum redactæ, actionis efficacia stragulant. Et de his oribus quidem cum possant, aut alicui, aut cuiusmodi cuiusdam succo, ueratri summum drachm. minimi drachm. coquito, et bibendam dato. Robustioribus autem cum aqua calida, aut aqua mulsa. In cipe purgatio post tres aut quatuor horas. Quibus rursus incipit, hi melius purgantur. Si uero uomitiones tardè prodierint, aqua mulsa bibenda data, ad uomitum cogantur, immixtis item pinnis in oleum tinctis. Si nec sic uomant, in balneum abducantur. At ubi uomere inciperint, si quidem pro ratione euacuatio fiat, nihil amplius molestie exhibere oportet. Si uero lancinentur aut etiam conuellantur, aquam & oleum bibenda dato. Nam hinc & decoctum per uentrem subdosis ipsis contingit, id quod etiam alias in his qui ueratrum sumunt aliquando contingere solet, & medicamenti coactione rationem facilius ferunt. Quod si animi deliquitum ipsis accidat, odoramentis resistentur. Sed & ad alia, uelut urissimile, accedens a symptoma malsimiliter congrua adhibere oportet. Ceterum multa contingunt euacuatio, nam ieiunantur & diuini permittantur, aliæque uelut in his qui nimis purgantur dictum est. Si uero perueniret adhuc, euacuatione stomacho assurgant, & aris deligantur. At si pro ratione euacuatio fiat, aqua mulsa ipsis bibenda datur moderatè, quo superfluitates ex medicamento eluat. Ergo postea post cibum concoctu facillè exstiterunt. Porro in his qui suspensa habent per os medicamenta, & tamè omnino ueratri usui opus habent, Annylus hic tali quodam infuso per clysterem utitur. Veratri albi drachm. in aqua sextarij macerant, & per diem ac noctem manere sinunt. Sequitur uero die ueratri in aqua ad diuersas coquimus. Deinde hanc per sedem infundimus ut uomitum conciet. Rursus purgat paulo debilius quam ueratri potio. Post sufficientem purgationem, glandula acri subdita excretionem irritamus, quo infusum reddatur, & ipsi non amplius noceant. Et post excretionem, aquam mulsam semel aut iterum infundimus, quo intestina claudantur. Idem Annyllus ita dicit. Fit etiam glandula inquit, ex ueratro albo falo ac cubrato, deinde melle cocto excepto, similiter purgata supernum uentrem, quemadmodum infusum ex ueratro purgat. At uero probatior est hic modus. Nam in nobis situm est ut moderemus purgationem. Sit itaque ueratri pondus drachmarum duarum ipsa uero glans laetis totum uero falo

Veratri sumendi modus

Infuso per sedem, superum purgante

Glandula falo falo purgante

Nidiotre obducatur aut obligetur. Et caput rementi extrinsecus per sedem propendat, quo post sufficientem purgationem, glandem extrahere non basiliat. Hic modus perfectissime purgat, & neq. suffocationem, neq. aliud quoddam periculum inducit.

De illius Antidotis.

Cap. XI.

Præfatio à Galeno libris de Antidotis præmissa.

Compositiones in medicamentorum quæ affectiones curant, & non forte imponuntur, sed in ea corpus sumitur, veteres Medici Antidotis vocant. Tres autem sunt ipsarum differentie. Quædam enim letalium medica mentorum gratia exhibentur. Quædam ob hebras venenorum etaculantes. Quædam affectionibus ex malo uscto obortis auxilium. Aliquæ triplicem usum promittunt, quemadmodum etiam eaquæ Theriaca appellatur.

Hedychroi in Theriacam ingredientis præparatio.

*Antidoti ar
na*

*Hedychroi
præparatio*

Aspalathi radicis corticis, calami aromatici, costibasi, xylobalsami, phlo, manci, mastichæ singul. drach. vi. carpopalsami drach. ij. Maridrac. xvi. floris tunc rotandi odorati drach. ij. cinamomi drach. xxiij. amomi, cassiæ, Rhei, singul. viij. nardi indicæ, solij, singul. drach. xij. myrtibz drach. xxiij. croci drach. xij. Vino bono exape, & pastillos efforma digitis opobalsamo tinctis.

*Pastillorū sal
sitiorum præ
paratio*

Pastillorum scillicetorum præparatio. Scillam loto aurifuræ massa oblitam moderate affato, & acceptis interne partis ipsius partibus duabus, & farinæ erui parte una, terito & similiter pastillos efformato.

*Pastillorū Ther
iacorum præ
paratio*

Pastillorum Theriacorum præparatio. Viperas quatuor aut quinq. sulciore ac recens captae sumito, & de ipsis ad caput & ad caudā, quatuor digitorum magnitudinem amputato, & tota pelle interne nidi ipsarum ablati, reliqua in aqua olla emanento & sale coquito, donec spina de car nibus discedant. Deinde ablatis ac diligenter à spina purgatis carnibus, pari panis æ qualem portionem ipsis ammisceto, & nita similiter in pastil los efformato digitis opobalsamo tinctis, & in umbra siccato.

*Theriacæ præ
paratio*

Theriacæ Antidoti præparatio. Pastillorum scillicetorum drach. xlviij. Pastillorum Theriacorum drach. xxiij. hedychroi drach. xxiij. cina momi drach. xxiij. pipēris communis drach. xxiij. succi papaveris drach. xxiij. rosarum siccarum drachmas. xij. scordij, boniadi feminis, tridis Illyricæ, agariæ, glycyrrhizæ, opobalsami singul. drach. xij. myrtibz, croci, zingiberis, Rhei pontici, quinq. solij radicis, calamithæ, marathij, petroselinij, stoechadis, costi, pipēris albi & longi, diacamni, tunc rotundi odorati floris, thuris masculi, ceribinthinæ, mastichæ, cassiæ nigre, spice nardi, singul. drach. vi. polij floris, styracis, apij feminis, selesis, Thlaspis, ammi, chamædryos, chamæpityos, hypocistidis succi, malabathri, nardi celiticæ, mei, gentianæ, anisoforniculi feminis, lemnis, sphragidis, chalcitidis castæ, amomi, acori, allami, phlo pontici, hyperici, ac acis, gummi, cardamomi, singul. drach. i. ij. dauci feminis, galbani, sagapeni, binaminis, opoponacis, castorij, cernuæ, aristolochiæ stematidis, singul. drach. ij. Mellis Antiei libras. x. uti si fulcni sextar. ij. Opium, hypocistidem, myrrham, sagapeni, styracem, acaciam, opoponacem, in pistam misto, & modico melle assuso, tundens dissoluta. Deinde vino a diectione supereminet, ad triduum mace rato. Postea reliqua rursū unito. Mel ipsam despumetur. Reponitur in argentea aut nitra vasa non valde plena. Et in opercula singulis diebus demunetur. Vnus ipsius est si ex urget, in mortis à hebris venenatis, & his qui venenati acciperunt, post septimum à præparatione annum, necis potitæ magis tudine, cum uini cyath. ij. ita utris in die bibatur. Similiter etiam his qui ab aliquo obitura periclitati sunt causa, ut corruptio in corpore letalissime, dicamini qualitatē sit imitata, quemadmodum in pestilensibus constitutionibus maxime fieri solet, semel in die datur. At in alijs affectionibus post decennium ipsius usus est, & usq. ad vigesimum annum. In cussu ue

*Vitæ Theri
acæ*

ro, & thoracis aut lateris doloribus, non febrientibus cum uino mulso, febrientibus cum aqua mulsa, datur adnoctem fabae Aegyptiae magnitudinis. Sanguinem spurcatis, si recens est malum, in potu diuturnum, in symphyti decocto datur fabae Aegyptiae magnitudine mane & uesper. Illarum & torminalium, aut coctiliarum datur mane ex aqua calida, fabae Aegyptiae magnitudine. Appetentiam incensam exhalat a rigore, perfrigeratione, & hiliis uomitis, aut accetibus pota liberat. Menses mouet, & moruos facit, eius eicit, fabae Aegyptiae magnitudine pota cum aqua mulsa, aut passo, in quo ruta aut dictamnium coctum est. Facit etiam ad uicem abscissam, et per se, & cum dupla tragacantha, ex uino mulso aut passo pota, & sub lingua detenta, & eliquata. Splenis et hepaticis datur ex posca. Si scirrhus dunctus addit, ex aceti mulsa, aut aceti scillitici scilicet cyatho. Nephriticis cum aceto mulso fabae Aegyptiae magnitudine. Dysentericis tantundem cum rhoeo de cocto, mane & uesper. Ad uisus quoque hebetudinem summe facit hoc modo. Antidoti & opobalsami sextantem, cum mellis cyatho misceto, & paulatim illando. Detergit etiam dentes. Plurique etiam praerustionis gratia ipsam accipiant, in nouissimo fabae graecae magnitudine, ubi probe concoxerunt, cum mellis cochleario uno, & aquae cyathis ij. Similiter etiam in profusionibus ipsa utantur, quum utiuaque aetrem aliquem, aut aquas superfluas habent, in locis ubi iter faciunt.

Sales Theriaci.

Viperas sumito recens captas quatuor. Deinde salis ammoniaci aut communis modicum lenticum, i. in pulam mittito, & cum ipso haec in crassas partes confundito. Gentianae sesquidram, aristolochiae rotundae sesquidram, cistarii penulae comae lib. ij. cardamomi, matrubij, singulorum sexuncem, scordij, apij, chamaedryos creticae, singul. lib. j. naphthalis seminis sextar. ij. Mellis Aitici mensura sufficiente haec uncto, & dimidium ipsorum partem in ollam mouam dato, deinde quatuor uiperas uiuas adiecto, insuper ipsas, etiam scillas teneras recentes minutim concisas addito, atque ita reliquam dimidiam partem superioris mixturae superinfundito, & olla diligenter operita, tribus aut quatuor saeculis operculum ipsius perforato, quo uapor per ipsa ex halana, affusionis modum tibi significet. Primum enim apparebit fumus multus, exiens caliginosus ac ualde turbatus, signum quod ignis iam feras ipsas contingat. Atque tunc tu diligenter caue, ne quid de hoc fumo insipias, dum aet uiperarum exhalatione insitum. Deinde quum cessauerit uapor, & flammam quandam exilitem conspexeris per foramina egredientem, tunc sane quam optime affatus putato, atque sic olla ab igne ablata, per totam diem ac noctem perfrigerata posita aperta, & exemptis carbonibus diligenter tunditis & cribrato cum his mixtura. Rursum sybuebris seminis, hyssopi creticae, singul. dodrantem, seminis fomiculi, nardi celtici, stachyos scythicae, singulorum sexuncem, petroselinum macedonicum, malabathri, solioeum, singul. orientem, amomi, racemi, homini seminis tolia, singul. quadranten, origani cacuminum, thymi cacuminum, singul. sextantem, baccharum laniperis, oliperis albi, & longi, singul. lib. siliij radiis sextantem, seminis coriandri, zingiberis non perforati, satyrj seminis aut radici, pulgij, scelis mullienis, mentae, singulorum sexuncem, castig siliulæ sextantem, cinamomi unc. j. Ceterum ego praeparauit ut bestiae non exulserim, sed passillos ex ipsis paratos, uelut in Theriaca exposui, cum his quae cum bestiis uruntur miscui, & hoc propterea, ut quam in se habent a maritudinem, eam in affione deponant. Tanta autem mensuram passillorum adiecti, quantam confectura assequi possit quatuor uiperas habere. Et conserunt reuera optimi.

Antidosis Mithridatica ex Scingo. Myrrhae Troglodyticae, zingiberis, cinamomi, singul. drach. x. spice nardi, Thuris, thalassipros, opobalsami, floris iunci odorati, costi, sicchadis, sedis, galbani, terebinthinae, piperis

Sals Theriaci

Mithridatica
ex Scingo

peris longi, castorei, succi hypocistidis, styracis, foliorum malabathri, singul-drach. iij. calter nigra, polij, pipēris albi, scordij, dauci seminis, carpoballami, cythreos, bdellij, nardi celtica, gummi, petroselinij, optij, cardamomi, feniculi seminis, gentiane, foliorum rosarū, singul-drach. viij. distane mī, anisi, acori, plu. singulorum drachmas. ij. mei Aethamantici, acacig, uentris scindij, hyperici seminis singul. j. z. Vini & mellis quantum satis est. Preparatio similiter ut Theriacum. Galenus dicit hanc ad eadem facere, ad que etiam Theriaca, exceptis his quibz uisera morbi sunt. Nam ad hos Theriaca effector est.

*Sanguis An-
tistox*

Antidotus ex sanguinibus, Faciens ad omnia uenenum elaculantis, & ad leuata medicamenta. Piperis albi & longi, costi, acori, plu, anisi, di-
chami cretici, singul drach. ij. amomi, opoballami, seminis rutę syluestris
seminis feniculi, cumini Aethiopici, anethi, sanguinis anatis masculi sic-
ci, sanguinis hœdi, sanguinis auleris, sanguinis anatis feminis, butiris dis-
syluestris seminis, singulorum, drachmas. ij. gentiane radicta, trisulph, lun-
ci odorati floris, Thuris, rosarū siccatū, sing. drac. iij. cinamomi drac. ij. scor-
di drach. viij. petroselinij, polij, myrrhæ, nardi, singul. drach. vj. ca. filiz drac.
in succi cyrenarē drach. ij. storachidis drach. v. alari drach. ij. ammoniaci
Thymamantis drach. ij. mei Aethamantici drac. ij. agarici drac. ij. carpobal-
lami grana xx. Mellis costi quantum satis est.

*Acetum mul-
sum simplex*

Acetum mullum simplex. Aceti acerrimi albi sextar. j. aquę sex-
tar. ij. Mellis sextarium. j. Coquito ad liquidioris mellis compagem, mel
inter coquendum despumans.

*Acetum scil-
liticum*

Acetum scilliticum. Scillæ albæ concise, & in umbra siccant ad
dies quadraginta, rursusq; purgant, minam unam, aceti boni sextar. xij.
Hec simul in uas mitto, idq; opertum ad dies sexaginta ad solem expo-
sito, post quas scillam expressam abscito. Acetum autem excolatum in
aliud uas transfundito. Quidam scillæ minam. j. in aceti sextar. vj. mit-
tunt. Alij uiridis scillæ idem pondus in acetum consiciunt. & ad menses
sex simul in uase esse sount. Et est hac magis incisorium. Facit autem ad
fluxiones circa os, si colluatur, & ad multas internarum partium affec-
tiones, si bibatur, exceptis his que cum ulceratione consistunt. Facit
item ad plura alia.

*Acetum mul-
sum scilliticum*

Acetum mullum scilliticum. Scillæ partium internarum tenerarū
runt lib. ij. aceti acris albi sextar. xv. pipēris, petroselinij macedonici, sin-
gul. sextantem, dauci cretici, ammi, anisi, nardi celtici, ligustici, alari,
cardamomi, spicæ nardi, amomi, thei pontici, singul. seminum etiam, semini-
nis feniculi, cumini, silphij, zingiberis, pyrethri, hyssopi cretici, costi,
ptolegij, singul. unc. j. mentæ uiridis fasciculat. j. rutę uiridis ramulosa. v.
Mellis Anici sextar. j. sapar sextar. ij. apij uiridis fasciculat. j. Internas scil-
læ partes albas contritas in acetum mitto, & ad dies septem sub canicula
ardoribus macerari sinito. Deinde exempta scilla, sicca quidem iam con-
trita, uiridis autem non contrita, in acetum dato. & rursus post septem dies
omnibus excolatis, mel & sapam ad acetum addito, & ad cōpagē coquito.
utroq; uase excipito. Viere hoc auxilio & tetanus uelut potione que a me
etiam sumi solet, & cum cibo ad iniectiones. Est enim longē ualidissimum.

Medicamentum Galeni ex scilla, faciens maxime ad comitales. Scil-
lam in tentes partes manibus confractam, in uas quod mel habenti consice,
& ad probe opertum in loco ad meridiem conuerso, sub canicula ardori-
bus expono. Post quadraginta dies ab ortu caniculae solue. & scillę corpus
effluxisse comperies. Exceptum itaq; succum ipsius optimo melle condito,
& his singulis diebus cochlear. j. pritheto, pueris paucum, perfectis ma-
gnum. Sed & ipsum scillæ corpus cum melle terito, indeq; cochlearium ex-
hibito. Est autem hoc facultate postertius sacco.

*Philonis An-
tidotus*

Philonis Antidotus. Piperis albi drach. xx. hyoscyami drac. xx. sue-
cipia

ci papaveris drac. x. croci drac. v. pyrethri, euphorbii, spicæ nardi, singul. drach. j. Mellis Antici, aut alterius boni probe cocti quod satis est. D. ut perfectis nucleis pondice magnitudine in eis, minoribus subeo, pueris ciceris. Medicamentum est quod dolorem maxime sedat, & somnum inducit.

Athanasia dolorem sedans pleuritica, Onibali. Cassiæ drach. viij. spicæ nardi, amomi, croci, opii, styracis, myrrhæ, costi, singul. drac. iij. mellis de spumati quod satis est. Dosis est eadem quæ philonis antidoti.

Athanasia

Antidotus ex duobus piperis generibus, sitislem uim habens. Cardamomi, castorei, opii, singul. drach. iij. myrrhæ, costi, piperis albi, & longi, galbani, singul. drach. iij. croci drach. iij. Exceipe melle cocto, & præbe fabor magnitudine.

Antidotus ex papaveris capitibus, & sapa. Capita papaveris inridia non aquosa, viij. aut x. postidie ut decorsperis, cum glycyrrhizæ nucis ana, in sapa sextario uno, ad diem unum macerata, coquitis donec fac cessant, & ubi moderatam habuerint hæc compagem, ab igne ablata ut se excipito, & cœstor in febrientibus qui utigila inestantur, & si de capite in thora cem tenuis fluxus ferat.

Antidotus ex papaveris capitibus, & melle. Capita papaveris utitur dictum est, & glycyrrhizæ unc. j. in aquæ pluuiatis, ut fontane sextario, donec fac cesset coquitis & exprimitis, & ad decoctum mellis sextarium dimidium adjecto, & ad spissitudinem coquito. Datur his qui cum doloris mitigatione, & summi inductiones, insuper etiam expurgatione & exetione opus habet, costis quæ in thora ce, aut circa pulmonem et theneris hæret.

Antidotus ad
ria ex papaveris
capitibus

Antidotus ex papaveris capitibus cõposita. Aquæ in qua capita papaveris iuxta relatum modum cocta sunt, sextar. j. uni dylicæ heminas. ij. mellis libr. j. croci, hypocythridis sacci, singul. drach. iij. coquito ad compagem. Cæterum ea quæ ex melle, & capitibus papaveris, & malis cydoniæ paratur, stomacho gratior est. Verum efficacior est, si cum papaveris capitibus, etiam melle totum & glycyrrhizæ in aqua coqueretur.

Elegma ex marubio simplex, ad tabescentes maxime. Cotinæ maritimi lib. j. in aquæ heminis. vj. ad tertias coquito, & abiecta herba, partem mellis mensuram aquæ adjecto, & ad mellis spissitudinem coquito, in dosi cochlear. i. præbeo.

Elegma ad
ria

Elegma ex marubio compositum.

Cotinæ marubii, iridis Illyricæ, hyssopi, pulegii, glycyrrhizæ, apii, singulorum sextantem, caricarum pingulum quadratæ nucleorum nucis plinæ resinatæ quadratæ. Contunditis in crassas partes sicca, & cum caricis in aquæ sextar. iij. macerata, ad tertias decoquito. Deinde ad excolatum aquam mellis libr. i. adjecto, & ad mellis compagem usque coquito.

Elegma ex eruo. Amygdalarum amararum sextantem, salsitæ erui trientem, hyssopi trientem, iridis semiantiam, nucleorum pineorum torrefactorum sextantem, Mellis sextar. j. aut quod satis est.

Deductionem
Elegma

Elegma dodecatheon. Iridis Illyricæ trientem, erui trientem, hyssopi sextantem, seminis uricæ sextantem, glycyrrhizæ sextantem, boni gregi sextantem, bulbonum trientem, seminis lini torrefacti trientem, melanthii scrupul. xvij. pulegii scrup. vj. nucleorum pineorum torrefactorum sextantem, piperis scrup. vj. Mellis quod satis est.

Antidotus Socra. Spicæ nardi scrup. xxxix. myrrhæ scrup. x. viij. croci scrup. xxxviij. castorei scrup. xxxix. petroselinæ scrupul. xlv. anisi scrup. ix. opii scrup. viij. Socra tunc odorati scrup. xxxvi. castorei scrup. xij. piperis longi scrup. xij. seminis sinonis scrup. vj. styracis scrup. xvij. a momi scrup. xij. fœlis scrup. xij. hederæ scrupulos. xvij. costi scrup. xvij. Mellis quod satis est.

Socra antidoti

Medicamentum ad tussim ex styrace. Amomi, cassiæ, singul. sextantem, styracis, spicæ nardi, singulo. sequiunciam, croci, piperis albi, singul.

D. a. uac.

unc. i. Mellis sextar. i. Echibe cochlearium unum.

Medicamentum Psiloxeni, ad suppuratos, & fluxiones diuturnas.

Terebenthinae drach. xxvij. nardi drach. xvi. myrrhae sacche drach. vj. cardamomi, bulborum, singul. drach. vi. croci drach. xij. galbani drach. xvi. galbani drach. xvj. amygdala amara. lxxx. Mellis heminam. Bibitur ex aqua fabae Aegyptiae magnitudine.

Ex his antidotum

Antidotus Hædre multo usus. Est enim ex his quæ valde siccant, Amomi scrup. vi. croci scrup. xvij. seminis dauci scrup. j. & cornu cili seminis scrup. iij. cassiæ scrup. j. s. floris iancti odorati scrup. iij. & cinamomi scrup. iij. hypocythidis succi scrup. iij. & sulphuris scrup. v. seminis papaveris scrup. v. pyrethri scrup. iij. petroselini scrup. j. & idris Ilyricæ scrup. vj. & hyoseyami seminis scrup. xij. & spicæ nardi scrup. vj. & seminis rutæ scrup. j. & anethi scrup. iij. cardamomi scrup. iij. rosarum siccarum scrup. iij. s. Floris nectij (Est autem uelut stitqua, ex qua rosa rododaphnes emergi) & rosæ ipsius, singul. scrup. iij. Rhei scrup. vj. genianæ scrup. vj. hedychoi scrup. j. & nig-gacanthæ scrup. xv. Lycij scrup. vj. foliorum citrij scrup. vj. seminis ocimi scrup. j. & anisi scrup. iij. costæ myrrhæ, singul. scrup. vj. bdellij scrup. xvi. succi artemisiæ scrup. xij. rhois Syriaci scrup. xxv. & alari, unctis mergi, in pida laipidis, singulorum scrup. iij. piperis scrup. xv. castoreij scrup. j. & cumolæ scrup. vj. filonis scrup. jx. Syriaci scrup. jx. opobalsami scrup. xij. & felis hæræ scrup. j. & Mellis uncias. xxvij. Vini quod satis est.

Medicamentum ex malorum cotoneorum carnibus. Malorum cotoneorum purorum lib. ij. concoquuntur in uini ueteris sextar. iij. deinde teruntur, & adiunguntur ipsi trita hæc, piperis, anisi, ligustici, singulorum. j. Quidam etiam zingiberis uncia dimidiam addunt. Qui pro uino acetum sumunt.

Ex malis cotoneis medicamentum variis

Medicamentum ex malorum cotoneorum succo. Ad prostratam appetentiam & ægre concoquentes commodum. Malorum cotoneorum maturorum succi sextar. ij. mellis hemi sextar. ij. aceti sextar. j. zingiberis quadrantem, piperis albi sextantem. Ad spissitudinem coquito. Hoc ad perfrigeratos preparat Galenus. In quibus autem, inquit, bilis abundat, citra piperis & zingiberis ammissionem preparato.

Meloplacuntio

Meloplacuntij id est placuntæ ex malis cotoneis præparatio.

Malorum cotoneorum purorum lib. vj. coquuntur in uino donec flaccescant. Deinde ad excolata ac trita quidam adiungunt Mellis lib. viij. & ad lentam ignem coquunt, mox etiam subinde ferula, donec totum massæ nō inqueant, & tunc contrita hæc adiungunt, piperis quadrantem, anisi quadrantem, petroselini unc. j. Quidam etiam zingiberis unc. j. & mastiches unc. j. Deinde mixta in placentas seminales efformant, & cum lauri folijs componunt.

Cydonarum

Cydonarum frustile frusta integra habena. Malorū cydoniarū purorum in frusta concisorum libræ. viij. coquuntur in uini sextarijs. viij. moderate, ut non dissoluantur. Deinde ammiscuntur plis, mellis despumati lib. viij. piperis bellis, petroselini, anisi, singulorum quadrantibus, zingiberis quincunx, spicæ nardi & cinnamomi uncia una. Omnia hæc contrita, & moderate cocta ad olei spissitudinem tollito, & ubi perfrigerata sunt, frusta simul cum iuleulo componita.

Antidotus ex tribus piperis generibus. Piperis communis, albi, longi, singulodi ach. vij. zingiberis, anisi, & acuminum thymi, singulo. drac. ij. Mellis quod satis est.

Alia oribadij.

Piperis albi sextantem, piperis nigri, longi, spicæ nardi, cinamomi, amnii caroi, hylopi, & felis, dauci, petroselini, singul. unc. j. zingiberis drac. iij. Mellis lib. ij.

Alia.

Piperis communis quadrantem, albi unc. j. longi unc. j. petroselini, Cinnamomi

namomi, ut cassie duplum, zingiberis, singul. unc. j. Mellis unc. xxi. Aut quantum satis est. Ego etiam Thymi cacuminum unc. j. ammisceui.

Dioscorides. Cumini aceto macerati ac terrefacti unc. j. piperis, zingiberis singulo, sextantem, rursus ut idis unc. j. & nutri drac. ij. & excipe melle.

Medicamentum ex calaminta, Petroselinii, pulegij, fescis, calaminta, singulorum quadrante, apij seminis unc. j. cacuminum thymi unc. l. ligulitici tridentem. Piperis unc. xij. Mellis quod satis est.

Medicamentum ex cistio, ad agie concoquendum.

Aceti heminas. ij. cistij suae medici mali carnis lib. j. hyssopi, ruta, origani, singul. fasciculum. Haec per diem ac noctem macerata in aceto coquantur ad tertias, et expressa abijciuntur. Ad acetum autem mellis sextar. j. ammisceatur, et rursus ad mellis spissitudinem coquitur. Quod ubi factum est, asari, mei, piperis albi singul. sextans infunditur. Datur inde cochlear. j. mane, & ad somnum.

Petra Galeni. Aloes drach. c. xyloballami, mastiches, croci, spicei nardi, asari, cinamomi, singul. drach. vi. Quidam etiam floris iunci odorati, & cassie, singul. drach. vi. addunt. Datur ex aqua melle drach. j.

Petra ex aceto melle. Ad stomachicos, utrum, & hydropem Aloes mentem, solij sextantem, costi, calice, amomi, iridis, singul. drach. j. corticis radiceis foeniculi libe. j. mastiches, nardi celestis, zingiberis, singulorum drach. j. piperis drach. j. mei drac. j. acetis sextar. j. & Mellis sextar. j. & Foeniculum in aceto ubi prius coctum est abijciuntur. Deinde melle adijciuntur, & facienda ad mellis compagem coctura, reliqua trita inspergantur.

Medicamentum optimum ex hepate lupino. Genianae, chamæpityros, petroselinii, marubij, fellis ursini, sinapi, scolopendrij, radiciapanacis minij, rubiae, seminis brassicae, aristolochiae longae, piperis albi, spicei nardi, costi, erugae seminis, eryngij radiceis, polij, echin. eupatorii, baccarum lupineri, hepatis lupini, emulae, singulorum quales partes melle cocto excipio. Datur nucis ponticae magnitudo, cum ulno melle cocto.

Theodoreus ex Anacardijs. Anacardium unc. j. & croci, cassie, theodorei solij, spicei nardi, caryophylli, mei, agarici, floris iunci odorati, rhei, epithymi, singul. drach. iij. acori, piperis singul. unc. j. & aloes quadrantem, & zingiberis, mastiches, iridis libyicae, singul. unc. j. & myrobalamonum unc. j. Mellis libe. j. aut quod satis est.

Theodoreus absque anacardijs. Aloes drach. lx. agarici drach. xxiij. croci, cassie, rhei pontici, acori, cinamomi, mastiches, singul. drach. x. costi, seminis rutae, piperis albi, singul. drach. viij. spicei nardi drach. iij. xyloballami, asari, chamædryos, mei, singul. drach. iij. Mellis quod satis est. Quidam etiam his addunt anacardila. ij. Dosis est drachmas. ij. cum aqua melle.

Cyphoides. Ad Hepaticos, & thoracis afflicti ones. Vulpæ assae, drachmas. xxv. croci drach. j. calami drachmas. ij. bdellij drachmas. ij. & cinamomi obol. iij. nardi obol. iij. iunci odorati drachmas. ij. yris drach. iij. terbinthinae drachmas. iij. aspalathi ramentis obol. xij. Mellis drachmas. xvi. Vinis quod satis est.

Cyphoides aliter. Alexandri. Croci, cinamomi, bdellij, singul. drachmas. iij. myrrorae, calami, singul. drachmas. ij. aspalathi, floris iunci odorati, singul. drachmas. iij. cassie, nardi, singul. drachmas. j. terbinthinae drachmas. xvi. vulpæ assae carnis drachmas. clx. Mellis heminam. j. & Vinis quod satis est.

Medicamentum ex Cacao hepaticum.

Cacajunc. j. costi unc. j. solij scrup. viij. piperis albi scrup. vi. spicei nardi scrup. vi. Mellis quod satis est. Datur cochlear. j. cum conditi porcione.

Zopyrius. Myrrhae drach. v. croci, cassie singulorum drach. iij. cinamomi drach. iij. spicei nardi drach. ij. floris iunci odorati drach. ij. piperis al

Dioscorides

Petra Galeni

Lupis hepaticum

Anacardijs

Cyphoides

Ex cacao hepaticum

Zopyrius

hidrach. j. Lithuris drach. j. colli drach. j. Mellis quod satis est.

Pecoris
Anidoti

Pgonia. Syracis calamitę drach. vi. thuris, anomi, croci, singul. unc. j. spicenardi drach. vi. folij drach. ij. piperis albi drach. vi. piperis com-
munis drach. viij. myrrhe unc. j. colli unc. j. Mellis quod satis est.

Carpoti. Hepatica, desichei. Aloes unc. j. spicenardi, folij, colli, singul. scrup. ij. agriei scrup. viij. mastiche scrup. xij. apthymi scrup. iij. Rhei scrup. j.

Acetum nullum ad splenem. Capparis radicis corticis, scolopēdrij, spicē nardi, asari, ludis, flos tunci odorati, flos tunci quadrati, anisi, cur-
mini, feniculi, acori, fructus erice, singula. unc. j. foliorum myrica, folio-
rum laetici, radicis apij, dendrolibani, scillae, singulorum sextantem, ac-
ti sextar. iij. Mellis sextar. iij. ammoniaci Thymiamatis, quadrantem. Prae-
parato uelut scilliticum. Dato cochlear. ij.

Acetum nullum faciens ad calculos. Saxifragę, betonica, grandis,
nis, adianti, spicē nardi, capellae, asari, myrsi, singulorum unc. j. petroseli-
ni macedonici, rutę seminis, singul. unc. j. feniculi uridis, scillae asarae,
chamaedaphne, singul. sextantem, Capparis radicis corticis quadrantem,
lij sextantem, aquę, aceti, mellis, singul. sextantem.

Pisces calidus
arteria

Piscis calidus arteria. Pulegij, mastiche, seminis apij, menthe sic-
ca, singulorum unc. j. salis communis torrefacti, lib. j. seminis coriandri,
spicē nardi, anisi, ammi, singul. scrup. vi. folij scrup. iij. piperis albi unc.
j. aut communis unc. j. lithospermatis sexuncem, betonica sexuncem, ac-
ti boni sextar. v. Omnia trita, cribram ac leuissime trita. per triduum acetum
amassato, & per dies xl infusato. Vltus autem tempore, ex eiecerit nigro,
& asparagorum radice, apij, & adianto decoctum parato, & ad ipsius tem-
peraturam aceti heminas. ij. adjicito, & gressu in calido balneo solio biben-
dum prebere. Quidam uero et statum specierum puluilli scrup. xij. cum po-
stea ex praedictorum reliquarum herbarum decocto mixta exhibent, & nihil
loquutus efficax est medicamentum.

Coultum
Vitis Asia
ludis
Hircini fegui
no medunt
tum
Cauderum me
dicamentum

Conditum calculos arteria. Piperis albi, saxifragę, spicē nardi, li-
thospermij, betonica, singul. unc. j. petroselini, folij, singul. unc. j. j. seminis
rutę syluestris unc. j. Mellis sextar. j. Vini Alsalonice sextar. xvi.

Medicamentum ex hircino sanguine. Quum uua incipit manire
scere, hirci etate uigentes sanguinem accipe, & in sole sicca, deq. ipso co-
chlear. ij. prebe calculosis cum pulo cretico. Quidam etiam anomi & folij
singulo, quadrantem amassent. Alij etiam myrrhe scrup. iij.

Antidotum Rhensis ex cicada. Lithospermij, acus piscis uisti, sele-
lis, singul. unc. j. ammi, eucamois satui seminis, saxifragę, uuarum passa-
rum exemptis nitaceis, seminis, altheę, phascoli albi, lycarij, singulorum
unc. j. spicē nardi, phus, mei, lapidum ex spongia, singul. drachmas j. adian-
ti, seminis paluri in serae partib. sij sicci, radicis rubi, graminis, polypodij
singul. drachmas sij. hircini sanguinis siccat uelut dictum est, scrup. vi. cic-
adum siccatam, ademptis capite, alis ac pedibus, tridentem, piperis albi
drach. vi. Mellis costi quod satis est. Datu nucis pontice magnitudinis, in
condito, aut decocto tribuli, aut saxifragę aut linonis, aut radicis aspara-
gum, aut graminis, aut quinq. folij, aut radicis herbe lanaria.

Antidotum ex lithospermio. Lithospermij, betonica, saxifragę, petro-
selini, piperis albi, æquales portiones. Excipe melle.

Antidotum ex semine porri. Piperis albi ac nigri, danci cretici, cucu-
meris satui seminis, feniculi seminis, porri seminis, petroselini Macedo-
nici, Pyrethri, zingiberis, folij singul. unc. j. Mellis quod satis est.

Antidotum ex Tecolithe. Spicē nardi, hyssopi, tecolithe, singulorum
scrup. viij. piperis scrup. xij. zingiberis, petroselini, colli, saxifragę, singul.
scrup. vi. callie, seminis apij sing. scrup. iij. cyprii scrup. vi. ramēti eboris scrup.
iij. cardamomi ligul. scrup. vi. lithospermij scrup. iij. Mellis quantum satis est.

Antidotum

Antidotus ex semine malue sylvestris. Cucumeris sativi seminis drachmas. xij. hyoscyami seminis drachmas. vi. cicutæ seminis drachmas. iij. alij vi. habent. opij, fœniculi malue sylvestris seminis, croci, singulorum drachmas. iij. seminis apij, drachmas. vi. cassiæ drachmas. iij. amygdalæ. x. nucis regias. x. uccis ponticas. x. asari drach. iij. Excipe passio Cretico, & obolos. iij. præbe non febrientibus cum sapa. Quidam melle excipit.

Medicamentum Rhenale ex bellarijs. Ad nesciæ ac rhenum ulcerationem. Vuc passio albæ uimæctis exemptis, nucleorum pingetorum receptaculum singul. sextantem, eucumeris seminis decorticati, baccarum myrti exempto ossis amygdalarum amaratum, paleularum pingulorum, seminis apij, seminis papaveris, croci singulorum drachmas. j. myrthæ sextantem. lxx. passio drachmas. j. et uno bibendam præbe.

*Bellariorum
medicamentum*

Antidotus Sarytica. Zingiberis, saryrij superioris, singulorum drachmas. viij. seinci caudæ, mei, asari, petroselinæ, cardamomi, scellæ, singulorum drachmas. iij. seminis cruce, citamomi, singulorum drachmas. iij. hœminij, pipertis albi seminis citici, singulorum drachmas. j. storacis, ciodorati, spicæ nardi, singulorum drach. j. sanguinis hircini mystrum. Datur drach. j. cum uino, debilibus cum lacte.

Sarytica

Catapoda ex xylomacere, ad dysentericos.

Xylomacere, opij, rheij, singul. serap. vi. gallæ, myrthæ, singulorum unc. j. Excipe uino spathite.

*Xylomacere
catapoda*

Antidotus ex corallio, podagrica. Rheij barbarici, peonij, myrthæ Trogodyticæ, spicæ nardi, singulorum sextantem, solij unc. j. caryophylli grana. xv. anagallidis ruscum id est panicum florem habentis, quam uocant corallium, unc. x. aristolochiæ longæ trientem, & rotandæ trientem. Datur serap. usq. j. quotidie concoctione probe facta. In ei peteuerit oportet ab æquinotio summasse, quod est circa xxij. diem mense septembris,

*Podagrica an
tilan*

*Corallium ad
gale*

& sumere deinceps ad dies quinquaginta, & intermittere diebus. xix. Aug. ita facto donec impleti fuerint dies quibus sumis, ccelxv. Sub cane porro in rotamutato, hoc est hæroxij lulij usq. ad Augustum completum. Abstinentum est à uenere, carnibus maxime porcinis, salisamenis, garo, betæ, dæuce, menta, lachrya coctis, & peponibus: A piscibus captonibus, goibij, mollibus & testa intestis: & ab omnibus leguminibus, & ab omnibus simpliciter crassum succum habentibus, & a uino nigro ac uberiore. Lacent autem quotidie, & exerceant se aut pedibus, aut equo, aut ueliculo. At uero qui siccior habito præditi sunt, hi etiam pleniore uitâ usque rine, non læduntur.

*Antidotus
antitoxica*

Antidotus podagrica. Agapeti.

Folij, rheij barbarici, croci, spicæ nardi, myrthæ Trogodyticæ, collij, chamædryos singul. sextantem, aloes hepaticæ quincuncem, hyperici, peonij, singulorum quadrantem, aristolochiæ longæ, phu, mei, damasij, anagallidis, sing. trientem. Vendi modus id est qui eius que ex corallio constat.

Rheij barbarici

Antidotus Anactos podagrica. Folij, mei, damasij, anagallidis ceculeam florem habentis, rubiæ, masticis, croci, cassiæ, aloes hepaticæ, gentianæ, chamædryos, singul. unc. j. caryophylli, asari, pipertis albi, & nigri, singul. unc. s. spicæ nardi, myrthæ, Rheij barbarici, pisonis radicis, aristolochiæ longæ, & rotandæ, singul. sextantem. Vnus idem est.

*Anactos an
tilan*

Antidotus croci podagrica. Facit etiam ad toxicodictes. Chamædryos dodrantem, centaurij bellæ, aristolochiæ septuncem, gentianæ sextuncem, hyperici quincuncem, petroselinæ Macedonici mentem, mei quadrantem, agariæ sextantem, phu unc. s. Mellis Anici heminas. j.

*Croci an
tilan*

Medicamentum ex vij. rebus constans, ad eadem. Hyperici, aristolochiæ longæ, singul. unc. j. centaurij, chamæphyos, agariæ, singul. singul. quadrantem, chamædryos sextuncem, gentianæ quincuncem. Quidam etiam petroselinæ unc. j. Mellis heminas. j. Datur drach. j.

Passillorum
species

Passilli a bobaculani figura Trochisci nominantur. Species ipsorum in
sunt. Quidam enim bibuntur, quidam per sedem infunduntur, quidam il
linantur. Ex his igitur qui bibuntur, quidam siccus alium, aut sanguinem,
aut alium quandam fluxum, perfrigerando, aut adstringendo, aut meratui
obducendo, aut siccando cohibentes, velut est is qui ex spina Aegyptia co
stitit, & qui ex seminibus, & conlimiles. Quidam dolorem extirpant, aut quod
sensum torpesciunt, velut est croceus: aut quod diffundunt, velut hi qui ex
aromatibus constant. Quidam splenem, aut thener, aut hepatis obturatio
ne liberant, velut est is qui ex amygdalis amaris paratur. Ex his autem qui
per sedem infunduntur, quidam acres humores obsidunt, ut in dysenteria,
velut sunt qui ex pompholyge, & amylo, & terra samia constant, & per pu
suras, aut huiusmodi aliter sive cum infunduntur. Quidam alui aut sangui
nis fluxiones siccant, velut qui ex alumine, acacia, & omphacio, parantur,
qualis est passillus Philippi, aut ex spina Aegyptia constant, qui cum succo
rosarum aut plantaginis infunduntur. Quidam urunt, in dysenteria de pa
scendo proserpentibus convenientes, ex sandaracha, arsenico, calce, char
ta usta compositi, qui cum lentius aut oxys succo infunduntur, intestino
prius multa infusa eloto, ita ut a grossi prius cibum ac potum ac ceperint, ut
ne quid de medicamentorum facultate ad stomachum rapiant. Viles au
tem sunt maxime passilli qui infunduntur, in affectionibus infra umbilicem,
Alios enim vis ipsorum non progreditur. At vero qui illinuntur similes
quidem vis habent cum his qui infunduntur. Verum qui adstringant, ad
herpetas facili, pustulas, inerrigines, sanguinis eruptiones, ulcera fluida,
quemadmodum passillus Andronis, & polydæ. Qui vero obtundunt, car
bunculis & malignis ulceribus conveniunt, velut est albus, & qui ex lota
ris constitit. Qui vero urunt, velut relas, & qui faustiani appellantur, in de
passentibus in pudendis ac ano ulcibus, In pyerigis nem, & carne ex
ercente conducunt.

Aliter passillus

Passillus albus. Croci, opij, castorei, spij, cardui, nardi, acaciae, myrrinae, sigilli
lemni, corticis mandragorae, singulorum drach. iij. anisi, scellit, semi
nis hyoscyami, styraeis singulorum drach. viij. Terito cum uino.

Trigonus pas
sillus

Passillus trigonus. Seminis apij, seminis hyoscyami, singulorum drach. ij.
anisi drach. iij. opij drach. ij. cum aqua terito.

Passillus ex seminibus. Anisi, ammi, sceniculi seminis, singulorum drach.
iij. seminis apij, opij, seminis hyoscyami, singulorum drach. ij. Excipe aqua trita.

Passillus croceus. Anisi, dauci, eretici seminis singulorum drach. iij. myrrinae,
castorei, singulorum drach. ij. croci, opij, singulorum drach. ij. seminis apij, styraeis, sin
gulorum drach. iij. hyoscyami seminis drach. vi. terito cum aqua.

Passillus ex rosis. Acaciae, gummi, floris rosarum, balaustiorum, suc
ci hypocythidis, galliarum singulorum drach. ij. rosarum utridium succi, seminis
plantaginis, singulorum drach. j. Lycij Indici drach. j.

Passillus ex corallio. Seminibus hyoscyami, thuris, singulorum drach.
viij. ceræ samiae, coralli, mingi, opij, singulorum drach. iij. amyli, bala
sticorum, singulorum drach. ij. Excipe succo polygoni.

Passillus ex succino. Physij quincuncem, malliches tridem, ramentu
m electri, tridis, croci, singulorum tridem, opij sextantem.

Passillus ex spina Aegyptia. Spinae Aegyptiae, Rhoeis, thuris, acaciae,
aluminis scissi, succi hypocythidis, gallie, lemnis, sigilli, coralli, symphyti, ter
re assente assente appellantur, aloes, ludani, aequales partes, uino excipe.

Passillus quem Galenus Aphrodisiasticum Clidion inferi bit.

Cytosum mali punice, spinae Aegyptiae, balaustiorum, hypocythidis
succo, acaciae, singulorum drach. vi. Lycij, rhei, ponicij, opij, singulorum drach. iij. myr
rinae drach. ij. Excipe uino myrrinae, aut de cocto rosarum aut myrti bac caris.

Clidion Orbassij. Ad dysentericos, & celsiacos. Gallie omphacitidis
drach.

Aphrodisi
cos Clidion

Clidion or
bassij

drac. viij. opij drac. iij. cū aq̄ efformat̄ et in posita. & iij. aut iij. præbet̄

Pastillus ex cornu ceruino. Ad dysentericos. & sanguinem spurcens.

Cochlearum drach. xij. cornu ceruini uisi, gallæ toste, acaciz toste, singul. drach. v. obol. xij. haecarum myri nigrarum drach. xv. opij torrefacti, succi hypocistidis, singul. drach. v. cenanthes drach. vj. mandragoræ radi- cis succi, terræ sumis asferis, singul. drac. xij. Rhoeis obolonicum drac. xij. malicorij tosti drach. vj. thuris drac. v. vij. picis corticis torrefacti drac. xij. hypocyami feminis tosti drach. x. Rhoeis corticij sextar. ij. uini nigri quantū satis est ad coquendum rhoem, quo uinum crassissimū fiat. Hoc autem per- colato reliqua excipiantur, & pastilli formentur.

Pastillus Amazonum. Seminis apij, anisi, singul. drach. vj. ablinthij *Amazoni p̄u*
comæ drach. iij. myrthæ, pipēris, opij, calicorij, singul. drach. ij. cinamoñi *stilis*
drach. vj. Excipe aqua.

Pastillus ex amygdalis amaris. Anisi, apij feminis, asari, amygdalarum amararum, ablinthij comæ, equalis singulorum partes aqua excipe, & pastillos drach. j. efforma. Dato non febricitantibus cum uino mulso. Febricitantibus cum aqua mulsa.

Pastillus ex erica splenicus. Ericæ fructus drach. iij. pipēris albi, mar di Syriacæ, ammoniaci Thymiamatis, singul. drach. ij. Ammoniacum aceto dissoluitur, & siccis adijcitur, & efformantur pastilli drach. j. Datur autem pastillus unus, cum ueni cyath. j.

Pastillus ex uescarijs. Seminis cucumeris fasciæ decoricati trientē, hysoyami feminis, cicute, singul. sextantes, foeniculi, ramici feminis, croci, nicleorum pineorum, amygdalarum amararum, opij, singul. unc. j. *Phy*
salidum hoc est uescariorum sexpartē, uini quod satis est.

Pastillus Philippi. Ad dysentericos. Balsamiorum, acaciz, succi *Philippi*
hypocistidis, opij, rhoeis, thuris, myrthæ, croci, gallæ, aloes, resæ ponticæ, ma *stilis*
licorij, haecarum myrthi, singul. drac. iij. excipe uino austero, & efforma pa-
stillos obol. ij. Duo non febricitantibus cum uino febricitantibus, cū aqua mulsa.

Pastillus Musæ. Aluminis, aloes, myrthæ, stramentis furore, singul. *Myrthæ*
unc. j. & mali coriherocomagmati, singul. drach. vj. excipe uino.

Crococomagmati preparatio. Croci sestantem, rosarum, amyli, myr *Crococomag-*
thæ, aloes, thuris, gummi, singul. unc. j. colli, spicæ nardi, singul. drach. j. ex- *is preparatio*
cipe uino in crocino oleo enima ista crococomagmati preparatio habetur.

Pastillus Nere, ex libris Heræ. Myrthæ, aloes, croci, singul. drach. *Nere pastil-*
viij. aluminis scissi drach. x. excipe aqua.

Polydixisphragis. Aluminis scissi drach. iij. thuris drach. iij. myr- *phragis p̄u*
thæ drach. v. q̄ stramentis furore drach. ij. cyrtinotum drach. xij. fellæ taurinæ *stilis*
drach. vj. alij drac. xv. j. habent, aloes unc. j. uino austero excipe.

Pastillus passionis. Squamaris aeris drach. xij. æris uisi, salis ammoniaci,
et aluminis rotundi, æruginis rase, thuris, singul. drach. viij. uini q̄ satis est.

Pastillus Andronius. Cytinorum drac. x. myrthæ drach. iij. gallarū *Andronis*
drac. vj. arstholochiz roeandæ drach. iij. stramentis furore, croci, aluminis *pastilis*
scissi, crococomagmati, Mafyos, thuris, singul. drach. ij. Cum uino acerbis
sataceto terito.

Pastillus sanctini. Auripigmenti drac. xij. sandarachæ drach. vj. cal-
cis uisæ drach. viij. chartæ uisæ drac. j. Cum haecarum myrthi facto, aut de-
cocto excipe, & forma pastillos, & per clysterē in sedem infunde, cum bac-
carum myrthi, & lentium, & radicem rufi decocto.

Pastillus ex charta. Chartæ uisæ lib. ij. calcis, auripigmenti, sandarachæ, singul. unc. j. excipe succo plantaginis.

Pastillus thronus Marcellius dictus. Chartæ uisæ drach. x. sandarachæ, auripigmenti, squamaris aeris aluminis scissi, singul. drach. iij. balsamij *thronus mar-*
drac. iij. opij drac. ij. calcis uisæ drac. xx. omphacij drach. j. succi hypocisti- *stilis*
dis drac. ij. uino myrthæ excipe, & efforma pastillos ponderis drac. iij. Et
ubi

ubi coxeris in uino malicorium, & myri baccas, & rosas, ad tertie partis consumptionem, præbe in vi. cyath. vini passillum. j. aut simpliciter drac. iij.

Pastillus ex subere. Gallarum ustrarum, chartæ ustræ, suberis ustris, panacis ustris, singul. drac. x. In alio exemplari habentur etiam cornu ceruini ustris drach. xv. ascripignei drac. ij. sandarachæ, calcis, singul. drac. xv. acaciæ, ceruissæ, singul. drac. v. spumæ argenti drac. iij. Vino uerito.

Pastillus Bithynus. Malicorium drac. x. cadmiæ quadrantem, aristolochiæ, gallarum, radicis panacis, iridis, stramenti fusori, aluminis scissi, chalcitidis, misyos, squamarum, manæ thuris: Aliqui etiam costis, singulorum unc. j. x. Excipe aceto.

Pastillus ex castorio. Ad ulcera, & nomas depascentes, & fluxiones. Croci, aloes, thuris, singul. unc. j. cyathorum, aluminis scissi, castorii, manæ thuris, arguinis raris singul. unc. j. m. Inj. Sinopici lib. j. Excipe uino uerito.

Pastillus ex castorio, ad colicos. Myrrhæ, castorii, sing. scrup. vi. croci, opij, singul. scrup. ix. anisi, feminis apij, feminis dauci, sing. unc. 2. feminis hyoscyami drach. xv. ij.

Pastillus ex uino & oleo. Ad sedem & pudenda. Cerussæ, dextansem, spumæ argenti quincuncem, thuris, terecrementi plumbi, aluminis scissi singul. sextantem. Vino maris experte terito. Vfus autem tempore uino & rosaceo, aut uino & myrteo oleo dissoluto.

Pastillus ex lapide phrygio, ad pudenda. Lapidis phrygij ustri & extinci tergrimum butyro aut rosaceo, secundo uino, tertio melle, sextidem, florum rosarum trientem, malicorium unc. j.

Pastillus ex Leoripa. Ad sedem & pudenda. Cerussæ, amyli, glaucij, croci, aluminis, æquales portiones terito cum succo leoniorum, aut uino.

Pastillus albus. Terræ alutis timentem, pompholygis, cerussæ, amyli, singul. sextantem, opij scrup. iij. Excipe aqua.

Pastillus ex Halicacabo. Spumæ argenti drac. x. iij. cerussæ drac. xj. aut xxi. halicacabi drac. viij. stramenti fusori drac. iij. aluminis scissi drach. iij. Mins ad colorem quod satis est. Excipe aqua.

Pastillus ex duplici ueratro. qui idem etiam ex duplici Acacia. Acaciæ nigræ & fuluræ, glutinis fabris, in alio glutinis piscium, singulorum trientem, ammoniaci, Thymiamatis, glaucij, aloes, singul. sextantem, thuris masculi, ueratri nigræ & albi singul. unc. j. Excipe aceti scissilico, uis autem tem pore eodem, aut eorum communi dissoluto. Illud utq; ante & post balneum.

Pastillus Criogenes. Myrrhæ, aris ustris, aristolochiæ rotundæ, gruginis raris, squamæ stomomatis ferri, verbenacæ rectæ, aluminis rotundi, singul. unc. j. Aceti quod satis est. Verbenacam colligere oportet, quum Sol est in Arietæ. Fit etiam Emplastrum hoc modo. Pastilli, ceræ, colophonis, olei, quales portiones, aceti quod satis est ad terendum pastillum.

Pastillus Melancholicus. Myrrhæ, aloes, squamæ aris ustræ, aut ipij genoi, aluminis scissi & rotundi, iridis, chalcitidis, misyos, salis scissilis, stramenti fusori, cerussæ, nitris, spumæ argenti, panacis radicis, cadmiæ, malicorium, gallarum, aristolochiæ rotundæ, squamæ stomomatis ferri, gruginis raris, singul. unc. j. Aceti quod satis est. Fit etiam Emplastrum hoc modo. Pastilli sextantem, colophonis, ceræ, olei, singulorum sextantem, aceti quod satis est ad terendum pastillum.

Pastillus Pantocollis. Ad chironia & maligna ulcera, Itemq; ad fluxiones. Cassiæ, gris ustris, cerussæ, spumæ argenti, gruginis raris, aluminis scissi, rotundi, liquidis, & laceris, panacis radices, aristolochiæ longæ & rotundæ, malicorium, stramenti fusori, portulacæ, iridis asfragalinidis, chalcitidis, misyos, ammoniaci, Thymiamatis, salis ammoniaci, rubiginis ferri, squamæ gris, aloes, diphygis, thuris, gallarum, sarcocollæ, plumbi ustris, fotoris olei, foreos, myrrhæ, melancholicæ liquidæ, balaustris, spumæ Aegyptiæ, sulphuris uiui, nitri, rhois rubri, rhois Syriaci, chrysocollæ, rhois coctarij, acaciæ, salis spumæ,

Aspicis, omphacis, auripigmenti, æquales singulorum portiones. Cum aceto tertio sibi eam ardentibus, addies xxx.

Pastillus Nymphodoti. Aphronitunc. *j.* natri Alexandrini, saporis gallici singul. unc. *j.* salis Cappadocii, mastiche, gallarum, singul. drac. *ssij.* foliorum rosarum, amomi, amyli singul. unc. *j.* folij drac. jaluminis scissi, costi, singul. drac. *ss.* vini myrtici quod satis est.

Pastillus ex Thapsia, Ad Hemieraniam. Succo Thapsie drach. xvj. ætreat drac. viij. opopanax, euphorbij, singul. drach. vj. natri, succi parthici, singul. drac. *ssij.* piperis, sagapeni singul. drac. *ss.* Aceti quod satis est. Vsa expente, aceto illinito, & post horas vi. lauso. Si vero remissione autur, la, æquali cerato excipe, illine, & per diem ac noctem sine.

Pastillus subditivus, Ad dysenteriam, & ani dolores. Terre Astensis, amyli singul. quadrantem, croci sextantem, acacie, tragacanthæ, sing. unc. *j.* castorei, thuris, lycij, singul. unc. *ss.* In calidioribus etiam opij. unc. *ss.* Excipe succo pyllij, & pastillos oblongos forma.

De pulvis qui inasperguntur, & de Unguentis.

Cap. XIII

Arida medicamenta quæ & puluilli, & cataplasmata ab inspersione uocantur, partim plicibus componunt, partim cuti adhibentur. Ex his quæ ulceribus conueniunt, quidam eam ulcera in carnant, quidam carnem superexerescentem deprimunt, quidam cicatricem inducunt quidam uerunt ac erodunt, quidam sanguinem sistunt. Quæ igitur incarnant, aut fordidâ purgando id faciunt, uelut sunt quæ consistant ex eruo, aristolochia, strychnide, gomace, myrrha, thure, alio aut superfluum humiditatem resiccando, uelut sunt quæ ex are, diphryge, squama aris, charta uisâ, piceo corneo, & ipsa consistant. Hæc autem etiam cicatricem indagant, aut acrimonias & mordacitatem obduendo, uelut quæ parantur ex pompholyge, amylo, cerulâ, fa, fece uini uisâ, lapide speculari, ostrea uisâ, terra Samia, & similibus, &

quæ ex his compolitorum uires habent. At ex his quæ superexerescentem carnem deprimunt, uisâ quidem sunt, quæ ex squama aris, miffi, chalcitide uisâ, & galla sunt. Fordiora autem quæ ex acrimonia sutoria, arugine, miffi, chalcitide non uisâ. Vrenia uero & erodentia, ex calce, & auripigmento, & sandaracha, & fecula, quæ est fax uini uisâ, componuntur. Omnia uero hæc si in tenuissimam puluillum redacta plicibus inaspergantur, minus mordacia sunt. Quibus uero magis crassas partes habent, tam magis mordent. Quæ uero sanguinem sistunt, aut adstringendo, aut perfrigerando, aut siccando, aut meatu obduendo, aut urendo, aut crustum induendo sistunt, quorum materiam in capite de pastillis tradidimus. Porro ex his quæ cuti adhibentur, quidam extergunt & extenuant uelut quæ ex cinobâ, apumice, sabazimento, ordaceo fermento, pponum carne, salis flore consistant, quidam attenuant ac discutiant, uelut ex ueraero, alyonio, sulphure, thapside syluestri, linapi, pyrethro, ronsmarini semine, leuanti de oleo adace, & sepiæ testa parata. Sed & hæc ubi calcem & auripigmentum assumunt cum aliquo humore, pilos aboleant, & singrata sunt: quidam uero capiti adhibentur, ut fluxionem quæ ex ipso deferunt resiccant, uelut sunt quæ ex nitro, sale, galla, mali corio & similibus siccâ. Omnia autem singrata cuti non illine adhibere oportet.

Puluillus Capitalis. Erui quincuncem, tridis unc. *j.* *ss.* mannae unc. *j.* aristolochiæ, squamæ aris, singul. unc. *j.* *ss.*

Alia. Piceæ corticis drac. viij. thuris drach. *ssij.* pumicis drach. *ssij.* aridis drach. *ssij.* resing sicce drach. vj. aristolochiæ drach. *j.*

Puluillus ex aloë. Aloes drac. vj. erui drach. viij. mannae drac. *ssij.* gallicæ drach. *ssij.* aluminis scissi drach. xij.

Puluillus ex fece uini uisâ, Manethonta. Cadmia uisâ & lotæ unc. *j.* terre Astensis unc. *j.* fecis uini uisâ tridentem, lapidis specularia tridentem, thuris tridentem. Quidam etiam amyli tridentem addunt.

Melitera

Nymphodoti
pulvis

Pulvis inasper
guntur
Cataplasma

Eruda

Angustia

<i>Meliscus</i>	Meliscus. Orisassij. Chalcitidis, squamarum æris, gallicæ, balsamorum,	
<i>Orisassij</i>	erui, singul. quadrantem, aristolochia longæ unc. j. malicorij, aluminis scissi, singul. unc. 2.	A
	Puillus ex ostreis. Cadmeæ, thuris, singulorum unciam unam, ostrearum uliorum quadrantem.	
<i>Rhoidarum</i>	Puillus ex thure. Spuma argenti, thuris, squamarum æris, Rhoidarij, amyli, ceruleæ, singul. æquales, portiones.	
<i>Aphroditarum</i>	Aphroditarum puillus. Thuris, squamarum æris, Rhoidarij, amyli, ceruleæ, singulorum æquales partes.	
<i>Radiastrum sanguinum</i>	Rhodia sanguinem siliens, & ad nomas, & carnem super excrefcentem: Gallæ crudæ drac. vj. gallicæ usq; & extindiquino siccæ drac. xij. squamarum nigri, sin minus, rubri drach. viij. stramenti futorij drac. xxiij. aluminis scissi drach. xxvj. terito ad dies sufficientes.	
	Puillus flauus. Chalcitidis usq; drach. xl. stramenti futorij drach. viij. Misys usq; drach. x. æris usq; drac. v.	
<i>Æther pulchellus</i>	Puillus pæurus. Misys quincuncem, gallarum tridentem, chalcitidis sextantem, squamarum æris sextantem, stramenti futorij unciam unam, graminis rasi sextantem.	
<i>Helioscor</i>	Puillus helioscor, id est sole usus, ad mens. Auripigmenti libræ j. calcis siue lib. ij. terito cum aqua in diebus sub cane, deinde siccatis miscor.	
<i>Floridus</i>	Puillus floridus. Cyperi drach. viij. myrris drach. xij. sandarachæ drac. ij. storacis rosarum drac. ij. croci drac. j. crocomagmatis, aluminis scissi, triditis thyncis, singul. drac. h. ij.	
	Puillus ex charta. Ad nomasoris maxime, & ulcera in pudendis. Squamarum æris, chartæ usq; singul. drac. viij. auripigmenti, sulphuris uini, singul. drac. xij. plumbi usq; drach. vj. Ad humiores putredines utere sicco. Verum ad siccas rosaceo subacto. Quandoque etiam melle cum rosaceo.	
	Puillus ex oxymyrrine. Ad eadem. Rhois centarij sextantem, foliorum oxymyrrines, sandarachæ, singul. drach. viij. foliorum salicis siccorum, malicorij, singul. drach. vj. aluminis scissi, chryso-collæ, aloes, chalcitidis crudæ, squamarum æris, auripigmenti, salis communis, sing. drach. iij.	
	Puillus Massaliotæ. Nisi rosti, chryso-collæ, lapidis Asij, sandarachæ, misys, chalcitidis, aluminis scissi, diphrygis, singulorum æquales partes. Vire sicco.	
<i>Aesculapian pulchellus</i>	Smegma aridum puillus Aesculapian. Baccarum lauri, nisi Alexandrinæ, salis triditis, salis cappadocii, ammoniaci Thymiamatis, aphronitri, pomiciæ, sing. lib. j. ueratri nigri, herbarum lanariæ, pyrethri, fetulæ, quæ est sex uini usq; staphidis sive sistris, sinapis, cyperi, aluminis scissi, floris tunc odorati, triditis, gallarum, singul. sexuncem, simplicis lib. j. feminis ulicis, pulegij, sanina fabacæ, & lupulorum, singul. sexuncem, chamæleontis nigri, sulphuris, gummi, thuris, pipenis, cucumeris sive sistris radicis, marturij, colicæ, pæoniæ, testæ sepiæ, feni graeci, folij, costi, cumini, euphorbij, (postea nardi, singulorum quadrantem. At Alexander etiam hæc addit. Salis ex niri fontibus, salis tragacij, sing. lib. j. adarces unc. j. aluminis liquidi, celticæ, cnicæ, grani Cnidij, graminis sicci, bryonis sicce, sing. quadratæ.	
<i>Alexander modicus</i>	Smegma peponaton. Thuris, mastiches, ammoniaci thymiamatis, singulorum unc. j. tragacanthæ unc. j. s. succi uinæ acerbæ, drach. iij. seminis recentis, quadrantem, semidialis sextar. v. ouorum albumina, xxi. triditis tridentem. Quidam etiam uratri nigri sextantem.	
<i>Peponaton purpureum</i>	Aliter, Critonis.	
	Lomensi modum. j. simlaginis sextar. iij. trifolij, myrobalani, triditis thyncis, singul. lib. iij. ammoniaci Thymiamatis lib. j. costi lib. j. ouorum albumina. vj. peporum carnis sextar. ij. succi uinæ acerbæ sextar. ij. Melle & efformata pastillos sicca. Deinde tuis cribratis utere.	
	Aliter. Tragacanthæ, thuris, mastiches, ammoniaci Thymiamatis, singul.	

singulorum drach. x. fuc ei uua acerbor drach. v. semilaginis sextar. v. albu-
 A mēis ouorum unc. j. peponum carnis decrantem. Præpara ut dictum est.

Smegma caput fluidum refectans. Nuri Alexandrinifuli quincun-
 cem, silis communis colli unc. j. x. silis cappadoei unc. j. Hæc accito aceri
 moribacila in facculum lincum misto, & unto in camano, donec ad carbo-
 nescere digantur, deinde refrigeratis ac vitis affricando utere, uinum adstil-
 lans in balneo.

Sapo Constatini. Rosarum siccarum, aloes, gallarum, malicorij, ma-
 labachi, sacro colli, singulorum, quadrantem, balsastiorum, myrrhe, sin-
 darachæ, spice nardi, singul. sextantem, colli unc. j. saponis Gallici lib. unā
 Excipe dec octo lupinorum.

Puluis depilatorius, podagricus. Mastiches, thuris mastulæ, phi-
 dis syluestris, uersorii albi, spumæ argenti, singul. quadrantem, solis, amyli,
 uersarii nigri, flos is lapidis Alij singul. unc. j. haleyonij, puniceis colli, cimo-
 liz, simplicis, singulorum quadrantem, spice nardi unc. ita in unam, Quidā
 etiam aloes unctam unam. His cōnectis, puluillum in uase differato. Vix aut
 tem exasperante, oryxæ & psilane fuc cum in ollam mitte, & postquam effir
 fuerint inijce puluilli unc. j. & saponis Gallici unc. j. & auripigmenti, alume-
 nis colli, singul. onctas unā, & sandarachæ unctam unam, & calcis vitæ re-
 centis libram unam, Vtatur illitione ter in mense, discunt nono, decimo
 nono, & uigilino nono, per annum unum. Post hunc semel in mense,
 xix. lunæ die.

Illitio cutis. Crp. XIII.

Q Vanto rarior ac mollior cutis, est superficies tunc in ore, in tantum
 etiam stomaticeorum quæ oei allinuntur medicamentorum usus euan-
 at. Ab initio igitur inflammationis, medicamentis id quod insitit repe-
 lentibus opus est, qualia sunt arida quidem, omphacium, galla omphacitis,
 thois succus & hypocyssidis, alumen, piceæ & thuris cortex, balsastia, &
 in se uena omnia adstringentia, excepta indacunda & uenenois facultate.
 Liquida uero, succus mororum tam rubi, tam eorum quæ sycamina appe-
 lantur. Nunc item uisidum corticis succus, & malorum puniceorum ma-
 xime acidorum, & malorum cydoniorum, & mustum aminarum. Mel autē
 in principio, ut permanent ac durent solum medicamenta miscetur. Quis
 uero consistenter humor, concoquentia & moderate disculentia ammiscen-
 da sunt, qualia sunt crocus, & myrrha, & radices dulcis succus. At per totū
 hoc tempus quod inter usgorem ac declinationem intercedit, mixto quodā
 ex ambobus opus est, quod & repellat, & discutiat, ac primum quidem pe-
 ualeant repellentia, deinde disculentia. Verum in declinatione solis discu-
 lentibus citra adstrictionem utendum est, qualia sunt nitrum, & aphroni-
 tron, origanum, hyssopum, Thymus, calamintia, iris, belisi, & similia. Li-
 quor autem tunc siueon, id est sapa situm, quæ ex musto cocto, tam quæ ex
 canicis & palmulis fit, & ipsum mustum dulce cum melle. Quam uero ue-
 lux reliquæ superfuerint inflammationis, etiam sulphur uisum ammiscen-
 dum est. Coquere aut primum oportet liquorem cum melle, ad mellis liqui-
 ditatis ipsitudinē. deinde sic arida lenissime trita inspergere, & postea mo-
 derate coquere, donec oia exacte unita fuerint, & tunc uinctis usis excipere.

Illitio stomatica ex moris, simplex. Mororum succi sextar. ij. præto
 quito in tercia pars consumatur, & mellis sextari. j. adfecto, ac coquito ad
 crassitudinem mellis.

Stomatica ex moris, composita. Mororum succi hominas vj. coquis
 so ad strigam entitatis ipsitudinem, deinde trita ammisceto, croci dra. b. j.
 myrrhe drach. j. succi uua acerbor drach. j. aluminis scilli obol. iij. mellis he-
 minam. j. Et ad ipsitudinem coquito.

Stomatica ex moris rubi. Sed & ex rubi moris illitio stomatica simi-
 liter preparatur, & magis adstringit.

Sapo Constatini

Podagricus
 puluis depi-
 latorius

Stomatica quæ
 syc

radice syci
 ratio

Sicca sapa
 sapine

Stomatice illi-
 tione rubi

Stomatica ex nucibus simplex. Nucum utridum corticis cōnusi fac
ci hemi. v. Mellis hemi. j. Coquantur uelut ea quæ ex mōis fit.

Stomatica ex nucibus composita. In principio quidem & uigore in
flammationum in ore, ad prodeciat mensuram succiac mellis, ammalicere o
portet croci & aluminis singul. drach. j. myrrhē drach. ij. Verum in declina
tione ad discutiendum mien drach. j. sulphuris drach. j.

Stomatica ex succo malsupinici. Malorum puniceorum nucleos non
habentium dulciani succi sextar. iij. malorum puniceorum acidorum succi
sextar. ij. mellis sextar. j. myrrhē Māngg drach. viij. crocomagmaris, gallæ,
singul. drach. viij. aluminis scissi drach. iij. triditis llyncæ drach. viij. ompha
ci drach. vi. præparata uelut ea quæ ex moris fit.

Eadem aliter. Malorum puniceorum unā cum putamine contusorū
succi sextar. vi. Mellis hemi sextar. j. aluminis scissi unc. unam, myrræ unc. &

Stomatica ex mulla. Mulla sextar. vi. gallæ, aluminis scissi, sing. drac.
ij. croci, myrrhæ, singul. drach. j. Siquidē mitigare uolēs, dulce sit mullam.
Si uero repellere, austera. Quod uero medium est, mediam quo damus
de inter hæc utin habet.

Stomatica Aegyptia. Mellis lib. j. olei bellēm, terebinthīnæ sextar.
sem, croci drach. iij. in duplēt liquantur: uase.

Stomatica ex balsa. Seminis anisi, seminis apij, floris iunci odorati,
seminis amomij aluminis scissi, triditis llyricæ, balsa quod alicui harmala uo
cant, Est autem una syluestris, cinamomū, myrrhæ Trogodynicæ, croci, gal
læ, sing. unciam unam, aristolochiæ longæ, cassiæ, crocomagmaris, rosarū
siccarum, sing. unc. iij. unā, costi, cineris hirundinū recentis, sing. quadrantiū,
nardi Indici, amomij, sing. unc. & Mellis quantum satis est.

Incantatio ex uale potione.

Cap. XV.

Incantatio simulq; unā ex potione ea, partim ex uno componentur, infectis
in ipsum speciebus quib; uisum, uelut pipere, ab sinthio, cassano, & pluri
bus alijs ex quibus etiam aliquādo appellaciones accipiunt, quandoq; mel
le ammixto, quandoq; non partim ex aqua, in qua decoquuntur mala aut
rosq; cum quib;dam succis, uelut uiscer acerbis, malorum puniceorum, myrris
baccarum. Ammalicetur his mel optimū de spumantem, & conseruatōis.
& iucunditatis gratia, quandoq; etiam uisitatione. Excepto austeris & uinolo
hydromelo, quod in paruis uasib; Cebryra affertur. Hoc enim noui etiam ci
tra mel parari, quemadmodum rursus Apomeli ex melle solo & aqua, citra
aliam aliquam substantiam. Sed & quæ ex uino componentur, quæ sanie
propomata appellantur, mellis de spumanti sextar. j. ad quatuor uini sextari
os accipiunt, & componentur ita ut non coquantur. Quæ uero ex aqua &
succo parantur, si quidem coquantur, unum mellis ad tres liquoris accipit
eius, quod serē partes in coctura consumantur. Si uero non coquantur, unum
mellis ad duos liquoris accipiant. Quæ uero non coquantur, eis omnino in
solare satis diu oportet, & maxime omphacomeli. Coquere potuō eas quæ
ex aquis sunt conuenit, eo quod propter debilitatem facile morantur. Om
nes autē testacis uasis paruis picatis excipere oportet, ea q; probe cooperta
reponere in locis supra testacis ad concoctionē. Venti autē est attentam
ribus, et aqua probe permixtis. Omphacomeli uero possit effertuerit uelut
mullū, & rursus qui euerit, tunc operire oportet. His igitur quæ ex uino co
ponentur, in non febrientibus uel in urina xine, aut solius uoluptatis gratias
exceptis his quæ ex scammonia, aut grano crudio, aut huiusmodi purgato
ris parantur: aut citā gratia affectioni eiusmodi, in quibus etiam medicā
menta ipsi infecta per os sumere quis possit. Quæ uero ex aquis aut succis
quib;dam, in febrientibus, quandoq; uelut iuranda, et odinena, quā
morbus non permittat ipsis ex uino uantur, quandoq; citā prout affectioni
bus conuenit, quemadmodū Apomelin, ad educendum spūm, aut moran
dum urinā, aut molliendā aluum, aut attenuandū humorem hydromelo &

hydro,

Expositio quid sit
Stomatia

Incantatio uale
& incantatio

Incantatio uale
& incantatio

Apomeli

Propomata

Apomeli
Incantatio

Aqua pluvialis
in

mr. Contereere natem oportet affuso humore non acutissimo, ut ne metalli ca
subsidant, aromata autem supematent, sed paulatim ut ad strigmentorum
modum conterantur. Sit autem aqua pluvialis, tam ob partium tenuitatem
non ob moderatam plus adfrictionem, nisi non vino aut succo quodam re-
rantur. Et rursus contereere oportet metalli ca quidem multo tempore. Que
vero ex succis constans, modico. Possremum vero post sufficientem leuiga-
tionem, adijciendam est gummi, & efformate malix reponende in apcis
aut ulcers usilis. Vuendum autem his que ex succis constant sicutis. Metalli
ca vero temporis tractu meliores fiunt. An vero arida collyria quaedam con-
sumunt ac extende callos, ficus, pterygia, & scabritias, que ex chalcide &
arugine, & mly componuntur. Quaedam lachrymas ducit, obnurationibus
& hebetudinibus usibus convenientia, que & ex his, & expipere ac spica nar-
di consistunt. Quaedam preferunt, eo quod infusiones ab oculis arceant, ut
lute sine que ex phrygio lapide, & lirocolla, ghuco, aloë, cadmia, silibio
& croco parantur. Asph hoc omnia in tenuissimum pulvum trita ac leuiga-
ta oculis adponantur. Ceterum liquida collyria parantur quidem ex melle
Autico, opobalsamo, oleo quod tenuissimum paritum est ob vetustatem, sicut
casi succo, selle diversorum animalium, succo cyrenatico, & pluribus alijs.
Commodum autem ad usus hebetudinem, & suffusiones incipientes, aut
manas, calceasida, & purgaria. Vuendum aut & his, & omnibus acribus,
capite nō repleto, in sereno, puro, horeali, non ualde frigido, neq; minus
calido aere non ambiente. Porō que agglutinatoria appellantur, parantur
quidem ex mearis obducenribus, & glutinantibus, & cōstringentibus, aut
frigidicantibus, aut adstringentibus, aut siccantibus, uelut est pollen, man-
na, terra semia, mirra, cochlœ, acacia, opium, cum oui candido. Agglu-
nantur aut fronti, in quibus nō sub calumia humor, sed extrinsecus colligit.

Agglutinatoria
in

Collyrium Monochemeron. Ad incipientes & ueteres lippitudines.

Acacie drach. xxxvi. gummi drach. xxxij. cadmia drach. xxiij. xris usti &
loti drach. viij. opij drach. j. Vno aulero terito, distans & sicca.

Collyrium Chitum. Minor lippitici, gulle emphacitidis, croci, rosa
rum nouarum exunguis floris, quem drylaco uocamus, gummi singul. quā
dracem, opij, unc. i. Vno Amiaqo aut phalerio, aut chio aulero terito.
Sit autem unum inaris exors.

Tylos in
in

Collyrium Cygnarium. Cadente nistæ & lotæ sextantem, cerussæ lotæ
trientem, pompholygis trientem, amyli sextantem, tragacanthæ, opij tot re-
sisti, gummi singul. sextantem. Aqua pluvia terito.

Cygnus Fulvus. Cadmia uisæ & lotæ sextantem, terre asteris sextan-
tem, cerussæ trientem, pompholygis bellæ, amyli sextantem, opij sextantiæ
acacie, tragacanthæ, singul. unc. j. gummi trientem. Aqua pluvia,
Cygnus albus. Cadmia unc. xv. cerussæ unc. xvij. opij drach. viij. thuris
drach. vij. amyli septuicem, gummi drach. xij. Aqua pluvia.

Pelatio

Pelatio ad ulcera. Cadmia, cerussæ, singul. drach. xxiij. acacie, opij,
singul. drach. xvij. gummi, tragacanthæ, amyli, singul. drach. ix. amyrrhæ,
drach. iij. crici, singul. drach. j. s. Aqua terito.

Collyrium Fuscū Ad supparatos oculos, & magnas affectiones. Cad-
miæ trientem, drach. xxiij. cerussæ drach. xvi. gurgula rasi drac. xij. silibij drac.
viij. aluminis scissi drac. iij. chalcididis uisæ drach. iij. nardi Indici drach. iij.
emphacij drach. iij. xris drach. j. squame xris drach. viij. bructu xris drach.
xij. succi papauis drach. xxiij. croci drach. iij. castorei drach. iij. mirhe
drach. viij. Indici, acacie, gummi singul. drac. iij. rosarum recentis drac.
iij. s. Vno Palermo aut Surrentino, aut Amineo, aut Chio aulero terito. Illi
minuter in die, a quoqum cum fecis græci succo dilutum, deinde cū ouo aut
lacte. Postremum cum aqua, crassius.

Collyrium ex decoctis. Cadmia unc. xvi. cerussæ bellæ, amyli, o-
pij, tragacanthæ, acacie, singul. sextantiæ, gūmi sextantæ, Terito cū decocto
rosarum

rosarū siccatū, mēliloti, capium papaveris, glycyrrhizæ, pari sing. mēfura.

■ Collyrium ex hydnis, id est uale aquario, Repellitum. Tū qui in uasis calcisctoris anq̃is reperitur lītis. itē cadmizæ aliæ & lotæ lib. j. p̃cruffæ lotæ, pompholygis lotæ, terræ aſteris lotæ, ſingul. ſextuncē. thuris uñco, j. myrrhæ uñc. j. ſucci ſeminis liti, pſylli, piſſanz, ſceti græci, ſingul. lib. j. tragacanthæ, ſexuncem, gummi lib. j.

Collyrium Nilantonis. Cadmizæ unc. j. pompholygis triuncem, ſceti ſe lib. j. tragacanthæ, gummi, opij, ſingul. ſextuncem. Aqua phoria.

Collyrium Spodiaceum. Ad inflammationes, fluxiones, & Chemoſes. Theris, ſibij, ſingul. drach. c. cadmizæ, ceruſſæ, ſingul. drach. xxiij. terræ Sarmizæ, ſucci papaveris, ſingul. drach. alij gummi drach. v. Terſiſtum olei ſa morſi ſucco. Hinc autem ſaccum ſic facito. Tenētiſ oleæ ſoſta lota, in morario moderata aqua effuſa tandito, & per lītzeolum exp̃mitit.

Collyrium ex oleæ ramulis tenerum. Theris drach. iij. ſibij drac. xv. cadmizæ drac. xxvij. ceruſſæ drac. xlii. terræ Sarmizæ drach. xv. opij drac. vi. gutti drac. j. plumbi uſti & loti drach. viij. Excep̃ ſucco ramulorū oleæ.

Collyrium ex oleæ ramulis ſaluum. Aens uſi drach. xij. ſandycia unc. xxiij. Poliorum oleæ ſextuncem, opij ſextuncem, gummi dextanem, Vinū ſpodiceum Amingo excipe.

Collyrium ex myrrha Claudioacum. Glaucij, ſarcocollæ, ſingul. drachi xviij. croci drach. xxiij. opij, myrrhæ, lapidis hematitæ, ſingulorum drach. mas. v. tragacanthæ drachmas xviij. gummi drachmas xvi. Vinolatico excipe. Vius eſt cum oſo.

Chlorium
teſtione,

Aliud ex myr ha. Ad Rhydas & Aegylopa. Cadmizæ lotæ, lapidis hematitæ loti, ſingul. drach. xxvij. myrrhæ, ſpodij cyprij, ſingul. drachmas. xxiij. opij drach. viij. croci drach. iij. Alij drach. viij. ſabote. Piperis albi grana. xxx. gummi drac. xvi. Vino latico excipe. Vius eſt cum oſo. In re cendit uſus aquoſum adhibetur.

■ Collyrium Scariſicon, proſechij. Cadmizæ, gummi ſingul. drach. xx. ſi bi j. atramenti ſutorij, ſingul. drach. viij. opij drach. xliij. æruginis rafe drach. x. piperis albi drach. vi. croci drach. viij. myſios crudi drach. viij. opobalfamū drach. iij. Aqua.

Scariſicon
ole
brum

Collyrium Hygidiū, Ammonij. Cadmizæ, æris ſingulorū drach. xvi. ceruſſæ, caſtorij, aloes, croci, ſingul. drach. iij. ſquamæ drac. v. roſarum ſtoris, pſambū uſi, ſingul. drach. v. iij. lycij drach. iij. lapidis ſchilli drach. iij. opij drach. x. acacie drach. xl. gummi drach. xviij. Aqua.

Hygidium

Collyrium Olympiacum, aut Olympiæ. Acacie, ſpice nardi, thuris, ſingul. drach. viij. æris uſi ac loti, ſibij uſi ac loti, cethuſæ uſiæ ac lotæ, cadmizæ, ſingul. drach. xij. myrrhæ, opij torrefacti, ſingul. drach. iij. croci drach. v. æruginis rafe drach. iij. lapidis ſchilli, ſquamæ rubræ, ſicij, ſedicti, omphacij, ſingul. drach. j. caſtorij, ſtoris roſarum, ſingul. drach. ij. palmularum drac. iij. oſis palmularum uſis numero. v. gummi quincuncem. Aquaplumia. Verum in aqua macerentur per tres dies ac noctes, calami aromatici, ſeminis hyoſcyami, roſarum ſiccatum, ſingul. drach. iij. ſolij drac. j.

Olympicum
collyrium

Collyrium Nardineum. Cadmizæ, croci, gummi, ſingul. drach. xxxvi. æris uſi drach. xviij. ſibij acetizæ, ſingul. drach. xxx. nardi Syriacæ drach. xij. opij, myrrhæ, ſingulorum drach. xvi. Aqua.

Collyrium Theodoteum parum. Sibiſacacie, ſingul. drach. xx. æris uſi drach. viij. ceruſſæ drach. iij. myrrhæ drach. iij. æruginis drach. j. aloes, ſucci papaveris, lycij ſingul. drach. j. Aqua plumbia.

Theodoteum

Collyrium Rhitarion. Lapidis hematitæ, lapidis ſchilli, ſingul. drach. xvi. æris uſi, cadmizæ, æruginis, ſingul. drach. viij. opij drach. v. chalcocitis drach. ij. gummi drach. viij. Vino.

Rhitarion

Xyſter. Pumicis uſi, mſyos uſi, oſiæconum uſtorum, ſingul. ſexuncem, æm, cadmizæ, opij, chalcocitis uſiæ, croci, aloes hepaticæ, caſtorij, ſolij, lim.

Xyſter
colly
rium

E 1 gul.

gul.drach.ſ. ſibij, acacie ſingul.unc.ſ. xris uſi i orientem, myrrhe Troglo-
dytica drach.iiij. ſpicie nardi drach.ſ. ceruſſe drach. viij. gummi drach. iij.
Aqua pluua. Quidam etiam unum miſcent.

Hecatombe

Hecatombe. Ad cicatrices craſſas. Cadmitæ uſe & lotæ, æris uſi ac lo-
ti, ſingul. drach. viij. ſibij uſi, acacie ſulug. gummi. ſingul. drach. xv. aloes,
gallæ, æruginis uermiculatæ, caſtorij, lycij, ſpicie nardi, croci, opij, myr-
rhe, ceruſſæ, tragacanthæ obſcæ, chalcitidis, ſingul. drachimam.ſ. roſarum drach.
lx. Aqua pluua.

Collyrium ex cornu. Ex Galeno. Plumbi uſi, cornu ceruini uſi, ſin-
gul. ſextantem, ceruſſæ, ſquamæ æris, amyli, thuris, teſtæ ſepiæ uſiæ, ærugi-
nis, myrrhe, gummi, ſingul. unc. ſ. Aqua pluua.

Collyrium ex thure. Thuris ſextantem, cadmitæ, pompholygis, terre
aſteris, amyli, gummi, ſingul. quadrantem, ceruſſæ ſextantem, ſquamæ æris
trientem, tragacanthæ trientem, opij ſextantem, Aqua pluua.

Libyanum

Collyrium Libyanum. Cadmitæ loq. amyli ſingul. drach. xij. ceruſſæ
drach. xij. ſpodij, pompholygis, terre aſteris, plumbi uſi ac loti, tragacan-
thæ, ſingul. drach. viij. opij drach. xij. gummi drach. iij. Aqua pluua & oſo-
rum. xx. albumina. Quidam etiam myrrhe drach. iij. addunt.

Aſter Colly-
rium

Aſter. Magni. Pompholygis, cadmitæ, ceruſſæ, ſingul. drach. x. vi. plū-
bi drach. viij. amyli drach. xviij. thuris drach. x. terre aſteris drach. xij. myr-
rhe drach. ſ. tragacanthæ, gummi. ſingul. drach. viij. Aqua.

Vranium

Collyrium Vranium. Terre Aſteris lotæ quadrantem, ſpodij loti,
unc. ſ. gummi trientem, ſibij uſi ac loti ſextantem, ſquamæ lotæ unc. ſ. opij
drach. vi. cadmitæ uſiæ & lotæ drach. ſ. Aqua pluua. Incarnat & repellit.

Collyriū ex foeni graeci ſucco. Cadmitæ, Tragacanthæ, ſingul. beſſem,
ceruſſæ unc. xxx. amyli unc. xxx. opij unc. ſ. cum ſucco foeni graeci terito.

Collyrium Cleonis. Pompholygis, plumbi ſingul. quincuncem,
croci unc. ſ. ſquamæ ſomomatis ſext. unc. ſ. gummi ſextantem. Aqua plu-
ua. Illinatur aequalum.

Collyrium ex roſis unclatum. lxxij.

Roſarum nitridium unc. lxxij. cadmitæ uſiæ & lotæ drach. xxvij. ærugi-
nis rafe drach. ſ. ſpicie nardi drach. ſ. ſquamæ æris lotæ drach. ſ. ſibij uſi ac
loti, opij, myrrhe, ſingul. drach. iij. croci drach. viij. amyli drach. ſ. gummi
drach. xxiij. Aqua pluua.

Collyrium album ex roſis. Cadmitæ uſiæ & lotæ, ceruſſæ lotæ, ſingul.
lib. j. amyli, opij tragacanthæ, ſingul. quadrantem, aloes unc. j. ſ. gummi qua-
drantem, croci unc. j. roſarum exanguium ſextantem. Aqua.

Collyrium ex aloes. Cadmitæ, ceruſſæ, aloes ſingul. dextantem, roſarum
nitridium ſextantem, amyli quadrantem, opij unc. j. tragacanthæ ſextantem,
gummi quadrantem, Aqua pluua.

Crocinum col-
lyrium

Collyrium Crocinum ex roſis. Spicie nardi, roſarum ſecarum, alo-
es ſingul. drach. ij. hyoſcyami albi drach. ſ. croci drach. iij. ſ. glaſci ſextan-
tem, ſarcocollæ ſextantem, opij drachmas ij. tragacanthæ unclam. j.
Aqua pluua.

Collyrium Nili ex Roſis. Roſarum tenerarum drach. iij. croci drach.
ſ. pappæris obol. j. gummi drach. iij. Aqua pluua.

Lyncus

Lyncus uſum i cura. Cadmitæ, æris uſi, ammoniaci Thymiamæ-
tis, ſingulorum drachmas. xij. myrrhe, lapidis hematite, opij Thebaici, ſin-
guloſi ſextantem, aloes hepatidis, ſellis taurini, gallanæ, ſagapeni, ſingul.
drach. iij. æruginis rafe, opopanaeis ſalis ammoniaci, ſingulorum drach.
ſ. gummi drach. vi. Aqua pluua.

Procer

Procer ad eadem, & cicatrices attenuat. Cadmitæ, ceruſſæ, chalciti-
dis cruda, ſingul. drach. xl. piperis drach. j. ſ. ſucci Cyrenaiſi drach. viij. cro-
ci drach. xij. opij Thebaici drach. x. ſagapeni drach. xij. oleæ Archopiciæ
drach. xij. auripigmenti, aluminis caſſi, ſingul. drach. viij. myrrhe drach. xij.
ammar

ammoniaci Thymiamatis drach. xx. opopaneis drach. xvi. opobalsami drach. x. gummi drach. xx. Aqua pluvia.

Collyrium ex succo foeniculi. Cadmiz drac. xvij. atramenti Indici drac. xvi. piperis longi drach. xij. & albi drac. xij. succi cyrenaei drach. viij. opobalsami drach. vi. spicis nardi drach. vi. sagapeni. opopaneis. singul. drach. v. opij drach. iij. euphorbe drach. j. gummi drac. j. Terito cū succo foeniculi.

Collyrium ex opobalsamo. Cadmita, cerussae, singul. drach. viij. omphacj drach. iij. piperis albi drach. xvi. opij drach. iij. opobalsami. gummi singul. drach. xvi. Aqua pluvia.

Thalassius. Cadmita bellem, iruginis sextantem, atramenti Indici bellem, piperis albi trientem, succi Medici unc. j. opobalsami sextantem, gummi sexuncem Aqua.

Collyrium Hematis. Ammoniaci Thymiamatis, xris usit, corticis thuris. singul. drach. iij. iruginis drach. j. gummi drachmas. iij. Aqua pluvia.

Collyrium Malabathreum. quod & Ilotheon. Cadmita drach. xvi. xris usit & loti drach. xij. opij. lici Indici. malabathri. nardi Indici. croci. aloes. singul. drach. ij. callosij drach. viij. mirrhæ drach. iij. cactæ sibiij. singul. drach. xl Aqua. Vnus cum ovo est.

Collyrium crassius ex uino. Cadmita lapidis hematis & schisti. singul. drach. iij. xris usit drach. xxx. chalcididis drach. xxx. seminis papaveris drach. xij. papaver aqua feruifacito, & expressum succi adjecto, & uino spatulæ aut Ammino terito.

Aliud ex uino. Acris usit, cadmita placitidis, singul. drodrantem, lapidis hematis loti sexuncem. croci. mirrhæ, aloes, ammoniaci Thymiamatis singulorum quadrantem. lici Indici, spicis nardi. singul. unc. x. piperis albi grana. clacactæ fulgæ drodrantem, gummi quadrantem, Vno salerno aut Ammino terito.

Collyrium ex duobus lapidibus, ad aspritudines. Lapidis hematis, & schisti. cassiæ. singul. drach. xvij. xris, cadmita, opij, iruginis rasæ, singul. drach. ix. gummi drach. ix. chalcididis usit drach. vi. Aqua.

Collyrium aridum præteritum, Galeni. Lapidis phrygi in remes partes conculsi, & usi in ossibus donec partes ignescant, & butyro non ueteri extitit, deinde rursus similiter usit & uino salerno extitit & terito usit & melle extitit & ac siccat lib. j. gris usit, piperis albi. folij, singulo. unc. j. sibiij. unc. j. s. Et ubi omnia leuigata fuerint, & reponere pharvacum uoles, succi balsami nō crassū probit et enim hic artus fieri medicamentū: sed lucidissimi unc. j. adjecta. Utendum autem est ipso, solis palpebris tacto specillo, ita ut tunica non attingantur, sed solas palpebras apertas medicamentum contingat. Sublinendumq; est non semel, sed saepe, ante & post cibum, & magis ubi iam sensu percipitur lipitudo. Mirū enim est quomodo præteret pta omnibus alijs medicamentis.

Collyrium aridum ex croco.

Sarcocollæ drach. viij. croci drach. iij. glaucij drach. iij. Saepe sa die illinito. Quidam etiam aloem addunt.

Aliud aridum. Ad lipitudinem siccat, scyosia, putredines & super excrecentem carnem. Cadmita drachmas. x. chalcididis drachmas. x. piperis grana xv. nardi cellicæ drachmam. j. Cadmita & chalcididis terito cum uino, & ubi resiccata fuerint, reliqua adjecto, & in tenuissimam puluillum redigito.

Collyrium liquidum ex Caulicido. Succo caualidis, chamædrys coronopodis, quondoc etiam othonnae, aequales singulorum portiones. Est autem othonna chelidonium magnum.

Aliud Ad Sycofes, & ulcera in angulo oculi magno, & carne excrecentem. Misyos to sit drach. vi. atramenti loticij drach. iij. mellis Attici sextar. j.

Collyrium liquidum panchrestos Erasistrati, admirandum uim habet

E + ad

Thalassius

Hematis

Collyrium

Collyrium ex lapide phrygi

Collyrium

Collyrium

ad oculos affectiones, non illas, pudenda, & aures permanentes. Aeris drach. vi. myrris tolii, myrris singul. drach. iij. croci drac. j. s. piperis drac. j. Vini chii & paili cretici, singul. heminam. j. s. Omnia cum vino tereto donec arida evaserint, & infuso pailo coquito ad mellis spissitudinem.

Adglutinatoria oculorum humore infestatorum. Terre Samiæ, mastice, thuris, myrris, æquales partes ceteri candido exceptas, & linteolo ita ductas, fronti impoñito.

Aliud. Hyoscyami seminis drachmam. j. opij drachmam. j. myrris drach. ij. croci drach. j. pollinis drach. iij. osorum assatorum utiiles duas. Qui albumine excipito.

De Emplastris, et his que in cætera ipsorum mittuntur, Et Anaplasta de cere ad oculos ostenda mola, Cap. XVII.

Ex medicamentis que in emplastra mittuntur, quedam sunt Terrea, ut lutum metallicum, & lapidei ac terree species, feces, cinis, cœchyli. Quedam oleosa: quedam lichyrina, quedam liquidabiles: quedam succi, partim spissi, partim liquidi. Semina vero, & herbas, & radices paucas recipiant. Ipsa autem Emplastra partim sunt vulneraria, quæ inde quod cruentis vulneribus competunt, cruenta appellamus, itemq; glutinatoria, & stractura. Hæc ex siccantibus non sumunt, sed secundi ordinis complent, & tereti incipientis componere oportet. Qualia sunt salix, quercus, cupressus, piceæ ac pinus cortex, myrris, drus, huiusmodi, aloë, aristolochia, cinis samentorum uisæ, cerussa, spuma argenti, & plura ex metallicis. Coquantur aut ad cœpagæ manus non inquinantem, partim vero cicatricem inducunt, quæ etiam ipsa ex siccantibus componuntur, efficacioribus quam glutinatoria habentur, luteum res utrum, & squama ipsius, & ferri tergo, chalcitis, flos zæcis utrum, alum. en. galla, plumbago, cadmia, pumex, & cœreacca. Partim discussoria, ex calcæcentibus ac siccantibus moderate, utrum Aristolochia, thapsia, olei uentis & raphaninum, mel, opoballinum, pice, terebintina, galbani, sal utrum, salis flos. Partim mollitoria, ex spuma argenti, & adipibus, medullis, oleo ueteri, propoli, ammoniaco, styrace, galbano, bdellio, mastiche, cerobindina, altheæ & cucumeris fluctuata radice. Partim siccantia, ex sulphure, nitro, sale, cinere, ex bitumine. Partim attractoria, ex sale, nitro, propoli, virgine, fermento sit ercoribus, sulphure, terebintina. Partim concoctoria, ex cera laudanda, nua passa, anomo, croco, thure, pice, mastiche, Aegyptia, styrace, myrris, galbano, butyro, cœpyo, adipe, virgine. Partim suppuratoria, ex aqua & oleo, polline, pane tritico, calice, butyro, adipe sullo ac uulino, thure, pice, resina. Partim mitigatoria, ex spuma argenti, cerussa, oleo, anetho, chamæmelo, amylo, cera alba. Porro cruenta emplastra recentibus adhuc vulneribus ac fracturis imponere oportet, ita ut auxilium insuper ipsi feramus, spongiæ postea madidæ supra ipsa splentia deligatur, & tertio quoq; die solvamus, rursumq; eadem splentia, & non alia imponamus. At mollitoria, attractoria, discussoria, insuperq; concoctoria, & suppuratoria, post cataplasmatum & ceratorum usum adhibeantur. Mitigatoria vero etiam ab initio statim infumtis doloribus commodant. Ceterum de cœtura ipsorum consequenter dicemus.

Emplastrum Regium Tetrapharmacum. Cere colophonis, pice, adipis taurini, singulorum partes portiones.

Emplastrum ex semine lini. Discutit & rumpit.

Olei ueteris lib. ij. cere uet. xx. colophonis, adipis porcini, singul. lib. j. s. spumæ argenti lib. j. cerussæ sexuncem, succi seminis lini sexuncem, polinis unc. j. Thons nientem.

Emplastrum ex melle. Spumæ argenti, cere, olei singul. lib. iij. terebintina lib. ij. mellis adipis taurini, singul. lib. j.

Aliud. Spumæ argenti lib. vi. olei lib. v. s. colophonis lib. viij. s. cere lib. ij. s. mellis lib. ij.

Empl.

Emplastrum
sic

Cruentorum
Emplastrorum
qda

Tetrapharmacum

Emplastrum ex sacco. Spuma argenti lib. vi. Olei castorei lib. viij. hyemeli lib. x. fœni græci sextar. 2. seminis lini sextar. 2. althææ lib. iij. Althæam & semina coquito in aqua sextar. xx. donec parum aestuerent, & ex ipsa lib. iij. ad oleum miscebo ac coquito donec bullæ quæserint. Deinde argenti spumam leuissime trita insperita, isto igne coquito donec manus nō inquinaet.

Empl. ex polline. Pollinis ammoniaci Thymiamatis, sing. lib. j. resinæ piceæ, ceræ, adipis porcini, singul. lib. ij. succi seminis lini quantum satis est.

Emplastrum ex herbis. Ramicis olei sirsigmentij, ancharæ quæ cho-
roæ pelestirum vocatur, id est ugerum porcinum: Est autem Onoclea se-
ptem nervos habentis plantagina, singul. quadrantem, olei lib. vi. adipis
porcini lib. vi. Herbar in oleo coctæ abjectantur. Reliqua cū oleo disquirunt.

Emplastrū ex asphodelis. Radicis asphodeli succi li. j. rosæ lib. chame-
meli, adipis asferini, sing. sextantē, adipis porcini quadrantē, ceræ trilitē.

Emplastrum ex fermento, rumpens abscessus. Fermenti, xzugig, sin-
gul. sexuncē, salis trilitē, resinæ piceæ quadrantē, ceræ trilitē, aphronitri unc.
j. ammoniaci Thymiamatis sextantem, mellis sextantem, saponis sextantē.

Dochiene Emplastrum. Ammoniaci Thymiamatis lib. j. nitri Ale-
xandrinī sexuncem, aphronitri sexuncem, adipis taurini lib. ij. ceræ lib. ij. ac
rebichinæ lib. j. olei ueteris unc. j. acetū quod satis est.

Emplastrum ex Seruthio, discussens strumas. Spumæ argenti, struthij,
aristolochiæ, singul. trientem, galbanij, squamæ græcæ, aloes, singul. unc. j. man-
næ sextantem, ammoniaci Thymiamatis sexuncem, resinæ piceæ unc. xvi.
acetū scillitici sextar. iij. ad sicā terenda.

Emplastrum Smellium, ad Abscessus. Olei ueteris lib. j. 3 spumæ ar-
genti, nitri rubri, salis ammoniaci, lituræ siculæ protothæcæ, resinæ singul.
lib. j. galbanij, ammoniaci Thymiamatis, singul. quadrante, matramenti su-
torij trientem, ceræ sexuncem, xzugis, opopanax, singul. unc. j. Acetū
quod satis est. Spumam argenti & aruginem in oleo coquito donec non in-
quinaet. Deinde ita reliqua adhibito.

Emplastrum ex alijs raptorum. Ceræ sexuncem, colophoniam trien-
tem, resinæ piceæ quadrantem, adipis taurini trientem, nitri salis unc. j. 3 al-
lij capita pura xx. Olei sextar. 2. Aliū in oleo coctū abijce, & reliqua misce.

Emplastrum ex Apyrano discussorium. Adipis asferini & phastanorij,
sing. quadrantē, olei ueteris unc. xx. vi. psylli quadrantē, seminis urticæ, radi-
cis apyrani uiridis, sing. lib. j. ceræ albæ sextantē, emplastri ex sacco sextan-
tē, rebichinæ unc. j. Radicē in tenuia stilla cōcissā, cū psyllio in oleo ma-
cerato, itemq; urticæ sementi per diem ac noctem, & tunc ubi coxerit. ipsa
quidem abijce, liquabilia uero resoluta ad oleum ammisceto.

Emplastrum Pyrrhonidei Tricicum, Ad duricias & scirrhomata.

Althææ, palmularū sive Nicolæarum, singul. lib. ij. fœni græci seminis
lini, sing. sextar. 2. chamaemeli, mellis li. 2. datæ, sing. sexuncem, quini Amingi
sextar. vi. spumæ argenti lib. j. ceruissæ, colophonij, singul. lib. ij. ceræ terebin-
thinæ, singul. lib. j. olei ueteris lib. v. aquæ lib. ij. panis sicci tui & cribrati li.
v. Herbar in uino coctæ exprimuntur, & in expresso succo panis macerantur.
Sequenti die spuma argenti & ceruissæ in aqua teritur, deinde ad dicto oleo
donec non inquinaet coquitur. Post ea adhibentur reliqua. Ablatis ab igne
adhibetur panis, & fortiter spathula agitur. Additur insuper & aruginis
rasa, & floris salis, singulorum sexuncæ, iridis, aristolochiæ singul. sexuncæ,
terebinthinæ lib. j.

Pelarium ex recremento urgenti. Ad desquamata & callosa similia. Cer-
ræ, adipis taurini, singul. quinæ uncem, recrementi argenti sexuncem, colo-
phoniæ trientem, piceæ, olei, singul. sextantem, Argenti recrementum sic cō-
teritur cum uino aut fœni græci succo. Quod si recrementum argenti non
adit, plumbagine utimur.

Emplastrum ex althæa. In podagricis & alijs duricijs, Succū fœni græ-
ci

*Anthaxi Chet-
ru pelastrum*

*Dothine em-
plastrum*

*Smellium em-
plastrum*

*Apyranide-
æ*

*Pyrrhonidei
le*

pelarium

cl. & feminis lini. & althaeae singul. lib. ij. olei lib. ij. Coquito donec saecus fuerit consumptus, & adijce colophoniam lib. j. cerebinthinam lib. j. lachrymas hedere quadrantē, Postq̃ uero hęc soluta fuerit, ablans ab igne, misce cere lib. j. galbani trientem, ambo simul confusa, & dissoluta spatula agitato.

Emplastrum cissinum id est hederae. Ad haec clausi uetuos. & pun-ctura maxime duraturas. Squamæ rubrę trientem & unc. x. thuris unciam. j. myrtos unc. j. chalcitidis drach. iij. aceti heminas. vi. Terto in Sole asituo, donec acetum fuerit consumptum. Deinde soluta amittit e, cere beffem olei unc. xviij. lachrymę hedere, galbani singulorum quadrantem. Si uero diu-
Melanchlori

usius & modus sitnerius, pro galbano cerebinthinę sextantem adijce.

Emplastrum Melanchlorum, Ad eadē, & ad eruenta uulnera.

Masticę, aris uisigallę, aristolochiaroundę, salis ammoniaci, squa-mę rubeę, aluminis cissi & liquidę Alij pro liquido rotundum habent indidis, myrtos, anamini fœnorij, chalcitidis, cinginis ralis, cadmice, aloes, myrtos, thuris, radicis panacis, spumę argenti, cerussę, omnia æquis portionibus te-runtur asitare in Sole cum aceto ad dies sufficientes, & in pastillos effingun-tur. Emplastum autem fit hoc modo. Medicamentum huius fumitur sextans, cere sexuncę, olei beffia. Si faucitati sunt nerui, oleum sit uetus. In alijis autem commune.

Emplastrum ex Senecione. Siccę senecionis lib. ij. olei ueteris lib. j. s. olei cyprini trientem, axungię ueteris lib. j. cerebinthinę unc. j. galbani unc. x. resinę picis unc. x. araginis, thuris, oryppi modicam eni, singul. unc. j. squamę aris serap. viij. cere sextantem, picis naualis unc. xij. Oleum est sacco adstringentium compagem coquito, addito etiam adipe porcino. Arida uero cum cyprino terito. Galbanum cum cera tundito, & in ollam adijcto. Picem naualem si arida fuerit, tritam ac cribratam ponderato ac in spergito. Si uero conterı non possit, cum parte olei dissoluta colentur, & tunc omnia misceantur.

Emplastrum Masticę discussorium. Cera, axungię porcine singul. lib. j. colophonię sexuncem, spumę argenti lib. ij. Vini boni lib. iij.

Emplastrum Aricarbaranum, ad eadē affectiones. Spumę ar-genti unc. j. s. cerussę lib. j. & quinq̃ uncem, aquę marinę unc. xx. v. olei ue-teris lib. j. s. buccinorum uisitorum spumę, & unc. s. e cere sulug dodrantē, cerebinthinę sexuncem, thuris quadrantem, & serap. ij. s.

Emplastrum ex draconculo. Cera colophonię, picis sicę, axungię, resinę singul. lib. iij. ammoniaci Thymiamatis lib. ij. radicis draconculi li. v. Radix arida trita, reliquis dissolutis in spergitur.

Emplastrum pſtation. Cera, colophonię, adipis porcini, hyoscyam-
pſtationis em
pſtrum ni foliorum tenerorum, aut facci eorundem, singulorum æquas portiones. Verum in Alexandria fumuntur cere lib. ij. s. hyoscyami lib. ij. axungię lib. ij. s. colophonię lib. j. & magis discutit.

Empl. Myrsinā. Argri spumę, cerussę, sindycis, plumbi uisi & lous, singul. unc. j. cera sexuncem, olei myrti lib. j. uini quod satis est.

Emplastrum ex cerussa aut ex ouis. Cera albę sexuncem, rosacei lib. j. s. spumę argenti sextantem, cerussę sextantem, amyli quadrantem, albu-mina colorum. v.

Emplastrum parlyggon, Onibasi. Spumę argenti unc. j. s. cerussę unc. j. s. cera trientem, pſtationis salis septantem, colophonię dodrantem, succi feminis lini, olei singul. dextrhem, Masticę facit ad ealeaneorum rimas. In ulceribus autem inquit, uitant. Nam graueolens euadit.

Emplastrum ex cadmis. Cicatricem inducens. Chalcitidis uisę sex-tantem, cadmice mænor, singul. unc. j. cera, colophonię, olei myrti, sin-gul. lib. j. Vini quantum satis est.

Emplastrum phoenicinum id est palmulatum. Axungię ueteris lib. ij. olei lib. ij. spumę argenti lib. ij. chalcitidis crudę sexuncem, Chalcitis pri-
mum

mon cum oleo praefigetur in pila commoda, aut etiam in Sole. Postquam autem frigidum spiritum dinem acceperis, etiam spumae argenti prius tria adijciatur. Postea etiam adeps, & ubi probe contritus eris, ad lentum ignem coquito, donec non inquinae, palmaram ramis uelut sphaerula agitans.

Emplastrum ex Anchusa, ad ambusta. Cere albae dodrantem, rosae et unci xvij. His liquatis anchusae purpureae radicis siccae tenuissime tritae triens inspergatur. Aliud.

Anchusae radicis uiridis, materibj comae, singul quadrantem. Coquito in olei dodrante, & absieto. Ad oleum autem cere albae quincuncem adquito, ac dissoluito.

Emplastrum pompholygerum.

Pompholyge
tum

Pompholygis sextantem, spumae argenti quadrantem, cum succo seminis lini terito, & adhuc liquata ac frigidifica, cere sexuncem, adipis asinini aut gallinarum sextantem, olei chamemelinum sexuncem adijcitur.

Emplastrum phycoryche, dolorem eximie, ad sedem destinatum. Thuris unci xvij. myrrhae septuncem, opij drac. iij. aluminis scissi drac. ij. bursari drac. iij. quorum assistorum unctis. iij. cadmix uisae & lotae drac. iij. pompholygis drach. vi. cere Tyrrhenicae drac. viij. adipis asinini drac. xvi. mellis ceruinæ drac. xi. plumbi uisae & loti drac. viij. lapidis haematite drac. j. cypseligaldi drac. iij. Arida terito eum uino Italico, & liquata misceto.

Phycoryche

Emplastrum Amythaonia, Ad distortes ac conuulsos articulos. Est etiam auctoriorum. Ammoniaci, cere bdelij, singul. drach. viij. et bethiniae tridis Ilyricae, galbani, singul. drach. xx.

Acidophus uis

Emplastrum Aristophanum, Mollitorium. Picis lib. iij. picis maza-lis lib. ij. cere lib. j. opoponactis unc. j. Acci hemigramm. j.

Emplastrum ex plumbagine, ad calidas affectiones. Plumbaginis tridentem, spumae argenti sextantem, cerulae sextantem, cere bellem, olei myrti lib. ij. Arida cum uino teruntur.

Empla. Coracum ex aceto mullso ad pudenda destinatum, & ad nomas Collicae sextantem, squamæ unci. j. & chalcitidis, thuris, singul. unc. j. Terito cum aceto ad dies sufficiens, deinde mellis quincuncem misceto. Scorsum autem ceratum parato, ex myrti aut rosacei sextante, & adipis taurini bellice ceruiente, terebinthini unc. j. Misceto ac simul contrito & untor, uelut eo quod ex charta constat, tum per instrumentum ad praeustandum aptum, tum per linamentum.

Coracum
Emplastrum

Emplastrum ex aceto & oleo. Spumae argenti partem. j. olei, aceti, singul. partes. ij. Quidam uero. iij. accipiant.

Emplastrum ex Achate discutiens ac molliens. Lapidis Achate feruulati unc. j. & cere quincuncem, resinae tritae quadrantem, olei unc. j.

Emplastrum lili, ad eruenta uulnera, glutinosa, incarnans, & purgans. Squamæ gris, gris uisae, aristolochiae rotundae, singul. drach. viij. aluminis scissi drach. vi. salis ammoniaci drach. viij. thuris drac. viij. ammoniaci Thy, mianis drac. viij. myrrhæ drach. xij. aloes drach. xij. galbani drachmas xij. sicci radicis draconculi drach. viij. ceratib. j. colophonis lib. ij. olei ueteris quadrantem, aceti quod satis est.

Isti empla
strum

Emplastrum Athena, ad ulcera sordida, impacha & neruos iraciatos. Masticorij, aceti uisae, gallarum, aristolochiae rotundae & longae, salis ammoniaci, ammoniaci Thyridamatis, squamæ gris, aluminis scissi & rotundi, tridis, melleos, stramini iurorij, chalcitidis, fruginis radice, cadmix, aloes, myrrhæ, propolis, galbani, singul. unc. j. cere drach. cc. picis drach. cc. colophonis drach. c. olei sexuncem. Aceti quod satis est.

Athena empla
strum

Emplastrum ex distanno, glutinosa, ad canum morsus & ulcera omnia. Spumae argenti lib. ij. squamæ gris unc. j. & olei ueteris sextar. ij. diphyæ quadrantem, gentianae unc. j. & aristolochiae, aruginis rase, sing. unc. ij. & distanni, gris uisae, singulorū unc. ij. & colophonis lib. j. maza galbani, aloes, singulorum

singulorum quadrantem, ammoniaci Thymiamatis sexuncem, propolis sex tantum, cera sexuncem & unc. 4. Oleum est spuma argenti prius si coque re oportet, donec non inquinat, deinde ab igne ablatis in se ere gruginem & squamam aris, & rursus coquere donec non inquinat, & rursus ablatis relisam & ammoniacum cribreum adijcere, & mouere donec feruere desinns, ad ignemq; apponere, & ubi parum effervuerint, ea & diphrygesim, mittere, & rursus coquere donec spassensum. Deinde ceram indere, eaq; donec non inquinat cocta, propolim adijcere, & paulo post aloem, mannam, dactynam, aristolochiam, gentianam, singula tria usque gere, ubi parum sunt perfringere.

Barbarum

Emplastrum

Emplastrum Barbarum, ad cruenta uulnera, & fracturis collos obductum. Bituminis iudaei, picis flecte, cere, resinae, singul. lib. j. cerebinthinæ sex tantum, spumæ argenti unc. j. cerulle unc. j. 2. manis sextantem, opopana eis sextantem, myrrhae sextantem, olei quadrantem. Acceti quod satis est.

Emplastrum ex silicibus, glutinosis, & quod sanguinem siccantibus, & peccore suppuratis in thoracem imponitur. Milyos, chalcidides, cerulle æruginis, gallæ, aluminis scissi & rotundi, melametricæ, singul. sexuncem, cere lib. ij. resine picæ lib. 4. picis lib. 4. malicorij sexuncem, bituminis lib. 4. sotiorum silicis lib. 4. olei rosacei trientem, iramenti satonij sexuncem, Acceti quod satis est. Quidam etiam cerebinthinæ dodrantem.

Emplastrum Nicolai, ad cruenta uulnera, sinus glutinosos. Squamæ aris trientem, æruginis rosaceæ, j. spumæ argenti unc. j. 2. aristolochiæ longæ & rotundæ, singul. unc. j. aluminis scissi & rotundi, singul. unc. j. stramonij scorpij unc. j. sulphuris uulvi unc. j. gallæ emphrasticæ trientem, silis ammoniaci unc. j. milyos unc. j. origani unc. j. chamaeleonis unc. j. cedre race molæ unc. j. uerani albi unc. j. pencedani quadrantem, seminis apij sextantem, radices symphysis unc. j. 2. cerulle unc. j. 2. succi Mandragoræ unc. 2. chalcididis unc. j. 2. simifasteris unc. 2. Thuris masculi unc. j. aloes unc. j. bdellij sextantem, opij Theriaci sextantem, myrrhae Troglodyticae unc. 2. ammoniaci Thymiamatis unc. j. feni greci sexuncem. succi perdictæ adis sexuncem, cere flauæ lib. 4. colophonis lib. 4. resine picæ lib. j. bituminis lib. j. mastichei sexuncem, picis nigre lib. 4. olei ueteris lib. j. Syriacis unc. j. opopaneis unc. j. 2. Acceti quod satis est.

Emplastrum

Emplastrum lectionis, ad strumas, & abscessus, & splenem, & articulos, & ad coxendicium mortuum Spumæ argenti drach. xxx. olei ueteris sextar. ij. acceti sextar. j. cingitis drach. j. 2. cornis picæ drach. viij. chamaeleonis cum radice drachmas. xvi. euphorbij drach. xvi. succi hypocistidis drach. xvi. propolis drach. xvi. myrrhae drachmas. xvi. heleni drach. xvi. pyrethri drachmas xvi. cere lib. 4.

Emplastrum

Emplastrum Neronis. Ad plagas, & omnem carnosarum partium do locem. Olei ueteris lib. j. 2. spumæ argenti lib. j. cere, resine picæ singul. sexuncem & unc. 2. ammoniaci Thymiamatis trientem, cerulle trientem, galbani, manis thuris, myrrhae, thuris, sing. unc. j.

Emplastrum oxerum multis uisus. Picis flecte lib. 4. cere lib. 4. ammoniaci Thymiamatis unc. j. cerebinthinæ lib. 2. galbani sextantem, manis sextantem, Acceti sextar. j. 2.

Acetum

Emplastrum acetorum id est sine cera, Galeni. Glutinas & concoquit, suppurans al. cera, cum ricinino aut ueteri oleo dissolutum, uelut medicamentum quod sita mentis silitur. Spumæ argenti lib. 4. olei ricinini aut ueteris lib. 4. 1/2. acceti acerrimi lib. 4. squamæ aris nigrae, chalcididis, æruginis, singul. sextantem. Spumam argenti cum oleo coquito ad strigmenum spississimam. Deinde metallis plumbis diebus cum aceto trita adijcto.

Emplastrum ex Metallis. Chalcididis unc. j. milyos sextantem, squamæ aris quadrantem, thuris quadrantem, colophonis sextantem, galbani unc. j. 2. cere lib. 4. olei unc. xv. Acceti quod satis est.

Empla-

Emplastrum Harmonia. ad fracturas Chalcitidis trientem, squamæ Harmonia
aria sextantem, & unciæ. & visis usi unctam. ꝑ. Thuris sextantem, olei Emplastrum
lib. ꝑ. Aceti lib. ꝑ. Coquito metallica in aceto & oleo donec non inquinant.
Deinde thus adijce.

Empla. Melinæ, Seraptonis. Spumæ argenti lib. ꝑ. cere septuncē am
moniaci Thymiamatis quadrantē, & unc. ꝑ. galbani, ruginis, singul. drach.
& colophonis septuncē myrrhe drach. ꝑ. olei heminæ. ꝑ. ꝑ. Spumæ argenti
coquito cum oleo, donec non inquinet. Deinde reliqua adijcto.

Emplastrum Anicetum, glutinans discutiens, squamas separans, & ad Anicetum
distortiones. Baccarum lauri, iridis sicce, thuris, singul. drach. lx. visis usi
drach. xx. niri, salis ammoniaci Thymiamatis, singul. drach. xxx. pyrethri,
staphidis sylvæstris, feminis Rosmarini, grani Cnidij, sinapis, lili coris co,
lumbini, aristolochiæ, cumini, æruginis, cyperi, feminis cruce, singul. dra. c.
viij. Aceti heminas. xij. Terito sub censis ardoribus donec acetum fuerit
consumptum. Deinde decocti caricarū crassissimi dodrantem adijce, & ex
perustis pastillos finge & ex sicca. Visu vero expetente ex ipsi pastillis sex
tantem cum aceto test, & resine quadrantem, cere Tyrrhenicæ sextan
tem, olei sextantem ammisce.

Emplastrum ex lolo. Picis lib. iij. resine picæ dodrantem, cere Tyr
rhenicæ quincuncem, olei quadrantem, bituminis cribrati sextantem, fari
næ loli sextar. ꝑ. Aceti quod satis est.

Emplastrum ex succo Sycamini. Spumæ argenti, picis aridæ, adipis,
singul. besse m. terebinthinæ quadrantem, cere quincuncem, æruginis ra
tæ, opoponacis, galbani, singul. unc. ꝑ. olei ricini, aut fusili, aut acetis un
dē, heminam. ꝑ. picis liquidæ hemin. ꝑ. suc. et sycamini citius succus sycomo
ra vocatur hem. ꝑ. Succo syc
amini

Emplastrum duplæis coloris. Aeris usi, aluminis scissi, ammoniaci
Thymiamatis, singul. unc. ꝑ. cere lib. ꝑ. colophonis lib. ꝑ. adipis porcini lib.
ꝑ. Aceti quod satis est.

Emplastrum Indicum. Ad nomas & sanguinem spuantes. Cere, resi
næ frictæ, picis sicce, bituminis liquidæ, acyinthij, singul. lib. ꝑ. ceræ, chal
citidis, mlyos, melantheræ, aluminis scissi & rotundi, galbæ ompha citidis,
malicorij, singul. sexuncem. Aceti quod satis est.

Emplastrum ex cinere Aspidum. Discutiens firmans & podagras. Tere
binthinæ, lapidis Asij, bituminis ludæi, singul. drach. c. lx. cere, baccarū
lauri, ammoniaci Thymiamatis, aphroniti, adipis utulanti, singulorum
drach. c. cxi. lapidis pyritæ, calcis viæ, singul. drach. c. lx. cineris Aspidum
drach. c. xl. olei ueteris heminas. ij. Medicamento perfusgerato cinerem in
spergito. Paratur etiam sine cinere, eo quod aliquis ipsum auculentur, & nisi
lib minus efficax est propter Alium lapidem.

Emplastrum Leona siccans & discutiens. Ammoniaci Thymiamatis, Leona Empla
strum
plumboginis, singul. drach. c. sinapis drach. viij. radicis chamæleonis drach.
xvi. colophonis drach. c. squamæ æris, radicis herbe lannæ, euphorbiæ, æ
ruginis, singul. drach. viij. aristolochiæ drach. xvi. pyrethri drach. viij. Olei
ueteris hemi. ꝑ. & raphanini quod satis est.

Aliud, Leona ex alto euocans, & humores euacuans. Atramenti fuso
rij sextar. ꝑ. auripigmenti unc. ꝑ. ueratri nigri, Thoracis cantharidi, sing. drach.
ꝑ. sandarach & quadrantem, cere lib. ꝑ. & resine frictæ lib. ꝑ. olei hemi. ij.

Emplastrum Macedonicum. Cere, colophonis, picis, adipis taurini,
thuris, sing. æquales partes liquefacto, & ab igne ablatis thus indispertito.

Emplastrum Sphæricum. Ad Feriada. Ceræ, spumæ argenti, calcis
viæ, singul. quadrantem, cere unc. ꝑ. niri Benenacis, rosæ c. singul. unc.
ꝑ. Liquefacta aridis affundito & pilulis formato. Visu vero expetente, olei
sexuncem cum cere sextante liquefacto, & medicamento unci. ꝑ. addito, &
spathula agitato. Frigefactum autem cum aqua dodrantem collidito. Ego uer
F ro

to etiam rosacei quadrantem addo.

Emplastrum ex ochra, Inflammationes atcet, tumoris qui sine sponse, nunquam iudicio totti sunt. Ochra Attica lib. ij. cere lib. j. spume ar. genti, bellum, uino terito, cere, colophoniz, picis, resine picis, singul. lib. j. terebintinae bellum, olei lib. j. Hec simul in massas formata. Resolvuntur autem hoc modo. Cere lib. j. olei ueteris lib. ij. medicamenti lib. j. cum uino conquassato.

Emplastrum ex cedris, glutinans, discutiens, extensum. Cere, picis sic ex. singul. lib. j. colophoniz bellum, cedrie sexuncem, liquefacta simul conquisita donec non inquinant.

Aliud mollitorium. Cere, picis, singul. bellum, colophoniz drach. xxv. propolis drach. xvij. cedrie drach. xx.

Emplastrum e pumice ciacatrice inducens. Olei myrtici lib. ij. cere lib. j. pumicis uili & uino extincti drach. vi. squamae stomomatis drach. vi. aris uili, cinolliz, singul. drach. v. Supra linamenta adhibetur, & spongia ex aqua superimponitur.

Psale Empla. Emplastrum psale id est Quies, ad fibras & inguinum tumores. Cere, colophoniz, nitri singulorum lib. j.

Emplastrum ex nitro, ad carbunculos. Nitri totius scilicet quadrantem, cere, olei, colophoniz, singul. unc. j. & sacci cyreniaci aut Medici drach. x. imponitur linamenti exceptum diluunt.

Emplastrum ex Anemone. Anemone exunguis sextantem, cere quincuncem, olei trientem, resine quincuncem & unc. s. colophoniz lib. ij. s.

*Macharionis
emplastrum*

Emplastrum Macharionis, Viride. Ad coxendicum morbum, articulos compactos, abscessus. Opopanach, galbani, arginis, myrtice, hidiz, ammoniaci Thymiamatis, aristolochiz, singul. unc. j. terebintinae, cere, olei omphacini, singulorum septuncem.

Aliud uiride simplex. Resina lib. ij. cere lib. j. arginis rase lib. s. thuris drach. xv. Aceti quod satis est.

Aliud Viride. Faciens ad ulcera bimoda, et carnem super excrecentem. Colophoniz sexuncem, arginis rase unc. j. & cere sextantem, salis Cappa docti unc. j. rosacei sextantem. Aceti quantum satis est.

Empla Rutacei, ad pleuriticos. Ruge uiridis lib. j. butyri lib. s. terebintini neque xv. opopanace quadrantem, galbani quadrantem olei anethini lib. j.

Emplastrum ex Laxio. Ad coxendicum & articulorum morbum, & ad tumorem laxum. Cere, olei ueteris, lixiu per calcem ex colati, singul. lib. j. resine fricta, niti Alexandrini, nitri albi, terebintinae, singul. sexuncem, Nitra cum lixiu terito.

Empla ex nitro. Ad abscessus, & tumores induratos. Olei ueteris, cere, sphroniz, iaponiz, lixiu, singul. lib. j. terebintinae sexuncem, galbani, propolis, ammoniaci Thymiamatis, singul. unc. j. propolis uelut procedens.

Emplastrum ex sale. Cere trientem, olei lib. j. salis communis trientem, sphroniz trientem, cerulle bellum, aceti sextantem ad arida conterenda.

Alter Salis communis, nitri singulorum trientem, cere, olei ueteris, singul. sexuncem, aque maris quod satis est.

Empla ex perna. Soluit ophos. Pinguetinis perne, fuisse ueteris, ammoniaci Thymiamatis, casei ueteris bubuli aut caprini, adipis taurini, picis ueteris quae de nauibus decurrit, & apochyma appellatur, singul. lib. j. medulle ceruinae bellum, cypri cerati quadrantem, olei cypri sexuncem. Vini Aegypti quantum satis est.

Apodysa

*Cinnabari
Emplastrum
Pampathos*

Empla ex Cinnabari. Ad ophos & alios omnis generis induratos tumores. Appellatur pampathos. Spume argenti lib. j. olei ueteris sextantem, squamae aris unc. j. aris uili unciam, j. cinnabaris scrup. xvij. magnetis utatim unciam, j. lapidis phrygi drach. vi. lapidis pyrite, cadmia, arginis rase, thuris, singul. unc. j. diphrygis sextantem, siccis. unc. j. & galbani in

ni unc. j. s. lapidis onitę Schythici scrup. xvij. lapidis hyematis unc. j. pro po
a lib. j. scrup. xxvij. cere unc. xvij. lapidis perdicie unc. j. Aliud exemplar
penicillare habet betonice unc. j. scrup. viij. gentiane unc. j. aristolochie lō
grę & rotunde sing. drach. iij. chameleonis nigri unc. j. dictamni scrup. xliij
resinę sicę lib. j. adipis struthocamelii lib. j. lapides cum spuma argenti teri
to. adjiciens floris salis lib. ij. particularem, donec totum fuerit levigatum.

Emplastrum ex nucleis aëllanis. Ad topicos articulorum approbatur.

Lixiuji per calcem excolari sexuncę, nuclei nucleis aëllanarū sextantę,
sphron itri sextuncę, olei veteris lib. j. saponis gallici trientę, mellis bellom,
candida ouerū. vi. cerę dextrantę, terebinthinę se xantę. Terito cū lixiuio.

Ceratum ex Torpedine. Ad podagram, dolorem eximens, admirandū.

Quinto mensis Martij die, in domo subterranea, in ollam olei comansis se
ra. ij. minto, & cum lignis unis coquito, ubiq. ebullierit, torpedinis picis
marini lib. j. inijeto, & sanguinis talper animalis, quod à quibusdam aspha
la, ab alijs Madanitadan dicitur, trientem. Et simul coquito donec carnes
picis dissolutę fuerint aut frictę. Deinde ad excolarum oleum, adijce cere
moderatum modum, quo spissitudo quam tenerima cerati fiat, quod in lin
tegium infractum imposito.

Emplastrum ex urina muli podagricum. Urinę muli masculi sextar.
iij. spumę argenti lib. ij. olei veteris minam. j. Duo omnia terito ut frigmen
tina euadant, & coquito donec non in quin em.

Emplastrum ex lapidis Asij flore, phlogrij. Ad tumores duos. Peste
dani radicis, floris lapidis Asij. qui non si non adia, salis ammoniaci Thy
miamatis, lanarium succidarum uisurum, singul. unc. j. aristolochie rotundę,
pumicis, stercoreis canini, æruginis rase, squamę aris, anisyos, singul. scrup.
xvij. castorei scrup. xvij. myrris quadrantem, aceti acerrimi quadrantem,
cere unc. xij. s. resinę picę, picis brutę, singul. unc. xvij. s. scrup. vi. Olei
veteris quantum satis est.

Aliud ex eadem Galeni. Cere, terebinthinę, singulorum libram. j.
lapidis Asij, manne, singulorum quadrantem, olei cyprini sextantem, æque
paleatoris quantum sufficit.

Emplastrum ex flore salis. Ad arthriticos in declinationibus, Terebin
thinę, resinę frictę, resinę picę, cere, singul. lib. j. picis sicę, aluminis scilicet
fussoris salis, singul. lib. s. Coquito in duplici uas.

Emplastrum nutrit, carnem in ulceribus generans. Rosacei, terebin
thinę, mellis singulorum sextantem, cerullę butyri, singulorum uncia m. j.
Alij etiam thuris unc. j.

Emplastrum litalicum, purgans sordida ulcera, & incarnans. Fici sylue
stris tenerum corticem in oleo coquito & abijcto, & in oleo cere saluę
quantum sufficit liquato. Vere, linamentis illito.

Emplastrum arrigendi uim habens. Satirij pudendi ceruini, eadę
scinici, singul. drach. ij. seminis cruce, pyrethri, seminis arorinadoli, cerę sin
gul. drach. ij. terebinthinę drach. j. octa passerum trogloditarum tria, scellio
nestres, olei laurini aut isini quod satis est. Scellionestres uisui in aceto maceran
tur ad dies. xl. uase infuso desolito.

Emplastrum aureum, ad cruenta uulnera. Thuris, aluminis scilicet, sin
gul. sextantem, colophonię, resinę, singul. lib. j. olei quadrantem, auripig
menti sextantem, Auripigmentum cum aceto teritur.

Emplastrum ad Fracturas, Oribasij. Picis brutę lib. j. & trientę, Spu
mę argenti libram. j. & trientem, thuris bellę, terebinthinę quin cuncem,
adipis taurini lib. j. & trientem, galbani, opopanacis, sing. unc. j. cere trien
tem, olei veteris lib. j. Aceti quincuncem.

Empla. ad Fracturas, & cum uulnere, & sine uulnere. Ex heraclida. Pi
cis aridę minam. j. spumę argenti minam. j. manne minam. s. adipis uisul
ni minam. j. cere Tyrrhenicę unc. xxvi. opopanacis drach. viij. æruginis ra

Torpedinis
Ceratum
Asphides
Madanitadan

Aqua pleuro
ni

Satirij angla
strum

Isidri empla

se, etis cyprii, singul. quintam & decimam minz partem, Terebinthinæ minam. j. s. olei olivini aut ueteris heminam. j. Accenti ueni. 8.

*Quidam liquidi
Preparatio*

Oleum liquidum Medicamentum preparatio. Mithridatensem, cardamomum sextantem, lanarum ualde solidarum sextantem, In unni sextantem ad tri daum macerata coquito donec parum super sit, & facta collatura, ad unum olei quadrantem misce esto. et coquito donec parci de usino restet, & sic ampe colophon in dextrantem, regibinthia de dextrantem, Quidam etiam ceræ dextrantem miscant, & hyssopi herbe unc. j. cum alijs coquunt. Alij barbasimo luitant, & uinum cum sorde, quod etiam pinon uocant, succant. Vbi uero exigente, excipio quadrantem consistant, & reliqua uelut dicta m. est.

Plura

De Cere ad oleum addendæ modo.

Stucis unguenta præparare uelut ea quæ acopa uocantur, quæ druplam oleum ad ceram immittit. Si uero quemadmodum in fracturis, molle ceram tum efficimus duplum. At si medicamentum emplastrum forma facere uoluerimus, tunc æqualem olei modum ad ceram miscemus, si aer ambiens moderatus fuerit. Si uero cera uetus sit aut squallida, & aer ambiens frigidus, paulo plus olei cibus quam ceræ quemadmodum ubi cera pinguis fuerit, & aer ambiens calidus, paulo copiosior cera quam oleum sit. Hoc autem paulo plus, duodecima pars sit, in utramque à medio & æquali modo partem. Nam tunc aut xij. olei uncias, ad ceræ lib. j. miscetis.

Ex antiplo. de coctura medicamentorum. quæ in Emplastris mittuntur.

Spuma argenti in medicamentorum cocturis cum oleo coquitur. Operiet autem ipsam tritam, rursus est oleo lenigare, ut frigidioris euadat. Et postea sic coquere ad lentum ignem indefinenter mouenda. Principio igitur inflammescit, & in bullas exurgit. Vbi uero prope accessit ad sufficientem cocturam, colore fœculentior fit. Modus autem cocturæ accipit, quæ ex tumore confidet, et non amplius manus iniquas. Plumbago similiter ut spuma argenti coquitur. Modus cocturæ ipsius est non solum ut non inquinat, sed etiam ut ex igneo colore, in fuluum & ualde floridum transierit.

Æra usum coquitur non à principio immittitur, sed ubi semicoctum iam est emplastrum. Modus cocturæ est, si non ualde modicum immittatur, ut colore præualeat, & emplastrum fuluum efficiat.

Squama æris coquitur ut æs, & eodem tempore immittitur, & eandem cocturæ rationem habet. Nil enim color eius præualeat, & emplastrum fuluum efficiat, nondum autem cocturam habet. Sed & ferri Squama eodem tempore infertur, & fuluum colorem inducit. Sori & diphygæ immittuntur ut ipsi in medio cocturæ. Modus ut diphyrgis idem est qui squamæ æris, ut colore præualeat. Sori uero nullum proprium habet modum. Omnibus autem communis modus est, ut non inquinans fiat emplastrum.

Chalcidis similiter ut æs coquitur, & cocturæ ipsius modus est ut fuluus quodammodo & magis panicem faciat emplastrum. Flus græ similiter ut æs coquitur. Modus autem cocturæ communis est. Autamentum statim in medio coctura immittitur. Etiam coquitur, liquidiorum emplastrum coloris facit. Si uero non sint alia quæ ipsi relictentur, nigri emplastrum facit.

Misy in fine injectus. Propetium autem modum nullam habet.

Auripigmentum & Sandaracha in fine cocturæ immittuntur.

Plumbum usum in medio coctura injectur. Cerassa in alba emplastrum in fine induitur. Sic enim colorem conferuat, & magis albefacit. Vtrum in nigra à principio. Dum enim amplius coquitur, nigrum euadit.

Acrogo in uicinis emplastris post cocturam injectur. In quibusdam uero omnino non in illis immittitur, sed ad ipsam in pila leuigaram & manentem reliqua euertuntur. At uero melini coloris emplastris, ubi semicoctum est preparatio injectur. Moderata enim cocturam adeptæ, melinum colorem inducit. Vtrum in his quæ duplicem faciem, ac geminum colorem præferunt, statim ab initio æruginem in coquimus. Perleuetana enim in coctura

primum

primum melinum colorem inducit. Deinde duplicem facit representans, potensque solum colorem efficit.

Alumē plerūq; post cocturā inijciunt. Propriū cocturæ modū nullū habet. Minum immittitur in fine. Cadmia & Pompholyx inijciuntur in principio. Sal & Niter in medio cocturæ. Sulphur in fine. Coctura vero ipsius emplastra nigrescit. Terra omnis & lapides immittuntur plerūq; in fine. Pumex itē in fine. Conchyliā quoq; ulla in fine inijciuntur. Oleū in principiis inieciū fuerit ad reserū aut picē liquidū, emplastrū nō spūat. Oportet igitur ubi spūilla fuerint, quæ coquistur, ita oleū inijcere. Pinguedines reliquas nō solās circa mediū cocturā immittere oportet. Ex unguētis linū cocturā fert, Cyprinū & Rosaceū minus. Reliqua penitus nō. Quare in fine cocturæ immittēda sunt. Cera nō coquitur per se sola. Cōburnitur n. Neq; cū resina liquida, aut picē liquida inspīllata, n. manet. Sed aut oleo parat, aut oleo alicui, cū quodā metallico cocto super inijciuntur, aut resina, aut picē precoctus, & prius spūillare cū alijs quæ inijci debēt. Resina sicca cū cera inijciuntur. Liquidā uero pre omnibus alijs ipsa per se ipsam coquistur, si nō ualde modica assumatur. Pix prę alijs omnib; immittitur. Modus autē liquet de est, ut dē coquitur spūillatur. Sic ex uero maxime cū aceto, ut nō amplius bullas emittat, neq; inuamefaciat. Pix naualis nra, & superfluitatib; quæ in ipsa sunt per cribellū separatis, cocto emplastro inspergiuntur. Si uero malis fuerit, cū oleo dissoluitur. Verū prioratio exardior est, eo q; in posteriore tepēdus nō seruetur. Bitumē coquitur in principio immīssum. Nō aut oportet ipsum leuigare, quoniam a prestudines ficus granes similes habet. Quare in acillas partes frīgatur, & in aceto coquat, ita ut ne foveatur, donec nō amplius bullas emittat. Ego aceto inquit Timocrates, in oleo coxi, & successit.

Propolim molliū oportet & coquere. Nā ex coctura penitus nō consistit. Si uero etiā cū Emplastrū suscipiat, cū cera propolim, quādamodū etiā Galbanū cōsulū inijcere oportet. Ammoniacū circa mediū cocturā inijciunt. Oportet autē, si teri ac cribari potest, tenui hoc inspergere. Si nō, cū humore alicui leuigare, & sic inijcere. Si quidē ad grūta uulnera idē nātū sit emplastrū, cū aceto aut uinō. Si uero fistulare sit, aut fluximā dicat, omnino cū aceto. Si uero molle, qualia sunt ea quæ ad annum parantur, cū aqua. Deinde ita leuigatū alijs perfrigeratis affundere, ut ne effuset. Cū Opopanax inijciunt itēq; posteriore ammoniaco. Omnia uero modica coctura opus habet. Galbanū cocturā omnino nō fert. Sed ubi nō inquinū factū fuerit emplastrū, posse ab igne oportet, & ipsum molliū inijcere. Sagapēdū in mortario cōditur, & ubi tenerū sit cū emplastro emolliunt, postq; ab igne fuerit ablatū. Aloe inspergiunt post cocturā. Papaueris succus pridie in modica aqua maceratur, Deinde in pillā teritur, atq; sic ad ipsum infunditur etiā Emplastrū. Thapsia postrema inspergiuntur. Aut cū humore aliquo teritur. Idē sit leuigatū inspergiunt. Postq; ab igne ablatū est emplastrum. Si uero pingue sit, & leuigari nō possit, similiter ut sagapēdū cōsulū ipsum, & ad emplastrū formā redactū, cū emplastro mollicimus post cocturā. Thus & Manna in fine cocturæ inspergiuntur, trita cū modico melle, aut aceto, aut aqua, aut uino, si humorem suscipiat emplastrum. Myrrha perfecta iam coctura inijciunt. Semina, Radices & herbe nullam cocturam sustinent. Ad trita igitur, & in pillā permanentia, liquata abundunt.

De Malignis & Epithematis. Cap. XXVIII.

Maligna appellata partim medijs corporis partibus imponuntur diu, si infamatis, aut induratis, aut feruentib; aut perfrigeratis, aut fluxione laborantibus; partim articulis cōpactis, aut nervis perfrigeratis, aut etiā alijs inueteratū in duratis partibus cōueniunt. De his igitur & in capite de emplastris dictū est, & in capite de Acopis dicetur. Ex his autē quæ medijs partibus conueniūt, quæ sanē etiā proprie Epithemata appellantur, ea quidem quæ stomacho et hepati adhibētur, qualiaq; itē tandē fuerint, cū corrobora-

intelligunt

Epithemata

te facultate per adstringentia opus habent. Nam sine his periculum uter se
quatur, quum illa communia ad uitā conferuandū opera habeant. Vnde ex
aromatibus maxime componuntur. Stomacho igitur autnon concoctū,
aut debili, aut infirmo, epithemata ex seminibus, & meliloto, & aloē, & ab-
sinthio, & sampſacho, & nardo, & maſtiche imponantur. Hepati uero, ex
myrobalano, ammoniaco, adipibus, & chamæmelino. Spleni autē, quæ ex
calce, auripigmento, capſei, ſalicibus, cardamomo, & rapine, ammoniaco,
& aceto parantur. Quod ſi fluxione lahorēt partes circa uentrem, quæ ex
œnanthe, alumine, medina, et alijs adſtringētibz componūtur. Nam et hæc
per abſaſum in cōmuni Malagmata appellant, etiā ſi contrariam his quæ
mollire poſſunt facultatē habeant. At ubi ſeruēt uulſera, uelutin febribz
ardentibus malagmata ex croco, roſæ, ſucco ſeminis lini, aut ſoridis aut
polygoni, adipe ſalſo, & ſpuma argenti cōueniunt. Perſiſſeritis uero quæ
ex opoballamo, folijs, caſſia, pipere parantur. Thoraci autē in ſanguinis
reſectionibus, adſtringētia & ſiccantia, ex alumine, & ſalice, & bitumine
cōpoſita cōueniūt. In tabe uero, ea quæ ex baccis lauri, marrubio, cardamo-
mo, & calce ſunt. Malagma ex Melliſſo. Croci, nardi celſici, cypri,
cardamomi, iridis, myrrhæ, ſingul. ſex unc. meliloti lib. i. ammoniaci Thy-
miſmatis lib. j. cere lib. iij. terebīthinæ lib. j. cyprini lib. iij. glaucini lib. ij.
bdelli ſextuncem. Quidam etiam cypheos ſextuncem, Vini quod ſatis eſt.

Polyarchion

Malagma polyarchion, ex ſilibz de compoſitione medicamentorum
ſecundū locos Gaſeni. Cere, terebīthinæ, bdelli, ammoniaci Thymia-
matis, cardamomi, cypri, ſingul. miſ. j. meliloti, amomi, nardi ladici, cro-
ci, myrrhæ, thuris xylorinnamomi, ſag. drach. xxv. olei cyprini hemi. j. Vini
italici quantum ſatis eſt. Præpara & uſare quōd meraco, quōd reſoluto eſt ce-
rato cyprino. Polyarchion aliter. Xylobaſami, coſſi, iridis, cypri, myr-
rhæ, ſloris iunci odorati, cardamomi, thuris, ſpicæ nardi, maſtiche, ſtyracis,
bdelli, amomi, folij, croci, caſſia, pyrethri, anilolochis longæ, ſingul. unc. j.
ammoniaci Thymſmatis unc. j. & olea ſicilæ quadrans, terebīthinæ li-
b. j. uſe doliæ cerniſe ſextans, & ere lib. j. opoballami ſex uncem, Vini bellæ.

Polygriaſi

Malagma Polygriaſi. Croci unc. j. aloes, ammoniaci Thymſma-
tis, bdelli ſtyracis ſingulorum unc. j. adipis anſeris ſextantem, celſipi me-
dicamentū orientem, palmularum ſextantem, libram. j. nardini ſexuncem,
lini ſexuncem. Vini quantum ſatis eſt ad arida terenda. Malagma or-
doriæ. Croci, aloes, maſtiche, abſinthij, ſtyracis, zenitæ, caſſia, caryo-
phylli, ſing. quadrans, nardini li. j. cere lib. j. melini ſexuncem, palmulas xij.

Ratione malaga-
ria

Vini q̄ ſatis eſt. Malagma Barii. Cardamomi, caſſia, œnithes, celſici,
balaſtordi, propolis, ſingul. ſcrup. viij. herbar ſibini, caſſia, amomi ſing.
ſcrup. vi. ſloris iunci odorati ſcr. xvij. iridis ſcr. iij. caryophylli ſcrup. j. &
ſuſſinē ſiliaci ſextans, thuri, myrrhæ, ſing. unc. j. ladanij ſexuncem, bdelli,
ſi. maſtiche, aloes, nardi, melleſſi, ſing. unc. & reſina certa, reſina picæ,
terebīthinæ, ſing. quadrans, opoballami unc. j. ammoniaci Thymſmatis
ſcrup. vi. cere ſextans. Succiſſa & arida cōſuſa oleo cœnithino oſerito. In a-
lio exſplari etiā piperis ſcrup. viij. habētur. Quidā etiā melleſſi ſcrup. j. habēt.

Malagma Gaſenium. Croci unc. & ſloris unc. j. maſtiche quadrantem,
ſeminis abſinthij ſcrup. viij. œnithes ſcrup. viij. palmulas magnas. iij. cere
quadrantem, olei melini ſexuncem.

Ratione

Ratione

Malagma Brythion. Syracis quincuncem, malorum cydoniearum
unc. xx. maſueche aut maſuepli, croci, ſingul. drach. x. micæ panis, cy-
pheos ſingul. drach. v. & zenithes ſextantem & unc. & caſſia, abſinthij, ſin-
gulorum drach. x. caryophylli ſcrup. xv. ammoniaci Thymſmatis ſcrup. x.
opoballami ſcrup. vi. & nardini quincuncem, colophoniæ, glaucini, melleſſi
ſingul. ſexuncem, melleſſi ſiliaci drach. x. propolis quincuncem, terebīthinæ de-
xuncem, mellis coctiliæ x. folij drach. x. ſpicæ nardi drach. x. cere ſepem-
cem & unc. & Vini ſaterno aut Ambroſio terito.

Malagria

Malagma Nili Splenicum. Et ad omnem duriciam. Cere lib. j. ammoniaci thymiamatis lib. j. olei cyprini lib. j. croci unc. ʒ. Alij unc. j. habent. Aceti quod satis est.

Malagma Citrini. Cere. colophonii sing. li. j. ammoniaci thymiamatis, auripigmenti, calci, aluminis, aceti sing. cyath. viij. Arida terito cū aceto.

Malagma Tonsoris. Picis sicce libram. j. cere, resine picce, ammoniaci Thymiamatis, niri, baccarum lauri siccarum, adipis taurini, singulorum libras. ij. farinæ feni græci sextar. j. pallinis sextar. j. radicis chamæleonis nigri aridæ libram. j.

Malagma ex flicore caprino, Onchali. Ad splenicos, hydropicos, hepaticos. Cyprini aut uersissimi olei lib. ij. cere lib. ij. ʒ. Pulverum flicoris caprini, baccarum lauri decorticatarum, indis Myricæ, sing. sextar. x. terebinthine lib. j. sinapis, niri, cyperi, seminis raphani, corticis radidis capparis singul. quadrans, colocythidis medulle sextantem, keni nigri unc. j. Quandoq; arida excipiuntur liquatis. Quandoq; aceto subacta. Si uero fluat uenter, colocythis non addatur.

Malagma ex flicore caprino, Spongiosa. Ad hydropicos. Picis bruta lib. ij. niri lib. j. colocythidis medulla, pyrethri, opoponacis, grani, Cadij, singul. quadrans, corticis radidis capparis, thuris, indis, adipis taurini, datorij, quatuor, seminis apij, lachrydam, singul. sexuncem. baccarum lauri, sextar. j. farinæ feni græci, unc. ʒ. scilicet taurini sextantem, olei cyprini sextar. ʒ. cere lib. j. resine sicce lib. ij. caprini flicoris montani, seminis rosæ, niri, cyperi, cardamomi singul. sextuncem. Malagma ex bacis lauri. Cere, resine, picis, baccarum lauri, adipis taurini, singul. lib. j. niri, ammoniaci Thymiamatis, singul. sextuncem, Aceti quod satis est. Malagma ex feminibus. Cardamomi, cyperi, herbe sabine, niri, baccarum lauri, cassiæ, mellis, feni græci, nardi celtici, seminis apij, sampsochi, anisidicis panacis, thuris, ammoniaci Thymiamatis, terebinthine, singulo. quadrans, mellis, cere, sardini, singul. lib. j. adipis taurini lib. j.

Malagma fetidum, pleuriticum. Resine picce lib. j. cere, niri, niri dis, cyprini, singul. sextuncem, sulphuris uis opoponacis, sagapeni singul. drac. iij. Quidam etiam galbani drac. iij. Malagma ex Sampscho. Cere lib. j. terebinthine lib. ij. sampsochi, baccarum lauri, feni græci, singul. sextar. j. Nardi quod satis est. Malagma Apolliphania. Ad hepaticos.

Cere drach. lxxx. terebinthine, manne, singul. drach. xl Irini feces contusæ, & pilam infuso. Malagma Copson, id est quod contunditur. Ad sinachi & hepatis duriciam. Propolis sextuncem, si praxia sextantem, mastiches unc. j. terebinthine unc. ʒ. feni nardi quantum sufficit.

Malagma ex cenanthe. Cenanthes, aloes, croci, acacie, aluminis scissi, rosarum siccarum, siacet ablinthij, galbe, omphacij, rhodis Syriaci manne, singul. drac. j. olei myrti, cere, singul. lib. j. palmulas magnas. uini amminci quod satis est. Malagma Anrylium. Aluminis scissi unc. ʒ. aloes unc. j. mastiches scrup. j. cenanthes scrup. vi. omphacij, scrup. viij. rosarum siccarum scrup. viij. rhodis Syriaci scrup. x. spingæ Egyptiæ scrup. x. balauitiorum scrup. xx. gallarum scrup. xv. cere quincuncem, olei melini quod satis est. Malagma ex uinaceta. Croci, sandicis, cenanthes, singul. unc. j. aluminis scissi orientem, balauitiorum, omphacij, rosarum floris, baccarum myrti aridarum, singul. sextantem, cere albi lib. j. olei melini lib. ij. malorij cydoniarum trientem, palmulas Nicolao x. uini Aminoci quod satis est, Viancorum aridarum bellem. In usu medicamenti quadrans emulgem cere unc. j. permisceto. Malagma Anethinum. Anethi niri dis sextuncem, mellis sextantem, chamæleidi sextantem, papaueris capita uiridis. x. Coquinæ, & decocti lib. ij. & eodem olei misceat ac coquito. Et ubi consumptum fuerit decoctum, adipis porcini rectis li. j. addicito. et scorum scissæ affate internæ partis sextantem, & medullæ cervinæ sextantem terito, ac om

ma misceto. Malagma Ambrosia, finiens febrem. Spuma argenti lib. j. adipis porcini recentis sexuncem, succi seminis lini sexuncem, cere albæ dodrantem, rosa cœi lib. j. mellis quadratam, croci (unc. j. Quidam etiam uillosos suorum crudos. z.

De Acopis, illitionibus, dropacibus et Sinapismis. Cap. XXXI.

A Copia dicuntur ex eo quod primariè ad lassitudinis sensum inuicti sunt, auditur est. Teniusus, ulcerosus, & ita sensus qui ossa lassare uidentur. Verum etiam alijs pluribus consentiunt. Quædam enim ex ipsis calidiora sunt quædam molliora; quædam lancinantiâ. Calidiora igitur ex pipere, piperis, roris marini semine, & similibus parantur, nervorumq; affectionibus conducunt, & perfrigerationibus uehementibus, & quæ difficulter recalescunt. Molliora uero ad duriciis & scirrhis, & compactionibus artuum, quorum materiam in capite de emplastris indicauimus. At lancinantibus, quæ ex adarce, & roris marini semine, & euphorbio, & grano Caidio quibusq; componuntur, in diuturnis affectionibus, & quæ ægrè exigi possunt, & in quibus Sinapismus etiam conuenit, uniuersum. Cæterum omnia Acopia lassitudinem inser cerata & emplastra medium habere conueniunt. Sed & illitiones acopis consimiles, liquidiorum quodam modo compagem habent. At Dropax duplici modo preparatur, altero uelut emplastrum, altero uelut malagma. Quidam etiam calidum ipsum illiunt. Verum materiam acopis & emplastris similes recipiunt. Vsum autem exhibet cataplasmatis, diuturnis conueniens affectionibus, si dem quibus & Sinapismus. Sed & ante Sinapismum adhibetur, ut corpus ad sinapim præparetur & post Sinapismum, ut affectionis reliquias excindat Sinapismus porro materiam non habet uariâ, sed efficacissimus est in diuturnis maxime affectionibus, post deuictam aliorum auxiliorum facultatem comperiens. Commodat autem maxime Cephalæ, alterius capitis partis affectioni, comitiali morbo, uertiginibus insaniæ, capiti adhibitus. Verum in anhelatione, recte cernicis spiratione, & uisui uteri, thoraci. At in diuturna destillatione, etiam caput cum thorace sinapismo integendum est. Sed & stomachum & uentrem, in diuturnis ipsorum affectionibus, sinapismo integimus. Est & conueniens auxilium cox endicibus & podagris, & omni parti resoluere, ut alius perfrigerare, ut ægrè recallescere possit. Modus autem operationis medicamenti sit, ut æger quidem uehementer doleat, caro uero liuidior ac altior fiat, & ut post balneum leniter pustule erumpant. Si uero etiam sensus perierit, animaduertere oportet, & frequentius retegendo considerare. Nam non percipientes, inuoluntè se uni ignorant. Quis & in acutis morbis lethargicos, & alios in profundiorum sonnum delatos, & sopore detentos, sinapismo integimus, in principio in omibus. Vbi uero materia statum accepert, in capite. At in perfrigeratis ut recallescere non possint, erura & cubitos sinapismo integimus. Porro uindictus est Sinapismus in his qui febre continua laborant, & his qui oleus habent. Itemq; in cartilagineis & ex carnis partibus. Combustuntur enim & denigrantur aliquando partes excaræ, dum sinapismo integantur.

Acopon Broomium. Cere, colophonis, resine, sing. lib. j. adipis porcini tridentem, butyri sexuncem, aliq; & sœci græci seminis lini singul. lib. j. olei lib. j. galbani sextancem, & unc. j. Saccum cum oleo coquito, donec multa feci pars fuerit consumpta, & reliqua cum cera & galbano adijcto.

Acopon Varium. Succis althææ, sœci græci, & seminis lini, rutæ, cumini, singul. lib. j. m. edullæ cereinæ libram. j. olei ueteris lib. j. adipis anserinis, opobalsami, nardini, singulorum libram. j. cere, colophonis, resine, singul. lib. j. euphorbii, acerbantini, opoponacis, singul. sexuncem, callo nigræ quadratam. At herbarum exquisitis succus sit, singulorum libra una sumatur, & coquatur uelut præcedens.

Acopon Azaræ. Adipis porcini lib. j. adipis taurini, resine, colophonis

Acopia uelut
dila.

illitionem uer-
tis
Dropax pre-
paratur & u-
luta
sinapismu
aria

Broomium ac-
pon

Azaræ ac-
pon

Aphoniz, cefypti medicament, cere singul. lib. j. galbani quadrantes.

Acopon Basilij. Althææ, chamæmelis, m. eliocti feminis lint, singul. unc. j. s. ammomi quadrans, hæc macerantur in uini Aſcalonij aut elijci ſextar. viij. ad triduum, & ad mellis ſpiſſitudinem coquantur. Deinde ſucci lib. v. cum olei ueteris lib. ſij. & coquantur, donec modicum ſucci ſuperſue rit, & adijciatur butyri ſexuncæ, terebinthina triens, adipis aſterini unc. xv. medullæ ceruinæ cum modico oleo tritæ quincuncæ, cere albe lib. ſij.

Lafſionis

Acopon Lyſipſion. Piperis, ſtyracis, caſtorij, maſtiche, aloes, elenij, iridis, ſingul. trientē, euphorbij, coſa, ammoniaci Thymiamatis, myrrhæ, ſumpruchi, thuris, cypriſi, caſſiæ ſiliulæ, feminis roſinæ mini, ſingul. quadrantem, adarces, amomi, bdellij, xyloballami, ſingul. ſextantem, maſa barchi, ſpicæ nardi, pyretri, croci, ſingul. unc. j. opoballami lib. j. nardij, cypriſi, gleuci, ſingul. lib. ſj. cere alba j.

Fetiſan Acopion

Acopon foetidum. Ex opere Galeni de compoſitione medicamentorum ſecundū genera. Cere, terebinthina, ſingul. drach. xxiij. galbani, ammoniaci Thymiamatis, ſingul. drach. vi. olei hemi. ſj. medullæ ceruinæ drach. viij. Vtere mero & reſoluto.

Aliud foetidū Terebinthinae drach. lvi. cere drac. xxvij. cefypti, mellis, ſingul. drach. vi. medullæ ceruinæ drac. vi. ammoniaci Thymiamatis, galbani, aſphronitri, baccarum lauri, ſing. drach. vi. olei ueteris ſextar. j. Vini cyath. ſj. Quidam etiam caſtorij drach. ſij.

Acopon Barbaricum ex Euphorbio, Ad coxendicum morbum, et maltaſia. Opopanacis unc. j. cere Tyrrhenicæ lib. j. terebinthinae lib. ſj. s. galbani unc. j. ammoniaci Thymiamatis ſextantiē, euphorbij, caſtorij, pipēris albi ſing. ſextantiē, medullæ ceruinæ trientē, cefypti trientē dimidiatū, eſt aut adarces unc. s. olei ſtyracis, laurini, irini, amaraſcini, ſing. ſexuncæ, olei ueteris lib. ſj. hedychroi ſexuncæ. Acopon pyxis appellatū.

Limbiū ad clauis

Colophoniz lib. j. s. terebinthinae beſſem, ammoniaci Thymiamatis quadrantiē, thuris dodrantē, olei ueteris lib. ſj. ſucci feminis lint lib. j. ſclæſia bebuli lib. j. adipis aſterini ſexuncæ, butyri beſſē, albuminis ouorū, xxiij. pipēris reponit in uafe huxeo. Acopū ex Abiete, Galeni. Seminis abietis maturi modū Italici j. hoc eſt ſextar. xvi. olei lib. xv. cere lib. ſij. refinæ ſtrebilinae aut terebinthinae trientē, Semē abietis cōſutum in oleo iſſice, & ubi permixtum in ipſo xl. diebus, expreſſum reſice, & reliquis ammixtis unc. & ad ſpēciem laſſitudines, & reſolutiones, et articuloſe perfrigitur ationes.

Extr. acopon

Si uero uſus neceſſitas urgeat ſemē abietis cō oleo coquere oportet, admixtis ut ne eſſebaratur, reſi aquæ ſextar. ſij. In podagricis & articulariſus aſſeſionibus. Aliter idem. Olei hemi. xxv. hoc eſt ſextar. xij. s. ſeminis abietis modū j. hoc eſt ſextarios. xv. refinæ abiegne quadrantiē, refinæ ſtrebilinae aut terebinthinae quadrantiē, cere lib. j. Acopon ex populo nigra. Ad enuſa aſſeſiones. Pro Abietis ſemine, parē meſuram ſeminis populi nigre conſcripto, & reliqua ſimiliter illud preparato.

Zyſan ditiis

Illitio coſmū, ad tremores celebris. Refinæ piceæ ſexuncem, cere trientem, olei ueteris lib. j. opopanacis ſextantiē adarces unc. j. euphorbij unc. j. aſtrij trientem, aſphronitri teneri trientē. Nitrū, euphorbij adarces cō uino teritis, deinde opopanacē adijcto ac ſimul leuigato. Scorum æroſiſtica bulia eſt anchuſa liquato, quo inde colorē ſumant, & perfrigerata ex capito.

Dropax Coli

Dropax Gallus Orbiliij. Colophoniz tuſa reſolentis, refinæ piceæ & lignoſe appellatæ, quæ in ſola Italia prouenit, picis naſalis, picis ſiccæ ſingul. lib. ſij. cere lib. ſij. refinæ ſtrebilinae unc. xv. picis brunæ lib. j. nitrū lib. j. bituminis, galbani, adarces, pyretri, ſingul. ſexuncem, opopanacis, euphorbij, ueratri albi, pipēris, ſingul. trientem, ſulphuris ului quadrantem, caſtorij, ammoniaci, ſtaphidis ſylueſtris, ſingul. ſextantem, olei Siccyonij lib. j. opoballami ſexuncem.

Zyſan ſtyracis

Aliter Simplex. Cere lib. j. picis ſiccæ lib. j. s. picis brunæ lib. j. refinæ piceæ lib. j. s. refinæ ſtrebilinae lib. j. & trientē. Loco exitio preparato impoſito.

Simplicis

*Sinapiſi præ-
paratio.*

Sinapiſi præparatio. Caricæ pridie in aqua tepida macerare oportet, & poſtera die probe expreſſas ſortiter tenere. Deinde acce Sinapi, quale eſt Sinacum & Aegyptium, per ſe tenere, cremore ſicum aſuſo, & permixta in maſſas cogere, ita ut ſi coherementem ſinapiſinum facere uolueris, duas partes ſinapis, ad unam caricarum miſceamus. Si debilem, uice uerſa. Si uero moderatum, æquales partes. At ſi antequam teratur ſinapi æcto macere uolueris, quidam faciunt, debilius euadit. Ceterum poſt abſuram ſinapi, & poſt balnei uſum, ſi dolor uehementis aut rubor ſuccedat, & bullæ ne poſſint erumpant, maluiſſe aut ſani gygei ſuccum cum roſaceo lincolo in hiſ inuſato, imponemus. Deinde cerato roſaceo cum ceruſſa utemur. Ac in reſolutionibus, in quibus ſenſus obſeſus eſt, frequenter animaduertere oportet, de tege reſpice inſpicere. Nam non percipientes ſepe inmodice combuſti ſunt. Sed & capitis ſticroſis pilulæ cum a ceto impoſite, efficacioreſ ſunt quam Sinapi, & maxime in coxendicum morbo laborantibus.

*Atramēti ſini-
peris illitio.*

Illitio ex atramento ſcriptorio. Rubificans proprie, & maxime hos quibus dimidiis capitis pars dolet. Ex Alexandro.

Euphorbiæ, aramēti ſcriptorij, ſingul. drach. ſij. myrrhæ troglodyticæ, crocoginæ, piperis albi, ſingul. quadranctum, croci drach. ij. Acci quantum ſatis eſt, ut hæc probe terantur, & crutiſſimo ſimiliſi ſtigmento fiat: Et tunc illitio, illitio ſumpto ab internedia ſuperciliorū parte uſq; ad totū ſpū, maxime ſi locus pilis nudus ſit. Et ubi ſiccata fuerint, nuſus illinito, & quā bene opus ſui peregerit auxiliū hoc, in balneo hominē deducito.

Ōleum ex Vaguetorum præparatio Velle. Cap. XX.

*Ōleum ex uaga-
entis præparatio.*

EX Vaguetis & oleis uaguetis quedā ſunt ſimplicia, in quibus una ſpecies oleo inſicitur: quedam præparantur, & ex pluſibus compoſita ſunt. Et ex ſimplicibus, quedam ex floribus in oleum poſitis ſunt, uelut eſt roſaceum, chamæmelinum, ſuſinum: quedam ex fructibus & ſeminibusque, dam etiam ex germinibus quibuſdam, uelut ruta, quæ etiam cum oleo coquantur, quoniam nullus ſlos coctura dimittit. Quæ propter magis inſolentur. Verum ſi quidem ſortem & duratiorem odoris locunditatem habeant, ſi pluſibus diſtributis inſolentur, magis ſenſum partium & magis uelut, ſunt, uelut roſaceum & chamæmelinum. Quæ uero flores debiliores ſunt, & facile diſſoluntur, hi minus ſerunt inſoluntur, ut qui prompte tranſpirent, uelut ſuſinum & uiola. Ex hiſ autem quæ ex fructibus & ſeminibus ſunt, quædam ipſis totis in oleum conſecta ſunt, uelut melinum: quedam conſecta aut molita, & oleoſo quod in ipſis eſt ſeparato, aut expreſſis ipſis in cochleis, aut per aquam calidam, ſicut ſeparatio fiat, uelut quod ex nucibus ſiſeſiminum, amygdalinum, lenoſſinum, laurinum, ricinatum, raphaninum, & huiusmodi. Quæ uero ex plantis aromaticis ſunt, poſſimum ita præparantur, ut ille in oleo coquantur, cum uino, aut muſſo, aut aqua, & excoſentur, ad oleum uero ammiſcantur ſucci quidam, quandoq; etiam adipēs, aut melle. Ex talibus autem quæ ex oleoſam compagem habent ſimpliciter unguenta aut unguina dicuntur, uelut glaucinum, nardinum, ſicyonium, cyprinum. Quæ uero acoporum compagem habent, ceram aut uelinam, aut tale quoddam aſſumunt, Myracopæ appellantur, quemadmodum eſt decumyron, & Amaraci uero & hiſ ſimilia. Et quædam ſane una uice coquuntur, quæ ſanctam non ita uariam habent, quemadmodum metopium, maſtichinum, ſicyonidem. Quedam per duas, aut tres, aut quatuor inſectiones, ita ut priores contumaciora coquantur, uelut eſt aſpalathrus, ſpachæ, arbor thuris, laurus. Deinde aromata, ſolum, ſpica nardi, amomum, herba ſahina. Poſtremo ſucci adipēs & medullæ & ſi ita coniungat, cera & reſina inſiſcantur. At Opoballami ſuccum omnino non coquuntur, ſed poſt perfectam cocturam, refrigato medio critere unguento inſiſtitur. Sed & ex ipſis unguentis quedam omnino non admittunt cocturam, ſed ſolum permixcentur, uelut Mendellum. Quidam porro aſide unguentum facere uolentes, tingunt ipſum poſt-

Myracopæ.

*Viſcidum ut ſit
unguentum.*

quidam

quas ab igne ablari efficit in v. olei sextarios, aeruginis rase trite probe, unc.
 3. & immixtiones, uelut in cyprino & amaracino. Ceterum simplicia ungenta
 uim habent specierum quæ in ipsa inijciuntur, aut ex quibus contritis facta
 sunt, quomodo oleum uelut marisæ rationem in ipsis obtineat. At eorum quæ
 uaria sunt, tota natura ad caliditatem uergit. Verum quædam uicem tenent
 calida & molliora sunt, ut etiam articulis distortis ac compactis conueni-
 ant, uelut est Myrtopy, Mendesium, Marciaron. Moderatus uero est pen-
 tanyron, quem admodum rursus deca myron fortius, ut etiam superficiem
 radat. Quædam uero moderate quidem calida sunt, sed tenuium partium,
 ideoq; & mitigant & concoquunt, uelut est Sulinum, amaracinum, Irinum,
 crocinum, soliatum. Quædam ad hoc quod calefaciunt, satis abunde siccæ,
 & secandi uim habent, uelut cyprinum & Sicyonium. Quædam uero cali-
 da quidem satis sunt, uerum magis corroborant. Unde stomacho maxime,
 & uisceribus exolutis conueniunt. Talia sunt mastichinum, nardinum, gleu-
 cinum. Magis tamē corroborat q; sit ex uase acerbæ sineco, omphacio appri-
 lato. At quibusdā unguentis propter odoris inceditatem solū, mulieres unun-
 tur, ut est foliatū, ipsi eam commugent, & ex moscho facta, moscholes dicta.

infoliat.

Rosaceum. Rosarum nobiliarum exunguium & per diem ac noctem
 siccatarum quadrante, olei omphacini sextar. Iulicū j. Vase diligen-
 ter confuso ut ne transpirent, insolato sub dio ad dies xl. Et tunc reponi-
 to non in paucimento, sed in tabula. Quidam pro insolatione, uas in pute-
 um demittunt additis xleo quidd ex frigidityate confertur odoris inceden-
 tas. Alij ipsum uas in terra desodiunt.

Chamælinum. Floris chamæmeli, citra albā folia, per diem ac noc-
 tem siccant sextante, olei sextar. Iulicū j. Vase limbo simplici contegito ut
 transpiret & hoc quoq; ad dies xl. insolato post quas secure operis reposito.

Anethinum. Coram anethi uiridia siccata unc. j. olei dulcis sextar.
 Ital. j. Similiter insolato. Plerūq; etiam poterit pro temporis occasione Anethi-
 num, si insolentem non addit. Sicut enim anethi coram cum oleo in duplici
 uase coquimus, & utimur. Fit etiam Chamælinum similiter. Verum de
 his flora hæc sunt illis quæ ex uindibus sunt, & insolantur.

Liliaceum, quod alij Sulinum. Fortassis ideo quod in Sasis reperitur
 sit, soliorum liliorum alborum similiter siccatorū sextans, in sextar. olei Ital.
 j. mititur, & exacte consiliugent ut ne transpiret, & per triduum insolatur.
 Post quod tempus primis excolatis ac abiectis, alius sextans inijciatur ad
 insudatq; triduum, atq; sic reponitur.

*sextans i. sa-
 j.*

Sulinum compolitum. Olei sextar. 3j. calami aromatici quincuncem,
 myrrhe quincuncem, cardamomi quadrante, soliorum lilij exunguiū &
 siccatorum lib. j. cinamomi quadrante, croci Calicij quincuncem, Tota
 preparatio in tres iniectiones diuidatur. Et primum quidem myrrham & ca-
 lamum uino ad dies quinq; maceramus, ac ter in die mouemus, & tunc cum
 oleo ad breuissimum tempus coquimus. Deinde Cardamomum ad tridui-
 um aqua maceramus, similiterq; mouemus, & rursus coquimus cum oleo
 ad unam horam. Postea colantes, ad oleum purum tertiam liliorum partē
 inijcimus: & post triduum excolantes, alteram tertiam liliorum partem inij-
 ciunt: & rursus post triduum excolantes, & priora abiecientes, postremam
 tertiam liliorum partem cum croco trito immittimus. Post aliud autem tri-
 duum, excolato oleo cinamomum contritum inijcimus, aut pro ipso, Arna-
 bo, aut cassia duplicem, aut capellum, atq; sic reponimus.

Violaceum. Violaceum præparant alij purpurearum, alij crocina. *Vide mpla*
 cum, alij albarum uiolarū soliorum exunguium quadrante inijcientes, in
 ter omphacini sextar. Ital. j. Et adstricto uase exacte ut ne transpirent, inso-
 lant ad dies x, rer ipsos uolus post triduum semper, uelut lilia permixtantes.
 Sed & ad repositionem paucas uiolas exacte siccas inijciunt.

Melinum. Hoc paratur ex malis cydonijs, forisfecus panniculo de-
 teritis,

tertia, & una cum corticibus in frustra conctis, deinde libris. iij. ex ipsis, in
fextar. x. Italicos olei omphacini iniecto, & insolato ad dies. xl.

Sesamini. Olei sit, cotulis aut molinis sesaminis, autq. filicellis in cochlea
expressis, aut in aqua calida oleo ipso separato, & in utrius uasis reposito.

Raphaninum. Et hoc eodem modo in Aegypto fit, ex semine rapha-
norum tenues radices habentium trito, & oleo separato.

Ricini. Et hoc eodem modo in Aegypto fit, ex semine ricini quod
croton uocatur, similiter trito, aut molito.

Aegirinum ex populo nigra. Circa ueris tempus hoc fit, quum mul-
ta circa lemnes est resina. Nam grana populi nigrescunt, & horum
trientem in sextarium olei dulcis inijciunt, & ad dies xl. insolant, aut in du-
plici uase ad horam q. coquunt, & sic excolatum reponunt.

Amygdalinum. Fit & hoc uelut praedictum, tuls amygdalis amara
paris, & modica aqua instillata, & oleo solo separato uelut dictum est. Qui-
dam tulsorum amygdalorum sextantem, in olei dulcis sextar. Italicum j. in-
munt, & in duplici uase coquant.

Amygdalinum quod & Metopium. Aegyptij qui hoc oleum inue-
nerunt, Metopium ipsam appellauerunt, eo quod galbanum recipit. Planta
autem ex qua fit galbanum, Metopium uocatur. Recipit hanc. Olei ompha-
cini sextar. xx. amygdalorum amarorum lib. ij. cardamomi lib. j. floris iunci
odorati, calami aromatici, carpobalsami, singul. lib. j. myrrhae, galbani, sin-
gul. sextancem, terchinthinae lib. j. Vini odorati ad maceranda in ipso arida
sextar. iij. Mellis Amici lib. ij. Resinam & galbanum cum parte olei trita ac
dissoluta, reliquis coctis inijcimus, & tunc mel addimus. Quum uero omnia
exacte permixta fuerint, dum leuiter calidum adhuc est, modicamenam ab
igne tollimus & excolamus. Frigescens enim crassam fit.

Balaninum. Sed & Balaninum similiter ut simplex amygdalinum fit,
non ab his quae in quercubus nascuntur glandibus, sed ex his quae unguen-
tae glandes & myrobalaui appellantur.

Quod ex nucibus fit oleum, eodem uelut relatu, ex ueterib. nucibus fit.
Lautinum. Purum quidem lautinum simili modo ut relatu, ex lautis
cui sit. Verum quod mixtum est, hoc modo paratur. Ad oliuarum maturari
sextar. v. baccarum laut sextar. j. inijcitur, ceruicunq. omnia ac exprimun-
tur. Quidam aequalem ex ambobus mensuram sumunt ac miscent.

Lentilicium. Et hoc similiter ut lautinum paratur lentilici fructu,
duplici modo, & per se, & cum oleis non maturis, sed acerbis.

Masticinum. Simplicissimum quidem fit, masticis chire unc. j. in
olei omphacini sextar. j. iniecto, & in duplici uase cocto. Quidam etiam ab-
sintij & styractis singul. unc. j. inijciunt.

Masticinum uellegatum. Olei sextar. l. de enj lib. v. xylomastici lib.
x. floris iunci odorati lib. v. cardamomi lib. vij. masticis lib. v. xylomasti-
cis lib. vij. terchinthinae lib. ij. comarabundinae lib. j. Vini odorati sextar.
v. aquae sextar. x. Arida uino triduo antea macerata, ad oleum & aquam mi-
scuntur, & coquantur horis vi. & tunc masticis & terchinthina inijciunt, &
exacte permixta excolantur, & refrigerata uasis excipiuntur.

Sicyonium simplex. Hoc fit radice cucumeris lyneffris sextante, in o-
lei sextar. Italicum j. coniecto, & in duplici uase coctum facta.

Sicyonium compositum. Olei sextar. x. radice cucumeris h. ludris
detrahe lib. j. serpylli, melilossi, singul. sextancem, cedrarum pinicarum pingulsi,
althaeae, singul. quincem, scelopendri sextancem, foeni graeci sextar. ij.
sic ut praedicti die uno in aqua prunis cerant, deinde excolant, & praedicta
inijciunt uni cum oleo, & uini sextar. j. Et ad omnia cocta, medulla ceruic
cum modico oleo trita triens immittitur, & adipis gallinae triens. Et ex-
colati oleum uasis excipiuntur. Quidā post coctura insolant ipsum ad dies xl.

Sicyonium aliud efficacia. Succo elaterij sextar. ij. aristolochiae ros-
tundae

Croton, nihil
fracta.

Metopium.

Vigintior
glandes Myro-
balani.

Sicyonium na-
re paratur.

tunda & longa, styracis, eleuthis, hyssopi, iridis, colo cyndididis, polegi, origa-
 ni, cyperi, dendroliham, centaury, solitori in liura, singul. sextantē, olei sex-
 tantē. Mixta coquito donec parum succi superest.

Cyperinum ex Polidonio. Olei sextar. xv. cyperi, eleuthis, iridis, sing.
 lib. j. sampfuchi, hyssopi, seminis utricis, salute, sing. quadrante, floris cy-
 perii ligustri lib. j. Reliqua omnia in uino die una macerata coquuntur cū
 oleo ad horts. vj. Ad excolatum autem oleum ligustrum inijciatur, siquidē
 addit, utride cum teneris ramulis non consulsis, sin minus, siccis cum modica
 aqua consulsis, & coquatur ad scipis horam. Si uero uelis ipsum tingere, ubi
 ab igne ademptum est, aruginis puræ unc. j. & inijce. Ad Polidonium acri-
 moniam frugis is fulgens, post cocturam inquit, dimittito oleam in cacabo
 non obliuo stanno per triduum, & tingatur facultate ipsius non lesa.

Aerugo in an-
 gustis

Cypripitalia descriptio. Folium ligustri, solitum lauri, iridis, cype-
 ri, salute, singul. quadrante, dendroliham, aristolochie longæ, seminis ut-
 ricis singul. tricenem, eleuthis, aspalathi, singul. sexuncem, nux sextantem, co-
 pressi sextantem, olei sextar. x. Hæc in uino premacerata cum oleo coqui-
 to, & excolato oleo rursus xylobalsami, xylocassii, sing. tricenem inijcto,
 sampfuchi, cumini, myrti, styracis, mastiches, singul. quadrante, opopana-
 cis sextantem, floris ligustri sexuncem, aruginis unciam unam.

Amaracinum. Eleuthis lib. x. xylobalsami lib. xx. cyperi lib. viij. floris
 iunci odorati, aspalathi, herba subina, singul. lib. viij. opopanaeis, seminis
 amaraci, singul. lib. ij. Olei primarij sextar. lxxx. Vini odorati sextar. v. Reli-
 qua omnia uino premacerata primam habent infectionem, secundam her-
 ba subina. Ex illa quidem horts vj. coquantur, hæc tribus. Quidam etiam hoc
 tingentes aruginis quadrantem inijciunt.

Cibus prima
 rium

Irinum. Iridis, aspalathi, cyperi, singul. lib. v. opopanaeis quadran-
 tem, anchusæ sextantem, olei sextar. xxx. Aquæ sextar. xv. Quidam etiam
 floris iunci odorati sextuncem adijciunt, & cassiæ quadrantem, xylobalsa-
 mi sexuncem, celticæ sexuncem. Omnis consusa, aqua & oleo præmaceren-
 tur ad dies v. & in duplici uase coquantur ad horts. vj. & Reponantur.

Crocinum. In quo etiam alterum Crocomagma. Olei omphacini odo-
 rati libram unam, calami aromati et quincuncē, myrrhæ troglodyniæ quin-
 cuncem, cardamomi septuncem, croci olei sextuncem. Primæ infectionis
 sit calamus & myrrha, quæ tria uino macerantur per triduum, & ter in die
 palmacea spatula agitantur. Deinde cum oleo coquantur. Secundæ carda-
 momum pridie aqua maceratum. Tertiæ crocus uino maceratus. Quidam
 cum croco etiam alium myrrhæ quincuncem adijciunt. Et excolatum olei
 parum reponunt. Specierum autem fecem subidentem totam in pastillos
 efformant ac sic cant, habentq; medicamentum illud quod Crocomagma tro-
 cant. Mendacium. Inde dictum est, quod in Aegypto inuenta sit, ubi
 & Mædes colitur. Recipit olei balsami lib. x. In alio sunt sextar. x. myrrhæ,
 cassiæ fistule, singul. quadrante, terebinthine lib. x. In alio sunt sextar. x.
 Cinamomi quadrans. Hoc non coquitur, sed arida iniedia per dies homo-
 uentur. Deinde liquata in olei parte terebinthina immittitur, & postea rur-
 sus per alios lx. dies monetur. Atq; sic reponitur.

Crocomagma
 Mendacium

Marcium. Mastiches, ceteræ, styracis, singul. quadrantē, olei omphacini, sin-
 gulorum quadrantem, medullæ ceruinæ unc. j. & terebinthine unc. j.

Marcium

Vegentum ex uia acerba. Iniedio. j. Aspalathi, spathe palmula-
 rum, melisoti, iridis, floris iunci odorati, xylobalsami, rosarum licetorum, ca-
 lini aromati, singulorum quadrantem, olei omphacini libras. x. succi u-
 iæ acerbæ sextar. x.

Iniedio. ij. Folij amomi, spicæ nardi, costi, caryophylli, cassiæ, cassamē,
 singul. quadrantem. In alio etiam arabio quadrantem. Vini quod satis est.

Iniedio. iij. Thuris, ammoniaci thymamatis, styracis, olei, myrrhæ,
 G masticæ

maſticheſ, ſingul quadrantem, uſui quod ſatis eſt, cere albæ quincuncem, opoballami ſexuncem. Quidam beſſem. Primæ iniectionis medicamentum in ſucco uitræ acerbæ & oleo olei una præparantur. Secundæ uero iniectionis in alia pelui, in uino Aménio, aurilio utrius & odorato. Moritur quotidie ſpacha palmacea. ter in dies tres. Poſt quos in cacabo ſtanno obliſo coquitur. Primum primæ iniectionis medicamenta donec parum de uing acerbæ ſucco ſuperſit. Deinde ſtatim quæ ſecundæ iniectionis ſunt cum uino immittito. Melius autem eſt ſacſa præparare colatur, ſic ipſa ad parum olei, ut inſicere, & poſtquam cocta fuerint, donec pauciſſimum uini reſbet, ut ne comburatur oleum, ablatur ab igne excolatos & rurfus ad oleum puri, ter in iniectionis medicamenta ſucculenta prius cum uino, quale diſit, in mortario trita inſicere, ſyracæ exceptio: Hic enim cum alijs iniectionis facile ſoluitur & ad prius coquitur, donec bene habere uſa fuerint, & ablata ab igne refrigerari ſinito. Poſtridie ad olei diligenter excolati, & ſufficienter calefactum ſuper ignem, etiam inſicere, & ablata ſpachula commouere, & ubi refrigerata fuerint, opoballamum adſicere, & in uas uſtreis reponere.

Glacium

Glacium. Iniection. j. Olei ſextar. x. muſti Aménii ſextar. vi. ſpachula trientem, ſpacha palmaceæ ſexuncem, ſloris ſunci odorati ſexuncem, meliſtri trientem, roſarum unc. j. myrrhæ quadrantem, foliorum lauri ſextantem, dendrobii ſexuncem, xyloballami ſexuncem, clematis ſexuncem, ariſtoloſchiæ longæ quadrantem, ariſidis quadrantem. Hæc in muſto macerata.

Iniection. ij. Cnicæ trientem, caſſiæ ſextantem, cyperi, caſſiæ, ſpicis nardi, aſari, amomi, coſti, ſampſuchi, ſing. quadrantem, calami aromatici, caryophyllorum, folij linguæ unc. j. cardamomi nienſem, uino odorato macerata.

Iniection. iij. Maſticheſ trientem, myrrhæ troglodyticæ, bdelli, ſingul. ſextantem, ladani quadrantem, ſyracis liquidæ, rhuiſis maſculi, ſingul. trientem, opoballami ſexuncem. Quidam etiam croci ſextantem. Præparatio uelut in quodam ex una acerbâ ſit, excepta cera. Verum hic per. vii. dies, duarum iniectionum ſpecies macerare oportet.

Roridum
Cicicium

Nardini Cicicium. Iniection. j. Olei primarij ſextar. x. aſpalathi, cyperi, elenij, ariſidis, xyloballami, ariſtoloſchiæ, cardamomi, ſloris ſunci odorati, ſing. ſexuncem, ſampſuchi trientem, herbarum ſahinæ ſextantem. Quidam etiam calami aromatici ſextantem. Hæc in uino odorati ſextarij macerata.

Iniection. ij. Caſſiæ. Caſſiæ, anaboſi, ſing. ſextantem, ſpicis nardi quadrantem, caryophylli unc. j. coſti, amomi, ſing. ſextantem. Quidam etiam ceteræ ſextantem. Hæc in uino macerantur. Iniection. iij. Myrrhæ troglodyticæ, aloes, rhuiſis, ſing. ſextantem, ſyracis quadrantem, maſticheſ trientem, opoballami ſexuncem. Quidam etiam croci uino triti unc. j. Præparatio & hoc uelut dictum eſt.

Decamylon

Decamylon. Spicis nardi, folij euphorbij, pipere, coſti, adarces, ſing. unc. j. maſticheſ unc. j. opoballami ſexuncem, nardini lib. j. cere ſexuncem.

Pentamylon

Pentamylon. Syracis unc. j. maſticheſ ſextantem, cere albæ quadrantem, opoballami trientem, nardini quincuncem.

Follatum

Follatum. Folij quadrantem, amomi unc. j. caſſiæ ſextantem, ladani unc. j. pipere albi grana, ad uirgæ troglodyticæ drach. j. Conuſa & cribrata turkas in pelle ſeuigato, olei nardini lib. j. adſecta. Quo uero nigrius pharſacæ reddatur, nucum iuglandum cortices uſtos acriter in mortario adſicere. Deinde opoballami cochlearia tria ammiſcero, ac utitur.

De ananthe

Cap. XXXI.

Ananthe
unde appellat
ta

Non quod ananthen recipiantur hæc, anantharia appellata ſunt: Quædam enim ananthen omnino non recipiunt ſed propter uinum, & flore meliſſorum, hæc appellatorem ad præparata ſunt. Vius ananthariorum apud quosdam in ſuauitatis odoris tantum, & deliciatum grana aſſimilatur, qui ipſa uteretur poſt balnea eis proſunduntur, & ſpongijs his imbutis emenſas deſurgit. Verum apud recte utentem etiam auxilia ſunt, in hijs qui ex oluſoribus, & ſynecopem inſtituti ad cataplaſmata ſtomachum corroborantia admiſceantur.

aur, & in his qui ex morbo febrili maxime se recoſcunt, qui poſt egreſſus
 è balneis perſudantur iſtis, & naribus adhuc valde inſpirantibus iſta ad-
 mouent. Trahuntur enim in profundum, & animalem acutalem ſpiri-
 tum corroborant. Comoda ſunt etiam his qui ſe preſeruant, ne in peſtilentes
 morbos incidant, quum aeris mutatio huiusmodi apparet. Eſt autem Po-
 ſidonij tale quod Meſopotamenum vocat.

Oenanthe Meſopotamici præparatio. Caſſiæ, myrrhæ, thuris,
 ſoli, amomi, maſtiche, coſti, carpopaſſami, opobaſſami, ſingul. quadran-
 tem, ſtyracis pinguis trientem, vini odorati Amianthi Italici ſextar. x. Om-
 nia conuſa & cribrata, ſtyracem vero in tenues partes diuiſum, in nas am-
 plioris compoſito, cum ſili ſolijs pridie ſiccatis & exungulibus alternatim
 locatis ſint ad ſidâ numero. ccc. Unde adijce vinum & opobaſſam ſan-
 te inſoſionem mixtae commota, & obſurato oſculo ualiſ inſiſtato ad di-
 ex. xl. Et uterè balneis, poſt recoſſationem ex morbo, & reſpergiſo ex ſe-
 pio domum & uſa. Tingo item in ipſo ſpongias, & ad faciem apponito.
 Aliud. Sicut nos parare ſolemus. Coſti quadrantem, ſpicæ nardi, an-
 nabo, caryophylli, ſingul. unc. j. amomi quadrantem, caſſiæ, oenanthe, cala-
 mi ſingulorum dodrantem, ſtyracis opobaſſami, ſingul. orientem, ſidâ. ccc.
 Vini ſalerni ſextar. x. præparato ſimili modo.

De ſuffimentis ex Cyphi. Cap. XXXII.

Cyphos materia media eſt inter paſtillos qui bibantur, & antidota. Vti-
 mur iſtis quoadq; ad ſuffitas, ſuæ odoris gratia, quædammodò etiam
 Thymiamatis ſuffimentis. Quoadq; uero oſſicimus ipſa ad eſſo quon-
 dâs deſtillationes, et granedines remouendas, & ad cerebrum perpurgan-
 dum, & ad præſeruationeſ peſtilentibus affectionibus. Sed & per os ſumum
 tur, nam ob ead, tum ut quæ circa thoracè hyemant edoquant, & ad frigido-
 res in hepate affectiones. Vnde etiam Cyphiſformes antidotos dicunt veteres
 inuenerunt. Miſceſtur enim in cõpoſita medicamenta, maxime epithemata &
 antidota. Thymiamata id eſt ſuffimenta roſati. Coſti, amomi, myrrhæ,
 caſſiæ, ſing. unc. j. ſtyracis, maſtiche, chitæ, bdelli, onychum, muſci, ladan-
 i, ſing. di. ach. ſp. oſorum purarum unc. xxx. opobaſſami, Vini quod ſatis eſt.

Suffimentum Lilaceum. Liliorum exungulam lib. j. ſtyracis primarij
 dodrantem, ſpicæ nardi quadrantem, coſti, caryophylli, amomi, maſtiche,
 onychum ſilorum, ciliſ ſing. unc. j. s. opobaſſami quincuncem, Vini quod
 ſatis eſt. Tenu ac efformato in paſtillos.

Cyphi magnam quod Solare uocant, ex rebus xxxvi. ſtyracis, myr-
 rhæ, bdelli, ladan, aſpalaſti, eleni, ſingul. ſextuncem, nardi celiæ, ſoli, cu-
 preſſi ſeminis, ammoniaci Thymiamatis, nucis pineæ, ſplanchni, aut pro ſe-
 pio onychum magnorum. ſ. carpopaſſami ſing. quadrantem, caſſiæ, tridâ,
 ſeſeli, ſphagni, cypri, cardamomi, calami aromatici, ſingul. quincuncem,
 roſarum licarum, eroci, ſpicæ nardi, herbe Sabine, radicis aſphodeli, alijs
 ſuccis habent, ſingul. orientem, lacaphebi (eſt autem pinſ, aut alterius, eu-
 ſiſidam arboris cortex) dodrantem, coſti, ſloris (ſunt odorati ſingul. ſextar-
 tem, hac eas ſumperi magnas. xl. & paruas. l. amomi, terebinthinæ, palamola-
 rum purarum, ſingul. lib. j. caricarum exemptis granis, uuarum paſſarum
 euſſæpæ uinacis, ſingul. lib. ij. Mellis deſpumati lib. v. Polidionis etiam
 uini odorati ſextar. ij.

Aliud cyphi Lantre appellatum, ex rebus xxvij. Bdelli, eleni, ſingul.
 ſeptuncem, amoni quincuncem, ſphagni quincuncem, hac eas ſumperi
 paruas. l. cardamomi quincuncem, aſpalaſti ſeptuncem, caſſiæ ſiſitile
 quincuncem, ſpicæ nardi ſextuncem, cypri quincuncem, aſphodeli radi-
 cis, Sabine, ſiſiquitrientem, ſeminis cupreſſi, nardi celiæ, aſpalaſti cili
 ſolijs, roſarum ſiccarum, ſingul. quadrantem, coſti, eroci, ſingul. ſextuncem, lada-
 ni, myrrhæ, ſingul. ſeptuncem, caricarum pinguum, uuarum paſſarum exemptis
 uinacis, ſingul. lib. ij. nucum pincarum bellæ, terebinthinæ lib. j. ſtyracis ſe-
 ptuncem

Suffimenta au-
 ria

Cyphi Solare

Lacophorum
 quid ſi

Cyphi Lantre

puncem, palmulari pingui lib. j. Mellis lib. v. Vini odorati quod satis est.

Preparatio Mastice quam aliqui Mastaphium vocant.

Capit. XXIII.

Melliosi dextrantem, xyloballami, aspalathi, herbe sabine, myrrhe, amomi, floris iunci odorati, foliorum lauri, flacles, styracis, calami aromatici, sampiachi, singulorum sextantem, iris quincuncem, folij, croci, singulorum unc. j. opobalsami unc. s. gummi lib. s. rosarum licearum sextantem, Vini quod satis est.

De pessis talis. Cap. XXIII.

Pessi sunt Tali, utro adhibentur. Differentia ipsorum secundum genus tres sunt. Quidam enim molliunt. Quidam adstringunt. Quidam oscula denarum aperiunt. Mollientibus igitur in uteri inflammationibus, ulcerationibus, perfrigerationibus, secuslibus sursum uetus, anersionibus & infestationibus utitur. Parantur autem ex cera Tyrrhenica, cyprino, susino, adeste asferio aut gallinaceo, butyro infuso, resina uita, medulla ceruina, ficenagrace, & quae eiusdem generis sunt. Aperientibus autem oscula uterinam, quum purgationem suppressam reuocare uoluerimus, aut uteri contractionem aut contractionem corrigere. Parantur hi ex melle, artemisia, didamno, brassicae succo, radice dale, porri succo, ruta, scammonia, & similibus. At uero adstringentes contrarium his qui aperiunt, usum exhibent. Nam fluxum multibrem cohibent, & expallum uterum contrahunt, & prolapsum repellunt. Verum materia adstringentium antea indicata est in tractatione de colligijs & pessis. Oportet autem frigiditatem & paulo crassiorem facere pessi spissitudinem. Deinde lanam linamento angusto similem duplicatam in medicamentum tingere, & ad uteri osculum apponere, ita ut filum oblongum habeat annexum, quo pessus facile extrahi possit, ubi id usum fuerit.

Pessus Croceus, ad inflammationes, & auersiones, duritiesq; ac inflammationes. Cere albæ, medullæ uulnæ, singulorum drachmas, xvi. medullæ cerninæ drachmas, xi. adipis anserini drachmas. viij. adipis gallinæ drachmas. viij. mastiches drachmas. iij. ceypti medicamenti drachmas. iij. mellis drachmas. ij. croci drach. viij. Rosacei quod satis est. Crocum cum lacte muliebris terito.

Pessus Arcus molliens optimus. Croci drach. j. ceypti drach. j. medullæ cerninæ drach. ij. terebinthinæ, cere, adipis anserini, singul. drach. ij. uorum assatorum utellos, xvi. olei & rosacei ex aquo quod satis est.

Pessus Lethargicus, menses ducti, & ad uerinas affectiones egregie cōducit. Vaguenti nardini sextantem, cere Tyrrhenicæ quincuncem, uaguenti susini nucem, adipis porcini recentis quadrantem, adipis anserini, gallinæ ceti, medullæ ceruinæ, unguenti amaraeina, singul. sextantem, adipis taurini, terebinthinæ, ceypti, singul. unc. j. Liquatur in duplici uase, quemadmodum etiam omnes alij pessi.

Pessus Encephalicus. Vaguenti rosacei, ricini, terebinthinæ, cere, mellis, adipis anserini & butuli, medullæ ceruinæ, butyri, sing. quales partes. Pessus Titianus emolliens. Cere sextuncem, colophonice trientem & unc. s. adipis taurini trientem, amantiaci Thymiamatis trisente m. Ammoniacum cum aqua terito.

Pessus Aegyptius. Mellis, terebinthinæ, butyri, rosacei, aut susini, croci singulorum portens. j. Verum si non inflammatis & sordidis, etiam sanguinis dimidia pars additur.

Pessus Genitura appellatus. Ad concipiendum. Butyri sextuncem, ceypti medicamenti, medullæ ceruinæ, adipis anserini & gallinæ ceti, terebinthinæ, aloes, singulorum quadrantem, cere Tyrrhenicæ sextuncem, rosacei libras. ij. myrrhe, cassiæ, singulorum sextantem, spicæ nardi unciam. j. Mellis quantum satis est.

De medicamentis inter se mixtis succedaneis. Ex Galieno.

Secundum

Capit. XXV.

IN Alexandria, inquit, quum muliercula quadam periclitante quæresivisse mulichnidem, nec repenssem nisi non tantum pro lychnide, acanthiæ semine comperito usus essem, perisset mulier. Quare rogatus à sodalibus, ad hanc succedaneorum inser te vicissim medicamentorum descriptionem iuxta for dinem literarum decendi ab hoc ipso initium facturus.

A

Acanthiæ semine, lychnis.
 Abrotano, origanum.
 Agallocho, calamus aromaticus.
 Agarico, epythymæ, aut euphorbiæ.
 Agrostiaphide, palmulæ Syriacæ.
 Anchusæ, hyacinthus.
 Acacia, lentisci succus.
 Acanthæ, acanthi fistiquæ.
 Acanthi fistiquæ, Acanthæ.
 Aconito, iudæi sylvestris radix.
 Acoro, asari radix.
 Alamine, sal fossilis.
 Alumine sicco, malicorium.
 Alia, glaucum aut fumus oullis.
 Alia, è sambeco, acanthæ.
 Alicacabo, Solani fructus.
 Aloe, ibidis fructus.
 Aloe Indica, aloes uiridis folia, glaucum, Lycium, aut cerasurion.
 Amnio, anisim.
 Amianto, aphroscemon.
 Amylo, pæles siccus.
 Amygdalis amaris, ablinthum.
 Ammoniaci Thymiamate, propolis.
 Adipe vulpino, ursinus. (hic.)
 Adipe cervino, anserinus. (urs.)
 Adipe nitulino, adeps porcinus uer.
 Adipe hyænz, adeps anserinus, aut vulpinus.
 Adipe crocodili, adeps canis marini.
 Amomo, acorus.
 Aniso, Dauces.
 Araco, sesamum.
 Argemone, seriphium.
 Aristolochia, eleonarchis succa.
 Aristolochia rotunda, aristolochia lili.
 Armato, passarii Babylonicæ. (ga.)
 Armenio, Auramentum Indicum.
 Asaro, zingiber.
 Asio lapide, lapis gagates, aut salammoniacus, aut sandaracha.
 Aspalathos, ericæ fructus, aut utricis semen.
 Asphodeli radice, betæ succus.
 Asinutio, abrotanum.
 Autipigmento, sandaracha.

B

Binumine, pix liquida aut terra am pelitis.
 Balastio, hypo-cistis aut Cytini.
 Balsamo, myrrha fructe.
 Bellio, sphagius aromaticus.
 Beta, semen rutæ sylvestris, aut her.
 Baprosii, blani cap. detractio. (talis.)
 Beryro, lactus bubuli concrementum.
 Buccinis, ostrea.

C

CAdmia, leucographis Aegyptia.
 Calamo aromatico, sphagnus.
 Calamintha, syacanthis menia.
 Camarithideus, phalangia. (dæ.)
 Caparis radice, ericæ aut myricæ.
 Cardamomo, cyperus, ylocarpalum.
 Calia, cinamomum diu (duna aut her.)
 Catibina.
 Castoreo, stipitum.
 Cenchry, lauri bacce aut pyrethri.
 Cedris, bacce cedri.
 Cedri bacca, ladanum.
 Calce nina, adarce.
 Ceramio, leucographis.
 Cera, salicetia cum puopoli cocta ac trita.
 Corolla, plumbi recrementum, ad plumbum utrum.
 Chamædri, ramicis sylvestris radix.
 Cicutia, pyllis semen.
 Chamæmelos, anthemis.
 Chamælonis succo, salicis succus.
 Chalcacabo, squame æris.
 Cinnabari, Rhodoides.
 Cinamomo, cassia duplum, aut her.
 Cistaceæ duplum.
 Clinopodio, heliotropium.
 Cnici semine, utricis semen.
 Colocynthide, Ricini semen.
 Colophonia, pix naturalis.
 Corallio, Moly, aut symphitum.
 Cotto, ammoniac succedri bacce, de.
 Coryledone, Onocardiis. (nid.)
 Chrinanthemo, aphrodisias.
 Croco, crocognama.
 Crocognama, Aloe Indica.

G

Camis

Cumino Aethiopico, Melanthium.
Cynobato, Solani fructus.
Cypero, Lusiperus magna aut cat.
damomam.
Cypharites uila.
Cornu cervi, cornu caprae.

D Amalfonio, *Carpesium* aut ca-
laminta.
Dancoi semine, lauentis semen.
Declamio, *pelegium*, aut salvia.
Diphryge, maly introdictum, aut la-
pis phrygius, aut uti usum, aut la-
pis pyrites.
Doryenio, hyoseyami semen.
Draconculo, aron.

E Benzo, lori arboris lignum.
Ebuli radice, radiæ papyri.
Elaterij succo, panni fuscus, ut et ali-
dem herbar succus.
Elliboro nigro, struthij radice.
Enneaphyllo, potamogeton.
Epithymo, colocynthis semen.
Ericæ fructu, galla omphacidis.
Erylimi femine, struthium.
Erizet folijs, folia mori.
Erucæ femine, erisimi semen.
Eupatorio, chamæpitys. (litia.
Euphorbio, iterum columbari stylic.
Bruca mini, Vexor cum cedria

F
Fūcunt ſiſta, ſandanaia.
Fella ſiperæ, ſel leſneumonts.
Fellecamela, ſel ſellonia.
Felle muſtelæ, ſel ſimix.
Felle hyenæ, ſel perdicæ.
Felle, Vrticæ ſemen.
Folio, ſiſca nadi, aus Iris ſiſica.

G Albano, Sagapenum.
Galla, myrica fructus.
Geniana, Blendum.
Gentiana radice, ap[er]i aromati r[ati]o-
dix, [et] autem petroselinum.
Glyceria, succo, succus mori.

Hydrazo fuc co, fuc cus per fuc-
Hyacintho, Flos flandis. (Oro.)
Hyo foyan femine, cynosbati fru-
Hypo flidid fuceo, acaziz fuccus.
Hyperico, anethi semen.
Hippuro, chamæpfitis.
Helictropis femine, rapii semen.
Hornis femine, femine lini.

I
[Ride Illirica, Elenium aromaticū.
lunco aromatico, cardamomū aut
lunco, polygotti radix. (cinamomū.
lunperi bacca. Ovisferus.

L
L Adano, *simpluchus*.
L aithyde, *granum Cnidium*.
L apathi radice, *radix pyrethri*.
L aur bacris, *serpyllum aridum*.
L apide Afio, *gagates lapis*.
L apide phrygio, *lapis argyites aut pyrites*.
L apide pyrite, *lapis picrobolus*.
L apide Magnere, *lapis phrygius*.
L entifeo, *tere binthus*.
L epidio, *erythrodanum*.
L epidii radice, *folia capparæ*.
L eptore marino, *concha marina*.
L enno sigillo, *sindaracha*.
L eur oij Flore, *strachion*.
L ini femine, *fabarum farcua*.
L osi femine, *betæ semen*.
L ygystici femine, *radix ebuli*, aut *pastinacæ*, aut *laurea semen*.
L ychnio, *acanthii semen*.

M Alabastrus, callia, aut cupres-
sus pilulas ferens, aut spica nar-
Malva, fœnem græcum. (di.
Mandagora, doryenium.
Maks : ydomis, melilotum.
Manna, thuris cortex.
Mastiche, lentisici succus.
Medulla cerui, adips corninus, aut
medulla vituli.
Medulla vituli, ælypus, aut medul-
la vituli, levis sylvestris. (la cerui.
Melle, sapa. (ram.
Melle Arisco erado, Mel despumæ
Neo, myrobalanus
Mendacio vino, vinum Italicum
Mily torrefacto, diphryga.
Mily cyprio, ochra cypria.
Menta, calamintha.
Molybdæna, spuma argenti.
Mori succo, rubi folia.
Myrobalano, pencedanum.
Myrteo vino, Mori succus.
Myrteo oleo, lentiscinum aut me-
linum.
Myrtha troglodytica, calamus aro-
maticus.
Muriu siccioro, musca parimen-
tura.

N

N Apī femine, rapī semen. (cus.
Nardo Syriaco, sumcus aromati
Nardo Indica. Nardus e ethica.
Nucleis pīncis, cūcumeris semen.

O chra, Misy cyprium.
Oelmo, silymbrium.
Oelmoide, menta sylvestris.
Oenanthe, omphacium siccum.
Omphacio, Rheois succus.
Oley lachryma, hypo-cistidis succus.
Olee Aethiopice lachryma, acacie
partes duæ.

Oleo ricinino, laurinum aut oleus.
Oleo neteri, Steyonū, aut deplū or
lei coquito cū adipē suillo neteri.

Onocardio, pŷchic herba.
Opopanace, castoreū, lac sycamini
id est mori, pix liquida.

Oriothogalo, Anathyllis.
Oryza, farina hordeacea.
Oſtreia, buccina. (ut.

Otocum utellis affinis, medulla cer
Oestypo medicamentū, medulla uitu
lina. **P**

P Amacis radicis uncia una, opopa
natis drach. j.

P ipere, zingiber.
Pipere albo, nigrum duplicatum.
perſea folia sicca, roſa sicca.
Poucedano, glycyrrhizes sicca.
Piedra, pix liquida.

Pice bruta liquida, bitumen, pix uer
nacula abunde, aut cū muniſpax
cocta cum aceto.

Pice liquida, oppanax.
Polā femine, cruce semen.

Polygoni succo, succus Plantaginis
Polypodio, chamætera.

Polyricho, abſinthium.
Pompholygo, cadmia usta.

Potamogitono, ſerpillum.
Popul, nigra ramulis, ſampſuchus.

Propoſi, ſadanum ammoniacum.
Pŷyllio, lens paluſtris. (dix

Pyrethro, zingiber aut lapathi ra
Phu, ſphagnos.

Phycoid est fluo, anchusa.
Pulegio, hyſſopus.

Pumice, terra cretica.
Plumbo uſto, ceruſſa.

R

R Apo, heliotropium.
Raphanino oleo, ricinum

Rheo, centurium. (argenti
Recrementum plumbi, recrementū
Recremento eiprio, melaneria Aer
gyptia.

Relina colophonia, pix naualis.
Relina pini, terebinthina.

Relina picea ſicca, ſagapenum.
Relina terebinthina, relina pini.

Radice lapathi, radice cinnae.
Radice cinnae, radice ſphodeli.

Roſa ſiccis, ſolia perſe ſicca.
Rodoide, linopis rubric.

Rhoe ſyriaco, lapathi raco.
Rhoe culinario ſiccio, ſampſuchus.

Robigine ſerri, recrementum ſerri,
aut ſquama ſerri, aut ſpuma argenti.

Ricino, ſordes e paleſtra.

S

S Agapeno, galbanum, aut reſin
picea ſicca.

Sabino oleo, ricinum oleum
Salamandra, ſacra uſidia

Saluta, calami raba.
Sampſucho, rhas culinaris.

Santonico, abrotanum.
Saryrio, cruce aut ſabine ſemen.

Serapiade, pronicæ radix.
Serpillo, potamogitū, aut pyrethri

Sēperuio, ſolia ſenſucis lactuca.
Sepia teſta, pumex.

Selmo, ſemen lini.
Schmoide, quod ab amarantho ex
preſſo reſtat.

Scammonia, colocynthia, ricini ſer
uini pars interna, lathyrus.

Seico, ſaryrium.
Seila, bullas.

Sinapi, naſturtium.
Sio, id est laſere, aſparagi aut ligu
ſtici radix.

Sione, anifum.
Silymbrio, ocinum.

Spodio, pompholyx.
Spodio cyprio, cinis foliorum olei

Subio, ſquama æris.
Suceade, chamedrya.

Sori, diphyrges, aut melaneria.
Struthi radice, elleborus niger aut

enphorbium.
Sale ammoniac, ſal cappadocius

Salis flore ſandaracha.
Seyrace, caſtorum.

Symphyto, centaurium. (nicit.
Sinone ſyriaco, petroſelinū macedo

Syrice, ſpuma argenti.

Sphagno, iuncus odoratus, herba Sabina.
 Sphon Mlo, spodium cyprinum, aut cinis foliorum oleæ.
 Sulino oleo, oleum fœni græci.
 Succo balsam, myrris, trachæ, succus carpassi, fructus balsami.
 Succo Therbaico, succus papaveris.
 Succo siliçis, succus hederæ nigræ.
 Succo carpassi, succus myrris.
 Succo cyrenatico, succus Syriacus, lafer, aut sulphur succus. (cum.)
 Succo papaveris, Mandragoræ succus.
 Succo mori arboris, hederæ succus.
 Succo persico, hederæ succus.
 Succo pucedii, ghyeithizæ succus.
 Succo Rhododaphnæ, ulcæ quæ.
 Succo fici, succus mori. (cum.)
 Succo syriaco, succus mori.
 Sulphure citius, sandaracha.
 Stercoræ felis, stercus Ichneumonis.
 Stercoræ uuluris, columbæ stercus.
 Stercoræ lupi, stercus caninum.
 Stercoræ turris, stercus columbæ.

T

Terbinchina, mastiche, aut resina sirobdina.

Terra tenera, plumbago.
 Terra aspera, terra Camolia.
 Terra cretriade, calx Thebaica.
 Terra cretica, terra Eserbina.
 Terra Samia, leucographis Aegy.
 Terra Megara, spuma salis. (pna.)
 Thapsia, nascitur autem ex semine.
 Thapsia succo, chamæleonis nigri.
 Thermantia de, lycopsis. (succus.)
 Troxinus id est intabes, malulidum appellatum sine lactuca.
 Thure, terra amphius.
 Thuris cortice, manna iburis.

V

Verberaca, chamæleure.
 Vitis Italica, vinum Misedis.
 Vitis Rhodio, vinum austerum.
 Vitis Syriaco, vinum Rhodum.
 Vitis acerba, masticotum, aut galla omphacitis. (caro.)
 Vitis passa sativa palmole Syriacæ.
 Vitis quercino, chamæleuco albus.

X

Xylolbassamo, Radix leuco.
 Xylolbassamo, Radix leuco.

Z

Zingibere, pyritheum.

De ponderibus et mensuris. Cap. XXXV.

E

Pondera
mensura

Pondera grauitatis mensura indicant: Mensura autem usculi capacitatis. Vasculum uero tam arida, quam liquida quantitas mensura existit. Quare tres omnino dimensionum quantitates sunt differentie: Una quidem ponderis: altera uero rerum utrarum, utpote quæ uelut in aggerem accumulatur: Tertia autem liquidorum. Ceterum quam penè infinita pondera ac mensuræ, tam prolocorum, tam pro eorum quæ eis unum conseruandine, existant: de his saltem quæ omnibus maxime familiaria sunt, nobis sermo erit.

De pondere ac Mensuræ notis.

Eius ponderis
et mensuræ

Verum quam quidam non integris literis, sed per notas hæc ipsa pondera ac mensuras significant, præstiterit fortassis & nos in hac parte uterres imitari, atq; primum characteres ipsos declarare. Primum igitur litera, h, ubi a. litteram habuerit incumbentem, chalcum id est aerem significat, hoc modo. h. Si uero. a. ipsi. h. Incubuerit, chos id est congium demonstrat, sic h. Si. a. chamære, h. Si. a. cheman, h. Si. uero littera si in eum bene. u. habeat, & linea recta inferiorem ipsius apicem per obliquum secerat, id est si liqui significet, hoc modo. K. Quod si. ipsi. a. Incubuerit, cyathum significet, sic K. Si uero. u. costylum id est heminum, K. Porò linea circumflexa, quam nihil aliud circumstat, & quæ omnino per obliquum ponitur, obolum demorat. u. Si uero duæ sunt literæ, quas nihil circumstat, duos obolos signant, u. Qui grammæ, hoc est scrupulum faciunt, quod per litteram. r. quæ. g. adiectam habet, denotatur, recta amplius littera ipsam. f. secante, hoc modo. r. Duæ autem litteræ iuxta alteram extram mutuo conferatæ, angulum constituent, ac similitudinem duorum apicem, qui in ipsius. r. litteræ pectus ad rectam lineam pecti bidentur, drachmæ significant, quæ & Holsæ cognominantur, hoc modo. L. Proprie autem hol

ea per A. litteram notatur, a. littera medium eius occupante, hoc modo A. Quod si i. littera ad A. apponatur, libra significatur, A. Aliqui tamen litteram ipsius A. lineam per obliquum alia linea secantes, libram denotant sic, X. At vero littera r. intra angulum suum a. litteram habens, unciam significat, R. p. autem iuxta medium ipsius r. habens, minam denotat, R. Si vero v. habear, mystrum, R. Si i. medium, p. Si a. modium, p. Porro v. litteram p. complectens, & v. incumbens habens, Tryblum significat, Xp. p. autem supra se v. habens, xestens, id est Sexarium designat, j. Si vero a. habeat supra scriptum, oxybaphum, id est acerabulum, j. Aliqui tamen Xestem per j. denotant recta linea dissectum, hoc modo j. a. autem incumbens p. habens, heminum indicat, p. K. vero cum p. connexum, incumbente ipsi littera p. ceramium signat. x^p.

De ponderibus.

Mina, id est Mina Antica & Aegyptia habet uncias	xvj.
Mina Romana habet uncias	xx.
Libra Vncias	xij.
Vncia drachmas	vij.
Drachma scrupulos	ij.
Scrupulus obolos	ij.
Obolus siliquas	ij.
Siliqua areos sive areolos	ij. duasq; tertij partes.
Ita ut obolus areolos vij. complectatur.	

De Mensuris liquidorum.

Mensura liquidorum

Italicum Ceramium habet, Choas vij.	
Chus sive Congius, Sextarios vij.	
Sextarius cotulas ij. quæ & Tryblia appellantur.	
Cotula sive Tryblum, magna mystra. ij.	
Acetabula vero. iij.	
Magnum enim mystrum continet Acetabula j. & tertiam ipsius partem,	
Acetabulum vero sequicyathum habet.	

Cyathus chenas parvas, sive mystra parvas ij. habet. Quod si velis liquidorum iuxta pondus scire dimensionem: Multæ enim rerum liquidarum differentia iuxta lancie momentum existunt: id ipsum ex oleis, melle, & mellis exemplo docebitur. Mel igitur uno grauius est quæta ampliusq; decima parte, quod ferè totam tertiam eius partem facit. Habet enim eadem mellis ad unum mensura, totam vini pondus, accedente insuper tertia eius ponderis parte. Ad oleum autem mel dimensum, dimidia eius parte ponderosius existit. Habet enim totum olei pondus, atq; insuper dimidiam eius ponderis partem. Vinum vero nona parte olei excedit. Habet enim pondus ipsius totum, ampliusq; nona eius ponderis parte. Quæ res ut magis euidenter et manifesta fiat, omnia mensuram p. sedus sigillatim subiecti mus, ut in tabella deponitur ita ut manifestè cõstet, quod per pondus quæ singul. mensuris subiecta sunt, oleum, Vinum, & Mel, ex ordine demonstratur:

Ceramium Italicum habet		
Olei	Vini	Mellis
Libras lxxij.	libras lxx.	libras cvij.
	Chus sive Congius habet	
Libras ix.	libras x	libras xij. & dimidiam.
	Sextarius habet.	
Vncias xvij.	uncias xx.	uncias xxvij.
	Cotula sive hemina habet	
Vncias ix.	uncias x.	uncias xij. & dimidiam.
	Magnum Mystrum habet	
Vncias ij.	uncias ij. scrup. vij.	uncias iij. & dimidiam.
	Acetabulum habet	
Drach. xvij.	uncias ij. scrup. xij.	uncias ij. scrup. ix.
		Drach. xij.

Cyathus habet drach. xij. A
 sequuntur scrup. iij. unctas. ij. drach. ij.
 Parum Mylrum habet scrup. xx. drach. ix.

Onbassus autem iuxta Adamantium. Sextarium Italicum, vini quoddam iuxta mensuram, unctas. xxiij. habere ait: iuxta pondus vero lib. j. unc. viij.

Sextarium autem mellis, librum duarum & dimidiam pondus habere tradit.

De Mensuris Aridarum.

Mensurae aridarum

Aegypti Araba continet Modios. iij.

Modius Aegyptius & Italicus habet choenices. viij.

Choenix Sextarius. ij.

Sextarius semisextarius ij. qui & Heminae appellantur.

Hemina autem habet cyathos. viij.

Articus Medimnus continet Hemidecta. xij.

Hemidectum autem seu Semodius, choenices. iiij.

Quoslibet Medimnus habet Modios vi. choenices. xlviij. sextarios. xcvi.

Ceterum pondus harum mensurarum non facile est proficere, quod immensa diversitas rerum aridarum, iuxta lancei inclinationem existat.

Finis librorum ꝑ. Pauli Aegineti, Iano Cornario
 Medico interprete.

Pondera Latina ab interprete usurpata.

Libra	Vncias xij.
Deux	Vncias xi.
Dextans	Vncias x.
Dodrans	Vncias ix.
Bes uel Bessis	Vncias viij.
Septranz	Vncias vij.
Sextanz uel Semilla. habet	Vncias vi.
Quincunx	Vncias v.
Trens	Vncias iij.
Quadrans	Vncias ij.
Sextans	Vncias ij.
Vncia	Drach. viij.
Semuncia	Drach. iij.

S. haec nota dimidium pondus cuiusque ponderis significat, hoc est
 Semia. Reliqua pondera ac Mensurae iuxta Pauli
 traditionem usurpata sunt.



